





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4911/A/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4911/A/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4911/A/2




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
49111/A/2

4911/A
(2)

A xxix Per





50969
IOHAN. PAVLI

PER NV MIA
PATAVINI MEDICI
SVO TEMPORE LONGE
excellentissimi

NOVA AC PLANE SINGVLA-
*ris, omnes totius corporis humani affectus
præter naturam medendi ratio.*

OPVS EXIMIVM AC VERE AV-
reum, propterque methodum expeditam,
ac doctrinam præclaram, non solum inter
Neotericorum scripta admirabile, sed vel
antiquitati iure comparandum.

Nunc primum studio & opera


LAVRENTII SCHOLZII MED. VRA-
tislauienſis in Germania editum.

Cum S. Caſar. Maieſt. Privilegio.



FRANCOFVRDI

Apud Andreæ Wecheli hæredes, Claudium Mar-
nium, & Iohan. Aubrium.



LAVRENTIO SCHOLZIO

VRATISLAVIENSI, FILIO

suo vnico & carissimo.

PAVLO POST: SI DOMINVS DEVS
noster volet : Philosophiæ & Medicinæ
studiis operam daturō,

THERAPEVTICAM HANC PERNV-
mianam:quam ipse nunc, ad commodi pu-
blici bonum, prælo submittendam curat:

CVM PATERNO TVM CONSILIO,
tum voto:vt vbi tēpus aduenerit, istiusmo-
di & similium Scriptorū lectioni, qui simul
& summe vtilēs, & summe sunt necessarij,
præ alijs, incumbere velit, & beneficio gra-
tiæ diuinæ, in pium bonumq; virum: in do-
ctum Philosophum: & in salutarem Medi-
cum euadere queat:

LAVRENTIVS SCHOLZIVS, PHILO-
sophiæ, & Medicinæ Doctor, Pater, vt
Pater:

SICVT COMMENDAT ET DONAT:
ita simul precatur & optat:

TV PATER NOSTER QVIES IN
IN COELIS ANNVE.

X 2.

IOHANNIS PAULI PER-
NUMIA, MEDICI PA-
TAVINI

Ad Lectorem candidum

PRÆFATIO.



*A*dmirabuntur quam-
plurimi, quod post tot
doctissimos viros, qui
de curandis affectib.
præter naturam per-
tractarunt, ego unus
inter omnes forsan
primus, quamplurima in praxi non solum
utilia, sed etiam quam maxime necessaria,
ab omnibus fere practicis prætermissa, non
modo animaduerterim, sed eadem etiã per-
tractare ausus fuerim. Verum ubi aut ra-
tionem, aut Hippocratis & Galeni auctori-
tatem, aut utrumq; potius audire voluerint,
non puto quicquam amplius reliquum futu-
rum, quod aliquem merito torquere, aut an-
cipitem, ambiguumq; retinere debeat. Pri-
mum enim cum nihil reperiatur in uniuersa
arte medendi, quod ita nobis utile sit, ut
est

*Scriptum Sicut
Lance*

1.

PRÆFATIO.

est e a, qua de principiis, & arte curandi tra-
ctatio, quemadmodum a Galeno, in libris
 methodi medendi, iis verbis memoria pro-
 ditum fuit: non posse quenquam ullius artis
 scientiam nancisci, nisi methodo quadam
 habita per uniuersalia vocata theoremata,
 quod sine uniuersalium cognitione probe
 exercitatio non procedat, neque sufficiens
 Medicus quis effici possit, non modo non ma-
 gnarum agritudinum, sed ne minimarum
 quidem, etiam si innumera sibi pararit do-
 cumenta, qui methodi curatiua ignarus, &
 inexpertus fuerit, libro de puero epileptico.
 Nihilominus huiusmodi pars (cuius tanta
 dignitas est, ut vel sola sine aliis perfectum
 Medicum efficere possit) ab omnibus fere
 practicis omissa fuit. Deinde quod ars alendi
agros, ea quoq; prætermissa sit, cum tamen &
necessaria, & summopere difficilis existat.
 Necessaria sane, cum ex Galeno lib. de dign.
 & medic. aliis auxiliis non semper utamur,
 sed alimento carere nullum animal possit, si-
 ne valeat, siue agrotet. Difficilis autem, cum
 primo de diebus decret. pauci medici recte
 præscribant victum in agris, ob eam forte,
 quam II. meth. rationem assignat, quod ars

Methodus
 seu ratio
 nalis ars
 curandi est
 potissima
 pars medi-
 cinæ.

Διατητική.

P R A E F A T I O.

ipsa tota cum sit magna non leuissima eius
 pars sit, scientia ordinandi victus. Tertio lo-
 3. co quod ~~cum ad effectum rem perducunt nul-~~
~~la habita simplicium affectuum~~ ~~precogni-~~
~~tione, de compositis & implicitis affectibus~~
~~duntaxat pertractant~~, cum tamen simplex
 prius sit composito, 2. Meth. sub finem, & in
 ventis simplicibus facile sit composita adin-
 venire, 1. de diffic. respir. Vnde legitimum do-
 cendi modum ita mutarunt, & transforma-
 runt, ut veteris illius modi procedendi, nul-
 la amplius apud nos vestigia supersint, quod
 a Galen. etiam 3. metho. iis fere verbis ani-
 maduersum fuit, sane, inquit, solemnis vete-
 ribus doctrina (quae utinam nunc esset in
 usu) maxime naturalis est, quippe si simpli-
 cis cuiusque affectus propriam curationem
 dicunt, praecipueq; omnium Hippocrates.
 Medendi namque Methodus ad hunc mo-
 dum bellissime procedet, si de singulis simpli-
 cibus seorsim praeceperimus, mox de compo-
 sitis omnibus alteram aliquam methodum
 indicauerimus, cum ad hunc modum dun-
 taxat Artifices fiant, lib. de crisi bus, primum
 quidem, & maxime totius artis subiecta ma-
 teria simplices vires, mox ipsarum etiam co-
 positiones,

P R Æ F A T I O.

positiones, quot & quales sint agnoscendo. Quarto, quod cū affectus implicitos curare incipiunt, dū aliis instrumentis nec utuntur nec uti possunt, quā humores mobiles & præcipites, de uno ad alium locum mutando, nūc a versione, nunc repulsione, nūc deriuatione, immobiles vero, & qui non amplius retrocedere possunt, nunc emollitione, nunc maturatione, nunc digestionē, nunc attractione, nūc cauterisatione. Qualitatib. immutatos alterando, nunc condensatione, nunc emplasticatione, nūc rarefactione, nunc abstersione, nūc incisione. Nimia quantitate peccātes euacuando, nunc purgatione, nūc venæsectione. In visceribus obstructis ut edo apertione. In dissoluta membrorū compositione unione. In excrementis fluētibus, suppressione. In suppressis fluxione. Dum inquam prædicta omnia molliuntur, non adhuc scitur, quid sit auersio, quid repulsio, quid deriuatio, quid emollitio, quid maturatio, quid digestio, quid attractio, quid cauterisatio, quid condensatio, quid emplastisatio, quid rarefactio, quid abstersio, quid incisio, quid purgatio, quid venæsectio, quid apertio, quid unio, quid suppressio, quid fluxio, quibus modis inter se distinguantur.

P R Æ F A T I O.

tur, & qua arte fieri debeant, ut mirum sane sit, quomodo tot instrumenta, quorum natura adhuc non cognoscatur, recte tractari possint. Quintum, quod me ad scribendum s: impulit est, quia antiquorum medicamenta temporibus istis adeo sunt neglecta, ut nullus sit, qui suis potius quibusdam, quam aliorum compositionibus non uti malit, quod sane pessimi exempli est, quoniam si diuinissimam artem, quam obseruarunt antiqui in suis compositionibus, non intelligebant, saltem inspicere debebant, quantum antiquorum medicamenti tribuendum sit, exemplo Galeni, qui fere semper Antiquorum medicamenti uti maluit, quam noua introducere, utpote quod Galeno ea precipue medicamenta semper magis placuerint, quæ non solum arte composita, sed etiam multorum seculorum experientia sint comprobata. Has igitur ob causas videns artem medendi, eam præsertim, quæ in actione consistit, mancā esse, atque in-

Ordo dicē- coatam, operæ pretium facturum me existo-
dorum. i stimani, si artis curatiuæ principia primum tractarem, quæ præcuntia expedirent iter, atque animum lectoris, ac tanquam lucem quandam præcuntem ostenderent, qua via
progre-

P R Æ F A T I O.

progrediendum sit, qua non sit, ne nostros sequeretur, qui nullum legitimum modum, aut rationem observantes, quibus ad propositum sibi finem peruenire possint, non magis artem medendi docere potuerunt, quàm si naus clauum regeret ille, qui nomen quidem portus nosset, sed nec usum dirigendæ, obliquandæq; naus haberet, nec ullam viam, aut rationem cognosceret, qua ad illum portum possit perueniri. Vt non ab re horum errores detecti atq; indicati maxima exornent gloria seculo nostro viros eximios. Secundo artem illam curandi, & principia prioribus duobus libris declarata, in tertio libro ad ipsum experientia usum reuocaui, & quomodo in arte alendi agros includi debeant ostendi, ita ut quisque facile artem alendi, cum iis quæ in arte curandi palam expressa sunt, compositam videre possit, & libero cursu quancumque libuerit ab arte curandi ad artem alendi descendere, & rursum per totidem gradus ab arte alendi ad artem curandi ascendere. Tercio ulterius progressus, particulariter artem curandi vniuersam, singulis affectuum generibus, accommodare conati sumus, eamq; prioribus tribus libris quasi adumbratam,

P R Æ F A T I O.

posteriorib. quatuor libris quasi expressimus
 illam in affectibus simplicibus & solita-
 riis, quod simplicium cognitio, veluti princi-
 priorum naturam obtinetium prior existat.
 Et in simplicib. & solitariis a curatione cau-
 sarū incepimus, eo quod symptomata, & mor-
 bi, non nisi earū causis prius amotis remoueri
 possint. Et ex causis primum ab antecedente,
 quam a continente exordiū sumsi, q̄ conti-
 nens ex antecedente nascatur, & incrementū
 suscipiat, qua ratione quartū librū curationi
 cause antecedentis dicani, quintū curationi
 cause continētis, sextum curationi morborū,
septimum curationi symptomatum, ut ex iis
 præcognitionib. tanquā principiis, ac veluti
 cōmentariis quibusdā facile modo sit iter ad
 curationē affectuū simul implicitoꝝ, de quib
 practici in suis libris vberime pertractarūt.
 Verum ut quarto etiā satisfacere, dū affe-
 ctus hos simplices, & solitarios curo, nunc a-
 uersione, nunc repulsione, nūc aliis instrumē-
 e tis utens, singula instrumēta medica instru-
mēto diffinitiuo declarare conatus sum, sciēs
 quod ars & methodus docendi scientiarū &
 artū vita ac spiritus existit. Si quidē ars ani-
 mos addiscentiū stupidos, obtusos, desides, vr-
 get,

P R Æ F A T I O.

get, propellit, excitat & inflāmat, ac per cæ-
 ta & lubrica quasi manu ducit addiscentē, &
 (ut ita dicā) indicat & ostendit digito laten-
 tia plura, quæ per se absq; arte & methodo cō-
 siderata, vita ac spiritu priuata, ac ex toto
 mortua inhaerent. Quapropter uniuersas
partes huiusce artis propriis diffinitionibus
clausi, easq; tanquā principia quedā, & sum-
ma artis capita ad usum, & casus omnes ac-
commodaui, atq; utrunq; simul tanquā vin-
culo quodā adeo ligavi, ut facile quisq; casus
omnes, qui quotidie in manibus versantur,
ad sua principia reuocare possit, & rursus ab
iis diffinitionib. & principiis per singulos ca-
sus secure expatiari. Ne autē alicui ex quinq;
 rebus initio propositis deficere viderer libro
 octauo artē cognoscendi medicamenta, tū a
natura, tū ab arte facta conscripsi, & plura
medicamēta cōposita examinari, in quib. (ut
 opinor) liquido ostendi artē curādi prioribus
 libris enarratam, uniuersam in Antiquorū
 compositionib. inclusam fuisse, ut hinc Me-
 dici nostrorū temporū tot ineptis suis compo-
 sitionibus aliquando parcere deberent: qua
 ratione mirū alicui non erit, si hoc opere ego
 medicamētis aliorū, & praesertim quorundā
 doctissimorum recentiorum duntaxat usus

P R Æ F A T I O.

*fuerim, quod sane feci, tum quod omnia fere
ex Galeno ab ipsis transcripta fuerint, tum
etiam quod videntur huiusmodi medica-
menta aliis omnibus fore anteponenda, non
modo, quia mera arte composita, sed ob id
precipue, quod & ab antiquis, & a Galeno,
& ab hominibus etiam nostrorum tempo-
rum longissima experientia sint comproba-
ta. Hæc sunt amice Lector, quæ non ita facile,
aut paucò saltem labore, sed longi temporis
animaduersione, ex Galeni doctrina concepi,
quæ si bona quadam earum fortuna a te be-
nigne accipientur, curabo postmodum ut ha-
beas etiam uniuersam naturalem Philoso-
phiam hoc ordine dispositam, & hac
docendi via declaratam,*

Vale.

ANTONII

ANTONII POLI
VENETI

*De Iohan Pauli Pernumia Thera-
peutica*

I V D I C I V M.

PERNVMIA noster, almi collegii Patauini splendor, Patriæ & familiæ suæ ornamentum, Galeni & excellentissimorum Medicorum anima, Latinorum præceptor, sapientū amicus, utpote secundus Æsculapius, inter Antiquos est celebrandus, & inter modernos summe honorādus. In his libris non nouam Practicā, nec nouam in arte curandi opinionē videbitis: sed totam Medicorum, præsertim Galeni, materiam habebitis, non confusam, non informem, non ut chaos, & molem indigestam, sed intelligentia plenam, formatam miro ordine, atque optima compositione dispositam, maximum fructum afferentem **QVOD SI QVIS SEMEL HOC OPVS PERCVRRERIT.**

QVAMVIS MEDIOCRIS ERIT INGENII,
PRINCIPATVM APVD MEDICOS OBTINEBIT, ET
DOCTISSIMVS INTER PRACTICOS ERIT CENSEN-
DVS. A primis enim generibus in hoc
opusculo vsque ad vltimas species
specialissimas procedit., nullo mem-
bro, aut aliqua membri parte intacte
relieta, sed vera arte diuidendo (vt
docet diuinus Plato) quicquid ad ar-
tem curandi attinere potest, com-
plectitur.

MVSA IN IOH. PAVLI

Pernumia opus.

*Scripsit Arabs, Italus, Germania, Gallia, &
orbis*

*Totus, vt hac miseris arte pararet opem.
Insiste hac Methodo, nullus tibi grandior
Auctor.*

(Parcat & ipsa mihi Græcia) visus erit.

DE

D E EXCELLENTIA OPERIS
ad studiosum lectorem.


Τις τὸδε δεσπεύει ἀπ' ἐγερσιν ὁμοῖο ἐνείχθειν
ἢ δ' εἰς βίβλοιο αὐτμῆ;
Μῶν τις ἀφ' Ἑλλήνων λαμπραὶ γ' ἀκτίνες ἀπ' αὐτῶ
σιλβοῦσι κύων σοφίῃ;
Οὐκ αὖ ΠΕΡΝΟΜΙΗΣ κερυβάς ἀρετῶν δ' ἀπὸ παλαιῶ
δρέπειν ἀγλαΐεται ἄλλων.
Οὐ πέλειτ' ἱπποκράτης, ἀλλ' ἱπποκράτους πέλεται νοῦς
καὶ Γαλήνης θαλερὸν κῆρ.
Ταῦτ' ἄρα, ἱετῶν προτέρων μυελός, ῥαμμαίων
φῶς, κροσμήτωρ τε κρηθεῖς.
Ὡς πρὸς τοῦ αἰῶνος, ἐνὶ ἄρα θεῶα ἀρετῶν
τύσῃ καὶ ἀμφεκεν εἰρατῇ.
Τέρεψαι δ' ἀγχινόες, ἔσθ' ὄνταρ αἰὲν ἀρετῶ
φιλήκροτο, ἥ δ' ἐὶ ἰατρὸς.
Καὶ τὸν ἀπαλάμνοισι πρὶν δύσφατον οἶμῳ ἐπ' αὐτῇ
ῥάδιον δ' ὑμῶν λόντ' ἐποίησιν.
Εἶδεις φέρετο, ἀγρεῖς ἡδύπνοον αἴθερος, ἀκρύεις
ὅτ' ἐτήτυμος ἔπαλετο φωνή.
Μήδε φύες αὐτ', ἔτε σοφὸν γάλα πίτον ἀμέλξει
ἀλάμπετος εἶναι ἐθέλων.
Ἄλλ' ἄγε, τηλεθάσσι ἔαρ καὶ ἥλιον ὥρει
χαρίεις φάτο ἀνδινάτ' ἔρρα.
Ναὶ δὴ ταῦτα γε πάντα σοφῶς κεχαράγμενα, διδυῶν
ἔφρ' ὕμνέτης πῶν ὄφειλεν.

Wratisslauiæ F.B. Flamin.
Gasto. Silef.

INDEX SVMMORVM CAPITVVM SINGVLORVM LIBRORVM.

Primus	{	{	In Ge- nere	{	De Curationis arte
Secūdus					
Tertius		{	agit	{	Causę antecedentis Causę continentis, Morborum, Symptomatum Affectuum simul in plicitorum,
Quartus					
Quintus					
Sextus					
Septim ⁹	{	{	In spe- cie.	{	De Cu- ratione
Octavus					

JOAN.



IOHAN. PAULI
PERNUMIA PATAVINI
THERAPEVTICE,

SIVE MEDENDI RATIO AF-
fectus omnes præter naturam.

De curationis arte.

LIBER PRIMVS.

Curatio est depulsio affectuum præ- *Curatio*
quid?
ter naturam, existentium in corpore
humano, facta remedio contrario
recte administrato ut actiones læsæ
pristinæ suæ dignitati restituantur. Quæ diffi-
nitio ut intelligatur, declarandæ sunt omnes
particulæ in diffinitione contentæ. Porro de- *Depulsio-*
ampla signi-
ficatio.
pulsionem hoc loco intelligo, non pressæ mo-
tionem secundum locum, ut vocabuli vis in-
ferre videtur; sed ampla, & multiplici verbi
potestate, quæ omnem morbi transmutatio-
nem contineat, siue in substantia, siue in qua-
litate ea consistat, cum curatio, seu affectuum
depulsio, mutatione quadam sicuti affectus
induci, gigni que debeat. Etenim cum fiat per
contraria, & affectum præter naturam in cor-
pore inductum immutet, eique vim inferat,

A

2 DE CVRATIONIS ARTE

aliquid ea quidem efficit, hicq; eius motus effectio dicitur. Corpus vero patitur, & afficitur, hicque eius motus affectio est, atque per-
 pectio. Sic ex affectione tandem proficiscitur affectus morbo contrarius, quasi impressum curationis per contraria factæ vestigium. Quod deinde subiicitur, esse depulsionem

*Affectus
 præter na-
 turam.*

AFFECTVVM PRÆTER NATVRAM, notat quod-
 cunque genus dispositionis præter naturam,
 quod aut partes corporis, aut ea, quæ in cor-
 pore continentur, aut functiones, aut excre-
 menta humani corporis afficiat, quorum om-
 nium sicut naturalis status sanitas est, & di-
 spositio secundum naturam, ita vitium cuius-
 que affectus est præter naturam, quamquam
 non eodem modo, nimirum quod partium
 corporis vitiata dispositio, Morbus proprie,
 eorum quæ continentur morbi causa. Fun-
 ctionum vero, atq; excrementorum vitium,
 Symptoma appellatur, quare affectus præter
 naturam hoc loco ampla significatione sus-
cipitur, prout extenditur ad vitiatam natura-
lem dispositionem, tum causarum, tum mor-
borum, tum actionum læsarum, atque excre-
 mentorum. Et quod sequitur EXSISTENTIVM
IN CORPORE HYMANO, notat subiectum, in
 quo affectus existit, intelligendo per corpus
humanum, tum solidarum partium constitu-
 tionem, quarum affectus proprie morbum,
 tum humorum, quorum vitiatam dispositio-
 nem causas affectuum, tum functionum, at-
 que

que excrementorum, quorum euersionem, atque immutationem Symptomata dixi appellari. Circa quas partes non solum affectus præter naturam, sed etiam eorundem curatio versatur. Quod deinceps additum fuit, FACTA REMEDIO CONTRARIO, eo spectat, ut notet causam efficientem, ac materialem ipsius curationis, intelligendo per contrarium, id omne, quod vim infert, cum omnis morbi depulsio, atque curatio contrariis vim inferentibus perficiatur, aliter morbus nunquam profligabitur. Quo fit, ut contrarium hoc loco non in qualitate duntaxat sit intelligendum, verum etiam in quantitate, in numero, in situ, in figura, in omni denique genere, quod plurimum distet: ut calidum, refrigerandum: humidum, siccandum: rarum, incrassandum: densum, rarefaciendum: crassum, attenuandum: tenue, incrassandum: viscidum, incidendum: nimis separabile, emplasticandum: nimis adhærens, abstergendum: durum, molliendum: molle, indurandum: in quantitate & magnum, & paruum: altum, & depressum, contraria & ipsa sunt, & proprie nuncupantur aduersa. Quinimo hoc loco contrarietas adeo fuscè est intelligenda, ut etiâ ad quæcunque priuatiua extendatur: ut plenû, & inane: integrum, & corruptum: continuum, & solutum: ut non ab re ratum & constans existat apud Medicos axioma illud, curationem perfici per contraria. Etenim & si

*Contrariū
quid?*

4 DE CVRATIONIS ARTE

*Quomodo
intelligen-
dum cura-
tionem
fieri, ex si-
milis*

affectus quidam remediis similibus videantur
depelli, cum rhabarbarum, quod calidum est,
febrem soluat, lassitudinem exercitatio leni-
at, vomitionem vomitio sedet, dysenteriam
purgatio leuet, frigida larga perfusio conuul-
sionem, ut est apud Hippocratem, soluat: Eo-
rum tamen causis primum, ac per se aduersa
sunt, & si morbis similia sunt, morbos tamen
non tollunt per se, sed ex accidenri, sublatis
eorum causis. Hoc modo rhabarbarum quam-
uis calidum, febrem tamen soluit, dum ipsius
materiam expurgat: lassitudinem exercitatio
lenit, dum humorem per musculos diffusum
discutit: vomitionem sedat vomitio, dum pro-
ritantem humorem excutit: dysenteriam pur-
gatio leuat, dum materiam eius efficientem
causam detrahit: atque ad eundem fere mo-
dum, frigida larga perfusio conuulsionem sol-
uit. Quod postmodum additur REGTE AD-
MINISTRATO, VT ACTIONES LAESA PRISTINAE 2
SVAE DIGNITATI RESTITVANTVR, eo spectat, ut
notet finem artis curandi, ac modum, ac ar-
tem assequendi finem illum. Quae quidem cu-
randi ars, recte, & conuenienter fiet, si trium
praeipue habebimus rationem, AFFECTVS, LO-1, 2
CI AFFECTI, & ipsiusmet REMEDII. Amplius & 3.
CIRCvNSTANTIARVM, quae sane in arte i-4.
ipsa curandi sunt maximi momenti. Ex quo-
rum distincta, & exquisita cognitione, cum
ars ipsa curandi, rectam, distinctam, & exqui-
sitam sui cognitionem ducat, sequitur profe-
cto,

*Ad artem
curandi, ut
recte, & con-
uenienter
fiet, 4.
requiruntur*

cto, vt horum quatuor capitum naturam distinguamus, incipientes ab affectu, quod, vt ait Gal. I. de comp. med. secundum genera 4. a morbificis dispositionibus primus curationis scopus nascatur, licet particularum affectuum natura simul cū illis indicat curationem, cum quibus etiam aeris temperies, ætas, regio, tempus, vitæ studia, & mores. AFFECTVS igitur, primum exquisitissime erit diuidendus, quia aliud remedium postulat affectus simplex, & solitarius: aliud vero affectus compositus, & alteri affectui associatus. Et affectus simplicis aliud causa, aliud morbū, aliud symp̃toma. Et causarum aliud antecedens, aliud continens. Et antecedentis, aliud vitium penes motum localem, aliud qualitas, & vitia; ta quantitas aliud, motus quidem præcepta a uersione, qualitas alteratione, quantitas vero vacuatione. Et in qualitate aliud vitium primarum qualitatum, aliud secundarum, ob id 2 in primis calfactos emendat refrigeratio; frigidos calfactio, humectos exsiccatio, siccos humectatio, & in compositis eodem modo calfactos, & humectos refrigeratio, & exsiccatio; calfactos & exsiccatos, refrigeratio, & humectatio; frigidos, & humidos calfactio, & exsiccatio: frigidos, & siccos, calfactio, & humectatio. In secundis densos rarefactio, raros condensatio, nimis separabiles emplastificatio, nimis adherentes absterfio, nimis crassos incisio, nimis tenues emendabit incrassatio, &

I.
Affectus,
est q̃ duplex.

Causa an-
tecedentis
vitium
triplex.

*Humoris bi-
lii si emen-
datio.*

Pituitosi.

Melancholici.

*3.
Plebotomia.*

*Pharmac-
ia.*

*Causa con-
tinentis
vitiis.*

in compositis ex primis, & secundis, aliud etiam, atque aliud, vt calidos, & siccos nimis acres, & attenuatos (quod vitium compositum bilis esse solet proprium) refrigerantibus, humectantibus, & simul incrassantibus, atque emplasticantibus, & si præter hæc ratione nimie tenuitatis præceptum erit ad motum, simul cum illis astringentia requireret. Frigidos vero, & humidos, densos, crassos, & glutinosos (quod vitium compositum humoris pituitosi solet esse familiare) calefactio, exsiccatio, attenuatio, incisio, & absterfusio simul. Frigidos vero, & siccos, & crassos (quod vitium compositum humoris melancholici solet esse proprium) calfacientibus, humectantibus, & incidentibus, iuuabimus: vacuatio autem, quæ vitium quantitatis emendat, si vitiosum simul cum utili vacuabitur, phlebotomia, sin autem vitiosum solum, & id quod qualitate peccat utili relicto pharmac-ia vocabitur. Et quoniam humor vitiosus utili relicto, vel simplex, vel implicitus esse potest, simplex igitur aliud, aliud compositum postulabit, & simplicis aliud bilis, aliud pituita, aliud melancholia, & compositi, aliud bilis, & pituita simul, aliud bilis, & melancholia simul, aliud pituita, & melancholia simul, & aliud bilis, pituita, & melancholia simul. Hæc de vitiis causæ antecedentis. CONTINENS vero causa, Aliud materia quæ a loco remeare poterit, aliud, quæ omni fluendi remeandique habilitate erit dotata,

tata, Aliud vero ea cuius pars remeare possit, pars vero remeare non possit. Nam quæ remeare poterit, repulsione & deriuatione. Eiusdem qualitates opposita emendabuntur alteratione, sicuti emendantur vitia causæ antecedentis. Eiusdem quantitas vacuatione. **B** tolletur, particulari quidem phlebotomia, vbi vitiosum vtili simul permixtum vacuabitur, purgatione vero particulari, vbi noxius solum humor in membro contentus vtili relicto eiiciendus erit. Et quia vel simplex, vel composita (eodem modo sicuti diximus in causâ antecedenti) causâ continens esse potest. Simplex igitur humor, simplex purgans, compositus vero compositum postulat. Vbi autem causâ continens nullo vacuandi genere vniuersa erit ablata, reliquum digestionem erit tollendum. Hæc de causâ continente, quæ a loco remeare possit. Vbi autem materia a loco remeare nō poterit, cum id præcipue contingat, quod dura euaserit, tunc emollitione, & pro cuiusque duritie specie, vario emolliendi genere, erit vten- dum, amplius maturatione, & loci ipsius incisione. Vbi autem materia ita pertinaciter, & in profundo existet, vt nullo enarratorum instrumentorum euacuari possit, attractione violenta, dropace scilicet, & sinapismo, atque etiam cauterio erit vten- dum. Cuius generis illa quoque videntur esse Escharotica, id est, crustifica. Septica,

*Morborum
distinctio.
Intemperies
est quadruplex.*

id est, putrefacientia, & vrentia. Hæc de
distinctiōe causarum. Sequitur MORBUS,
cuius natura, & ipsa exacte erit distinguenda,
quod aliud intemperies, aliud obstructio, ali-
ud vnitatis solutio, & aliud inflammatio. Et
intemperierum, aliud intemperies simplex,
aliud composita, & aliud quæ sine materia est
causa: aliud vero quæ cum materia erit asso-
ciata. Et simplicis, aliud calida, aliud frigida,
aliud humida, aliud sicca, quod calida indicet
frigidum, frigida calidum, humida siccum,
sicca humidum. Et in compositis calida, & hu-
mida tollatur frigidis & siccis; calida, & sicca
frigidis, & humidis; frigida, & humida calidis
& siccis; frigida, & sicca calidis, & humidis,
Et ubi intemperies erit associata cum mate-
ria, non solum indicabit alterationem per
contraria, sed ulterius adhuc compositā ma-
gis exhibebit indicationem, nempe ratione
intemperiei communem indicans indicatio-
nem, cum intemperie simplici sine materiæ
affluxu, & præter hanc ratione materiæ indi-
cabit euacuationem. Materia autem, cum sit
& ipsa confusa, nec possit nisi sui ipsius con-
fusam indicationem præbere, ulterius erit di-
stinguenda, vtrum sit fluxa, an fluxura, an par-
tim fluens, partim fluxura, & quodcunque
horum sit, ulterius erit distinguenda, vtrum
hæc materia sit tota bona, vel tota mala, vel
partim bona, partim mala, quoniam quæ to-
ta bona erit, præsertim si etiam cum boni-
tate,

tate, coniuncta reperiatur nimia quantitas, indicabit quidem euacuationem, sed determinatam per phlebotomiam, quæ vero tota mala, euacuationem quidem, sed determinatam per pharmaciam, quæ partim bona, partim mala, euacuationem per hoc, & illud instrumentum. In OBSTRUCTIONE vero perpendendum erit, vtrum sit coarctatoria, an vero attenuatoria, an potius oppilatiua. Et si oppilatiua, cum huius obstructio fiat a re intus hærente, atque obstruente ductus, seu vias organorum, distinguenda erit materia illa obstruens, vtrum sit naturalis, vel præter naturam, an potius media inter id quod naturale est, & præter naturam, & si naturalis, vtrum sit solida, veluti caro, vel callus durus in meatu vrinæ existens, cum caro sit res naturalis, sed genita in loco, in quo non deberet gigni, an potius fluida, veluti est sanguis in plethora replens venas, ex cuius repletione obstruente impeditur spirituum progressus. Sin autem res obstruens præter naturam sit, vtrum mollis sit, veluti pus in venis: an potius dura. Et si dura, vtrum possit colliquari, veluti sunt feces duræ in intestinis, quæ possunt mollificari, vel non possit colliquari, cuiusmodi est calculus in vesica. Sin autem media, vtrum sit media, veluti sunt humores crudi, de quibus secundo de facultatibus naturalibus, qui & si nondum acceperint opus naturæ, apti tamen sint verti, an vere media sit, & quod acceperit qui-

OBSTRV-
CTIO tri-
plex.

dem opus naturæ, sed inepta sit vt amplius fiat corporis pars. Sin autem morbus erit VNI-

VNITATIS
SOLVTIO
duplex.

1. *Vulnus.*

TATIS SOLVTIO, perpendendum erit, vtum vnitatis dissolutio pura sit, quæ vulnus appellatur: an impura, quæ vlcus dicitur, & si pura, vtum in dissoluzione, propriæ substantiæ portio deperdita fuerit, & hæc vulnus cauum dicitur, an vero in dissoluzione, nihil substantiæ deperditum sit, quæ vulnus simplex dicitur. Et si vulnus est simplex, considerandum erit, an sit longum, an breue, an rectū, an obliquum, an cutem solum occupans, quod appellatur summum, seu superficiarium, aut in carnem, & subiectas partes inflictum, & appellatur profundum. An vero partibus omnibus sit summum, aut partibus omnibus profundum, aut partibus omnibus angustum, aut partibus omnibus latum, & appellatū sit vulnus æquale, an altera parte summum, altera profundum, altera latum, altera angustum, quod appellatur inæquale. Sin autem vnitatis dissolutio sit impura (vlcus dicitur) an sit impura ratione materiæ, quæ vlceri succrescit, & progignitur, an vero ratione materiæ, quæ vlceris est causa. Et si ratione materiæ, quæ in vlcere progignitur, vtum vlceri adhærescat, veluti concreta (appellatur sordes) an vero non adhæreat, vlceri, sed defluat, atque illud quod defluit, vtum sit animatum, (appellantur vermes) qui cum putredinis, tum sordis soboles sunt, solentque
in

2. *Vlcus.*

Sordes.

Vermes.

in neglecto vlcere procreari, an vero inanimatum. Et si inanimatum, vtrum sit tenuissimum, minime glutinosum, nec subalbidum, subrubrum, (appellatur sanies) quæ defluere solet ex vlcere crudo, non tamen maligno, quia quod ex maligno defluit, virus nomen obtinuit. An potius sit crassior, glutinosior, subalbida, (appellatur pus) quod solet in sanescente vlcere fluere. Sin autem impura sit, ratione materiæ, quæ vlcis est causa, vtrum ratione continentis, an antecedentis, & si ratione continentis, vtrum efficiat tumorem, vnde vlcus phlegmonodes, erisipelatodes, œdematodes, & carcinodes, quod cancer exulceratus dici solet. An vero sit sine tumore, ab humore bilioso, acri, mordace, vnde vlcus exedens, & ambulans, quod si solam cutem exedat, phagedæna dicetur. Vlcus cacoethe, id est, ægre sanabile, quæ quod ad cicatricem difficile ducantur, Græcis dysepulora nuncupantur, vel si cicatrice tenui interdum obducantur, mox disrupta vlcus renouant, exulcerato cancro simile, cuius generis sunt telephia, & iis veteriora chironia, & vlcus putridum, in quo non solum id quod exit, sed vlcis causa, cadauerosa sit, & hoc vel ex sola humoris perniciæ, vel quod calor arteriarum insitus ob arteriarum obstructionem sit extinctus. Sin autem sit impura ratione causæ antecedentis, perpendendum erit, an sit intemperies, vel tumor, aut varix,

*Sanies.**Virus.**Pus.**Vlcera cum
tumore.**Vlcera sine
tumore.**Phagedæna
vlcus caco-
ethe.**Telephia.
Chironia.*

aut contusio, an viscerum, præsertim iecoris, & lienis mala constitutio, quod hæc, cum vlceri materiam pabulumque suggerant, vlcus agglutinari non sinunt, neque carne impleri, neque cicatrice obduci, ni prius auferantur, & conuenientem naturæ suæ modum obtineant. INFLAMMATIO vero, quod aliud remedium postulet ipsamet inflammatio, aliud vero vitia, quæ inflammationi succedere solent, & in inflammatione perpendendum erit, an prouenerit ratione fluxionis, an vero ratione congestionis, sensim scilicet ex sanguine in partem vice alimenti distributo. Et si ratione fluxionis, vtrum fluxio sit ratione causarum interiorum, an euentium, & si ratione interiorum, an sit ex fluxuri sanguinis copia, an eius acrimonia, vel tenuitate, an propellentis partis robore: an viarum laxitate, vel excipientis partis imbecillitate, situe decliuiori. Et si ratione euentium, an ratione contusionis, an vulneris, an laxationis, aut alterius similis causæ doloris, aut caloris vi fluxionem sanguinis accersentis. Sin autem sit inflammatio ratione congestionis, an congestio fiat ratione imbecillitatis ipsius partis, cuius ratione affluens alimentum in propriam substantiam mutare non possit, an potius ratione partis vitiata, quæ illum corrumpat, nec genita excrementa a se propellere queat, vnde necessaria fiat in parte sanguinis congestio. Vitiorum autem inflammationi succedentium,

INFLAMMATIO, ratione fluxionis.

Ratione congestionis.

rium, vtrum sit ratione materiæ inflammatio-
 nis, extra venas putrescentis, an vero ratione
 loci, in quo continebatur materia inflamma-
 tionis. Et si ratione materiæ extra venas pu-
 trescentis, vtrum sit tantæ putredini associata,
 vt nequeat ab insito calore vinci, ita vt caloris
 flos pereat, & extinguatur, & pars incipiat
 corrumpi (gangræna appellatur, qua vitio- *Gangræna.*
 rum, qua phlegmonis, aliisque tumoribus
 succedunt, non aliud peius) An vero pars li-
 uescat, & nigrescat prorsus cadauerosa sine
 arteriarum pulsû, aut dolore, aut vlllo sensu,
 itaque iam eo processerit, vt pars corruptio-
 ne extincta, & emortua sit, (sphacelus, seu sy- *Sphacelus.*
 deratio appellatur) in carne quidem, cæteris-
 que partibus, sphaceli nomen retinens, in os-
 se vero cariei nomen assumens. An vero ma- *Caries.*
 teria inflammationis ab insito calore vinca-
 tur, & concoctione in pus facessat, quæ puris
 collectio absolute erit abscessus. Sin autem *Abscessus.*
 ratione loci, qui sane apparet expurgato ab-
 scessu, vtrum venter ille, & obtecta latensque
 capacitas, quæ a pure fit diu coercito, proxi-
 mas partes tendente, & sinuante, non sit ar-
 ctus, nec oblongus (sinus appellatur) an vero *Sinus.*
 sinus ille arctus sit, & oblongus longiore du-
 ctu, pus emittens, & fistula erit. Hæc de mor- *Fistula:*
 bo. Sequitur SYMPTOMA, in quo sane perpen- *Symptoma*
 dendum erit, vtrum sit actio læsa, an vero mu- *duplex.*
 tatum excrementum. Est si actio læsa, an sit
 naturalis, an animalis, an vitalis, & si naturalis,

*De actioni-
bus natura-
libus laſis.*

*Attractio
diminuta.*

*Attractio
abolita.*

*Appetitus
abolitus.*

*Attractio
deprauata.
Sitis immo-
derata.*

*Retentio di-
minuta.
Cœliaca.
Lienteria.*

Eingultus.

*Concoctio
læſa.*

utrū ſit earū, quæ facta ſint propter indiuiduū,
an earū, quæ propter ſpeciem, & ſi earū, quæ
propter indiuiduum, an ſit principalium, an
vero deſeruientium principalibus. Et ſi deſer-
uientium principalibus, an ſit attractio, an re-
tentio, an concretio, an expulſio. Et ſi eſt at-
tractio, utrum ſit diminuta, veluti eſt affectio
illa, quæ appetitus imminutus dicitur, an ab-
olita, veluti eſt affectio illa, quæ cibi faſtidium,
ſeu inappetentia, ſiue appetitus abolitus dici-
tur, cuius cauſa impedita, ſolet eſſe deſinentia
ſenſus exſuctionis ipſarum venarum. Cauſa
autem deſinentiæ eſt nimia repletio, huius
autem, quod non fiat euacuatio: quæ quidem
cauſa ſi adeo non ſint magnæ, affectionem e-
tiam inducunt, non adeo magnam, & aboli-
tam, ſed diminutam, atque exiguam inappe-
tentiam. An vero attractio ſit deprauata, ve-
lut eſt Symptoma illud, quod ſitis immodera-
ta appellatur, quæ ab intemperie calida, aut
ſicca, aut calida, & ſicca ſimul ſine bile, aut
cum bile, progigni ſolet. Sin autem læſa ſit re-
tentio, an ſit diminuta, veluti eſt affectio illa
quæ Cœliaca dicitur, an abolita, veluti eſt Sym- 4
ptoma illud, quod lienteria dicitur, cuius cau-
ſa ſolet eſſe intemperies frigida, raro calida, &
exulceratio inteſtinorum. An vero deprauata,
veluti quoquomodo affectio illa, quæ ſingul-
tus dicitur, cuius cauſa ſolet eſſe, aut repletio,
aut inanitio, aut calida intemperies cum ma-
teria acri. Sin autem læſa ſit concoctio, an ſit
dimi-

diminuta, velut sunt Symptomata illa vt flatus, seu inflatio, & tarda concoctio (*bradypepsia* dicitur) cuius causa solet esse omnis intemperies ventriculi vel propria, vel alterius vitiata, quamquam quia calor diminui soleat, a frigidityte, ad intemperiem frigidam saepius sit reducenda. An vero sit abolita, veluti est Symptoma illud, quod cruditas ventriculi dicitur, & *aepsia* appellatur, ab eadem causa procedens, a qua concoctio diminuta, sed vehementiori. An vero concoctio sit deprauata, veluti est Symptoma illud, quod cibi corruptio, seu *dyspepsia* dicitur, cuius causa solet esse, aut aliena cibi qualitas, aut vitiosi humoris permixtio, aut vtendi ordo præposterus, vt cum liquidiora post solidiores cibos eduntur. Sin autem læsa sit expulsio, an sit diminuta, velut est Symptoma illud, quod tarda alui deiectio dicitur, quæ ab intestinorum obstructione ratione siccarum fecum, vel crassæ lentæque pituitæ progigni solet. An abolita, veluti est Symptoma illud, quod ileos dicitur, cuius causa solet esse obstructio intestinorum, præsertim graciliū, atq; eorundē inflammatio. An potius sit deprauata, veluti singultus est, cuius causam diximus esse, aut repletionem, aut inanitionem, aut calidā intemperie cū materia acris, & nausea, & vomitio, quæ ab humorum copia, & eorundem qualitate, seu vitiositate progredi solent. Sin autem principales propter indiuiduum factæ, læsæ sunt: perpenden-

*Bradypepsia**Aepsia.**Dyspepsia.**Expulsio
læsa.**Alui tarda
deiectio.**Ileos.**Singultus.**Nausea.**Vomitio.*

*Nutritio
laesa.*

*Hepatica
affectio.*

Hydrops.

Atrophia.

Cachexia.

dum erit, an laesa sit nutritio, an auctio, & si laesa est nutritio, an sit diminuta, velut est Symptoma illud, quod Hepatica affectio appellatur, cuius causa solet esse, intemperies quaecunque & calida, & frigida, & humida, & sicca, & Hydrops, & Sarcites, & Ascites, & Tympania, quae ab intemperie frigida progigni solet: quamquam haec potentia sanguificatiuae epatis proprie magis videantur esse Symptomata. An vero nutritio sit abolita, veluti est atrophia, seu tabes, in qua corpus sensim, & paulatim exarescit, & absimitur. Cuius causa, esse solet humor in venis contentus, caloris, & substantiae bonitate, saepe etiam fibris, quibus concreascit, destitutus, qui partibus neque adharefcere, neque assimilari potest. Huius autem principis alicuius visceris affectus, veluti in corde, febris hectica, & exulceratio in pulmone, quamquam etiam a ventriculi, lienis, iecorisq; grauioribus affectibus procedere possit. An potius nutritio sit deprauata, praesertim corporis vniuersi, veluti symptoma illud quod Cachexia dicitur, seu vitiosus totius corporis habitus, quamuis ad quid habeat reduci cachexia, non reperiatur in Galeno patefactum. Cuius causa solet esse humorum cruditas, in venas, & habitum corporis vtilioris vice alimenti rapta, qui & si partibus singulis apponantur, & glutinentur, cum tamen perfecte non assimilentur, sequitur vitiata nutritio, in qua vitiatus humor pro vtili dissipato

dissipato reponitur. Cruditatis autem causa
est ventriculi, & viscerum imbecillitas, quam-
quam etiam ab impuris, & vitiosis alimentis
ortum trahat. Sin autem sit generatio læsa (nā *Generatio*
auctioris symptomata apud medicos non e- *læsa.*
narrantur) quæ est auctio facta propter spe-
cierum cōseruationem, perpendendum erit,
an sit diminuta generatio, veluti est sympto-
ma illud quod ignauia partiū genitalium, seu
impotentia rei Veneræ dicitur, quamquam *Impotentia.*
huius symptoma non videatur ita proprie ge-
nerationi diminutæ conuenire. Cuius causa
solet esse seminis inopia, vel pudendorum re-
solutio, ob aliquam frigidam intemperiem in
ipso exortam. Huc quoque pertinere videbi-
tur symptoma illud, quod priapismus dicitur, *Priapis-*
in quo stat erectum membrum, absq; rei ve- *mus.*
neræ appetentia. Cuius symptomatis causa
esse solet, vel arteriarum, vel fistulosi nerui, vel
vtriusque repletio. Huius autem repletionis
causa est spiritus vaporosus, huius autem hu-
mores viscosi, ac crassi, & caliditas moderata.
An vero generatio sit abolita, veluti est sym-
ptoma illud, quod sterilitas appellatur, nam *Sterilitas.*
tamen si sterilitas proprie magis videatur esse,
conceptionis priuatio, tamen, cum conceptio
ad generationem sit ordinata, hoc symptoma
huc reduci poterit, cuius causa solet esse, aut
vitio mulieris, aut maris, & hoc aut vitio par-
tium obscænarum, aut aliorū viscerum, præ-
sertim vbi cachochymia laborabunt, & hoc,

B

quod semen nec ex vtili materia produci possit, nec spirituum benignitate perfundi. An potius generatio sit deprauata, cuius symptoma non inuenitur apud artis Medicæ professores. Sed hæctenus de actionibus naturali-

De actionibus animabilibus læsis.

bus læsis. Sequitur actio læsa ANIMALIS, in qua perpendendum erit, vtrum sit læsa motiua, an sensitua, seu cognoscitiua, an vtraque simul, & si cognoscitiua, an exterior, an interior. Et si exterior, an visio, auditio, odoratio,

Visio diminuta symptomata.

Nyctalopia.

gustatio, tactio. Et si visio, an sit visio diminuta, cuius est symptoma illud, quod Nyctalopia an Græci, quidam nocturnam cæcitudinem dicunt, in qua affectione die quidem vident, sed occidente Sole obscurius, & noctu nihil omnino: & symptomata, etiam alia sunt tria,

Difficilis discretio.

quorum vnum hebetudo, alterum lusciositas, reliquum vero difficilis discretio videndi dicitur, quorum trium symptomatum causæ esse solent in spiritu, qui cum ad acute & distincte cernendum multus ut sit oporteat, & æthereus, si in aliquo horum deficiat, causa fiet alius cuius enarratorum symptomatum. Nam si multus erit, & crassus, longinqua quidem, & vicina quoque videbit, vix tamen illa discernet, si autem paucus erit, licet sit æthereus, lusciositatis erit causa, in qua propinqua quidem videmus, distantia vero haud quaquam discernimus: ubi autem & paucus & crassus erit, causabitur hebetudo, quæ senum fere vitium existit, in qua neque distantia videntur,

Lusciositas.

Hebetudo.

neque

neque propinqua discernuntur. An vero visio sit abolita, cuius est symptoma, illud, quod obscuritas, siue offuscatio oculorum dicitur, in qua cernendi sensus deperditur. Cuius causæ solent esse quodcunque morbi genus, aut intemperies, aut solutio cōtinui, aut mala compositio partium visioni deseruientium. An potius visio sit deprauata, cuiusmodi solet esse symptoma illud quod hallucinatio dicitur, cuius causa solet esse corneæ tunicæ infectio ab alieno colore, quo etiam foris omnia tincta cernuntur, vt in ictero citrina etiam contingere solet. Sin autem sit læsa auditio: an auditio sit diminuta, cuius est symptoma illud, quod grauis auditio dicitur, qua affectione laborantes audiunt quidem, sed difficile, & cuius causa potest esse quodcunque morbi genus: An vero auditio sit abolita, cuius est symptoma illud, quod surditas dicitur, in qua laborantes neque exiguas, neque magnas voces percipiunt, quæ & ipsa quodcunque morbi genus sequi pōt. An potius auditio sit deprauata, cuius esse solēt huiusmodi symptomata, auriū sonitus, tinnitus, sibilus, fluctuatio, strepitus, quorū symptomatum cā solet esse flatus vario modo obambulans. Sibili quidem, vbi tenuis flatus exiliter elabetur: Tinnitus, vbi interrupte curret. Sonitus vero, vbi & crassior, & plene erumpet. Strepitus vero, vbi valide impellitur. Fluctuationis vero vbi iactabitur. Sin autem læsa sit odoratio, an sit diminuta, an abo-

*Obscuritas.**Hallucinatio.**Auditus læsi symptomata.**Grauis auditio.**Surditas.**Sonitus aurium.**Sibilus.**Tinnitus.**Strepitus.**Fluctuatio.**Odoratio**læsa.*

*Odoratio
læsa.*

*Gustatio
læsa.*

*Tactio læsa.
Stupor.*

*Paralysis
imperfecta.*

*Doloris dif-
ferentia.
ratione loci.*

Punctitius.

lita, an vero deprauata. Cuius actionis sympto-
ma vñico capite apud Practicos expediri solet
sub hoc titulo de læsione olfactus, & nariū vi-
tiis, cuius affectionis causa esse solet, vel ob-
structio colatorii meatus, vel intemperies fi-
nium cerebri, aut sola, aut cum materiæ afflu-
xu. Sin autem læsa sit Gustatio, An sit diminuta,
an abolita, an potius deprauata, cuius actio-
nis symptoma nullū reperitur apud practicos.
Sin autē sit læsa tactio, an sit diminuta, cuius-
modi est symptoma illud, quod stupor appel-
latur, in quo sensus tactus torpet, & hebescit.
Cuius causa solet esse aut facultatis, aut ner-
uorum imbecillitas, huius vero, aut ætas: aut
causa vires resoluens, quanquam & a neruorū
obstructione, a lentis crassisque humoribus,
quæ sit tamen maior quam in tremore, leuior
vero quā in paralyti; an vero tactio sit abolita,
cuiusmodi solet esse symptoma illud quod pa-
ralysis imperfecta dicitur, in qua deperditur
sensus constante motu, cuius causa solet esse
prohibitio influxus, & distributionis ipsorum
spirituū. Huius vero, quodcunq; fere morbi
genus, aut intemperies frigida a viscidis humo-
ribus causata, aut Inflammatio, aut Scirrhus, aut
Cerebri, aut Spinalis medullæ, aut alicuius
nerui. An potius tactio sit deprauata, cuius so-
let esse symptoma illud quod dolor dicitur. Et
in dolore quærendum erit an proueniat ratio-
ne loci, in quo reperitur, an vero ratione ma-
teriæ, quæ ipsum efficit, an poti⁹ vtriusq; rōne,
& si ratione loci, utrū sit punctitius dolor, qui

membranarū solet esse proprius, & hoc, quod
 cū membrana sit membrū solidū ac densū,
 vndiq; maxime resistens, nō sinit dilatare ma-
 teriam, seu qualitatem dolorem efficientem.
 An vero sit tractivus, qui neruorum solet esse *Tractivus.*
 proprius, cum neruus sit membrum quod tē-
 ditur vel a caliditate exsiccante, vel materia
 humectante neruum, sicuti tendūtur chordae
 cytharædorum. An vero dolor sit lacerativus, *Lacera-*
 qui membranarum quæ carni commiscetur, *tivus.*
 solet esse proprius, in quo membrana videtur
 a carne diuelli, & separari; an potius perfora- *Perfora-*
 tivus, qui videtur quasi terebello membrum *tivus.*
 perforare, membrorum crassorum proprius,
 veluti sunt tria intestina inferiora. An vero do- *Gravativus*
 lor sit gravativus, qui solet esse proprius mē-
 brorum ægre sentientium, cuiusmodi sunt
 renes, & epar, quæ non sentiunt nisi ex cōsen-
 su membranarum, illa contangentium. An vero
 pulsativus, arteriarum duntaxat proprius. Sin *Pulsativus.*
 autem proveniat ratione materiæ, quæ ipsum *Doloris dif-*
 efficit, vtrum proveniat, a qualitate ipsius ma- *ferentia*
 teriæ, an vero ab ipsamet materia, & si a quali- *ratione*
 tate materiæ, vtrum sit mordicativus, qui ab *qualitatis*
 humoris acutie provenire solet, seu humor *materia.*
 frigidus sit, seu calidus. Nā tametsi aliter cali- *Mordica-*
 ditas, aliter frigiditas dolorē causet, nēpe quod *tivus.*
 caliditas dilatando continuū soluat, frigiditas
 vero cōprimendo, & exprimendo, vna tamen
 sequitur forma doloris, quæ mordicativa di- *Seu pefa-*
 citur. An vero stupefactivus, qui nihil aliud est *ctivus.*
 nisi via quædam ad resolutionem, seu paraly-

Exasperatius.

*Differentia
ratione mul-
ta materia
Compres-
sius.*

*Contusius.
Differentia
ratione
vtriusque
Extensius.*

Vlcerosus.

Pruritiuus.

*Differentia
ratione par-
tiū corporis.*

Colicus.

Nephritius.

*Articularis
estque tri-
plex.*

sin, id est, amissionem sensus: qui a materia frigida occurrente membro pauci caloris, ac spiritus, & parum resistente contingere solet. An vero sit exasperatius, qui a materia sicca occurrente membro sensibili contingere solet, sicuti cum fauces ab aliqua re sicca exasperantur. Sin autem proueniat ratione materiae, an sit B compressius, qui non a qualitate, sed a materia multitudine in aliquo loco angusto contenta procedere solet. An vero contusius, qui a duritie materiae, sicuti lapidis sui duritie contundentis, & souentis continuum, progredi solet. Sin autem proueniat ratione vtriusque simul, materiae scilicet, & subiecti, seu loci, an sit extensius, qui vel a multitudine vel a flatulentia materiae, & simul angustia loci, procedit, cavitatum membrorum, & musculorum proprius, a Galeno pro primo lassitudinis specie positus, an vero vlcerosus, qui a materia acris & pungitiua in subiectum sensibile agente procedit, & reponitur in secunda lassitudinis specie, an potius pruritiuus, qui a materia tenui, penetratiua ad superficiem, & non potest diffilari in subiectum densum agente procedit, familiaris cuti ratione suae densitatis. Nam reliqui dolores diuersitatem sumere solent ex diuersitate partiū corporis, veluti dolor colicus appellabitur, qui exercebit colon intestinum: nephriticus qui est acerbissimus renum cruciatus, aut certe vreteris, cuius est sensus eximius. Articularis qui articulos membrorum corporis, ex interuallis inuadit: cuius arthriti-

dis differentiæ ex articulorum numero statui solent, quanquam tribus duntaxat vsus nomina indidit, hæc sunt Chiragra, Ischias, & Podagra. Nā quicunq; alius in alio quouis figatur articulo, generis nomine Arthritis appellari solet: Lateris dolor, capitis dolor, qui si vehementer dolorificus, diuturnus, ac difficile solubilis erit, & ex facili occasione vehemētes habēs occasionēs. 3. de locis aff. & 2. de cōp. med. prin. lo. Cephalæ nomen acquiret. Sin autē recens erit, & caput vniuersum occupās, Cephalalgia esse dicetur, recens quidem ad differentiā Cephalæ, totius aut capitis ad differentiā Hemicranæ, quæ tunc Hemicrania esse dicetur, vbi affectio capitis dolorosa iuxta dimidiam eius partem aliquando dexteram, aliquando sinistrā prehendet. quas ambas partes distinguit sutura per longitudinē ipsius prætracta, sub qua intra capitis ossa linea medium cerebrum diuidens protenditur. Hæc sunt de tactione deprauata, & vitiis sensuum exteriorum. Sin autem vitiatus sit sensus interior, an vitiatus sit sensus communis, an vero sensus, qui Princeps dicitur. Et si vitiatus est sensus communis, an operetur anima sensitiua deficiens a somno naturali plusquam oporteat, veluti est vitium illud, quod vigilia dicitur, cuius causa solet esse siccitas immoderata. An vero animæ sensitiuæ agitatio incipiat cessare, ac quiescere magis quam requirat iustus naturæ modus: veluti est vitium illud, quod

*Lateris
dolor.
Capitis.*

*Cephalæ.
Cephalalgia.*

*Hemicranæ.
nia.*

*De vitiis
sensuum
interiorum:
& primum
sensus communis.*

Vigilia.

*Somnus non
naturalis.*

Coma.

Lethargus.

Caros.

somnus non naturalis dicitur : cuius causa so-
let esse immoderata humiditas , quod veluti
cessatio & requies animæ sensitiuæ modera-
ta (quæ somnus naturalis dicitur) moderata
humiditate fit, ita longior somnus naturę ter-
minos incipiēs excedere, ab immoderata hu-
miditate nascatur. Et affectio illa, quæ Coma,
seu Cataphora dicitur, quamquam a Galeno
reponatur inter symptomata imaginationis
deficientis, & infirmæ existentis ex libro de
differentiis symptomatum, quod quidem vi-
rium nihil aliud significare videtur Hippo. &
Gal. quam propensionem quandam in som-
num, tamen si nomen hoc cataphoræ ad duas
species extendatur iuxta Hip. referente Gal.
lib. de Comate. Amplius & vitium illud, quod
lethargus appellatur, veteribus quibusdam
dicitur, quod quidem, & si videatur esse vi-
tium memoriæ, cum taliter affecti non pos-
sint meminisse eorum, quæ dicuntur, Trall.
libro 1. capite 14. unde etiam obliuio iners
dicitur, immo quod etiam ratio perit Gal. 3. 6
loco. aff. & libro de differentiis symptoma-
tum, quo in loco, in lethargo imaginationem
quoque lædi scribit, vt hac ratione & si videat-
ur esse symptoma tū memorię abolitæ, tum
rationis, & imaginationis deficientis, quoniā
tamen in hac affectione marcor, & inexpu-
gnabilis pene dormiēdi necessitas percipitur,
quapropter huc quoque vitium hoc reduxi-
mus. Et vitium illud, quod Caros appellatur,
qui

qui quidem & si 4. loco. Aff. ponatur esse vitiū facultatum animalium principum, præsertim imaginationis abolitæ, & sensuuitatis, ac motricū, spirandi facultate excepta, qua median- te differt ab Apoplexia, tamen huc quoq; hu- iusmodi affectionem reduximus, quod eius quoq; causā sit frigida, & humida cerebri in- temperies a pituita orta, vt hac ratione Aetius hos, qui hac affectione laborāt, curet similiter vt lethargicos, aucta solum attenuatione, & incisione. Sin autem vitiata sint functiones *Vitia sen- principes, an sint diminuta, cuiusmodi est af- suum prin- cipum.*fectio illa, quæ stultitia appellatur, *μωρία* græ- *Fatuitas.*cis dicitur, Fatuitas etiam dicitur, qua qui cō- ficiantur *μωροι*, hoc est, insipidi appellantur. Cuius affectionis causā 4. de causis lymp. & 3. loc. affec. frigida est & sicca cerebri intempe- ries, quæ ratione frigiditatis functiones om- nes torpidas, segnesq; reddit, quamquam etiā quandoq; ex vehementi concussione, ex ictu, aut vulnere, aut cerebri, aut temporum, quæ id imbecillius fecerit, aut inconcinna cerebri figura, malaq; conformatione, aut certe pau- ca cerebri substantia, vt quibus caput pusillū existit. An vero sint abolitæ, cuiusmodi est vi- tium illud, quod amentia dicitur, *ἄνοια* græcis *Amentia.* dicitur, imaginationis seu mētis priuatio, qua qui affecti sunt, vix mentis inopia loqui di- scūt. Cuiusmodi causæ, eadem esse solent, quæ etiam ipsius stultitiæ, sed valentiores, ac frigi- ditatis gradu magis intensæ. Cuiusmodi etiam

B 5

*Memoria
deperdita.*

est affectio illa, quæ memoria deperdita dicitur, qua qui affecti sunt, omnium eorum quæ prius nouerant, obliuiscuntur, ut cuidam contigit, qui non solum non potuit literarum, sed ne nominis quidem sui memoriâ retinere, ex Gal. lib. de differentiis, & 2. de causis sympt. cuius causa solet esse Hip. & Gal. frigida cerebri intemperies, quæ animales actiones torpidias reddit. 3. loc. aff. & 2. de causis sympt.

*Melancho-
lia.*

An potius functiones principes sint deprauatæ, cuiusmodi est vitium illud, quod melancholia dicitur, nomen a causa sortita, cum ex melancholico succo maxime nascatur 2. meth. & 3. loc. aff. in qua affectione imaginatio sola læditur, & deprauatur, non autem cogitandi, aut memorandi functiones noxam suscipiunt, in hac affectione. 2. de causis symptomatum, atq; hoc est illud quod ait Gal. 2. de causis sympt. Melancholicæ demetiæ varias esse species, prout in ipsis particulatim dolose imaginationes apparent. Atque etiam vitium illud quod Mania

Mania.

appellatur, latinis insania, seu furor dicitur, melancholiæ adeo cognatum, ut interim furor pro melancholia, interim melancholia pro furore sumatur: Gal. 6. Aph. 2. in qua affectione secundum Aetium imaginatio, & ratio læsæ sunt, & deprauatæ. 2. de causis symptomatum, per quod distinguitur a Melancholia, in qua sola imaginatio est oblæsa. Cuius affectionis causa 2. de causis symptomatum solet esse calida cerebri intemperies, aut sola, aut calidis succis

eis associata, quam ob causam diuiditur etiā a
 melancholia, & conuenit cum phrenitide, &
 deliriis cum febre ortis. Amplius & affectio il-
 la, quæ catoche, seu catalepsis dicitur, conge- *Catalepsis.*
 latio etiam dicitur, qua affectione qui corrip-
 untur permanent in illo habitu, in quo repe-
 riuntur, in qua imaginatio resoluitur, seu ab-
 3oletur, quamquam etiam reliquæ animæ fun-
 ctiones quodāmodo vitiantur, seruata tamen
 secundum naturam spiratione, velut in Caro,
 ex Gal. 4. loc. aff. quo malo quidam ex cōdisci-
 pulis Gal. correptus fuit, 2. Prorhet. Cui⁹ cau-
 sa solet esse frigida, & sicca cerebri intēperies
 2. aph. 3. quod magis exprimens Aetius ait, ex
 atræ bilis humore contingere: argumento
 illud esse potest, quod corpus in tali affectio-
 ne stipatur & cogitur ex frigidityte, & siccita-
 te, non autē laxatur, vt in lethargo, qui a ma-
 teria frigida, & humida pendet, & Caros etiā,
 quæ ratione qua in causa scum lethargo con-
 uenit superius reposita fuit. Hactenus de vitiis
 animæ sensitiuæ, & cognoscitiuæ. Sequitur *Vitia ani-*
 motiua quæ quidem, aut erit diminuta, cuius- *ma.*
 modi est affectio illa, quæ tremor appellatur, *Motiuæ.*
 qui sane est inuoluntarius motus sursum, & *Tremor.*
 deorsum motarum partium ab inuicem. 2. de
 palp. trem. rigo. & conuuls. Cuius causa solet
 esse facultas motiua imbecillior facta, & mē-
 bri pondus. Etenim dum virtus non finit mē-
 brum decidere (neq; enim ex toto est prostra-
 ta) & membri pondus non permittit virtutē

pondus sublatū seruare, veluti cum valens erat, sequitur motus quidam compositus, qui tremor appellatur. An vero motio sit abolita, cuiusmodi est affectio illa, quæ apnœa, id est, respiratio abolita dicitur, in qua motio ea voluntaria, quæ respiratio dicitur, penitus auferitur. An potius motio voluntaria sit deprauata, cuiusmodi est Affectio illa, quæ Dispnoea græcis, latinis respirandi difficultas appellatur, proprie dispnoea appellata, vbi ita media sit, vt ex toto non strangulet Celso, & Gal. 3. de differentiis resp. Et affectio illa, quæ Asthma dicitur, quæ cōtingit vbi magis increbuerit huius anhelitus difficultas, atque aliud quoque vitiū, quod orthopnoea appellatur, quæ contingit vbi respirandi difficultas ita aucta erit, vt iacentes ægri suffocentur. Quæ sane affectiones secundum magis & minus inter se distinguuntur, quarum causa esse solet in mala compositione Morbus, obstructio sane in viis per quas aer inspiratur: quamquam interitu etiā constriquantur, & coarctentur pro causarum diuersitate, quæ secundum Galenum. 4. loc. Affect. plures esse possunt: Amplius & affectio illa, quæ Tussis dicitur, quæ vitium est non quidē naturalium, expultricis scilicet, veluti nausea, vomitus, sed facultatis voluntariæ motiuæ, secundo de causis sympto. quo motu natura conatur perpetuo eiicere quidquid spiritum intercipit, seu humor sit a capite defluens, seu aliquid collectum in asperis arteriis, vt in peripneumo-

pneumonia, & pleuritide, de cuius causa si sit adeo vehemens tussis, vt nec supprimi, nec prohiberi possit, morbus solet esse in via, obstructio sane viarum spiritus, vbi autem tussis non est adeo violenta, sed adeo exigua, vt & supprimi, & ne eueniat prohiberi possit, causa solet esse non obstructio, sed inæqualis intemperies organorum spiritus, frigida quidem, secundo de causis Symptoma. quamquam etiam calida. 6. mor. vulg. & 4. Aph. 24. a vehementi æstu, aut aeris, aut febrium ariditate asperitatem in faucibus inducente, quamquã Trala reliquis etiam intemperaturis humida scilicet, & sicca gigni contendat: Amplius & vitiũ illud, quod palpitatio cordis dicitur, seu dilatatio, quædã, *Palpitatio cordis.* & depressio cordis, secundo de causis Symptomatum: quod etsi conueniat cum tremore in eo quod non sponte, sed inuite mouetur, in hoc tamẽ a tremore differt, quod palpitatio nis proprium est, maiorem & minorem locũ non relicto primo occupare, tremoris autem 7 adeo locum commutare, vt in eadem sede nõ maneat, cuius causa solet esse frigida cordis intemperies, secundo de cau. Symptomatum. Arabibus autem & intemperies etiam calida ab aerea quadam substantia halitiosa, & crassarũ partium in tanta quantitate existente, vt dilatari possit: Amplius & Affectio illa quæ Spasmus dicitur, ita a contrahendo dictus, quod fiat cõtractio mēbri patientis hunc affectum: Latini eodem nomine, & scopo Conuulsionẽ *Conuulsio.* appellant,

appellant, quæ sane est actio corrupta, præter voluntatem cōtinuo, virtutis voluntariæ motiua propter breuitatem factam, a re præter naturā in neruo mouente: in eo quod præter voluntatem fit, a voluntaria, ac naturali motione se iungitur: in eo autem quod cōtinuo fit, eiusmodi contractio, se iungitur, ab Epilepsia, in qua non fit continuus motus. Cuius affectionis causæ quæ breuitatem efficiunt duæ esse solent. Hip. 6. Aph. 39. nimia humiditas, & nimia siccitas: Nimia quidem humiditas, quæ imbibita, chordā quantum efficit crassiolem & in latitudine auget, tantundem in longitudine breuiorem facit. Nimia vero siccitas, quæ abbreviat longitudinē, & latitudinem simul: quas duas causas etiam appellare solent, alterā quidem ex humiditate a repletionem, alteram vero a siccitate prodeuntem ab inanitione.

Causa repletionis. Causæ autem repletionis, vel intrinsecæ esse possunt, vel extrinsecæ, & intrinsecarū vel remotæ vel proximæ. Qui quidem spasmus, & corporis contractio cū tripliciter variari possit, vel ad partes anteriores, vel posteriores, vel æquali robore in vtramq; partē distendendo, (quod contingit quoties vis trahens ad partē anteriorem, tantum potest, quantum vis quæ trahit ad posterius) tribus etiā nominibus fuit insignitus: prima enim species dicitur Emprosthotonos græcis, secunda Opisthotonos, tertia Tetanos, de quibus Gal. lib. de iectigātionē, & spasmō. & 5. Aph. 59. Quarum specierum causam

*Conuulsio-
nis causa
quæ breui-
tatem ner-
ui efficiunt.*

*Causa
repletionis.*

*Spasmi dif-
ferentia.*

causam in spinæ ini-^o contineri extra cōtro-
 uersiam est: Illud autem non est ignorandum,
 conuulsionē partium variam fieri, pro varie-
 tate ipsorum membrorum, vt interdum, in
 frontis cute, in lingue radice, in maxilla, in la-
 biis, vnde risus fit sardonius, interdū in brachio, *Risus sardo-*
 in manu, in crure, aduersante eo scilicet ner- *nus.*
 uo, aut musculo affecto qui partis motioni de-
 stinatus est. In oculo etiā conuulsio facta ita, vt
 in obliquū is dimidius torqueatur, vt nequeat
 amborum vnus aspectus esse, strabilisimi no- *Strabilis-*
 men obtinuit. Sed hæc de vitiis virtutis moti- *mus.*
 uæ, & sensitiuæ solitariis. Sequitur vt percurrā
 vitia sensitiuæ, & motiuæ virtutis simul vitia- *Vitia sensi-*
 tarum. In quibus perpendendum erit, an mo- *tia & mo-*
 tus, & sensus simul sint diminuti, veluti est af- *tia virtu-*
 fectio illa, quæ incubus appellatur auctorita- *tis simul*
 te Possidonii, vt refert Aetius, præludium, & *vitiatarū.*
 procæmium morbi Comitialis, aut Apople- *Incubus.*
 xia. Symptoma omniū affectionum animalium,
 nempe quod imaginatio deprauetur, motus
 difficilis euadat, ac sensuum fiat stupefactio, re-
 spirationis offensio, vocisq; interceptio, præ-
 fertim tēpore nocturno: cuius causa solet esse
 crassus ac frigidus vapor ad cerebrum delatus,
 ejusq; ventriculos obstruens. An vero motus,
 & sensus simul sint aboliti, cuiusmodi est af-
 fectio illa, quæ Apoplexia dicitur, quæ secūdo *Apoplexia.*
 de causis Sympt. inter Symptomata numera-
 tur omniū functionū animalium, motiuæ, sen-
 sitiuæ, & principum ablatarum, cum in huius

affectione auferatur sensus, & motus simul corporis vniuersi ex latione virtutum existētium in cerebro, 3. loc. Aff. vnde prouenit sensus, & motus in corpus vniuersum, cuius causam dicit secundo de causis Sympto. & 3. locorum. Affect. propter repentinum eius exortū non posse esse morbum similem, seu intemperiem, sed instrumentalem, ob principaliorū ventriculorum cerebri obstructionem, factā a frigido viscoso, & multo humore, frigido quidem, quod calida materia non tollat actiones, sed illas deprauet, crasso vero, & viscido, quod humor tenuis cum sit fluxibilis, nō possit imprimi in partib⁹ laxis, cuiusmodi est cerebrum, multo vero, vt hoc ratione concludi possit huiusmodi affectionem a pituita sola (quod de melancholia non est, quoniam licet crassa sit & frigida non tamen gignitur in tanta quantitate, vt pituita) plerunque gigni. Atq; hoc est illud quod ait Gal. 1. Aph. 42. corpus senile admodum aptum esse vt in apoplexiam incidat, causæ autem pituitæ erunt omnes illæ extrinsecæ, quæ ipsam procreare poterunt.

Paralyss. Amplius & Paralyss, latinis resolutio nuncupatur, quæ est actio ablata sensus & motus simul alicuius partis corporis facta ex priuatione animalis virtutis, & spiritus, quæ membrū paralyticatum animare nō possint: Noranter autē dictum fuit esse actionē ablatā motus & sensus simul, vt seiungatur a modis quibusdā imperfectis ipsius paralyss auferentibus aut motum

motum tantum, aut sensum duntaxat alicuius partis corporis, vt per hoc seiungatur ab Apoplexia, quod vt ait Gal. 3. loco. Aff. cap. ii. in hoc differat Apoplexia a Paralyfi, quod Apoplexia fit in toto corpore, hæc vero in aliqua parte corporis solum. cuius causa est priuatio animalis virtutis, & spiritus, quæ membrum paralyticatum animare nõ possunt. huius autem, vel neruorum in frigidatio per quos transit spiritus animalis, vel ab aere frigido, vel a regione frigida primo stupefaciente, dein paralyticante, vt hac ratione, secundo de locis Aff. stuporem dicat esse viam ad paralyfin frigiditate aucta, ipsumque sensum auctum paralyfis esse nuntium, vel crassa pituita neruo tenaciter impacta, & impediens, quominus spiritus animalis in eam deferatur partem, in quam neruus propagatur, cuiusmodi sequi solet Apoplexiam, & proprie paraplegia dicitur, periculosior quã ea, quæ fit in stupore sensum aucto, cum sæpe in Apoplexiam recurrere soleat. Vbi autem non omnes corporis partes, quæ sub capite sunt, sed alterum tantum corporis latus occupabitur, hemiplegia dicitur. cuius causa nõ in tota spina, sed in illius altera duntaxat parte inhærescit, quamquam etiam a quacunque alia causa procedere possit paralyfis: velut ab intemperie frigida a viscidis humoribus facta in altera cerebri parte, seu spina, seu particulari neruo, & ab inflammatione, & scirrho. quin imo a causa etiam euiden-

*Stupor est
nuntius
paralyfis.*

Paraplegia.

Hemiplegia.

*Conuulsio
canina.*

Vertigo.

Epilepsia

ti, vt percussione, & casu, qualem curauit Gal.
in Paularia Syro sophista: sensu, ac motu digi-
torum manus priuato, quod ex curru delap-
sus esset. Huc quoque pertinere videtur Affe-
ctio illa, quæ conuulsio canina, græce spasmus
cyniens, quibusdam oris tortura appellatur,
in qua fit resolutio mandibularium musculo-
rum, & deperduntur functiones animales sen-
sitiuæ, & voluntariæ motiuæ, tametsi quan-
doque etiam alterum illorū duntaxat deper-
datur. Aut motus, & sensus simul erunt depra-
uati, cuiusmodi est affectio illa, quæ vertigo
appellatur, suffusione, in qua solum fumi, nu-
bes, muscæ, hisque similia volitare ob oculos
putantur, grauior existens, epilepsia vero im-
becillior, vt hac ratione proditum sit a multis,
vertiginem ingrauescentem in epilepsiam de-
generare, in qua quidē vertigine sensus, præ-
teritū visio, & motus simul deprauantur.
Cuius causa solet esse inordinatus motus spi-
rituū in anterioribus ventriculis cerebri ex-
sistentium: huius autem, vapores crassi turbu-
lenti, spiritibus illis admixti, horū autem di-
minutus calor non potens excoquere excre-
menta, a quo calore diminuto flatus gignuntur.
3. loc. aff. 8. Intellego autem hoc loco de verti-
gine fixa & exquisita, quoniam vertigo non fi-
xa ex vaporibus etiam bilis, & a causa calida,
vt ex ebrietate, procedere potest. Amplius &
affectio illa, quæ epilepsia dicitur, Celso mor-
bus comitialis. quāquam in huius affectione
non

non proprie auferatur simul & sensus, & motus, sed diuerso modo vtraque vitianur, nempe quod ex 3. loc. aff. cum sit ex genere conuulsionis motrix deprauetur, & cum nec audiāt, nec alio sensu aliquid percipiant, ibidem, sensus sint ablati, Ratio quoque simul cū memoria perit, & aufertur, 3. loc. aff. & lib. de differentiis symptomatum. Cuius causa solet esse, non quidem intēberies, quod, vt ait Gal. 2. de causis symptomatum, generatio & solutio horū symptomatum subitanea fiat, sed semiostructio meatuum ventriculorum cerebri, siue is medius sit siue postremus. Notanter autem dictum fuit, huiusmodi obstructionem integrā non esse, quoniam vbi ad integritatē peruenit, non amplius motum corrumpit, & epilepsiam gignit, sed apoplexiæ morbus euadit, quamquam non solum fit epilepsia a materia obstruente, sed etiam ab aura frigida ad cerebrum ascendente, & coarctatoriam faciente obstructionē, nō ratione materiæ obstruentis, sed ratione eiuscemodi qualitatis stimulantis parietes vasorum circumstantium, & locū coangustantis, qualem in puero vidisse se scribit Gal. Hæc de vitiis actionum animæ sensitivæ, tum cognoscitivæ tum motivæ simul affectis. Sequuntur vitia omnium actionū corporis humani simul, quæ quidem vbi erunt imminuta, cuiusmodi est affectio illa, quæ animi æstuatio appellatur, seu anxietas, tunc initium quoddam sunt, ac veluti præludiū de-

*Epilepsia &
apoplexia
differentia.*

Vitia omnium simul actionū corporis humani. Animi æstuatio.

*Lipothymia**Syncope.**II. Mutatū
excremen-
tum, ratio-
ne nimia
fluxionis.*

liquii ipsius animi. quæ affectio si increſcat, ita, ut non tantum quietem turbet, ſed inordinet motum, & ſenſum etiam auferat, lipothymia, ſeu animi deliquium eſſe dicetur. Sin autem adhuc magis increſcat, ſequitur tertium omnium terribilium, quod ſyncopē dicitur, quæ ferit actiones omnes omnium virtutum, ubi homines remanent abſque ſenſu, & motu, & videtur eſſe ablatio actionum omnium corporis ſimul, ſaltem quo ad ſenſum, quæ quidem tres affectiones differunt exceſſu duntaxat maioris, & minoris, & iisdē ex cauſis progredi ſolēt, nimirū ex diminutione caloris innati, & ſpirituum ipsius cordis, cauſata vel a reſolutione, vel ſuffocatione, reſolutionis vero cauſa, erit eorū inanitio, ſeu euacuatio, aut alimēti ſubtractio: Alimenti quidem aut intrinſeci, velut tenuioris partis ſanguinis. aut extrinſeci, ut aeris, aut cibi, & potus. ſuffocationis autem cauſa erit, aut multitudo qualitatſ contrariæ, velut aquæ frigidæ, vel multitudo rei ſimilis, velut ſanguinis nimia repletio, quod athletic contingit. Haſtenus de læſione Actionum omnium. Quoniam vero ſuperius agentes de Symptomatibus, diximus aliud eſſe actionem læſam, aliud vero mutatū corporis excrementum, cumque iam pertranſiuerimus vitia ſingularum actionum corporis humani, occurrit modo ut percurramus vitia excrementorum. In excremento autem perpendendū erit, An ſi mutatum ratione nimie ſuppreſſionis. Et ſi erit

si erit immutatum, quia nimis fluat, an sit ca- *Catarhi*
 tharrus, qui sane est Sympto. in genere immo- *causa.*
 dice excretorum 3. de cau. Sympt. & est fluxio
 pituitosa, emanans a cerebro ad subditas par-
 tes, facta vel ratione cerebri affecti, vel ut pars
 similis, veluti ab intēperie calida, aut frigi-
 da non potente conficere alimentum, & con-
 sequenter congregante excrementa, vel ut in-
 strumentum cum nimis repletur ex Gal. 3. de
 cau. Sympto. vel ratione partium inferiorum,
 & solent esse ex 3. de locis affectis temperature
 illa, quæ habent epar, & venas calidas, in qui-
 bus tametsi caput sanum sit, multiplicatur ta-
 men vapores, & pituita ratione membrorum
 inferiorum. Hæc sane de causis gignentibus
 catharrum. Sin autem causæ genitum cathar- *Causa ca-*
 rum a capite exturbabunt, perpendendum e- *tarrhum*
 rit, vtrum huiusmodi depulsionis causa sit, aut *depellentes.*
 copia grauans, aut frigus exprimens, vel æstus
 liquefaciens, vel balneum laxans, vel pertur-
 bans exercitatio, vel animi pathema. An vero *Profluii*
 fiat sanguinis eruptio ex naribus, cuius causa *sanguinis*
 ex 5. Meth. solet esse triplex, veluti etiam reli- *triplex*
 quarum eruptionum, aut ratione vasorū, aut *causa.*
 ratione sanguinis, aut ratione virtutis. Et si ra-
 tione vasorum affectorum, an sit ratione ana-
 stomasis, seu refectionis suorum orificiorū.
 An vero per diæresin, seu vasorum diuisionē.
 An potius per Diapedesin, id est, tunicarum
 rarefactionem. Et si hoc cōtingat per anosto-
 mosin, an hoc proueniat propter eorum im-

*Exspuitio-
nis cruenta
causa.*

*Cholera
causa.*

becillitatem, an propter sanguinis copiam, qui impetu quodam ad os valorum ruat, aut propter eiusdem sanguinis acrem quampiam, quæ illi extrinsecus euadat, qualitatem. Sin autem hoc eueniat, per diæresin, an hoc procedat ex vulnere, an contusione, an ex ruptione an erosione. Sin autem per Diapedesin, an contingat, ex ipsa tunica rarefacta, sanguine vero attenuato, (ex his enim duobus oriri sanguinis eruptionem fatetur Galenus.) An vero sit cruenta spuitio, cuius causa, vbi e vasis sanguis profluet, solet esse aut morbus instrumentalis, veluti est apertio osculorum ipsorum vasorum, aut vnitas soluta, ruptio scilicet, aut erosio, causa vero apertionis ipsorum vasorum, aut est victus calidior, & humidior, aut balnei vsus immoderatio, calidi loci inhabitatio, & anni tempus eiusmodi. vnitatis vero solutæ causa, & primum rosionis, aut est acrium, & prauorum ciborum esus, aut inedia longior paulo: ruptionis autem causa, aut erit externa, vt quouis vehemens motus, aut interna, veluti humorum abundãtia, seu sanguinis copia. 4. loc. Aff. aut nimia frigiditas, quemadmodum de aqua frigida narrat Hip. 5. Aph. 24. quæ dum tunicas duras efficit, & extensioni contumaces, eas ruptioni paratas reddit. An vero sit cholera affectus ille ita vocatus, cū ventriculus adeo molestat, vt & superne, & inferne conetur excernere. 3. de caus. Sympt. Barbaris passio cholerica dicitur, quamquã 3. de causis Sympt.

Sympt. nō ad excrementa immutata, sed ad affectionum læsionem, nempe ad depravatā expultricem videatur huiusmodi affectionē reducere. Cuius nimis excretionis causa solet confluere, vel e suo folliculo, vel e iecore, vel e pancreas, vel ab intestinis, stomachoque, e quibus cumulata, ac supra modum aucta, naturæ grauis atque insensibilis existens, huc illuc impellitur, ac diffluit. An vero sit Dyarrhæa, seu alui profluuium, quæ affectio. Gal. i. de mor. vulg. est deiectio, & semper, & assidue humorum excrementorū absque Dysenteria, Lienteria, atque Tenesmo, cuius confluxus causa varia erit pro varietate excrementi exeuntis, humoris enim pituitosi, intestina crassiora, & mesenterium, quod in his locis cumulari, & concreescere solet: renuis vero spumosaq; pituitæ caput, quod eam deicere solet in ventriculum, atque intestina: dulcis & dissoluta pituita, habitus corporis vniuersus. Hippoc. Biliosi vero humoris, iecur calidius aut cystis fellis, quāquam etiam quodammodo e venis maioribus, atque e corporis habitu prorumpere solet. Melancholiæ vero e liene. An vero sit cruenta alui deiectio, quæ est cruoris sine dysenteria, atque tenesmo effusio. cuius causa, præsertim si non verus cruor existat, sed dilutus, & recentis sanguinis, per similes, erit iecoris imbecillitas, e qua dimanabit. sin autem purus sit, ac noster, erit hæmorrhoidum erit, quæ illum prosequatur.

*Diarrhæa
causa.*

*Alui cruenta
deiectio
causa.*

*Mictionis
cruentā.*

e vena caua pfundet. An vero mictio sit cruentā, quæ etiā sanguinis renum profluuium appellabitur. cuius causa solet esse aut imbecillitas retentionis, & etiam alterationis ipsorum renum, huius autem, aliqua intemperies, aut morbus in compositione, veluti nimia amplitudo osculorum vasorum, urinā ad renes excolantium, Aut vnitas soluta, huius autem aut ruptio, aut casus ab alto, aut oneris grauioris gestatio, aut quid simile. Gal. 4. Aph. 75.

*Vrina in-
continentia.*

Rosionis vero humorum acritudo, aut quæ præcellerit inflammatio. An vero sit urinæ incontinentia, in qua præter voluntatem vrina excernitur, 6. loc. Aff. cuius causa solet esse nō quidem læsio functionis naturalis facultatis ipsius vesicæ, sed animalis musculi quæ ablata sit. cuius causa solet esse intemperies frigida præcipue, veluti in piscatore percepit Gal. qui adeo circa sedem, & vesicam erat in frigidatus, vt ipso inuito affluerent, & excrementa, & vrina, & causæ omnes, quæ prohibere possunt animalis facultatis transitum ad prædictū musculum, de quibus in paralyfi mentio facta fuit, An vero sit Diabetes, quæ est velox, ac exsuperans exitus per urinam, ejus, quod potatū est, a sua qualitate non mutati. 6. loc. Aff. cuius causa est læsio trium functionum ipsorum renum, Attractionis quidem deprauatæ, qua ratione primo de crisibus assimilatur hanc renum appetentiam propter quam attrahūt, cupiditati in ore ventriculi, cum canina molestatur

*Causa Dia-
betis.*

appe-

appetētia, retentionis vero, & alterationis ab-
olitarum, qua ratione ait, 6. loc. Aff. infirmos
in hac affectione exsuperāter id reddere quod
biberunt, eo a sua qualitate nō mutato. Qua-
rum lēsarum actionum causa Paulo, & Alexā-
dro est intemperies, & immodica renum cali-
ditas. Addit Aetius, ob vitiosos humōres re-
nib⁹ imbibitos. An verō ictericia citrina, quæ *Ictericia*
tamen inter Sympt. qualitatum corporis im- *citrina.*
mutatarum, præsertim visibilium, quod circa
colores consistant, lib. de differentiis Sympto.
enumeretur, tamen 3. de causis Sympto. ad ex-
cremēta immutata a Gal. reducitur, quæ qui-
dem affectio est citrini, & biliosi humoris in
cutē, & in corporis summa effusio. cuius cau-
sa 3. de causis Sympto. Gal. triplex est, vel vitio
particulæ quæ excrementum expurgat, vel ra-
tione viarum, per quās expurgatur, veluti ex
obstructionē meatuum ad bilis cystin pertinē-
tium, vel ratione ipsiusmet excrementi, velu-
ti contingit ex iecoris caliditate, cuius vi pars
maxima vertitur in bilem, quamquam quan-
doque etiam ex crisi biliosa, nō febrium con-
tingat, qua noxiā materiam natura ex alto
corpore in summum, forasque propellit. An
vero sit ictericia nigra, quod Sympt. et si Gal.
reponatur inter qualitates corporis immuta-
tas lib. de differentiis, & 3. de cau. Sympto. huc
tamen nos illud reduximus, quod & ictericiā *Ictericia ni-*
citrinam ad excrementa immutata reductam *gra.*
viderimus. cum etiam huiusmodi affectio ni-

hil aliud fit, quam melancholici humoris incutim, & in summa corporis effusio, cuius causæ itidem sunt, vel ratione particulæ, quæ excrementum expurgat, liene scilicet adeo exsuperante, ut exturgentia illius portionem refundat in venas, aut ratione viarum veluti ex
 B obstructione venæ e portis iecoris in lienem directæ, qua sanguinis fex deducitur, atque expurgatur: aut ratione ipsius excrementi, veluti cum a iecore adeo hic humor procreatur, ut totus lienis vi elici, expurgarique non possit. An vero sit lactis redundantia, quæ est affectio, in qua lac multum e mammis effluit. Cuius causa solet esse & sanguinis multitudo, & eius bonitas, ex qua lactis redundantia, ubi non excernatur, solet sequi affectio illa quæ lactis in casei speciem conuersio dicitur, siue lac in grumos conuersum, quod fit ob lactis copiam, & eiusdem crassitiem. An vero sit, mensium fluxio immoderata, quæ est affectio, in qua non tempestine, neque ad animalis commodum exeunt menses, sed intempestiue, & cum noxa, quæ mulieribus infertur. Cuius causæ solent esse, aut ratione virtutis eiusque; aut membri mandantis, aut vteri recipientis, aut ratione sanguinis, aut quantitate, aut qualitate peccantis, aut ratione viarum, & vasorum, & horum aut per ruptionem aut per reserationem, aut per erosionem. An vero sit seminis profluuium, gonorrhœa dicitur, in quo affectu semen inuite, & inuoluntarie excernitur. 6. loc. aff.

*Causa redundantia
lactis.*

*Mensium
immoderata
fluxionis.*

Gonorrhœa.

aff. cole haudquaquam extento. Cuius im-
mutationis in femine, causa solet esse actio
læsa spermaticorum vasorum, retentionis sci-
licet imbecillitate. Aut vt ait Gal. resolutione,
huius autem imbecillitatis causâ quæcunque
intemperiei species, præsertim humida, & ca-
lida, aut calida, & humida simul. Intemperiei
vero causæ erunt progressæ victus sane, & hu-
iusmodi, quamquam causæ etiam huiusce fe-
minis excretionis esse soleant, nimia seminis
copia coarctata, aut eiusdem seminis quali-
tas. Acrimonia scilicet, & tenuitas, quæ reten-
tionem excitat & stimulat; An vero sit fluor *Fluoris mu-*
muliebris, quæ quidē est affectio, quoties non *liebris.*
quidem sincerus sanguis effluit, veluti in mē-
sum fluxione contingit, sed vitiatum aut san-
guis, aut aliquis alius humor, ab vniuerso cor-
pore fluens, vt per vterum expurgetur, ipso v-
tero haudquaquam affecto, Gal. 3. de causa
sympt. & 6. loc. affe. Cuius causa solet esse aut
virtus vitata, aut sanguis. Et si virtus aut retē-
tio imbecilla, aut expultrix immodice conci-
tata, aut vtræque simul læsa: debilitabitur autē
retentrix, a copîa, & a serositatē sanguinis. Cō-
citabitur autē expultrix ab eius qualitate, san-
guis vero vbi serosus euadet, serositatis autem
causa erit, vel frustratio sanguificæ facultatis,
vel eius quæ tenue, & serosum separat, quam-
quam & ratione cutis inspissata, & ex renibus
occlusis lib. de diff. sympt. Hactenus de excre-
mentis immutatis ratione nimie fluxionis. Se-

*Excremen-
ta immuta-
ta ratione
suppressio-
nis.
Causa ischu-
ria.*

Stranguria.

quitur, vt percurramus excrementa immuta-
ta ratione suppressionis. In quibus perpēden-
dum erit an sit ischuria, quæ sane est totalis v-
rinæ suppressio. Cuius causa solet esse propria
eius actionis oblatio, quæ est urinae excretio.
Huius autem causæ erunt, aut vesicæ imbecil-
litas, aut oris eius occlusio, vbi fortis erit ipsa
vesica. Causa autem imbecillitatis vesicæ erit,
aut intemperies, frigida præsertim, vel affecti
vesicæ nerui, & quasi stupefacti, qui cum affe-
cti sint, neq; molesti excrementi irritationem
percipere queant, urina intra continetur. Sin
autem vesica fortis sit, causa erit occlusio sane
oris seu meatus, qui urinae fistula appellatur.
Occlusionis autem causa erit, aut conuiuen-
tia in seipsum ex nimia siccitate, aut tumor ali-
quis, aut lapis in ore genitus, aut pus, grumus,
vel crassus, lentusque humor. i. loc. aff. An ve-
ro sit stranguria, quæ est affectio, in qua stilla-
tim fit urinae excretio, & parum & frequenter
mingitur. 5. apho. 58. Cuius causa duplex
assignatur Gal. ibidem, aut retentionis ve-
sicæ imbecillitas, aut urinae acredo mordens. 10
Causa autem imbecillitatis vesicæ, aut est in-
temperies, frigida præsertim. 6. loc. aff. aut tu-
mor aliquis præter naturam, aut vlcus. Causa
autem acredinis urinae erit, intemperies cali-
da, & sicca. 3. aph. 16. quamquam demorsus fie-
ri possit non solum ab urinae acredine, sed etiã
ab humoribus, qui sunt in venis, & vniuerso
corpore, & renibus vitiatis, præsertim puru-
lenti

lensis 5. aph. 58. An vero sit calculus, qui sane
 est corpusculum durum, toto genere præter
 naturam, instar lapidis, seu tophi, in substantia,
 seu in sinibus renum genitus, quamquam Gal.
 lib. de diff. mor. reponatur inter morbos in
 numero. Cuius causa materialis humor cras-
 sus, ac lentus est Gal. quamquã admixtum pos-
 sit habere etiam omne aliud humoris genus.
 6. de mor. vulg. huius autem assiduæ cruditates
 Actio, quæ incoctæ, ac crudæ permanēt. Cau-
 sa vero efficiens calculi, & lapidum, & si tum
 frigiditas, tum caliditas esse soleat, tamē quod
 in animali tanta frigiditas reperiri non possit,
 ignea solum renum caliditas, seu ardor circa
 renes nunc vehemens, quandoque vero non
 ita vehemens, causa esse solet Gal. lib. de ren.
 aff. dig. & curatione. An vero sit lactis defectus,
 cuius causa solet esse vitiū ipsius sanguinis, aut
 paucitas, aut vitiositas. Paucitatis vero causæ
 erunt, aut nimix euacuationes, aut exercitia,
 aut vigiliæ, & huiusmodi alia, quæ corpus vni-
 uersum calfacere, & desiccare possunt, 5. simp.
 quamquam causa etiam esse possit in ipsis mā-
 millis, aut macilentis, aut aridis, intēperie sic-
 ca laborantibus. Causa autem vitiati sanguinis
 in qualitate, erit cacochymia aut biliosa, aut pi-
 tuitosa, aut melancholica, & horum cuiusque
 aliæ quoque causæ. An vero sit mensium sup-
 pressio, cuiusmodi causa duplex est Gal. 3. de
 causis sympt. aut in vtero, aut in vniuerso cor-
 pore. Vteri quidem aut densi, aut duri, siue id

*Causa cal-
culi.*

*Defectus
lactis.*

*Suppressio-
nis mensiū.*

natura, seu post contractum fuerit, aut venarum angustia, aut obstructio vasorum ad vterum pertinentium. Horum autem causa, aut sanguis crassus, & glutinosior, aut tumor aliquis & inflammatio: Vasa & venas angustantia. Sin autem causa fuerit, in vniuerso corpore, id erit, aut ratione causarum internarum, aut externarum, internarum quidem, veluti temperaturæ corporis vniuersi, aut calidioris aut frigidioris, quod altera nimis resoluat, altera vero, quod sanguinem nimis incrasset, & vias obturatas retineat. Huc quoque pertinere videbitur habitus corporis vniuersi, aut nimis gracilis, aut nimis obæsus, gracilis vero, aut natura, aut morbi diuturni ratione, aut præcedentis ratione euacuationis, vel per sudorem, vel aliunde factâ, præsertim per venæ sectionem, ex cubiti venis, quod hæc sanguinem ad superiores partes retrahens, menstruas purgationes cõprimat, Gal. lib. de curâdi ratione per venæ sectionem, q. gracilis nihil superflui sanguinis habeat, obæsus vero cū sanguinē in pinguedinē trāsmuret, venulas minores q̃ par sit efficiat. Sin aut fuerit ratione causarū euidentiū, aut ratione ciborū, idq; aut qualitate aut quātitate peccantium: quantitate, aut excedente, aut deficiente, quod excedēs meatus obturet, & excretionem intercipiat, deficiens vero illico transpiret. An vero sit mola, quæ Gal. 14. de vsu partium, & 14. meth. est caro inuulilis, atque informis, quæ vtero gestatur, quæ quidem

Mola.

quidem affectio, et si 14. meth. med. reducatur ad morbos in compositione speciatim in numero, veluti est lapis in vesica, huc tamen ad excrementa suppressa nos illā reduximus, idque ratione suarum causarum fecimus. Cum huiusmodi affectionis causæ Hipp. & Gal. libr. de mor. muliebribus, & lib. de sterilibus sint conceptus multorum mensium cum modico & morbofo semine, mensium quidem tanquam materia molæ: Semine vero modico, & morbofo, id est, calorem imbecillum possidente, tanquā causā efficiente, quod a Gal. expressum fuit. 14. de vsu partium, vbi subuentanea, inquit, oua gigni ab imbecillo calore, veluti & molā. An vero sit secūdina derelicta, ita dicta, veluti secundum domicilium, ac receptaculū, ab utero, & velut fœtus indumentū, quæ quidem affectio huc quoque reducta fuit, quamuis morbus in numero quibusdam sit. Cuius detentionis causā solet esse, aut ob vteri clausum, ita vt foras prodire non possit, aut quia circa aliquam vteri partem instar pile, sit conuoluta, aut quia vteri fundo adhuc sit connecta. An potius sit lumbricus, qui & ipse libr. de diff. mor. & 14. met. inter morbos in numero reponitur, huc tamen illum reduximus, quod excrementum sit ortum ex putribus humoribus retentis, & corruptis a vehemēti, & vberissimo calore vitam assumens, aut longus, & teres sit, aut brevis & latus, aut exiguus, tenuis, simulque teres, cuius causā Gal. est putredo,

*Causa reli-
cta secun-
dina.*

*Lumbrico-
rum.*

*Ex humo-
ribus sola
pituita est
materia
lumbricorū.*

2.

*Affectus cō-
positi va-
riant artem
curandi.*

*Scopi cura-
riui vulne-
ris cum con-
tusione.*

putredinis vero huius materiam accommodam
exprimens Paulus Aegineta ait, esse crudam,
crassam, pituitosamque materiam, huius autē
cibaria corrupta, quod nullus alius humor a
pituita, materia possit esse lumbricorum ge-
nerationi accommoda. Non bilis quidem, q̃
eos sui amaritudine poti⁹ interimat, vt inquit
Paulus, melancholia vero ratione frigiditatis,
& siccitatis longinqua sit ab animalis vita, san-
guis vero, quod quum naturalis existit, nutri-
tioni est, non autem corruptioni aptus, sin au-
tem sit preter naturam, cum necessarium sit,
vt effundatur ad intestina, quo in loco gigni-
tur lumbricus, necessarium est etiam 6. aph.
secundo aut vt calefiat, aut infrigidetur, & cū
calit, vt suppuretur, cum infrigidatur, vt in-
grumos vertatur. Hactenus percurrimus af-
fectus omnes simplices, & solitarios nempe
causas, & morbos, & symptomata solitaria. Se-
quitur modo, vt percurramus affectus simul
implicitos, & associatos, quod affectus simul
complicati artem curandi varient, & medica-
menta etiam simul componere, & complicare
cogant. (nisi forte in vno simplici pluriū vsuū
vis reperiatur) qua ratione vbi adest simplex
vulnus cum contusione, plures etiam curandi
scopi simul impliciter consurgunt, vnus quidē
a vulnere medicamentorum glutinantiū, al-
ter a contusione digerentium, aut coquentiū,
tertiū a dolore, vel in parte icta, vel etiam illi
continua, & is scopus anodinorum, vel si hæc
non

non sufficiunt, narcoticorum, vbi videlicet omnibus victis, horum maxima erit necessitas. Et in affectib. pulmonis pro educatione crassi, *Pulmonis affectuum.* & lēti humoris, plures vires simul miscemus, veluti incidentia, tenuantia, tergentia, expulsiōni parantia, purgantia, & lenientia, ne exasperatio dolorifica his succedat: & in omni fere vlcere conueniūt vires simul cōplicate, exsiccatio scilicet, & tersio, quod ei perpetuo fere adsit sanies & sordes qua ratione Gal. 1. de med. secundum genera in morbis causā associatis: Vlcera, inquit, tum ea quæ ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrium oriuntur, ita vt locus affectus huiusmodi in se dispositionem non habeat, Dysepulotica appellata, hoc *Dysepulotica.* est agre ad cicatricem peruenientia, tū ea quæ dictā dispositionem sortiuntur cacoethe, hoc *cacoethis.* est, malignantis naturæ appellata, ea medicamēta requirunt, quæ absq; rosione, & morfu desiccant, quæq; præterquam non erodāt, aut manifeste astringant, detergere etiam possint, sed thuris etiam aliqua portio, inquit, est indenda, vt vlcera malignorum dispositio co- *Thus vlcera ducit ad suppurationem.* quatur & ad suppurationem perueniat. Et ibidem: Vlcera, inquit, in quibus acre & mordax aliquod fertur, ex aqua potius maceranda singula sunt, quemadmodum ex vino, vbi copiosus humor vlcerebus influens apparet. Et 2. de med. secundum gen. Vlcus, inquit, cauum vt *Vlceris causi curatio.* curetur, sumministrantibus succrescentem aliam carnem loco deperditæ indiget. cum au-

*Sordidi.**Scopi cura-
tini vlcera.**Fractura
caluaria.*

tem hoc fieri non posse cognoscamus, vbi in
 vlcere sordes, aut copiosa humiditas aderit,
 quapropter medicamentis deterfione sordē
 auferentibus, humorem exsiccatione discu-
 tiuntibus vrimur. Et ibidē, proposito empla-
 stro viridi Galli vlceribus sordidis, humidisq;
 ex rosaceo liquefacto, inquit, proderit: pura
 vero vlcera erodit: ac proinde, inquit, impuris
 admiscendum esse cerato liquido ex cera, &
 resina confecto, vel ex rosaceo, vel oleo liqua-
 to. Et ibidem: vulneribus inquit, magnis glu-
 tinantibus, expurgandis sordiciebus maxime
 vtile esse viride Hecatondracmon. Et eodem
 loco vlcerum, inquit curandorū consilia sunt
 sordidis adhibere abstergentia, profluentibus
 exsiccantia, atque ad id quod in fluxu est, re-
 pellentia, & vbi copiosum, & contumax est
 quod fluit, fluoris causa prius est amputanda,
 & vlcerum inflammatorum prius, inquit sa-
 nandam esse phlegmonem, & carnem intem-
 peratam ad temperiem esse reducendam. Et
 ibidem: sinus, inquit, impleatur medicamen-
 to isis vocato, aut Macherionis emplastro li-
 quato ex copiosiori oleo per foratum cornu
 infuso, meraciori quidem, quum sinus opple-
 tus est sordibus: soluto vero ex oleo largiori,
 cum magis purus existit: rosaceo vero liqua-
 to, cum phlegmones parue adhuc infestantis
 est suspicio. Et ibidem: Fracturis, inquit, calua-
 riæ potissimum, emplastra quædam cephalica
 catagmatica nominantur, quibus inest facul-
 tas

tas abstergerendi, digerendi, & siccandi. Pleriq;
 etiam paululum ex astringentibus pharmacis
 eis admiscant, vt id quod affectis partibus in-
 fluit, repellatur, & abstergentium facultas in
 altum vsque descendat, quale est catagmati-
 cū Asclepiadis ad confirmanda fracta ossa. Et *Catagma-
 ticum Ascle-
 piadis ad
 ossa fracta.*
 4. de medicamentis secundū generale. Medi-
 camenta, inquit, dyssepuloticis, malignisq; vl-
 ceribus cōuenientia difficilima inuētu sunt,
 quod ex contrariis viribus constare debeant;
 quarum quædam influentem humorem re-
 pellant, alia infixum parti discutiant, influxum
 autem reprimant astringentia, impacta dige-
 rant, quæ trahendi potestate prædita sunt, a-
 stringentia autem exasperent, trahentia ex al-
 to humores non citra acrimoniam id faciāt,
 acrimoniam dolor sequatur, dolor iterū hu-
 morem influentem irriteret, humor in vlcere
 phlegmonem exciter. Et ibidem: vlceris, in-
 quit, sordes, humorq; quoniam pharmaci ro-
 sionem exsoluit, quapropter perpendendum
 esse, inquit, quantum humiditatis, ac sordium
 in vlcere medicamentorum desiccet primus
 vsus, quantum secundus, quantum tertius, &
 eodem in lib. Vlcus, inquit, vbi in partib. cir- *Vlcus phle-
 gmonodes.*
 cumiacentibus phlegmonem ambientē ha-
 bebant, phanirino emplastro partes circumia-
 centes imbuere oportebit ex oleo liquato, nō
 quouis, sed vbi rubor, atque caliditas in adia-
 centibus vlceris partibus dominabuntur, a-
 stringente, & refrigerante erit solvendum,

*Vlceris cum
varice cu-
ratio.*

*Curatio
ulceris asso-
ciati aliis
affectibus
internis.*

*Sordium
differentia.*

*Vlcus cauū
& purum.
Sordidum
& malignū.*

velut mirteo, melino, omphacino, vbi duri-
ties conspicietur, liquandum erit oleo veteri,
vel ricinino, vbi nihil in ambiente vlcus loco
apparebit, tutius, inquit, erit repellens medi-
camentum regioni supra positæ vlceri applicare,
vt repellat si quid influit. Et ibidem: vlcus, in-
quit, vbi varice erit associatum, excindenda
erit, prius auspicando a venæ sectione, dein **B**
pharmaco purgante melancholiam, postea
venam vlceri supra positam in longum scarifi-
cando, postea venæ sectæ medendum, quæ v-
bi cicatricem visa erit recipere, malignum po-
stea vlcus erit curandum. Ad eundem modū,
inquit, progredientes vbi vlcus associatū erit
lieni male affecto, aut iecore, aut corpore ex-
istente plethorico, aut caco chymo, postea vl-
cus valde sordidum maxime abstergentibus,
ab iis ad miriora secundum deficientiam sor-
dis, & vlceris puritatem, modo sordes ab acri
medicamento non sit inducta, sed discerne-
tur, inquit, sordes ab acri medicamento exci-
tata, ab ea quam vlcus propria ratione produ-
xit, quod vbi a medicamenti acredine sordes
accreuerit, maior vlceris cauitas, oræque ru-
bentiores, & calidiores effectæ cernantur. Et
ibidem epulotica describit medicamenta, ea-
que diuersa pro affectus diuersitate, quod vl-
cus cauum, & purum a mediocriter siccantib.
medicamentis curetur: sordidum vero & ma-
lignum, & oris duris, & prætumidis quidem,
sed carne iuxta cutem fluida, validissime sic-
cantia

cantia requirunt. Et 5. de medicamentis secundum genera, Pharmaca, inquit, ad multos usus utilia (polychresta appellatur,) excogitata sunt, quod contraria sint non solum secundum primas, sed etiam qualitates secundas, quale est illud Panacia Horæ inscriptum ad omnem malignitatem vlcerum mire conducens, rumpens, atque dissoluens quidquid corruptum est, omnem sanguinis eruptionem supprimens, hæmorrhoidas ipsas consumens, & tabefaciens, omneque vlcus quamuis agreste mitius statim reddens, quod marrubium, non autem selenion recipit. & hoc quod selenion acre sit, & ratione acedinis irritans, mordens, calfaciens, & fluorem concitans ad affectas particulas, amarum vero exsiccat citra morsum, atque calorem, eoque exulceratis conducit. Thus concoquens, & pus mouens, intemperatis naturis præsertim, oleum leniens, ac pharmaca valida obtundens. Terra Anpelite tum siccans, tum digerens, chalbanum emolliens, concoquens, leniens, atque dolorem sedans, terebinthina detergens, discutiens, & etiam concoquens, bitumen siccans, Propolis attrahens. Mel siccans, digerens, putrescentibusque maxime congruum, & a putredine seruans, mel, & aloe citra rosionem siccans. Et 2. de medicamentis secundum locos. Capitis, inquit, dolor ob plagam ortus, multos medendi scopos habet ad inuenienda præsidia, vnus circa vlnus, quod postquam fuerit constrictum fibulis,

*Polychresta.**Panacia
Hora.**Marrubiū.
Selenion.
Acria.**Amara.
Thus.**Terra An-
pelite.
Galbanum.
Terebin-
thina.**Mel.**Scopi cura-
tini in dolo-
re capitis a
plaga orti.*

*a ventriculo
exortu.*

*Affectus o-
culorum.*

*Dentium
erosio.*

glutinantia, & arcentia phlegmonem medicamenta postulat: secundus contusioni est in-
tētus: tertius totus in doloribus est, qui interdum quidē in ipsis solis percussis partibus fiunt, plurimum etiam ratione connexionis ad vicinas etiam partes se extendunt, & ibidem in dolore capitis a ventriculo exorto, quod affectus capitis proprius non est, sed ab humorum noxiis vaporibus a ventriculo volitantibus exortus, quemadmodum etiam ob id genus succorum aliis suffusorum symptomata eueniunt, capiti adhibenda remedia non esse dicebat Gal. sed quam celerrime, qui in ventre consistunt succi vacuandi. Et 4. de medicamentis secundum locos in affectibus oculorum narrabat, quod si quis priusquā caput ab humoribus ad oculos diffluentibus purget, vtatur obturantibus pharmacis, vehementes dolores ob tunicas distentas inducet, & ob multitudinem influentium humorum, aliquando ipsam rupturam; aut erosionem pariet. Et 5. de medicamentis secundum locos loquens de dentium perforatione seu rosione: Corporum, inquit, erosorum medela erit, re- 12
siccatio vitiati influentis humoris, qui si paucus fuerit, per localia, exsiccantiaq; auxilia absumetur: si vero multus, vniuersi capitis prouidentia est habenda, quod quidem si ob vniuersum corpus affectū sit, huic etiā est p-
spiciendum: quapropter cum in arte medendi tanti ponderis sit affectuum simul implici-
torum

torum cognitio, vt ex Gal. vidimus, sequitur vt ars curandi implicita rectius inueniri, & implicatis affectibus recte accommodari possit, vt singulas affectuum complicationes repetiamus, hinc sumto exordio. Porro affectus impliciti, aut erunt eiuldē generis, aut generis diuersi. Et si eiuldē generis, aut erunt similes, aut dissimiles, aut contrarii. Et similia, aut erunt causæ similes, aut morbi similes, aut sympt. similia. Et dissimilia, aliud causæ dissimiles, aliud morbi dissimiles, aliud sympt. dissimilia. Et si contrarii, aliud causæ contrariæ, aliud morbi contrarii, aliud sympt. contraria. Sin autem erunt impliciti, & generis diuersi, aliam curationem postulabant similia, veluti causa morbus, similia, causa sympt. similia. Morbus sympt. similia. Causa morbi sympt. similia. Aliam dissimilia, & ex dissimilibus aliud causa, morbi dissim. Aliud causa sympt. dissim. Aliud causa morbi sympt. dissimilia. Aliā contraria, & ex contrariis, aliud causa morbi contraria, aliud causa sympt. contrarium; aliud morbi sympt. contrarium, aliud causa morbi sympt. contrarium. Atque hoc est illud cur in morbis similibus, veluti si trachæa arteria asperitate, & duritie laboret, a siccitate ortæ, vnde tussis, & vox vitiosa sequantur, similibus etiam medicamentis sint depellendi, veluti componendo simul emplastica cum mollicibus, emplastica pro tollenda asperitate, pro duritie emollientia, veluti tragacanthum, aut

*Affectuum
composito-
rum com-
plicatio.*

*Morbi simi-
les.
Tussis &
vocis vitia
a siccita-
te, curatio.*

*Causa simili-
les.*

*Scirrhus a
pituita.*

*Symptoma-
ta similia.*

*Dolor colic-
us a crassa
materia.*

*Morbi dif-
similes.*

*Ventriculi
intemperies
frigida &
humida cū
excoriatio-
ne oesophagi*

mucilaginem seminū maluarum, aut altheæ. sirupum violaceum, aut confectionē ex succo tusilaginis, ex quib. formatur eclegma. Causas vero similes, veluti in scirrho pendente a materia pituitosa crassēfacta, & indurata, & pituita tenui, & viscosa, emollientibus simul & abstergentibus, complicatis eas depellunt veluti bdellio ammoniaco, emollientibus calidis, & siccis vsque ad secundum gradum, admiscentes mel, lupinos, aloen, aut intra aut extra medicamenta admoueantur. Sympt. vero similia, veluti dolor colicus, a materia crassa inclusa intra tunicas cum alui astrictione, cum similia sint, ex eo quod vtraq; a constipatione proueniunt, aperientia lenientibus, & abstergentibus simul commiscendo erunt pellenda, veluti in clystere oxymelitis simplicis, ptisanæ collatæ singul. vnc. iij. admiscentes olei camomellini vnc. iij. a quibus habemus abstersionē, incisionem, & apertionem, & discussionem eius quod est abstersum. oleū enim non multum calidum imponendum est, ne nouæ materiæ attrahantur. Vbi autem morbi erunt dissimiles, medicamenta ex qualitatibus dissimilibus insignita, miscēda erunt, veluti in frigida & humida ventriculi intemperie, cum excoriatione oesophagi, baccas myrhtorū summach ad excoriationem facientia, ratione frigiditatis, & siccitatis, acerbitalis & astrictionis cum absinthio, rhabarbaro, & huiusmodi calidis & siccis abstergentibus, & incidentibus facien-

facientibus ad frigidam & humidam ventriculi intemperiem. In causis vero dissimilibus, *Causa dissimiles.*
 veluti in corpore atra bile, & ruffa repleto, cū *Bilis atra & ruffa.*
 medicamento etiam habente facultates dissimiles procedemus, veluti sach. aut succo granatoru, dulciū aut pomorū dulciū ad atrā bilē
 facientib. ratione caliditatis, & humiditatis ratione dulcedinis, & emollitionis admiscentes
 aquā, seu decoctū violarū, lactucā, & huiusmodi facientia ad bilem ruffam, ratione frigiditatis, humiditatis, insipiditatis, aciditatis, emplastificationis, & contemperantia. Ad eundē
 modum in symptomatibus dissimilibus, *Symptomata dissimilia.*
 veluti in dolore colico, & syncope ob spirituum inanitionem. Anodyna quæ calfacientia sunt *Colicus dolor cum syncope.*
 in primo gradu, & discutientia pro dolore admiscentes nutrientibus, calfacientibus, & odoratis, veluti oleum amygdalarum dulcium, cum vino maluatico, vbi vero morbi erunt *Morbi contrarii vlcus intestinorū cum obstructione epatis.*
 contrarii, medicamento habente facultates contrarias, veluti in vlcere intestinorum cum obstructione epatis, cum vlcus astringētia requirat, obstructio vero aperientia, admiscebitur
 sigillum lemnium, seu terram sigillatam, cum feniculo, spica, cinnamomo, semper aduertentes, vbi affectus impliciti erunt contrarii, vt Hydrops cum febre, *Hydrops cū febre.*
 vrgentiorem, medicamentum energiae maioris postulare. In *Causa contraria.*
 causis vero contrariis, veluti in hemitritæo *Hemitritæus pendens a pituita & bile simul.*
 pendente a pituita, & bile simul, decoctiones iubebimus habentes vires contrarias ex hor-

*Inflam-
tio in prin-
cipio cum
doloro.*

*Affectus
diuersorum
generum.*

*Febris ter-
tiana a bile
flaua.*

*Febris quo-
tidiana a
pituita.*

deo, vel endiuia cum pipere, cinamomo, absinthio, & huiusmodi. In symptomatibus etiā contrariis, veluti in inflammatione exsistente in principio cum dolore, quæ sane cum postulet repellentia frigida, dolor vero anodyna calfacientia, calfacientia aut augeant inflammationē, & defluxū, infrigidantia aut dolorē, admiscemus simul infrigidantia cū calfacientibus, habentes vtriusque rationem. Sed hæc de affectibus implicitis, & arte curandi cum remediis implicitis habentibus mixtas facultates depellendi affectus implicitos eiusdē generis, seu morbi sint, aut causæ, aut sympt. & hoc aut similia, aut dissimilia, aut contraria. Ex quorum similitudine facile erit cōstruere medicamenta, vbi affectus erunt diuersorum generum, velut morbus cum causā, aut morbus cum symptomate, aut causā cum symptomate, aut singula tria, simul, aut similia, aut dissimilia, aut contraria. Nam vbi morbus, & causā morbi implicita, erunt similes, postulabunt idem remedium contrarium, veluti in febre tertiana, intemperie calida, & sicca bile flaua, assatim erit refrigerandum. vbi autem morbus & causā morbi erunt contraria, veluti in febre quotidiana, quæ est intemperies calida & sicca pendens a causā frigida, & humida, pituita scilicet, pituitæ habebitur ratio, cū coquentibus, tenuantibus, tergentibus, incidētib: febris vero refrigerantibus, & humectantibus. Illudque in affectibus implicitis erit

tit aduertendum, non solum affectuum complicatorum esse habendam rationem, sed etiam temperamenti, & causarum externarum, qua ratione curandi ars adhuc variatur, veluti si morbus sit complicatus cum causa simili: cum temperamento vero contrario, & causa externa adhuc simili: veluti existente febre a bile in aere calido, & temperamento frigido, maxime refrigerante erit vtendum, quod non solum affectus, & causa, sed etiam aer quatenus insalubris est, & intemperie habet morbo similem, refrigerantia postulet: temperamentum vero similibus erit seruandū 7. met. 9. & alibi. Sed de circumstantiis, quoniam suo loco agemus: sequitur vt percurramus alia, quæ circa affectuum distinctam, & exactam cognitionem requiruntur, vt distincta, & exacta consurgat curandi ars. Quæ sane tot numero sunt, ordo, tempus, & quantitas. Quorum triū ordo, affectuum implicitorum est proprius, quantitas autem & tempus vtriusque tum simplicibus, tum implicitis sunt communia: ordinis igitur erit habenda maxima ratio in implicitis affectibus, quo in simplicibus non indigemus. Nempe morbum solitarium, cui nec comes sit causa, nec symptoma aliquod graue, nec alius morbus, simplici remedio depellimus, ac simplicis affectus, simplicissima est per contrarium curatio, veluti si corpus, vel humor, aliudne contentum, calidius euaserit, cuius efficiens causa esse defierit, facile

Temperamenti & causarum externarum etiam habenda est ratio. Febris biliosa in aere calido, temperamento humido.

Ad exactam morborum cognitionem tria requiruntur. Ordo. Quantitas. Tempus. 1. Ordo.

Simplicis affectus simplicissima curatio.

*Ordo neces-
sarius in af-
fectibus im-
plicitis.*

*Omnis cau-
sa prius est
depellenda
quam affe-
ctus.*

*Causa sunt
triplices.*

*Causarum
remotio
ordinem
etiam
posulat.*

est contrario refrigerante ad mediocre, tem-
peratumque restituere. Si frigidius, solis calfa-
cientibus, si repletum sit humoris copia, va-
cuantibus, si inanitum sit, replentibus, eadēq;
ratione in cæteris, omnem exsuperantiā con-
traria depellet exsuperantia. At in morbis im-
plicitis non solū contrariis est pugnandū, sed
etiā perpendendum prius, a quo exordiū cu-
rationis sit faciendum. In his igitur, vt ordinis
habeatur ratio, perpendendum erit morbus
ne sit implicitus causæ, an vero morbus mor-
bo, si morbus causæ erit associatus, semper a
causæ curatione erit exordiendum. Nam cum
a causâ immutante continue foueatur mor-
bus, causâ omnis prius quā affectus est depel-
lenda, cum ea persistente, si morbum adnita-
ris remouere, quantum de morbo demseris,
tantundem assidua, & continens causâ (nun-
quam enim naturalis cum sit otiosa manet) p-
ferat, quare causâ primū, dein genitus affectus
erit remouendus, nihil vt deinceps repullula-
re possit. Hoc autem non solum in causâ con-
tinente intelligendum, sed in omni causarum
genere, quæ cum triplices sint, externa, ante-
cedens, continens, hoc singulo causarum ge-
neri commune est, vt prius causâ, quam affe-
ctus tollatur, quinimo etiam inter ipsas cau-
sas, ordo seruandus, vt sicuti earum mutua in-
ter se adhesio, copulatioque reperitur talis,
vt alia ex alia nascatur, & existat, nempe con-
tinens ex antecedente, antecedēs ex euidente
defluat,

defluat, suo etiammet ordine quæque erit demenda, ita vt primo dematur euidens, quæ reliquarum est effectrix, dein antecedens quæ continentem efficit, ac mouet, ab his sensum, ordinatimq; ad cæteras, postremoque ad morbum progrediendum erit, atque horum omnium vitium contrario erit depellendum, quod symptomatum, nulla sit propria curatio neq; iis contrarium quicquam e regione obiciatur, quod sublati morbis ea protinus euanescent. Quo autem remedii genere in antecedentibus, & continetibus vtendum sit, hoc particulatim locis propriis discutiendum: Vbi cuiq; determinato vitio determinatum & proprium remedii genus sumus explanaturi. Patet igitur in morbis causæ associatis, causam prius esse demendam, & vbi causæ omnes conspirant, quo ordine quæque sit demenda, atque hoc est illud cur Gal. I. de med. secundum locos, in affectibus pilorum capitis primum totius corporis purgationem molitur pharmaco purgante determinatum humorem peccantem, redundantemque, & post totius corporis euacuationem apophlegmatismis vt iubebat, dein localibus auxiliis, quamquã sola purgatione (in affectionis tamen principio) adulescentem se curasse fatetur. Atque hoc est illud, quod ait Gal. loquens lib. x. de comp. med. per loca de articularibus doloribus. curatio, inquit, ipsa exordienda est ab euacuatione affligentis humoris, siquidem ex æquo humo-

*Euidens
primo de
menda est.*

*Symptomatum nulla
est propria
curatio.*

*Scopi curat:
in affectib.
pilorum
capitis.*

In articularibus doloribus.

*In Ischiade.**Ordo curationis morborum implicitorum.*

ribus redundarit, venæ sectione primum omnium administrata, dein purgatione, quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens atque opportunus vsus. Et ibidē: Ischiade, inquit, urgente non esse vtendum acribus medicamentis circa partem affectam ante totius corporis euacuationem, quod quemadmodum sola saepe sanguinis euacuatio sufficiens auxilium existit, sic contra in omni dolore coxendicum, & præsertim eo qui ex humorum copia exortus, si quis ante euacuationem totius corporis, acribus pharmacis circa partem affectam vtatur, affectum ægre curabile reddit, copia videlicet indissolubiliter ibi condensata, ob idque ab euacuatione incipiendum est, non solum a cruribus, sed a cubito etiā sanguinis detractione facta. Sequitur modo, vt percurramus, quo ordine demendi sint morbi simul impliciti, in quibus sane perpendendum erit, an morbi impliciti nihil inter se consentiant, an vero consentiant. Sique nihil inter se cōsentiant, ita vt ambo seiuncti ac disparati sedibus in corpore distantes, suam seorsum medendi rationem obtineant, poterit vterque, & sigillatim, & seorsum alter ab altero, & etiam pariter omnes curari, minimumque refert, cui primum propria remedia decernat. Sin autem morbi inter se consentiant, perpendendum erit an ita conueniant simul, ita vt vnius sanatio alteri sanando conducat, aut saltem nihil incommodet. An vero in hoc consen-

B

consentiant, quod vniufuis curatio prorsus incommodet alteri curando, an vero partim cōsentiant, partim dissentiant. Si ita consentient simul, vt vnius curatio alteri curando conducatur, aut saltem nihil obsit, tunc vtrumque simul & seorsum sanare licebit, & si seorsum curaueris ab vtrouis incipias, ars non vetabit, veluti si iecur frigida intemperie, simulq; obstructione simplici teneatur, ex quarum permixtione implicitus morbus insurgit, licebit emendare intemperiem medicamentis, quæ obstructionem nec expediant, nec geminent, licebit etiam obstructionem expedire intemperie remanente, licebit etiam simul iisdem remediis vtrumque tollere, tum obstructionem, tum intemperiem. Sin autem ita simul consentient, vt vniufuis curatio alteri sanando prorsus incommodet, proprie magis dicemus eos inter se dissentire, tunc nec prorsus huic, aut illi, sed vtrique medicritate quadā, & contrariorum permixtione erit succurrendum. Sic enim ventriculum frigidiorē, & iecur calidius temperata iuuant, quæque ex calidis frigidisque constant, & modo horū, modo illorum vltus alternatus. Nam vbi vtrique incremento iam vires acceperint, quoniam contraria præsidia postulant, difficile sanescunt, ac plerique desperati, & insanabiles permanent. Vbi autē morbi simul impliciti partim consentient, partim dissentient, ab eo aspiciendum erit cuius curatio alteri haud qua-

*Iecoris intē-
peries frigi-
da & ob-
structio
simplex.*

*Ventriculus
frigidior &
iecur cali-
dus.*

Ophthalmia albugo implicita.

Vrgentiori morbo prius occurrendū est.

Symptomata quandoq; curam ad se trahunt.

quam officiat, & ab eo, sine quo alterius curatio compleri nequeat, ad hunc modum, si enim ophthalmia implicetur albugo, quoniā acribus hanc detergere non est, quin noua accersatur fluxio, exasperetur phlegmon, hæc in primis erit sananda, mox detergenda erit albugo, quamquam non hæc duntaxat, sed in omni implicatione morborum commune est, vt in morbis cōnexis, & implicitis semper aduertatur, quinam eorum vrgentior sit. vrgentior autem, ac periculosior affectus esse dicitur, aut si magnus existat morbus ratione suæ essentia, ita quod propriæ essentia magnitudine sit periculosus, vel ratione præstatiæ functionis læsæ, seu dignitatis facultatis offensæ, quarum periculosissima ea existit, quæ vniuersalem facultatem prosternit, & vires frangit corporis gubernatrices, & quarum cōseruandarum gratia instituitur omnis curatio. Et in iis sane ab eo incipiendum erit morbo, a quo maxime agro periculum impendet, etiā quod ex huius posterioris morbi curatione 14 prioris curatio fiat longior, ac difficilior. Etenim etsi ab inceptione vrgentioris morbi ferocius affligentis, & prosternentis agrotantis vires, in agro læsio sequatur, ac longior curatio; ab hoc tamen melius est ordiri, quod læsio morte ipsa sit tollerabilior. Ad eundē modum seniori quandoq; symptomati, quod vires nimio opere conuellat, aut prosternat, morbo interdum prætermisso, succurrendū erit, nam

nam etsi sublato morbo protinus sympto-
ma euanescat, quod nusquam in corpore sub-
sistat, si tamen nimium graue infensumq; est,
leniendum protinus, quoniam tunc sympto-
matis sanatio est, non qua symptoma, sed qua
aut offensus virium, aut noui cuiusdam af-
fectus causa existit morbo tantisper omisso,
omni ratione vires fulciendo, & reficiendo,
quo & morbo obsistere, & toto curationis
spatio satis esse possint. Quemadmodum loco
proprio, vbi de symptomatibus trahentibus
ad se curam, fusius pertractauimus. Haecenus
de ordine qui affectuum implicitorum pro-
prius erat. Sequitur tempus, quod necessario
requiritur, vt ars curandi recte, & conuenien-
ter fiat, & determinatū tempus exhibendi re-
medium statuatur, atque praescribat, cuius quidē
electio elicietur ex temporibus ipsorum affe-
ctuum. Nam veluti genus curandi, siue reme-
dii genus, elicitur ex distincto morbi genere,
& affectus, ita profecto tempus exhibendi re-
medium elicietur ex temporibus affectus ac-
talis erit curationis mutatio, qualis erit mor-
borum per sua tempora, cum enim tempus
sit mensura pugnae, ac variae mutationis factae
inter morbum, & naturam, ac nihil, quod
felix sit, medicus efficere, ac citra naturae opē,
cuius minister est, tentare possit; sequitur, vt
medicus naturae progressum habeat imitari,
si eam sibi adminiculantem habere debet. Ex-
emplis certe hoc manifestum fiet, praesertim

II.

*Tempus ex-
hibendi re-
medium
elicitur ex
temporibus
morbi: vt
remedium
ipsum ex
distincto ge-
nere morbi.
Curationis
talis est mu-
tatio qualis
est morborū
per sua tem-
pora.*

E

*Tumor præ-
ter naturā.*

*In princi-
pio.*

In statu.

*In augmen-
to.*

in morbis compoſitis, in quibus temporum
varietates magis ſunt euidentēs. tumor præ-
ter naturā, cum ſit morbus pendens a mate-
ria, & omnes morbos a materia replente, e-
uacuatio ſanet, ſequitur quod etiam tumor cū
pendeat a materia repletionē, ſemper ſit cu-
randus per euacuationē, nec vnquam varia-
bitur curandi genus, ſeu ſit in principio, ſeu
augmento, aut ſtatu, aut declinatione. Sed
modus duntaxat curandi variationem ſuſci-
piet talem, tempora morborum per ſua qualis
erit. Vnde in principio etſi euacuandum ſit, nō
tamen euacuandum erit, per reſoluentia, quo-
niam cum materia adhuc fluat, præpararemus
nouum fluxum, ſed euacuabimus cum iis quæ
reprimunt, reperiētibus, frigidis, & aſtrin-
gentibus, quod hoc modo euacuantes non ſi-
nimus materiam fluere, & locum præter hæc
corroboramus. cum autē tumor erit in ſtatu,
in quo tota materia, iam fluxit, neque pericu-
lum eſt, quod amplius defluat, cū in ſtatu ha-
beamus morbum factum, tunc adhuc erit e-
uacuandum, ſed non amplius cum iis quæ re-
pellunt, aliter faceremus retrocedere materiā
corruptam. Stante tamen ſemper eodem cu-
randi genere per euacuationē, euacuabimus
ſane, ſed cum iis, quæ diſſilant per halitū. Cum
autem tumor deuenit ad augmentū, cum-
que augmentum medium ſit inter principiū,
& ſtatum, nempe quod in augmento morbus
partim factus eſt, partim adhuc fiat, ſtante ad-
huc

huc eodem curationis genere, nec variato, euacuabimus sane etiam in augmento, sed modo euacuandi diuerso, nempe medicamentis mediis, quæ partim repercutiant, & partim resoluant. Ex quo patet quomodo ad temporū variationem ipsorum affectuum, varietur etiā ars curandi, & remedia, quibus ars ipsa curandi reuocatur ad vsum, atque hoc est illud, cur Gal. i. de med. sec. genera, phlegmone incipiente, atque augeſcente, astringere, atq; refrigerare opus eſſe inquit, & ideo emplaſtrū phœnicinum ex vino, vel aceto, vel aqua, vel oleo immaturo, vel astringente liquare docuit, quod in principiis phlegmonum, vim repulſoriam augere oporteat, in incrementis repulſoria minuenda, digerentium virtus augenda, in ſtatu pares vtrorumq; vires conuenit eſſe, niſi vehemens dolor pharmacum leniens requirat, inclinante vero phlegmone viſ digerendi augenda, qua ratione docet vti prædicto empl. phœnicino ſecundum varias indicationes, variis oleis, atque ſuccis liquato, roſaceo quidē in phlegmone eripſelatode, ſimul cū vicia acerba, & portulacæ, & ſemperuiui ſucco, vbi æſtas ſimul adfuerit, ſi perfectum non fuerit eripſelas, phœnicinum, emplaſtrum ſuccis diluit, moderate refrigeratibus, ab his tranſit, & commiſcet cum lini ſeminis, & camomelli ſucco, tandem ſolo emplaſtro, nihil aliud miſcens, vtitur, vbi vero eripſelas liuidum ob refrigerantium vſum eualeſcit ſolo phœni-

*Phlegmone
incipiens.*

*In augmen-
to*

In ſtatu.

*In declina-
tione.*

*Phlegmone
eryſipelato-
des*

*Eryſipelas
liniaum.*

*Capitis do-
lor ex ardo-
re.*

*Capitis do-
lor cū febrī.*

*Diamoron.
Caus.*

cino veteri oleo liquato illud discutere docet, quamquam nonnulli sint, qui calcis viua non-nihil ipsi pharmaco admisceant, & 2. de med. secundum locos iis qui ex ardore caput dolēt, principio repulsoria curatione, ait esse vtendum, ex refrigerantibus, & astringentib. constante, postea mitigatoria, & cōcoctoria pharmaca ad repulsoria ait miscere opus esse, dein etiam ex discussoriis quippiā addendum, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt, optima autem, inquit, sunt censenda quæ substantia tenuium partium sunt prædita: Et ibidem in doloribus capitis qui ab initio inuasērunt cum febribus, venam secāt Gal. post primam, aut secundam remissionē, nisi quid impediāt, & præsertim in corporib. bonæ habitudinis, & multo sanguine redundantibus, vbi autem serius, post tertiam diem dolor prehenderet, aluo prius abunde per clysterē soluta, cucurbitulis ad occiput, aut ceruicem affixis, & capitis irrigationibus ex oleo: Et 6. de med. secundum locos, quemadmodum, inquit, in principio utilia sunt pharmaca repellentia id quod influit, sic post principium vsq; ad finē pharmaco opus est ex vtriusque mixto, repellente videlicet facultate, & discutiente prædito, ac primo quidem tempore astringens præcellere oportet, ad finem vero discutiens, atque interposito tempore æquales vtrorumque partes esse conuenit. Merito inquit, qui pharmacum diamoron composuit, parum ex croco, & myrrha

& myrrha ei commiscuit, quod communem *Myrrha:*
 habeant facultatē concoctoriam inflamma-
 tionum, priuate vero crocus quidē astringat,
 myrrha autem calfaciat, in tantum, vt sufficiē-
 ter discutiat, tenuiuni partium etiam substan-
 tiam possidens, qua facile in altum subire pos-
 sit, viresque aliorum medicamentorū dedu-
 cere. vnde in principio, inquit, ad pharmacū
 diamoron soleo admiscere rosarum succum,
 aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas
 rosas siccas, necnon balaustium, citinos, mali-
 corium aridum, & huiusmodi: At vbi iam in-
 flammatio cōstitit, sufficit ad mororum succū *Inflamatio*
 addidisse tantum crocum, & myrrham, vt ipsa *consistens.*
 inflammatio coquatur, quæ vbi cōcocta fuerit,
 addere aliquid ex discussoriis licet, cuiusmo-
 di sunt nitri spuma. Et paulo post addit: Ego *Inflamatio*
 autem pharmacum ex succo nucum viridium *nes oris.*
 confeci facultate ad oris inflammationes, cē-
 teris omnibus stomatici plurimum antecel-
 lens: cuius compositio est huiusmodi, succum
 externi nucum viridium corticis, cum mellis
 iusta portione coquo, donec ex vtroque mel-
 lis crassitudo consistat. Et paulo post, addit:
 optimum itaque ac simul suauem esse nucum
 succum mihi persuadens, eum in quatuor par-
 tes diuidō: Et ad primam, statim aliquid ex a-
 stringentibus misceo. Ad secundam, ex cro-
 co, & myrrha. Ad tertiam, sulfuris, & nitri nō-
 nihil. Quartam vero solā sinceram seruo, ob
 dulcorem, futuram vtilē pueris, mulieribus

*Scopus cu-
pationis
podagricis
arthriticis.*

*III.
Quantitas
remedii
curationis
elicitur ex
quantitate
affectus.*

*Curationis
finit.*

*Quantitas
remedii*

*Remedii
tantum in
eodem gene-
re applican-
dum est
quantus est
recessus.*

que, & viris effeminatis. Ex x. lib. de cōp. med.
per loca, loquens de podagricis, & arthriticis
affectionibus, scopus, inquit, in hisce est affe-
ctibus, siquidem adhuc fluant humores, ipsos
per altitinentia repellere: si vero amplius nō
influant, dicere qui sunt iam impacti. Se-
quitur quantitas affectuum, quæ sane indica-
re solet remediorum, & curationis quantita-
tem. Nam sicuti genus curandi elicitur ex ge-
nere affectus: & tempus applicandi remediū,
ex temporibus affectuum: Ita sane quantitas
remedii, ac contrarii elicitur ex quantitate
affectus: & distincta quantitas contrarii ex de-
terminato quantitatis recessu: cuius quidē ra-
tio ex hoc manifesta fiet. Etenim si finis cura-
tionis est, ut actiones lesæ antiquæ suæ digni-
tati restituantur, sequitur igitur utique, ut co-
lusque etiam curatio sit promouenda, dum in
pristinum habitum (cuius memores oportet
esse) fiat regressus, quod eo redire opus sit (si
pristinus habitus habet restitui) vnde morbus
exordium sumpsit. Atqui cum in pristinū habi-
tum restitutori sumus, quoties remediū con-
trarium æquale in eodē gradu applicabimus
(nimirum quod si maioris gradus esset reme-
dium contrarium, aut minoris, cum altero ad
oppositum ducatur, altero vero curatio non
perficietur) sequitur quod remedium contra-
rium tantum esse debet, quantus est recessus,
veluti intemperies a temperamento recedens
per quatuor gradus caliditatis, aliter ad pristi-
num

num habitum non poterit reduci, nisi remedio contrario frigido per quatuor gradus a temperamento. Et in morbis cum materia vbi aderunt tres heminae humoris peccatis, euacuandae erunt medicamento habente vim euacuandi tres heminas duntaxat, nec plures, nec pauciores. Quapropter affectuum quantitas eadem remedii quantitate contraria erit curanda. nam tamen si actio duntaxat a proportionem maioris inaequalitatis sequi possit, vt ait Aristot. illud tamen intelligendum est, in generatione, quoties vnum in aliud verti, & transmutari volumus, non autem in rerum mixtione, & temperantia, quomodo volumus duos caliditatis gradus, cum duobus frigiditatis esse ponendos, non vt calor, frigus expellat, sed vt simul contemperentur. Quare patet, curationis, & remedii contrarii quantitate eliciendam esse ex quantitate affectus, ac tantum remedii applicandum esse in eodem gradu, quantus est recessus. Cum autem applicatio huius quantitatis in eodem gradu dupliciter fieri possit, vel applicando totum remedium tantae quantitatis, quantus est recessus vniuersum, ac semel exhibendo, vel pluribus vicibus sensim, ac paulatim contrarium partiendo: Sequitur vt inquiramus, vtrum quantitas remedii, primo modo semper sit applicanda, an secundo modo semper: an potius quandoque primo modo, quandoque secundo modo, quod quidem facile manifestum fiet, si percurramus v-

*Quantitatis
in eodem
gradu fit
dupliciter.*

tilitates, atq; incommoda huius & illius. Porro remedium in contrarietate par morbo existens, etsi hanc utilitatem secum gerat, quod ita vehementer immutat, ut sua cum morbi colloctatione tantum detrahere possit affectus, quantum erat inductus, hoc tamen incommodi secum affert, ut non citra corporis offensionem, magnamq; naturæ iacturam affectum sibi demoliri liceat, & hoc quod in contrariorum validorum pari robore, magna vi, & utriusque iactura configatur, multoque magis ei, aut corporis, aut partis affectæ substantia rara, aut eximio sensu prædita sit, atq; hoc est illud, quod ait diuinus Hip. vniuersim, & repente, vel euacuare, vel replere, vel calfacere, vel infrigidare, vel alio quouis modo corpus mouere, periculosum. Remedium vero in contrarietate impar existens lente scilicet, paulatimque exhibitum affectum minuat, eaq; ratione iunet, cum tamen hoc incommodi secum ferat, ut affectum prorsus non tollat, nec sanet: quod enim ordine, exempli gratia, secundo frigidum est, haud quaquam poterit quarti ordinis calidum affectum semel, & vniuersim eximere, sed eius portionem aliquam duntaxat delebit, depeiletque, cum tamen ex altera parte naturæ consulat, ea, quam minimū fieri potest, offensa. Sequitur hanc quoque curandi rationem remedio sensim, paulatimque exhibitio magnæ utilitati esse arti medicæ. Ex hoc sequitur curationem factam remedio contrario,

*Remedium
sensim paula-
timque
exhibitum
præstat eo,
quod vni-
uersim &
repente of-
fertur.*

trario, quantus est recessus, duplici via administrari posse, & vtramque curandi arti vtilem esse. Sequitur vt ostendamus in quibus affe- & iū generibus liceat vti remedio aequali, & tanto, quantus est recessus, & in quibus vti liceat remedio inæquali sensim, & paulatim exhibito.

Porro primo curadi genere aequali ipsi recessui in duobus morborū generibus licebit vti, in leuiorib. scilicet, & in iis, qui extremi sunt, ac periculosi: in leuioribus quidē affectibus, & hoc quod remedium par in contrarietate leuioribus morbis existens, ac semel, vniuersimque morbos summouens, id efficere possit, nullam corpori, viribusque insignem vim, aut noxam inferens, in extremis vero, ac periculosis, eo quod cum præcipites sint, & acerrimi, vt apoplexia, breui vires sint extincturi, nisi remedio proecedatur tanto, vt semel, vniuersimque morbum depellere possit, atque hoc est illud, quod ait Hipp. extremis morbis, extrema diligentissime remedia esse adhibenda. Intellico autem per extremos morbos, eos quoq; in quibus materia turgente, initio statim præstat valentissimum afferre remedium, quam sinere vt ea materia principem aliquam partem obruens, vniuersas vires mox concidere faciat. Ceteros vero ab his morbos, qui nec leuiiores sunt, nec præcipites, ac periculosi, sed qui mediocres potius existunt, remedio inæquali sensim scilicet, & paulatim exhibito tutius depelli posse, dummodo reme-

*In morbis
leuioribus
& extremis
semel & vniuersim
depellimus.*

Morbi extremi.

*Morbos mediocres
paulatim
tollimus.*

*Artis admi-
nistrandi
quantitatē
remittit cō-
firmatio te-
stimonia
Galeni.*

*Vlcera con-
tumacia &
eruenta.*

*Medicamē-
torum quā-
ritas neces-
saria est.*

*Nervorum
punctio.
Canis rabi-
di morsus.*

diorum vires ita imbecillas, & languidas nō exhibeamus, vt morbus vehementior eas, vel etiam iteratas aspernetur. Haftenus de arte administrandi quantitatem remedii, ab affectus quantitate desumptam. Sequitur vt percurramus locos, in quibus huiusmodi quantitatem a Gal. seruata obseruauimus, atq; hoc est illud, cur Gal. de med. secundū genera. Vlceribus, inquit, contumacibus, eruentis, glutinatione indigentibus, fistularumq; in callū nō induratarū adductione, & citra morsum exsiccatione: idem medicamentum candidum, & 16
ex oxelgo & clythargyro confectum valebit, nēpe olei, & aceti duplo maiorem portionem, quam argenti spumam miscendo, quod maxima liccandi potentia polleat. Et 2. de med. secundum genera. Vlceris, inquit, pro diuersitate, & corporum, eruginis nunc duodecimam, vel decimam, vel octauam partem admisce, inquit Gal. Emplastro viridi. Et 3. de med. secundum genera. Medicamentorum, inquit, non solum qualitas, sed etiā quantitas est conuenienda, quippe quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est, vt siccitatis quantitas, copiae humiditatis respondeat. Et 3. de med. secundum genera. Nervorum, inquit, punctiōi medicamentum ex euphorbio conuenire, & ex pice liquida, quod etiam vtile ait esse ad canis rabidi morsus, quod in aceto coquitur, vt pūcturę oras, conuiuere non sinat, & pharmacum ex colum-

eolumbarum stercore confectum. Et 4. de
 med. secundum genera. Vlcera, inquit, dys- *Vlcera dys-*
 epuloticorum, malignorumq; cum alterum *epulotica.*
 altero malignius sit, & dysepuloticum magis,
 tot etiam desiderantur auxiliantia pharmaca,
 quot fuerint ipsorum vlcera differentia. In
 promptu tamē duo, maximi, minimique ratio-
 ne differentia adesse debent, quæ omnia id ge-
 nus vlcera curare possint. Et 4. de med. secun-
 dum genera. Quod, inquit, vlcera maligniora *Vlcera ma-*
 valentioribus indigeant remediis, imbecillio- *ligna.*
 ribus autem mitiora, qua ratione pharmacum
 ponit ad mitiora vlcera cicatrice inducenda,
 & alia quæ faciant ad vlcera maligniora, & dys-
 epulotica. Et 5. de med. secundum genera. Vl- *Vlcera pu-*
 cera, inquit, putrida, cum ambientes partes *trida.*
 depascent: Nomæ proprie appellantur, vhe-
 mentissimis medicamentis indigent, vt sæpe
 in eis etiam cauteriis vtamur. Et 1. de med. se-
 cundum locos. Alopecias, inquit, inueteratas, *Alopecia in*
 ac difficulter curabiles cum fortibus esse cu- *ueterata.*
 randas. Incipientes autem, & paruas cum im- *Alopecia*
 becilibus: Et ibidem. Affectu, inquit, perse- *incipiens.*
 uerante in alopecie rebellis curatione, præter
 medicamentum assidua rasura utebatur, & ru-
 bificatione ex sinapi, frictionibus, & post fri-
 ctiones scarificatu, & quidam acicularum a-
 ceruo affectam cutim compungunt: vbi etiam
 ait, esse curandum, vt in aere calido, insolatoq;
 (si id fieri posset) pharmacum applicetur. Et i- *Capillorum*
 bidem in capillorum defluuio omnium præ *defluuium.*

stantissimum medicamentum dicebat esse, q̄
ex ladano, & lentiscino oleo cōficitur: vbi au-
tem large defluerent capilli, maiorque cutis
raritas, pro lentiscino myrtheo agebat esse v-
tendum, quamquam a vehementer astringē-
tibus cauendum esse aduertebat, quod omnia
refrigerent, & alimenti influxum reprimant,
propter cuius inopiam capilli defluunt, & ibi-
dem in defluuio capillorum resectoriam, salu-
bremque victus rationem, in plerisque etiam
solā sibi satis fuisse profitetur Gal. Et 2. de med.

*Dolor capi-
tis ex frigi-
ditate re-
cens.*

*Dolor capi-
tis inuete-
ralis.*

Opium.

*Dolor au-
tius.*

secundum locos: Dolorem capitis ex frigidi-
tate contractum, qui recens sit, solo rutaceo
oleo calido syncipiti affuso, perfecte hominē
sanabat: In inueterato autem in oleo euphor-
biā indebat, & pharmacis vtebatur ex pipere
constantibus, & in capitis inueteratis affecti-
bus necessario pilos radebat, aut præsecabat
ad cutim vsque: Et eodem in lib. Opio, inquit,
eo tantum tempore vti cogor, dum præ do-
loris vehemētia eger de vita periclitatur, quod
sensus exstinguat, maximeq; solidas partes of-
fendat, adeo vt postea correctione sit opus, &
tertio de comp. med. per loca. In dolore auriū
pharmacis ex papaueris succo omnib. sensum
stupefacientibus, tunc solum sane vtendum **B**
esse inquit, vbi nullum aliud mitigatiuum do-
loris contulit, admisceoque castorium papa-
ueris succo, vt vehementem eius frigiditatem
retundat: Et quarto de comp. med. per loca. In
lippitudine inquit seu ophthalmia. Foveri o-
culi per

culi per spongiam debent ex meliloti, & fenugræci decocto, semel quidem, aut bis in die, si mediocris sit dolor, sæpius autem, si vehementior. Et 6. de comp. med. per loca, loquens de columella. Sane, inquit, quemadmodum in aliis omnibus, in quibus ex humorum influxu contingit morbus, sic & hic prima auxilia debent fluxionem ipsam repellere, quare astringentis sint facultatis oportet. Verum si quidem influxus sit moderatus, moderate astringentis, quã priuatam austeram vocant, si vero vehementior, acerbæ, ambæ si quidẽ facultates astringunt, sed debilius austeræ, vehementius acerbæ. Et eodem lib. loquens de aphthis, verumtamẽ, inquit, etiam infantes illino, si quidem subrubras videro aphthas: in principio quidẽ iis quæ moderatissime astringunt, & frigefaciunt, deinde vero eis, quæ citra mordacitatẽ discutunt. Si vero subflauas videro, iisdem vtor, sed magis refrigerantibus. At si pituitosiores, astringentibus, at si nigrescentes, discussoriis generosioribus. Sed hæcenus de affectu, & remediorum, & curationis quãtitate, quæ remedii quantitas ex sola affectuum quãtitate indicata, cum manca adhuc sit, atq; incoata, nisi quantitas remedii contrarii, quã morbi magnitudo præscripsit etiam pro partis affectæ cõditione, & situ præscribatur. Sequitur igitur vt locorum affectorum naturam percurramus, quod erat secundum a nobis propositũ pro recte, & conuenienter tradenda curationis arte,

*Columella**Aphthæ.*



IO. PAULI PERNUMIA
PATAVINI.

De curationis arte.

LIBER SECVNDVS.

SI CONDITIONES partium corporis humani, eandem temperaturam, & compositionem, operationē eandem, eandem præstantiam, seu dignitatem, eundem vsum, ac sensum obtinuissent, eandem etiam remedii contrarii quantitatem postulassent omnes. At naturæ necessarium fuit, variam compositionem, diuersam dignitatem, atque operationem, connexionē variam, & situm, multiplicem sensum illi adhibere, pro varia, ac multiplici earū actione. Ita vt quo ad formationem, quædam obtinuerint plures vias, ac meatus, quædā pauciores, quædam vero nullum. Quoad cavitatem, quædam obtinuerint foramina sensibilia, vt pulmo, quædā solidiora, vt renes. In situ, quædam in summo corpore fuerunt constituta, ac parum distantia ab ore, vel ab eo loco, cui remedium est applicandum, veluti ventriculus: quædam vero in alto corpore magis fuerunt demersæ. Quoad dignitatem, quædam sunt partium

*Partium
varia est
formatio.
Cauitas*

Situs.

Dignitas.

partium corporis, quæ principes existunt, a quibus corpus vniuersum gubernatur, cuiusmodi sunt cor, cerebrum, iecur: quædam vero munus publicum habent, & toti corpori commune, qualia sunt, pulmo, ventriculus, intestina, renes, vesica, & quæ iis subseruiunt, venæ, arteriæ, & nerui: quædam vero munus priuatum sibi duntaxat, non aliis utile. In sensu vero, quædam sunt hebetis sensus, quædam vero acutioris, quam ob rem necessariū fuit, vt etiam remedii contrarii quantitas, recte, & cōuenienter præscriberetur, immutaretur, ac varia fieret, pro varia partium corporis constitutione. Qua ratione, vbi continget partem substantia rariorem, vt pulmonem, ac partes densas, & compactiores, veluti renes, eodem morbo, atque eiusdem recessus morbo laborare, & si quoad eandē morbi magnitudinem, eiusdem ordinis contraria remedia postulent: tamen si rationē partis affectæ perpendamus, qualitatem remedii variare cogemur, partibus rarioribus mitiora, densis vero, & compactis validiora exhibentes. Rursus si contingat partem in corporis summo positam, vt abdomē, extrinsecus inflammata esse, eademque inflammatione laboret iecur in alto corpore demersum, & si quoad eandem morbi magnitudinem, eandem remedii quantitatem exposculent: tamen si situm partis affectæ perpendamus, valentiora, atque attenuantia magis iecoris, quam abdominis extrinsecæ inflam-

Sensus.

*Pro varia
partium
corporis
constitutione
variant
remedia.*

*Partibus
raris mitiora
densis validiora
conueniunt.
Abdominis
inflammatio
iecoris
inflammatio.*

*Via longi-
tudo veh-
ementiora
requirit.*

*Renēs vali-
diora postu-
lāt quam
ventriculus.
Digniores
partes mi-
tiora quam
ignobiles.*

mationi iubebimus exhiberi, & hoc quod via
longitudo actiora, & vehementiora requirat,
ratione cuius tantum augenda a nobis est re-
mediū quantitas, vltra id quod nobis præscri-
pfit morbi magnitudo, quantum deperdi pos-
se putamus in transitu, in quo remedia, dum
aliis permiscetur humoribus, non leuē mu-
tationem subeunt. Eadem ratione ex assum-
tis, vehementiores renibus, quam ventricu-
lo exhibebimus: & hoc, quod in ventriculum
illapsa, qualia sunt perueniunt, ad renes vero
hebetiora, & imbecilliora reddita. Rursum si
pars aliqua dignitate præstans, ac pars priuata,
& ignobilis eadem morbi magnitudine labo-
rent. Etsi morbi magnitudo eandem remedii
contrarietatem requirat in vtrisque, ratione
tamen præstantiæ partis affectæ, ad vitæ con-
seruationem fabricatæ, mitiora semper adhi-
beamus remedia, quæ quadam etiam corro-
borandi facultate polleant. Priuatis vero,
atque ignobilibus vehementiora, & tanta
quanta exposcet morbi magnitudo. Eadem
ratione a situ sumta: Si enim per os veli-
mus euacuare a pulmone, cum adsit magna
distantia, nempe, quod opus sit, medi-
camentum prius deuenire ad œsophagum,
ab œsophago ad ventriculum, a ventri-
culo ad mesaraicas, a mesaraicis ad epar, ab e-
pate ad concauum, a concauo ad conuexum,
& per venam concauam ascendentem deue-
nire

LIBER SECVNDVS.

81

nire ad pulmonem, deinde per pulmonē spargi: nulli dubium, quod longinquitas situs augebit quantitatem medicamenti: vt si medicamentum ratione quantitatis morbi in ordine ad tria requiratur, ratione tamē longinquitatis ipsius situs, in ordine ad quatuor erit exhibendum. Ad eundem modū, quæ vi sentiendi præstabunt, vt oculus, os ventriculi, nō ita acris, & vehementibus medicamentis erunt tentanda, quorum tamen vehementiā, partes, quæ hebetioris sunt sensus nullo incōmodo sustinere, ferreque poterunt. Ad quod respiciens Gal. lib. de med. secundum genera. In cura neruorum, quæ sensuum sunt instrumenta, a rebus mordicantibus cauendum esse monet, tametsi valide abstergentibus indigeremus. Quoniam igitur ex iis, quæ in affecta sede digna consideratione sunt, & ex intellecta morbi magnitudine elici solet quantitas remedii præscripta, quam validum, quo gradu recessus, quo pondere, & qua forma etiā conueniat, quapropter sequitur vt diligētius percurramus, quomodo loci affecti diuersitas diuersitatem inducat in medicamento, & variet medicamenti tum formam, tum vehementiā. Intellego autem per locum affectum, tum ipsummet locum, tum vias ducentes ad ipsum locum, loci quidem affecti figura varia, temperamentū, vsus, sensibilitas, & connexio: via vero ducēs ad locū affectū, q̄ alia sit lōginqua alia propinqua, alia lata, alia angusta, alia lata,

F

Situs longinquitas augebit medicamenti quantitatem.

Partes hebetes acris, ora magis perferunt. Neruorum curatio.

Partis affecta diuersitas medicamenti formam variat & vehementiā.

II.

Locus affectus quid?

Loci affecti via.

Medicamentorum varia est forma pro partium affectu figurata.

Sinus.

Emplastra.

Clysteres.

Pess.

Balani.

Partium canitas varias medicamentorum formas excogitare fecit.

Canitas aurium.

Narium.

Oris.

& propinqua simul, alia angusta, & longinqua simul. Et primum sane ratione loci affecti, varia loci affecti figura, variā medicamēti formā induxit: Etenim partes intus caue medicamēta intro recipere possunt, foris foras, intus, & foris, utroq; versus, nec intus nec foris nusquā. Amplius loci affecti figura, formam variat, secundo ad Gl. ob id sinib. liquida omnia iniicimus, ut quaquaversum spargantur, & nihil sinus relinquatur intentatū. Vbi autem diu hærere volumus, pro fotu ex oleo vnguenta, cerata, emplastra formamus, vrinis, sudoribus, mensibus mouēdis leuissime terimus, & ex liquore tenuissimo, purissimo, non crasso, lento conficimus, & cum eluendū est maxime clysteres aquosos formamus, quādo vero intestinis morari, & hærere diutius volumus, crassos magis, & lētos, ex adipibus, butyro, vnguentis, muccaginibus, cremoribus hordei, tritici, horize. Et ratio variorū locorū ut attingeretur a medicamētis, varias medicamentorum formas excogitate fecit, vnde pessī collo vteri, balani intestino recto clyster crassus inuentus est. Et in partes cauas, ut aures, nares, os, & reliqua ei cōnexa, vterum, meatū vrinarium, sedem, sinum, medicamenta impelluntur, vel attrahuntur, vel recipiūtur, corpore in id figurato: in aures auriculario clystere infunduntur: in nares flatu per tubum impelluntur, vel inspirando attrahuntur, vel turunda immittuntur: in os imposita nunc gargari-

garizantur, nūc per foramina palati exspiratu propelluntur, nunc deuorantur, nunc paulatim deglutiuntur, nunc faucibus retenta sensim inspiratu trahuntur in pulmones, nunc ore retinentur, vt ventriculū, vel cerebrum roborent, vt fluxiones acres temperent, cogant, & reprimant. Cavitas narium, & sedis, & uteri, & quorundam sinuum, quia deorsum spectat, ob id vel corpus in contrariam figurā cōstituere facit, vel liquidis materiis in hoc meatus iniectis, bombace, turunda, pello est opus, vel alio operculo, ne materiæ refluant. In os, & fauces recepta, foraminibus palati, gutturi, & gulæ communia sunt: In illa autem efflatu, in asperam arteriam inspiratu, in gulam deglutione feruntur, quæ ipsi, vel ventriculo, vel tenuibus intestinis, vel venis mesaraicis, vel e-

*Sedis.**Vteri.**Iniectionū**varia for-**ma pro par-**tium varia**figura, situ**& connex-**ione.**Loci affectū**tempera-**mentum**variat me-**dicamenta.*

*Cephalica**Cardiaca.**Nephritica.**Arthritica.**Oris vlcera
putrida.**Aphtha.**Vlcera sedis.**Intestinorū.**Vteri.**Vesica.**Meatus v-**rinarii.**Achoros.*

ramentum etiam diuersum, diuersitatem inducit in medicamento: ob id cū medicamentis miscemus ea quæ ex proprietate, & similitudine naturarum habent vim ducendi medicamentum ad locum affectum, vt hæc temperamento similia, seu natura, simul vim medicamenti eo deducant, atque hinc ortum duxerunt cephalica, quæ medicamēti vim ad caput secum trahunt, cardiaca ad cor, nephritica ad renes, arthritica ad articulos; & vbi loc⁹ est calidus, & humidus, consequenter putredini magis paratus; medicamētum validius efficeremur, atque hoc est illud cur. 6. de comp. B med. per loca. vbi agit de oris affectibus Gal. in putridis oris vlcerib⁹, medicamētis valētib⁹. vti cogitur, qualia sunt caustica, & quæ crustas ferri candentis modo efficiant, & hoc, quod ratione loci medicamenta idonea continentur, per saluā elota adhærere non queāt. Atq; hoc est illud cur Andromachus, & Crito ibidem, æruginem cū aliis mixtam, aphthis malignis adhibeant, & arsenicum, & sandarachā, & alumen scissile oris putredinibus, atque eadem ratione malignis vlceribus sedis, intestinorū, vteri, vesicæ, meatus vrinarii similia adhibeantur medicamēta, & remedia vario modo mixta, & soluta pro partis natura. Et loca affecta dura indicarunt vim medicamenti esse augendam, ob id cuiusdam achoribus chartam vltam ex aceto Gal. illeuit, quod eum vim medicamenti ob partis duritiem facile toleraturum

raturum confidit, & partibus natura frigidis, *Partibus natura frigidis narcotica caute adhibenda.*
 vt capiti, oculo, etiam si morbo calido laborēt,
 actu vehementer frigida, qualia sunt narcotica, adhibere veretur Gal. 6. comp. phar. per genera. licet ab æstu calfactis, olea etiam niue refrigerata capiti affundantur, & oculis calentibus aqua frigidissima applicetur. Hactenus de locorum temperamento: Vfus vero ipsius loci, & membri, medicamentum corroborans aliquod sibi admixtum petit, astringentia facultate præditum, quod in partibus actionē, aut vsum toti corpori communem, & necessarium habentibus, est perpetuum, ventriculo inquam, epate & liene sæpe, ob id phlegmō *Plegmon stomachi. Ventriculi Epatis.*
 stomachi, & ventriculi, & epatis non solis laxantibus curatur, ob harum partium actionē vniuerso corpori necessariam ad viuendum, sed admiscēt astringentia, harum partiū robur seruantia, vt absinthium, aloen, mastichē, nardum, cydonium: qua ratione etiam in scirrho epatis, mollientibus admodum moderatis est vtendum, quod iecoris corpus, velut ex humoribus concretum sit, ob id Herophilo parenchyma dicitur, & calfacientia, & tenuantia magis præpollere debent, quam in scirrho aliarum partium. Et 8. de comp. med. per loca. vbi loquitur Galenus de pharmacis congruentibus ori ventriculi, inflammationes inquit, oris *Inflammationes oris ventriculi & hepatis.*
 ventriculi, & epatis cum relaxantibus, miscellam astringentium pharmacorum desiderant, quippe quod nisi facultatem quæ firmitudi-

nem addat, in illarum partiū affectibus ad relaxantia misceas, vita in discrimen vocatur, vt proinde complures empirici, nec pauci methodici per pharmaca relaxantia curantes inflammationes oris ventriculi, & epatis absque miscella astringentium, ægros omnes ad vnū occidant, atque ad interitum adigant. Hactenus de vfu. Sensus vero qua ratione? Pars vtiq;

*Loci affecti
sensus.*

*Obtusior
sensus va-
lentiora
perfert.
Hemicra-
nia vetus a
causa fri-
gida.*

*Ophthalmia.
Phlegmon.*

*Pompholyx
lota.
Cernisa
lota.*

vbi exactius sentiet, medicamentum viribus languidius postulabit, vt euphorbiū vetustate ignauum. 1. de comp. med. per genera. & sensus acutior mitiora, obtusior valentiora feret remedia, ob id. 2. de comp. med. per loc. in hemicrania veteri a causa frigida, auribus sensu tactus exquisito instillabat oleum euphorbiatum, quod minus euphorbii recipiebat, vbi autem sensus erat obtusior, euphorbii multo magis, & loca sensu tactus exquisito prædita, valentia, & acra, & mordacia medicamentis non ferunt, quæ obtusa ferunt. 3. meth. ob id in ophthalmia, etsi omnis phlegmon per vacuantia curetur, tunica tamen illa ob sensus promptitudinem, & substantiæ raritatem, repellentia postulat, quæ non exasperent, sed elementer astringant, mixta liquoribus mitigatoriis, oui albumini, fœnugræci decocto, lacti mulieris iuuenulæ e mamilla supra co- 19
tem medicam expresso, in qua collyrium teritur, vt tepidum adhuc oculo infundatur, & alia addendo, velut pompholigen lotam, & cerusam lotam, rosionis omnino expertia, &
sola

sola terrestris substantiæ parte mediocriter siccantia. Ad eundem modum vlcera oculorum, & si siccantibus, & tergentibus indigent, sine morfu tamen esse debent, ob id lauari solent.

*Oculorum
vlcera.*

Haftenus de sensu. Connexionis vero ratione in oris affectibus ab emplastro diachalciteos, & aliis huiusmodi validis, & vim quandam lethalem habentibus cauebimus, tamen si his in

*Partium
connexio.
Oris affe-
ctus.*

vlceribus cutis vti possimus, & hoc quod fau-

*Cutis vlce-
ra.*

cibus subiecti sunt duo meatus, scilicet guttur in pulmonem, & gula in ventriculũ, per quos aliqua portio medicamenti defluere potest,

*Diachalcit.
emplastrum.*

quod partes illas vehementer ledere posset, & in phlegmone,

quæ est in parotidibus, & si phlegmon initio repellentia postulet, hæc ta-

*Phlegmon
in paroti-
dibus.*

men quæ erit in parotidibus ex 3. de cõp. med. per gen. trahentia requirit, nisi interdum, &

raro parum ex astringentibus multo digerenti admisceas, quando scilicet parotis cum paruo dolore erumpit. Ad eundem modum in pleu-

*Pleuritis.
Capitis do-
lor ab æstu.*

ritide, & in dolore capitis ab æstu, secundo de comp. med. per genera initio refrigerandum

per sinciput ait, quod ibi os sit tenue, rarum, & futura coronalis, non per occiput, quod id

ægre vratur, nec citra noxiam refrigerantia sustineat, ob spinalis medullæ exortũ tot neruo-

rum principium. Haftenus de cõnexione. Viæ vero ratione, locus affectus superficialis, &

*Loci affecti
viæ.*

sublimis medicamento viribus integris tãto, quantus est recessus, depelli requirit, locus ve-

ro affectus profundus, quia in transitu alte-

*Potiones.
Cataplasia.
Boli.*

*Acetum.
Euphorbiū.*

*Meatus
angusti.*

*Obstructio
nes viscerū.*

*Tritura
medica-
menti.*

fatut, quia aliis miscetur, & consequenter obtunditur, medicamento tantum virium esse iniungendum ostendit, quantum in transitu deperdi posse putamus, & via alimenti primę inantēdę forma potioris, forma vero cataplorum, aut bolorum, cum a longinquis partibus est trahendum: quę vero volumus, ad vterum, renes, vesicam, articulos, cutē peruenire, forma tenuissima medicamenti, & liquidissima cum tenuissimis mixta. Et pars ab ore, & stomacho remotior, sumenda medicamenta valentiora indicat, quod priusquā affectui occurrant, vires eorum obtundantur, alteratione, aliorum mixtione. Eadē ratione, quę sunt profundę partes admouēda medicamēta postulat valentiora, & quibus tenue aliquod aditum ad penetrandūm paret, vt acetum, euphorbium, vel etiam astringens aliquod quod a tergo impellat, contra vero cum parti affectę remedium viribus integris, aut parū fractis occurrit, & vbi medicamentum transiturum est per meatus aut natura, aut obstructione, aut densitate, aut compressione angustissimos, vt facilius ad locum conuehi possit, addimus illi ea quę sui, vel acrimonia, vel essentia tenuitate, vel vtraque, medicamentū conuehere possit, atque hoc est illud, cur obstructionibus viscerum liberandis acetū misceatur medicamento, & euphorbium externis intro penetraturis remediis. quamquam præter hæc, tenuissima medicamenti tritura facilius

lius medicamentum ad locum conuehat, atq;
 hoc est illud, cur in aluo tantū mouenda rha-
 barbarum crassum, & negligenter tritum ex-
 hibere soleat, quod pars affecta ex partis situ,
 & figura facile, mox medicamento occurrat,
 vbi autem mouēdum est lotium, aut menses,
 cassia, cinamomum, & huiusmodi tenuissime
 teruntur. Et solutio vnitatis in pulmone per
 vas apertū, ruptum, calida & tenuiū partium
 requirit, vt alia deducantur ad locum affectū,
 B tametsi apertioni similia sint, quibus non in-
 digemus in sanguinis reiectione, e gula, ven-
 triculo, & intestinis, sed vt aliis viam præpa-
 rent, & alia in corpus deducant, cinnamomū,
 cassiam, amonum, piper, myrrham eis admif-
 cemus, qua ratione etiam, tametsi frigida, &
 narcotica sputo sanguinis sint maxime salu-
 bria, dum frigiditate sistunt sanguinem ad vas
 affectum ruentem, ab illis tamen cauemus,
 quod viam, & sibi, & aliis præcludant. Ducta
 vero medicamenta per viam ad locum, vbi
 voluerimus vt diutius agāt in partē affectam,
 medicamento addimus ea quæ medicamen-
 tum parti affectæ diutius affigant, atque hoc
 est illud, cur in medicamētis gulæ, & tracheæ
 arteriæ crassa, & lenta addi soleant, vt vim me-
 dicamenti sarcoticam, colleticam, sinuloticā,
 si vlcus adest, in parte remoueant, & affigant,
 veluti ceram admouendis, oleum vero, adipē,
 vel lentum aliud sumēdis ex 6. de comp. med.
 per genera. ob id in vlcerebus gulæ, & asperæ

*Alui subdu-
ctio.*

*Mensium
& urina
motio.*

*In pulmone
solutio vni-
tatis.*

*Sputum
sanguinis.*

Narcotica.

*Vlcera gula
& aspera
arteria.*

arteriæ, syrupos, butirum, oleum, & lentores
 succorum miscere solent. Amplius vbi in par-
 te aliqua medicamentū immorari volumus,
 non solum familiaria illi parti, sed quæ illud in
 parte remorari possint, addemus, ob id vbi in
 epate medicamentum diutius permanere vo-
 lumus, aliquid stomacho gratum ei admis-
 cendum, quod medicamentum diutius festi-
 nans retrahat, & remoretur: additur & multis
 opiū, quod vires medicamenti per corpus di-
 stributi tot coctionib. resolui prohibeat. Præ-
 ter hæc tamen, complicatorum quoque sem-
 per erit habenda ratio, ob id pars affecta vbi
 eiusdem erit temperaturæ cum corpore toto,
 maiorem vim medicamenti postulabit, ob id
 vlcus in parte natura sicca, & toto corpore sic-
 co, sicca magis postulabit, minus vero in parte
 præhumida, & toto corpore humido, vbi ve-
 ro pars, & corpus totū erūt temperaturæ di-
 uersæ, medicamentorum parti, & corpori toti
 consentiens, æqualis mixtio erit facienda, non
 obliuiscendo indicationis, quam affectus, vl-
 cus scilicet, exhibet exsiccandi. 3. & 7. meth. Se-
 quitur vt ostendamus quanti fecerit Gal. in
 curatione loci considerationem, & viarū du-
 centium ad locum, atque hoc est illud, cur. 2.
 de med. secundum genera, sinus inquit liqui-
 diora pharmaca postulant, vlcera autem caua,
 quæ superficiem corporis infestant crassiora,
 qua ratione ceratum docet Gal. valide abster-
 gentibus admisceri, in sinibus vero oleum, vel
 rosacei

Opium.

*Vlcus in par-
 te natura
 sicca & toto
 corpore
 sicco.
 Pars & cor-
 pus totum
 diuersa te-
 peratura.*

*Sinus.
 Vlcera.*

rosacei plurimum, & 3. de med. secundum genera. Nervorum inquit vulneribus putredini obnoxiiis (quod frigidum nervis oblit) per siccantia, medendum, & media inter calidum & frigidum, quamquam possit etiam calidum esse pharmacum abunde, modo siccandi facultate polleat, quod calor citra humiditatem humectare non possit. Et eodem in libro, nervis inquit nudatis auxiliiorum integra indicatio sumi potest, punctis vero ita ut partes interiacentes sint sanæ, tenuius pharmacum inveniendum est, cuius virtus interiacentes particulas permeando non dissoluat, sed in altum penetret, quod quidem etiam si non erit in calefaciendo, & refrigerando symmetrum, offendere tamen læsum nervum non poterit, quod facultas calefaciendi, aut refrigerandi, quæ illi inest, admodum imbecillior reddatur, dum particulas nervoso corpori præpositas permeat. Et ibidem, oleum, inquit, quo foueo partem, quæ nervum vulneratum habeat, calidum esse volo, ita tamen, ne vulneratam partem offendant, quod frigidum corpori admotum perspiratum ipsius obstruat, & prohibeat, calidum vero, digerat, & extenuet. Et ibidem nervis inquit, vulneratis conferunt quæ ex alto humores educere, ac digerere possunt & nervis læsis, ne aqua eis intercidat, cavendum, quod illis sit inimica. Et ibidem ratione sensus ipsius loci, tendines inquit, membranarum instar extensos, & dilatos, non mediocri cum

*Nervorum
vulnera putredini obnoxia.*

*Nervi nudati.
Nervi puncti.*

Nervi vulnerati.

*Aqua nervis inimica.
Tendines.*

Ligamenta. periculo consues, ligamenta autem quomodo-
cumq; afficiantur, ab omni sunt remota pe-
riculo, utpote insensibilia existentia, & ex of-
sibus, non ex musculis, ut tendines orta, neq;
ex cerebro, aut spinali medulla, ut nervi. Et i-
bidem ratione viæ, nervorum inquit pūctio-
Nervi. nes angustam cutis diuisionem habentes, nō
Nervi pun- eodem curantur medicamento, quod nudato
cti. neruo auxiliatur, quod inulto calidius, magis-
Nervi nu- que mordeat, quam ut nudus nervus perfer-
dari. re possit. Et ibidem rationem viæ habēs, vul-
Vulnera neribus, inquit, angustis, aptiora sunt medica-
angusta. menta, quæ longiori tempore fuerint attrita,
quod tenuiorem consequantur substantiam,
Nervorum quemadmodum in nervis carne nudatis ad-
punctura modum tenuia, exedentiaque cauenda sunt.
Et ibidem, utriusque tum loci, tum viæ ratio-
nē habens, puncturis inquit nervorum acio-
ra pharmaca ex usu sunt, quæ vulnus apertum
conferuent, denudatis autem mediocri astri-
ctione; cum digerendi virtute absque morſu
pedita offerre conveniat, & i. de med. secū-
dum locos, curationem inquit indicant non
solum affectus ipsi, sed etiam ægri temperies,
& natura partis affectæ, ob id ibidem, viæ ra-
tionem habens, in tingendis capillis, etiam a-
Capillorum liquid, quod tenuium partium esset, admiscē-
unctura. dū esse advertebat, quo non in superficie tan-
tum, sed in profundo etiam cutem permutet,
progrediendo vsq; ad capillorum radices: se-
Occiput. cundo autem de med. secundū locos. occiput
dicebat

dicebat nec facile exuri, nec citra noxam refrigerari, principium spinalis medullæ cum sit. Et ibidem rationem viarū habens. At vero inquit, regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis ad coronalem suturam, & ob ossium tenuitatem, & raritatem, facile tum caliditatem, tum frigiditatem omnium, quæ adhibentur pharmacorū, intro distribuit, quare siue refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Et ibidem loci rationem habens, stupefacientia inquit, & quæ vehementer astringunt refrigerando vitanda in doloribus capitis esse, veluti a papaueris, & mandragoræ succo, cū non citra damnum refrigerent, & quæ cum refrigeratione manifeste astringunt, aut si quando necessitas postulet, perexiguum quid ad refrigerantia miscebat. Et ibidem in iis quibus dolebat caput ex ebrietate, potu aquæ omnino utēdū esse aiebat, at quia nōnullis vētricul⁹ a frigide potu subuertitur, malū punicū ipsis superedendum esse dicebat, aut solū p se aut cū allica flaccida calida, probeque cocta, quin & mala cestiana citra cocturam austera, post cocturam vero stomacho commoda, eaque iubebat esse coquenda ad vaporem aquæ suspensa. Et ibidem rationem viarum habens, affectiones inquit sitæ in p̄fundo diuersa pharmacā ab iis quæ hærent in superficie, desiderant, vbi laudat antiquos, qui acētū aliis phar-

Sinciput.

*In dolore
capitis vi-
tanda stu-
pefacientia.
Dolor capi-
tis ex ebrie-
tate.*

Phrenitis.

macis miscuerint ad phreniticos, & hoc, q̄ licet ad propria affectioni auxilia aliquādo cōtrarium sit, & nocentis facultatis, exsoluitur tamen omnis ipsorum vis in transitu per pro-

Acetum.

fundum, quippe acetum ex se, cum nec mitigandi, nec laxandi vim habeat, etsi præter rationem misceatur auxiliis iis, quæ ad dolentē inflammationem administrantur, tamen quia p̄sinciput pharmacum penetrare volumus, ob id aliquod eorum, quæ in profundum deducunt, miscemus, interdum quidem frigida facultate, sed tenuium partium præditum, cuiusmodi acetum existit, interdum vero calida, quale est euphorbium. Et ibidem, fracto

Fractura cranei.

cranio commode instillabat rosaceum solum tepens in crassam meningen, existente autē integra caluaria, viæ rationem habēs acetum illi permiscet, ut per sinciput ad membranam cerebri penetret, quod aceti facultas vehemens, tum per viarum transitum, tum per rosacei miscellam exsoluatur. Et 3. de med. secū-

Parotides inflammata.

dū locos, prima parte curationis partium inflammatarum in parotidibus minime utitur Gal. reprimentē sane, repulsoriaque, præsertim cum nec malignum est, nec multū quod influit, nec vniuersum corpus phethoricum, sic neque spongia sola ex posca imposita incipientes inflammationes reprimit: sed in parotidibus loci rationem habens contrariam curationē molitur, nempe pharmaca attractoria adhibens, & si hæc nihil memorabile efficiant,

ciant, etiam cucurbitulas affigens, aut fomenta assidua adhibens, laborans vt infestans humor ad cutim ipsam trahatur, præsertim si affectio in capite hæreat, quamquam cum natura per acutas febres redundantes humores ex vasis ad regionem inter cutem, & subiecta corpora pellat, quandoquidem illis etiã glandulæ imbuuntur, inulto satius videtur Gal. opitulari naturæ, febres per abscessus curanti, quamquam si vehementi impetu fluant humores, omnia suadet naturæ esse permittēda, quod vbi aut cucurbita, aut pharmaco humores ex alto trahere volueris, vehemens dolor hominem apprehendat, vnde & vigiliæ, & febres exoriūtur, atq; exsoluuntur vires, quinimo mitigare tunc ait, & non influxum prouehere oportet, per vsum cataplasmatum lenientium dolorem. Quinimo quasi Archigenem reprehendens, qui commendabat in parotidibus etiam plantaginis vsum, ego vero *Plantago in parotidibus.* inquit nunquam pharmacis ad parotidas destinatis repulforia admisceri existimo, nisi forte aliquando pauxillum repulforii, multo diffusorio addatur, idque vbi citra vehementē dolorem ipsæ irruant parotides. Et ibidem rationem loci habēs, in poliponarium pharmacum per fistulam insufflat, atque omnia remedia assidue fieri oportere narrat, vt nunquā ab affecta parte absit pharmacum quum facile ab humiditate eluatur. 4. autē de med. secundū loca, in ophthalmia inquit pharma- *Ophthalmia.*

ca omnia huiusmodi affectionem curantia, ex genere eorum sunt, quæ medentur inflammationibus, assumunt tamen necessario non nihil, pro ipsius partis natura, quæ excellentē molliorem, atque eximiam quandam supra omnem totius corporis cutem, ad patiendum facilitatem est nata, ob sensus subtilitatē, ac raritatem substantiæ, adhibenda itaque inquit sunt pharmaca repellentia, minime tamē exasperantia, hoc est non vehementē astrictiōnem sortita, sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint, tum lenitiui liquoris admixtione adhuc magis talia reddantur. Voco

Liquores lenitiui.

autem lenitiuos liquores, oui candidum, & fenugraci decoctum, inagisque adhuc ipsum lac. Sexto autem de comp. med. per loca loquens de oris affectionibus, cōmunis inquit,

Oris inflammationes.

scopus in oris inflammationibus est, prohibēdi eas dum incipiunt, secundus autem ab ipsa particula sumitur, cum sciamus longe rariorem, atque molliorem esse oris tunicā cutē, qua vniuersum tegitur corpus. Et ibidem connexionis rationem habens, oris inquit affectionibus exhibenda non esse fortia, nec ve-

Calchantis

21
nerosa medicamenta, cuiusmodi calchantis existit, nisi magna urgeat necessitas, & hoc, quod possint medicamenta ori indita defluere in ventriculum, & pulmones, quorum neutrum cuti reliquæ adest. Et 7. de comp. med. per loca, viæ longinquæ rationē habens, in sanguinis inquit, reiectione distributionis ratione admiscemus

Sanguinis reiectione.

miscemus astringentibus medicamenta cō-
 traria dispositioni hamophthoicæ: In iis enim
 inquit, qui ex pulmone, aut thorace, aut arte-
 ria, aut laringe reiectant sanguinem, miscen-
 tur prædictis congruenti mensura calida, &
 tenuiū partium medicamenta, quæ infestissi-
 ma sunt tribus illis vasorum affectionibus, re-
 serationi scilicet, ruptioni, & rosioni, miscen-
 tur inquam gratia distributionis, vt videlicet
 astringentibus medicamentis præparent, ac
 veluti sternant viam. At cum ex locis circa sto-
 machum, aut aluum, aut aliquod intestinum
 sanguis educitur, huiusmodi pharmacorum
 mixtura non est opus. 8. autē de cōp. med. per
 loca, habēs rationē vsus ipsius loci: In vniuer-
 sum inquit, in stomaticis Asclepiadis fugiēda
 ea pharmana sunt in vētriculi affectibus, quæ
 calchantum, mandragoramue recipiunt, aut
 id genus alia. Et ibidem, in medicamētis An-
 dromachi, rationem habens operationis ie-
 coris, in eo quod Ciphois appellatur: Non-
 nulli inquit, huiusmodi pharmacis, opiū, aut
 hyosciamum, aut aliud quidpiam refrigeran-
 tium miscendo ad calidas intemperies vtilia
 medicamenta efficiunt, quamquam inquit,
 ex epaticis pharmacis nullū esse debet vehe-
 menter refrigerans. Et 9, de comp. med. per
 loca. In splenis affectibus, loci operationis ra-
 tionem habens: Quo inquit, actiones ipsius
 conseruentur, ex austeris aliquid eis admisce-
 tur, quale etiam astringentium genus existit.

*Ventriculi
affectus.*

*Epatis affe-
ctus.*

*Splenis affe-
ctus.*

G

Lien.

*Philonis an-
tidorus ad
sedandos do-
lores.*

*Vlcera pu-
dendorum.
Vlcera sedis*

*Vlcera cir-
ca uterum
& vesicam
consistitia.*

Et hoc, quod cum vniuersæ particulae propriae incolumitatis gratia certas quasdam facultates possideant, attractiuam familiarium, ac tū alienorum expultricem, tum assimilatricem eorum quæ sibi attraxerunt, aliquibus ipsarū inest, vt ex accidenti sint vniuerso corpori ex vii. ex quorū genere est liē, qua ratione naturalē ipsius firmitudinē custodire oportet, quo conueniens sibi alimentum alliciat, per quā actionem vniuerso corpori, ad humorū bonitatem conducit, & excrementa genita in ipso demittere in ventrem potest, vt vna cum excrementis alui excernantur. Et in Philonis antidoto viæ profundæ rationem habens, ad sedandos dolores facto, quo inquit hæc opii scilicet, hyosciami que mixtura citius distribueretur, & totam affectarum partium penetraret profunditatem, calefacientia admiscuit, piperitum, euphorbium, piper. Et ibidem loci rationem habens, cæterum inquit, pudendorum vlcera, & circa sedem citra inflammationem consistentia, resiccantibus valde indigent pharmacis. Et figuræ locorum rationem habens ibidem, Quæ inquit, citra uterū, aut vesicam consistunt vlcera, eisdem medicamentis indigent, sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa intromittant, vt sunt metrenchitæ, & catheteres vocati, aptioraque sunt arida, qualis est crocus, pompholyx, & aloë, quæ facile plantaginis, aut alteri succo tali miscentur. Et 10. de comp. med per loca, loci rationem

rationem habens: In manibus, pedibusque *Fluxiones*
 pharmacis repellentibus fluxionem inquit, *manuum,*
 vtamur, iuxta coxendicem vero, ea minime *pedum, coxæ*
 administremus, cum enim iunctura ea in p- *dictis.*
 fundo sit sita, sanguis ex vicinis, & ambientib.
 vasis a musculis ad illam truditur. Et ibidem
 rationem habens longinquitatis ipsius viæ:
 B in nephriticis medicamentis, si quidem in- *Medicamēta*
 quit, quæ ad inflammatas, & exulceratas renū *ta nephriti-*
 affectiones componuntur, mitigatoriis me- *ca.*
 dicamentis indigent. Cæterum inquit, cum
 impossibile sit hæc cito penetrare ad regionē *Diuretica.*
 renum, ob id ipsis miscemus diuretica: Ex iis
 igitur manifestum esse potest, quantum cu-
 randi ratio virium, & incrementi sumat ex lo-
 corum affectorum notitia. Quorum cogni-
 tio cum in vniuersali quodam exposita fuerit,
 sequitur vt singulorum membrorum naturas
 particulares percurramus, vt ex eorum natu-
 ra recte percepta, singulis sua propria, & pe- *Singulorum*
 culiaria remedia accommodari possint. Hæc *membrorū*
 autem præcipue cum rationem curandi va- *particularis*
 riare soleant apud artis medicæ professores, *natura va-*
 nempe ventriculus, epas, lien, renes, vesica, v- *riat reme-*
 terus, cerebrum, pulmo & cor. Sequitur igi- *dia.*
 tur vt singulorum naturas particulares per-
 curramus, incipientes a ventriculo. Porro *Ventriculi*
 ventriculi temperatura cum frigida sit, & ner- *temperatura,*
 uosa, ea ratione, ea quæ vehementer frigida
 sunt, pati non poterit, eius vero habitus cum *Habitus,*
 sit facile dissolubilis, quo dissoluto sequitur

*Partium o-
peratio.*

*culus
Hecur sunt
partes prin-
cipales.*

error in concoctione, & in vniuerso corpore,
ob id postulat roborantia, & leniter astringē-
tiā, quamquam astringentia quoq; desideret
ventriculus, & iecur magis quam cætera mē-
bra, quod sint e principalib. partibus. ii. meth.

Sequitur operatio. Partes itaque sibi soli in-
seruientes vacuabimus audacter quantum fe-
ret affectus, modo virtuti etiam attendamus.

At vbi partes opus habebunt non solum sibi,
sed omnibus animalis partibus necessarium,
veluti sunt ventriculus, & iecur, de eorum ro-
bore non levis erit habenda sollicitudo in va-
cuatione. ii. meth. ventriculus enim etsi qua-
tuor illas facultates retinet quemadmodum
aliæ partes, attractricem, retentricem, super-
fluitatum excretricem, & ante has omnes al-
teratricem, in hoc tamen ab aliis differt, quod
natura illis non indidit sensum eorū quæ de-
sunt, sed in modum plantarum nutriuntur:
soli enim ventriculo hoc fuit a natura iniun-
ctum, & hoc, quod totius corporis partes re-
liquæ nutrimentum ex venis a caua prognatis
trahant, ipsa rursus caua ex venis epatis, hæ
rursus ex iis, quæ sursum feruntur ad portas,
illæ rursus ex ventriculo, & intestinis, cum-
que nulla iam superesset amplius particula, a
qua ventriculū capere oporteret, animali fa-
cultate ipsum extrinsecus repleuit, in qua dif-
fert a plantis, quæ per os, cum non essent nu-
triendæ, promptuarium copiosi alimenti sub-
iectam habuerunt terram, cui hærentibus, at-
que

que vnitis semper affluunt alimenta. 4. de vsu partium. Ventriculi vero vsus fuit a natura factus, non vt esset earum partium, quæ confectum alimentum in totum corpus deriuant, sicuti venæ, neque vt haberet vsum aliarum partium, quæ excrementa suscipiunt, sed earum quæ recipiunt, & conficiunt cibum, & iecori præparant. 6. anatom. adminis. Vsus etiam ventriculi, est primum in cibariis subire laborem, sine quo erunt inutilia, in nullamque rem animalicommoda. Purgat enim ex ipsis, vt præparandi tritici periti, si quid terræ aut lapidum, aut syluestrium seminum admixtum sit, quæ pernitiōsa corporibus esse solent. Ventriculi enim facultas pariter, si quid fuerit eiusmodi, pellit inferne, reliquum vero omne, quod fuerit natura vtile, vtilius adhuc ab ipso redditum, venis, quæ tum ad ipsum ventriculum, tum ad intestina perueniunt, distribuit: hæc autem quemadmodum baiuli in ciuitatibus repurgatum in promptuario frumentum, in aliquam communem ciuitatis deferunt officinam concoquendum, & vtile ad nutriendum mox futurum, simili modo prius elaboratum in ventriculo alimentum, venæ ipsæ deferunt ad aliquem concoctionis locum, communem totius animalis, quem epar nominamus: initio 4. de vsu partium. Amplius cum nutritio sit assimilatio nutrientis secundum qualitatem mutati ad id quod nutritur, assimilatio autem non sine transmutatione fiat, transmutans autem

Vsus ventriculi.

*Nutritio
quid,
Assimilatio.*

*Iecur**Os.**Ventriculus**Oris ventri-
culi sensus
exquisitus.**Sensus ege-
statis in ven-
triculo.*

facilius transmutationem exerceat, & com-
modius in iis quæ preparata, præcoctaq;, quã
quæ concocta non fuerint, ob hanc rationem
tot concoctiones sibi inuicem successerunt.
Etenim cum cunctis partibus iecur alimentũ
præparet, illi ventriculus, huic os, ori quædã,
vel iurulenta, vel alia, vel frixa, vel tantummo-
do madefacta, his omnibus gubernatrix na-
tura fructiferas plâtas præparet, quinimo non
nulla ab ea ipsa gignatur, quæ nec elixãda, nec
assanda, nec madefacienda, nec aliter præpa-
randa sunt, atque ad eundem modum ani-
malia, & animalium partes lib. de cibis boni
& mali succi. Sequitur sensus, qui oris ven-
triculi cum exquisitissimus sit, ob id sympto-
mata non pauca, tum vero syncopas accersit,
& in consortium affectus reliquas partes fa-
cile ducit, quapropter ad robur virtutis con-
seruandum, & ne syncope accidat, non solum
temperamenti trium principiorum, sed et-
iam ventriculi est habenda ratio, hac ratio-
ne quia vetriculi oris facultas, quamprimum
fatigatur propter eximium sensum, vnde red-
dere solet pulsus languidos, paruos, crebros
interdumque inæquales. 4. prælag. pulsuum.
Sensus autem egestatis in ventriculo vnde
est? & propter quid est? Cum animalibus
impossibile fuerit plantarum ritu ex terra su-
gere humorem, opus sane fuit per cibaria id
temporis edere, quo ventriculus senserit in-
digentiam, ea vero ratione qua nulla corpo-
ris par-

ris particula ex seipsa habet sensum sibi innatum, affluere igitur ventriculo facultatem sensitivā oportebat per nervos, veluti per canales quosdam, cuius rei gratia, per nervorum haud mediocriter superne defertur, & disseminatur, contextitque maxime quidem eius os, & partes ipsi continuas, & in alias partes usque ad fundum ipsius ventriculi protenditur. Sequitur ventriculi connexio, qui quidem cerebro colligatus est, simulque consentiunt propter nervorum a cerebro ad os ventriculi descendendum magnitudinem, per quos etiam sensus huic parti, quam vlli reliquarum corporis partium acutior est, ut hac ratione ventriculus cerebro, & cerebrum ventriculo suas affectiones transmittant, quo circa capitis fracturas, cum ad membranas usque perveniant, biliosus vomitus, nausea stomachi; morsio comitatur, & hypochondriacas dispositiones melancholica tristitia sequitur, & quibusdam oris ventriculi dispositionibus, ea quæ in affectionibus suffusioni similatur affectio. 3. de locis affectis. Non solum autem cerebrum propter convenientiam, quam cum eo habet propter duos nervos, sed in eisdem affectus cor quoque ducit propinquitatis ratione, item & septum transversum, cui adnatum est; convenit quoque ventriculi ostium cum spinali medulla, qua participi adharet, & colli vertebrae adnexum est. libro de melancholia ex Galeno

*Ventriculi
connexio.
Consensus cum
cerebro.*

Capitis fractura ventriculi Symptomata causant.

*Ventriculus
consentit cum
corde.*

*Septo transversum
spinali
medulla.*

*Epate.**Membra
preparantia.**Epate est
pars prin-
ceps.**Ventriculi
 situs.*

Ruffo, Possidonio: consentire etiam ventri-
culum cum epate dicere possumus, quod vē-
triculo, & intestinis meatus nullus adsit, præ-
terquam ad iecur, quæ ratione fultus Galenus,
arguit omnia membra, quæ totas materias, at-
que integras aliis præparât, esse membra præ-
parantia, ut hæc ratione, cum non alius quispiã
meatus a pulmone aliorum tendat, quam v-
nus ad cor, neque e ventriculo, & intestinis,
præterquam ad iecur aliquod permeat fora-
men, neque ex reticulari contextu, nisi in ce-
rebrum, neque ex semen præparantibus con-
ceptaculis, nisi ad testes exitus aliquis patet, &
qui biliosum excrementum colligunt meatus
omnes in vnum demum vas deferuntur omnes,
iecori scilicet annexum folliculum: non secus
renes in vnam tantum vesicam transmittunt:
qua ratione ductus Gal. concludit, epate nullo
consilio a natura fuisse fabricatum ut cordi san-
guinem, præpararet cum ei dimidium tantum suppe-
ditandi munus iniunxerit, consequenter epate
ducem esse, & principem, non autem mini-
strum. 6. de decretis Hipp. & Plat. Sequitur vē-
triculi situs, cui sane præpositus fuit thorax, &
quæ in eo sunt viscera. Positus enim fuit ven-
triculus non statim post os, tametsi postulabat
id alimenti certe susceptio, sed post eam partem
quam vocamus thoracem, & quæ in eo sunt
viscera præposuit natura, ut ille quidem in in-
ferioribus partibus. effluvia haberet superfluo-
rum, hic vero per os attrahens, & rursus emit-
tens

tens aerem, vocis, & respirationis fieret conditor. 4. de vsu partium: ventriculum autē circumdedit iecur, ob hoc, vt ventriculus ab epate, & a ventriculo cibaria calefierent, atque hoc est illud, cur natura iecur produxit quibusdam lobis tanquam digitis ventriculum ad vnguem complectens. Sequitur epar, cuius temperatura calida est, & humida, vnde iecoris specie nihil sanguini similis, & temperatura. 6. de decretis. Sequitur epatis habitus, cuius propria substantia est ipsa caro, cuius naturam si quis considerarit, proximam sanguini manifeste videbit. Si enim animo cogitaris portione tenuiore exhausta a calore ipsum sanguinem crassiores factum, nihil aliud inuenies esse, quam epatis carnem. 4. de vsu partium, ob id iecur plus cæteris membris astringentia petit. 11. meth. quæ ratione etiam non perfectum hoc membrum fortia medicamenta, veluti splen, lib. ad Glauc. & 6. de decretis Hip. & Plat. Iecoris caro nihil aliud est quam sanguis coagulatus, argumento est illud, quod si sanguis conspissetur, caro iecoris prorsus effecta erit, atque hoc est illud cur Gale. carnem iecoris concludat esse instrumentum conueniens pro sanguinis generatione, cum id quod mutatur, in mutantis similem speciem euadat 6. de decre. Hip. & Plat. Sequitur iecoris operatio, iecoris sane opus particulis omnibus est pernecessarium, tametsi non adeo perpetuam necessitatem habeat, sicut ipsius cordis, atque

*Iecoris lobi.**Iecoris temperatura.**Habitus.**Iecoris caro.**Operatio.*

*Munus.**Vfus.**Iecoris sensus.*

ad portionem iocinoris etiā ventriculi opus
 se habet. 7. meth. in fine, quod quidem iecoris
 corpus ex propria sua natura functionem pro-
 priam est consecutum, maxime rubrum enim
 cernitur, perinde ac sanguis. 6. de placitis. Mu-
 nus insit iecoris facultatis est vniuersam in
 animali procurare nutritionem, cuius maxi-
 ma pars, & nobis, & sanguineis omnibus san-
 guinis est procreatio. 7. de placitis. Sequitur v-
 lus, vsum quendam iecur præstat, & cordi, &
 cerebro, sicut enim cerebrum ad præseruan-
 dum cor vtile est nervis thoracem agitando,
 quo distento inspiratio, contracto expiratio
 fit, eodem modo cerebro vsum quendam cor
 ipsum præstat, atq; iis vtrisque iecur, vt tradit
 Galenus libro de fœtus forma. Et iecur cum
 ex iis partibus sit, quæ opus habent non so-
 lum sibi, sed omnibus aliis necessarium, si-
 cuti etiam ventriculus, vt hac ratione de ec-
 rum robore non levis sit habenda sollicitudo
 in vacuatione 11. meth. Sequitur iecoris sensus 23
 iecoris tunicæ nervus cur est insertus, intro
 vero non etiam peruenit euidenter? quoniā
 sicuti vt conueniens modus caloris, visceri
 seruaretur, arteriæ a corde ad ipsum perue-
 runt, ita etiam vt nō prorsus insensibile esset,
 inseruit natura neruū tunicæ ambiēti, quo-
 niam si nec phlegmonis, nec alterius affectio-
 nis sensum habuisset, nihilo vtique a planta
 differret, quamquā obtuse sentit omnes hu-
 iusmodi morbos non luculenter, vt aliæ cor-
 poris

poris particulæ, quod nervus cum sit parvus, qui in tunicam ambientem distribuitur, aut non omnino in viscus, aut non in totum certe sese insinuat. Superfluum enim erat nervum spargi in totum viscus, quod obscurum ipsi sensum vel per distributionem erat suppeditaturus 4. de usu partium. Quam ob rationem iecori, cordi, & renibus in superficie solum sensus inest, non in cavitate: dolorem autem cur persentiscant ex hoc contingit, quoniam grauantur, ideo dolor exsurgit, extenditur namque membrana, quæ foris est undique, quod cavitas interna repleatur, & sic extensa membrana dolorem facit, lib. de dig. & medic. Sequitur epatis connexio de qua 4. de usu partium in hunc modum sermonem facit: superest, inquit, de tuta ipsius positione verba facere, quam solícite natura iam olim ipsi meditata est. Nam ventriculo, intestinisque omnibus, per venam, & colligantem ipsa tunicam, coniunctum erat, ab eisque separare ipsum haud quaquam erat facile, propter figuram & lobos, at non sufficiebant hæc, proinde ipsum vinculis quibusdam stabilitum natura proximis corporibus inseruit, vno quidem, ac maximo, tunica a peritoneo oriunda, quæ ipsi ptegmene est, cuius occasione futurum erat, ut omnibus etiam internis coniungeretur. Omnia enim tunica hac obuoluuntur, magno præterea alio vinculo, phrenibus, atque aliis quibusdam membranosis, & paruis costis no-

Causa doloris epatis cordis & renum.

Connexio.

*Vinculi Epae
tis & perito
nai differenti
tia.*

Vena caua

his connexum est, verum id vinculum, quo phrenibus viscus ipsum coniungi diximus, est quidem & ipsum corporis substantia ipsi peritonæo adsimile, quippe quod ortum habet ex tunica ambiente ipsum epar, & ea quæ phrenas inferne succingit, quas ambas diximus a peritonæo produci, crassities autem eius, robur, ac patiendi difficultas, permultum a peritonæo distat, neque id immerito. Nam si recti steterimus, a phrenibus necesse est epar pendere, quo fit ut periculum non paruum fuerit, ne vehementioribus motibus facile abrumperetur, repenteque animal interiret, copulatur enim epar non solis phrenibus ibi, sed etiam cordi per phrenas. Nam venam illam cauam toti corpori cum sanguinem distribuere, omnino quidem erat necesse ad cor pariter ascendere, alium autem transitum commodiorem cum non haberet, necessario phrenas penetrauit, ut quæ medium inter utrumque viscus sita sint. Non igitur conueniebat, alia quidem vincula venæ ipsi, alia autem visceri comparare, sed vnum durum, ac crassum indumentum simul cauæ venæ, simulque communi ligamentum ad diaphragma, tum venæ ipsi, tum toti visceri fecisse præstiterat. Momentaneus igitur in primis his locus futurus erat, noxaque venæ eius loci omnibus, quæ in toto sunt animali, venis communis erat futura, non aliter quam si quando truncus arboris affectus sit. Vlneratam enim hanc venam, aut

aut diuulsam, adeo acuta sequitur mors, vt cū cyclopi quamquam longe omnium maximo, sapientissimum Vlyssēm poeta scriberet insidiari, mortemque machinari, non in aliā corporis partem ensē impulsurum fuisse finxerit, quam qua ep̄a phrenes continent, fecissetque ita, inquit, si trucidato eo, quod sperarat assecuturus fuisset, manibusque lapidem grandem, quem altis ianuis ille opposuerat, potuisset amoliri, adeo certe huic loco confidebat, vt si vulnere adfectus esset, ne tēporis quidem momentum ipsi viuere esset permissurus, &c. Lib. autem de fœtus formatione partes prosequitur iecori seruientes, ob iecur inquit partes istæ factæ sunt, renes & vesicæ duæ, fellis receptrix ipsi visceri innexa, ad renes vrinæ receptrix collocata, cœnosa autem visceris excrementa lien expurgat, vētriculus iecori præcoquit alimentum, intestinorum anfractus, digestionis, quæ in ipsa intestina fit, causa, fuit effectus. Sequuntur loca per quæ iecur purgatur. Iecur inquit per aluū & vomitū expurgari fuit hinc cognitum, ex eo quod cōpertū habebamus, quod cauo iocinoris subicitur ventriculus, & ieiunum, tum quod ieiuno ipsi tenue intestinum succedit, id vero colon excipit, ac colon quod appellant rectū, quare nisi hæc nobis comperita fuissent, non licuisset inuenire, quod iecur & per aluum, & per vomitum euacuari possit, cæterum aptior est prior vacuatio, tanquam vsu iam calētib,

*Partes iecori
seruientes.*

*Iecoris pur-
gationis
loca.*

intestinis iocinoris superflua tolerare, 7, meth
in fine, quamquam iocinoris cauum per aluū
magis purgatur, gibba vero per ea quæ modi-
ce vrinas mouent, cuiusmodi est apium, 13,
meth. idem secundo ad Glau. vbi ait, quod fi-
tus ipse visceris ostendit, quod cauum per al-
uum, gibba vero per vrinas sit expurganda;

*Lienis tem-
peratura.*

Sequitur lien, de cuius temperatura ita : it 2.
de temperamentis. Lienis, inquit, renum, &
iocinoris caro tanto cute est humidior, quan-
to est mollior, calidior autem, quanto magis

Habitus.

abundat sanguine. Habitus vero lienis rarus,
laxusque est instar spongiæ, tanto rarior epa-
te, quanto crassior pulmone, splenisque caro

Operatio.

talis perpetuo seruetur. Sequitur lienis opera-
tio, quæ sane est ex iocinore quicquid limo-
sum, & melancholicū est, expurgare, propte-
rea quod ex eo humore nutriatur, qua ratio-
ne nec lienem relaxantibus tantum curare o-
portet, quod indicatio tuēdi roboris in iis tā-
tum partibus sit communis, quarū munus ex
vfu est vniuerso corpori, vnde lien, eparq; si-
milis nutrimenta, & medicamenta requirūt,
nam quale medicamentū iocinori absinthiū
est, tale est lieni capparidis cortex, quale rursum
iocinori est eupatorium, tale scolopendrium
lieni, si quidem similia genere medicamenta,
quemadmodum & nutrimenta, ambo viscera
requirunt: ceterum tanto conueniunt valen-
tiori, & seniori lieni, quanto is crassiore uti-
tur alimento, 13, meth. Attrahit autē splen hu-
moreq;

*Epar & lien
similia me-
dicamenta
& nutri-
menta re-
quirunt.*

mores crassos, & melancholicos in hunc modum, & per hunc meatum. Etenim natura quandam velut stomachum ex finis partibus ipsius splenis productum venosum vas, ad portas extendit, ut nihilominus epar certe purgetur, quam si prope ipsum esset splen vocatus, neque longo ut nunc, sed breui aliquo stomacho excrementum traheret, lienis autem necessitas, & consequenter operationis suae in hunc modum habetur 4. de usu partium, veluti, inquit, vinum mustum in ebullitione, ex ipsis excrementis, quod faeculentum est, ac crassum subsidet, innatat vero quod tenue est, ac leue, ac veluti spuma quaedam in sanguinis superficie fluitat: His sane ratio sunt instrumenta parari, caua quidem ut recipiant facile, praelonga vero colla, velut stomachos quosdam utraque parte cauitatis habentia, alterum quidem eorum attrahendo excremento, reliquum autem emittendo idoneum. Et lib. de atra bile. Humor enim, inquit, pituitosus, qui in prima ventriculi coctione fit, cum mutetur in concoctione, quam epar obit, in sanguinem, proinde ei nullum datum peculiare instrumentum est ad sanguinis purgationem, nam haec biliosi humoris sunt, & serosorum excrementorum, ut etiam lien melancholici humoris, ob id male Erasistratus tam magnum instrumentum existimavit a natura artificiosa frustra conditum. 2. naturalium facult. praesertim cum Hip. & Plato, & cum iis veterum tum philosophorum,

Necessitas.

*Lienis
sensus.*

tum medicorum innumeri contra illud sint. 2. naturalium facult. & libro de fœtuum formatione, & 6. anatom. administ. Sequitur lienis sensus, cuius parum a natura adhibitum fuit, quod sicut epas ea ratione, qua a quatuor instrumentis cum purgetur, consequenter nullus succus malignus, & acris mansurus esset, sensu maiore haudquam indigebat, ita etiam cum hæc excrementa, ipsis nihil incommodi essent, allatura (argumento illud esse potest, quod huius excrementa trahere non potuissent, nisi qualitatis communitas quædam cum excrementis ipsis intercessisset) sensum maiorem non postularunt 5. de usu partium. Sequitur lienis

Situs.

situs: Positionem inquit lienis convenientem esse oportebat lationi excrementi, & ipsas stomachorum ad epas implantationes positionibus respondere, unde vesicam flauam & leuæ recepturam epas natura imposuit, splenem quoque oportebat ipsis portis subducere, quo sua sponte inclinaturum erat pondere delatum melancholicum illud excrementum; quoniam vero ventriculus prior occupauerat omnem locum, cumque in sinistris partibus amplum spatium esset relictum, illic splenem deposuit, & ex sinistris partibus ipsius splenis venosum quoddam vas, quo epas purgatur, ac si prope ipsum esset splen locatus, quarto de usu partium. Sequuntur

*Loca per
quæ purgatur
lien.*

locæ per quæ expurgatur lien. Loca inquit Gal. per quæ expurgatur lienis pars, quemadmodum, & iocinioris caua per intestina purgatur.

gatur. 13. meth. quamquam etiam per vrinas purgetur, quemadmodum renes, & iocinoris gibba. 2. ad Glauc. Sequuntur renes, & primo temperatura, lienis, inquit Gal. renum & iocinoris caro, tanto cute est humidior quanto est mollior, calidior autem, quanto magis abundat sanguine. 2. de temperamentis: habitus vero renum densus fuit, ne cum vrinis per aliquod foraminum quæ in renibus habentur, quemadmodum tenue & biliosum, ita vt sanguis elaberetur, vt carni aspersus sanguis ipsorum renum, adhæresceret, vniretur, atq; demum ipsis fieret alimentum, 3. de vsu partium. Sequitur vsus. Cum, inquit, vt ex iocinore purum, nulliusq; superflui particeps vniuerso corpori dispensari vellet natura, instrumenta ad id expurgandum accommodata condidit, aliud quod subtile, & leue bilem, aliud quod terrestre, & graue, aliud quod serosum, aquosumq; renes, 6. anatom. administ. quam quidem vrinam vi sua trahunt, 1. de nat. facul. ratione vero, qua alias excrementorum species serosa hæc superfluitas non parum superat, renes natura duos, non vnum effecit. Sensus vero parum renibus tributum fuit, veluti & aliis instrumentis quæ purgant epar, vt quæ nihil vnquam negotia comprehensis in se excrementis erant habitura, 5. de vsu partium, idque sensus in superficie, non autem in cavitare. Sequitur situs: renes, inquit, adiacent vtrunque ipsi venæ cauæ, quæ paulum sub epate, vt quic-

*Temperatura
reum.*

Habitus.

Vsus.

Sensus.

Situs.

H

quid in ipsam sanguinis assumatur, confestim purgetur, solusque postea is purus eat per totum corpus, paucis omnino ipsi admixto aquoso humore. Non enim egit amplius sane multo hoc vehiculo, ut qui tum per amplas vias illinc ferretur, tum fluxilis magis iam natura redditus sit, quod ei accidit primum ab ipsius epatis, deinde cordis calore multo vehementiore 4. de usu partium. locus vero

Locus purgandi renes.

enim, inquit Gal. renes tum per deiectiones & pharmaca deiectoria, tum per urinarios meatus, per deiectionem quidem, & pharmaca deiectoria, ubi multo vitioso succo sunt repleta, per utinas vero, ubi mediocri, 7. meth. in fine.

Vesica habitus.

Sequitur vesica, & primum vesicæ habitus, vesicæ, inquit Gal. venæ, arteriæ, & nervi maiores quam renibus & lieni a natura dati fuerunt, quod cum purum, atque ab aliis secretum excrementum attraheret, iure optimo alia vasa sibi ipsi suppeditatura flagitavit, ob id venis, nervis, & arteriis maioribus opus ipsi fuit, quod etiam vesica bilis eadem ratione obtinuit, 3. de usu partium. Sequitur vesicæ

Operatio.

operatio. facta inquit Gal. fuit ad purgationem serosorum excrementorum a sanguine, sicuti lien melancholici, vesicula bilis, lib. de atrabile. Musculi vero eius operatio, & officium proprium est coercere, & excrementorum effluxibus præesse, excernere autem nequeunt nisi secundum accidens, cum agere desierint,

Musculi vesicæ officium.

quare

quare errarūt, qui causā excernēdi superflua,
 musculos esse dixerunt, cum tum eius qui ve-
 sicæ, tum musculi ani officium sit non excer-
 nere superflua alimenti, sed retinere, 2. de
 motu musculorum. Cuius quidem vesicæ o-
 pus cum sit commune, ob id in vacuatione e-
 ius quoque maxima ratio erit habenda, ta-
 met si in partibus, quæ sibi soli inseruiunt, au-
 dacter vacuare liceat, & quoniam non par est
 actionum communium dignitas, sed aliæ ma-
 gis, aliæ minus vtilēs sunt, ob id ad portionē
 actionum, dignitatis etiā cuiusq; partis p̄spi-
 ciendum erit robori, sicut fit in corde, q̄ ma-
 xima sit cordis officii dignitas, in fine 7. meth. *Sensus*
 sensus vero vesicæ ex superius dictis elici po- *Situs,*
 test. Sequitur colligantia & situs, cum, inquit
 Gal. excrementū hoc tanquā superfluū esset
 excernēdū, locus autē vnde superflua alimēti
 euacuantur, in imo præstaret collocare, ob id
 in imo vesicam natura collocauit, quæ tan-
 quam cisterna quadam, & receptaculū esset,
 ad cuius finē musculum fabricauit, qui aduigi-
 laret, ne superflua intempestiue effluerent.
 Quoniam vero renes, quo vrina secernitur,
 prope epas construxerat, necesse fuit ab ipsis *Meatus vris*
 ad vesicam vias quasdā construere, atq; mea- *naris.*
 tus vrinarios, qui renes vesicæ committunt. 5.
 de vsu partiū. Locus vero purgādi vesicā est, ut *Locus pur-*
 inquit Gal. vt purgetur sicut renes, & iecoris *gandi vesti-*
 gibba, p̄ deiectoria quidē phamaca, vbi multo *cam.*
 vitioso succo sunt referta, p̄ vrinales autē mea-

Vteri situs. tus, vbi mediocri, in fine meth. 7. Sequitur
uterus. Sita inquit, Galen. libr. de vuluæ dis-
 sec. est vulua intra abdominis mēbranā inter
 vesicam, & rectum intestinum. ita vt recto in-
 testino toti fere incumbat, ad vmbilicum ve-
 ro, qua parte fundum eius est, maiori ex parte
 vesicam excedat, ad cūnum vesicæ collo ex-
 tendatur, vesica enim fœminarum ad pubem
 collocata est. Et ibidem de eius colligatione

Colligatio. ita ait. Porro uterus, inquit, multis annexus
 est, multisque item coniunctus, atque vnitus,
 qui moderata fuerit magnitudine, tenuiora
 intestina attingit, qui supramodum paruus
 est, ea tantum tangit, quibus est innexus;
 maximus vero, qualis est præcipue prægnantis,
 & alia & abdomen implet, & multa intestina
 tangit, tenuibus quibusdam fibris recto inte-
 stino, & vesicæ, sed vesicæ, pluribusque neci-
 tur, sacro item ossi alligatur: ex quo etiam ex 25
 multorum sententia, firmis quibusdam vin-
 culis, & neruorum, & muscutorum depen-
 det, dependet etiam totidem nexibus ex lū-
 borū vertebis: lumborum enim magni
 musculi vtrinque processus quosdam satis ma-
 gnos vtrinque promittunt, qui tum in vtra-
 que vuluæ partes, tum in ceruicem vesicæ,
 tum in sedem distribuuntur, atque hæc vin-
 cula laxa omnia sunt, vnde efficitur vt late, &
 moueri, & trāsformari vulua possit, nex⁹ nihil-
 omin⁹ ea sunt, quæ in ipsam penetrāt, partim
 vt corp⁹ ipsius contexāt, vt sunt magna ex par-
 te nerui

*Vteri vincu-
 la.*

te nervi a dorſi medulla propagati, partim vt
& vuluæ, & fœtui, tum augmentum, tum ali-
mentum exhibeât, cuiuſmodi officium venę,
& arteriæ præſtant veſicæ, & principi intelli-
no, ad ceruicem tantum mēbraneis, & arteri-
oſis partibus aliquanto cum adipe coniūgitur
atque vnitur, ita tamen vt reſolui excoriando
poſſit, adeo vero exacta cōglutinatione ea eſt, vt
vna & eadem caro efficiatur, teſtes vero, & ſe-
minarios meatus agnatos habet, cunno autē
ceruicis extremitate committitur, atq; ita fit,
vt vulua cum aliquibus coniuncta vniatur, ali-
quibus annexa ſit, ab aliis depēdeat, ab aliis cō-
texatur, alatur ab aliis, collo quidem veſicæ,
& recto intelliſtino iuxta cunnū, perinde ac re-
ſtibus, & vasis ſeminariis vnita coaleſcit, aliis
partib. veſicæ, & recti intelliſtini annexa eſt, an-
nexa quoque eſt oſſi ſacro, ex eodem tamē et-
iam dependere recte diceretur, ex dorſi me-
dulla, & lumbi muſculis dependeat ſolūmo-
do, nervis & annexa, & coniuncta, & cōtexta:
arteriis, & venis, non tam annexa, & coniun-
cta, & contexta eſt, quā ex iſſis etiā nutritur,
quarum venarum, & arteriarum magnitudi-
nem, poſitum, numerum, & ortum etiam de-
clarat, 14. autem de vſu partium, vuluæ, & mā-
marum coniunctionem magnam per venas,
& arterias declarat, quo loco ait: Porro quid
cauſę ſit, cur mammae tantum habeant cū ma-
tricibus conſenſum id iam explicabo. Etenim
mirabilem quandam id quoq; naturæ artē in-

*Vterus qui-
bus partib.
coaleſcat.*

Vteri nutritio.

*Mammarū
& matricis
conſenſus.*

*Menstrua
sistuntur
cum fœmi-
na lactat.*

*Sensus.
Operatio.*

*Lota expur-
gandi vterū
Cerebritē-
peratura.*

dicabit. Cū enim partes vtrasq; ad vnum opus obeundū comparasset, ipsas per vasa cōiunxit, & paulo post: Sola enim hæc in animalib. vasa, partim quidē ex partib. quæ sunt supra phrenas protecta, ad inferna corporis ferūtur, partim autem ex inferioribus sursum, quod prædictas solas particulas per vasa cōiungi erat necesse, vt quando in matricib. fœtus augeretur, ac conformaretur, illi soli venæ cōmunes ex vtrisq; alimentū affundant, quando vero natus fuerit, mammis rursum alimentum totum affluat. Quæ causa est, cur eodē tempore menstrua belle procedere nequeant, & fœmina lactare. Altera enim pars, dum sanguis ad alterā transfertur, sicca semper relinquitur. Cæterū ante conceptū in muliere ætate florēte, quicquid sanguinis superflui colligitur, natura singulis mensibus per venas ad vterū pertinētes, id excernit, cum autē iam conceperit, ex iisdē vasis fœtus trahit alimentū. De vteri vero sensu, & opere ex superiorib. elici potest, quamquam circa vteri opus illud erit notandū, fœtus expulsionem non esse vteri opus, sed abdominis musculorum, qui scilicet tum ad deiectionem, tum ad reddendam vrinam nobis sunt auxilio, 3. de nat. facult. de locis enim per quos expurgatur, habet 2. ad Glau. quod per menstrua purgatur. Sequitur cerebrum, cuius temperaturā frigidam esse, & humidam initio lib. de compagine membrorū Gal. asserit, vbi etiam causa ponitur, cur frigida sit, & humida tempera-

peraturæ: Cerebrum, inquit, natura quidem frigidum est, & humidum, & hoc ideo, vt facillime ad susceptionem diuersorum conuertatur, & vt membris mouēdis habilitatē præstet, & vt calido, & sicco spiritui ad caput exhalanti temperiem inferat. Sequitur cerebri *Cerebri operatio.* operatio, quæ sane est vt spiritum animale transmittat, vt cor vitalem, ait enim 3. de placitis Hip. & Plat. in fine: quemadmodum corpus ipsum cordis, cum ex seipso dilatatur, ac contrahitur, vicissim materias, & attrahit, & emittit, eadem ratione cerebrum etiam cum vult spiritum, quē in ventriculis suis continet, quem animale nuncupamus, in aliquod mēbrum transmittere, accommodata huic rei agitatione motu id facit, hic autem spiritus, qui in ventriculis continetur cerebri, parua quada ex parte, fortasse ex iis etiam, quæ ad ventriculos ipsos pertinent, venis gignitur, maximum vero, ac præcipuum ortum huic arteriæ illæ, quæ sunt ad reticularem in fundamento cerebri sitam texturam suppeditant, a corde ipsa ortum habentes. Quibus autem partibus cerebrum consentiat, & colligatum præcipue sit, lib. de melancholia in principio tradit, neque enim, inquit, quicquam obstat, aliunde atque ex alio membro, quam ex cerebro, huius affectus melancholici originem esse, cū facile ostiolum ventriculi quiduis patiens in similem affectum cerebrum ducat, nimirum ob conuenientiā, quam cū eo habet propter

Animalis spiritus.

Consensus.

*Colligatio.**Loca purgationis cerebri.**Pulmonis temperatura.*

duos nervos, qui desuper a cerebro ad ipsum maximi descendunt, in eodem affectus cor quoque idem trahit propinquitatis ratione, item & septum transversum, cui adnatum est, convenit quoque ventriculi ostium cum spinali medulla, qua parte ipsi adhæret, & colli vertebri adnexum est. Sequitur situs capitis, quod sane 9. de usu partium, partibus corporis omnibus, velut rectum quoddam calidæ domui est superpositum, quo fit ut cū omnia, quæ a partibus subiectis sursum efferuntur fuliginosa, ac vaporosa excrementa caput excipiat, largiore egeat vacuatione. Locos vero, per quos expurgatur cerebrum tradit 7. met. in fine, ubi non solum locos expurgandi cerebri, sed locos etiam expurgandi alia membra percurrit, a figura vero, inquit, indicatio ipsius modi vacuandi excrementa suggeritur ad hunc modum, ventriculus vomitu, deiectioneque inanitur, intestina deiectione tantum, sicuti etiā iocinoris caua: renes vero, & vesica & iocinoris gibba, si multo vitioso succo sunt referta, per deiectiones, & pharmaca deiectoria (catoterica Græci vocatā) expurgantur, sin mediocri per vrinales meatus, cerebrum vero per palatum, & nares, & aures, pectus & pulmones per asperam arteriam & fauces, quamquam satis prolixius locos expurgandi cerebrum. 9. de usu partium percurrat. Sequitur pulmo, de cuius temperatura ita ait Galenus: quod, inquit, pulmonis,

pulmonis, cerebrique proprium corpus proximimum ad ipsi humiditatis ratione sit, ex molli-
 tie eius cōiectare licet, non enim a frigido cō-
 gelatur, cum nec a calore fundatur. 2. de tem-
 peramentis, & 7. de vsu partium: quod, inquit,
 motu agitetur perpetuo, ob id mollissimus, &
 calidissimus fuit, ossa vero velut ex diametro
 pugnancia bonam totius vitæ partem quies-
 centia, frigida, & dura, quas ob causas etiam
 perdurat ipsorum substantia, nec facile dissol-
 uitur. Habitus vero talis est, pulmo viscerum
 omnium leuissimum, mollissimumque. 6. de
 vsu partium, atque humidam omnem substan-
 tiam facile potest, promissimeque adinit-
 tere, cum adeo rarum, ac molle sit membrum,
 26 lib. de crisibus. Pulmonis caro longe laxior est
 quam splenis, laxissima enim est atque lenissi-
 ma, utpote ex spuma quadam velut coagula-
 ta, 4. de vsu partium. cum autem vnumquod-
 que sibi simili nutriatur, ob id puro nutritur,
 ac vaporoso sanguine flavo, subtili, & spumo-
 so, quas omnes dotes habet sanguis, qui a cor-
 de mittitur ad pulmones, nō autem, quomo-
 do iecur, limoso, ac crasso: quamobrem vasa
 etiam obtinuit ratione habitus ipsius cōstru-
 cta, contraria maxime quidem iis, quæ sunt in
 epate, post autem & aliis animalis particulis.
 In iis enim cum vasis sanguinem suppeditan-
 tis tunica rara sit, ac tenuis, assatim crassi san-
 guinis, ac celeriter partibus circumfusis di-
 stribuit: in pulmone vero, quod crassa ea, &

*Pulmonis
temperatura.*

Habitus.

*Pulmonis
nutritio.*

*Pulmo con-
tra quā reli-
qua partes
habet venā
crassā &
arteriam te-
nuem.*

densa existit, nihil nisi tenuissimum sinit ela-
bi, 6. de vsu partium: ratio autem, cur pulmo
non habuerit venam tenuem, & arteriam
crassam, sicuti cernimus in reliquo anima-
lis corpore, sed opposito modo, venam
crassam, & arteriam tenuem, hæc est, quoni-
am in reliquo animalis corpore, venam fecit
natura tenuē, vt sanguis crassus, grauis, agre-
que mobilis, qui in ea continetur, facile cir-
cumfusus partibus distribueretur, contra vero
arteriis crassam, ac densam tunicam exhibuit,
ne spiritus tenuis, lenis, & citus, exspiraret re-
pente, atque euolaret. Pulmo vero vasa op-
posito modo facta obtinuit, venam crassam,
arteriam tenuē, & hoc, quod pulmo, etsi mo-
tus omnis sit expers, a thorace tamen cum
continenter moueatur, cumque venas, veluti
cibi promtuarium quoddam, non esset opus
dilatari inspirantibus nobis, nec expirantib.
contrahi, arterias vero opus esset, veluti spi-
ritus conceptacula quædam a natura factas,
repleri inspirantibus, celeriterque vacuari
expirantibus nobis, ob id arteriis pulmonis
corpus molle factum fuit, vt prompte vtrif-
que thoracis actionibus obsequi possent,
venis vero durum corpus, quod nihil obe-
dire opus erat. Cum igitur corpus nutriatur
per ipsorū vasorum tunicā sanguine, labora-
bit ne igitur pulmo inopia alimenti, cū tuni-
cas venarum densas admodum obtinuerit?
quinimo hoc fuit maxima naturæ prouidētia,

vt cum

*An pulmo
laboret ali-
menti ino-
pia.*

vt cum sibi simili nutriendus esset, nihil etiam, quod nō esset lene, & tenuissimum elabi sineret, sexto de vsu partium, cum pulmo sit corpus lene, rarum, ac velut ex spuma quadā sanguinis concreta conflatum. Operatio vero, & vsus talis fuit, cum inquit, ex cordis palpitatione in terribilium rerum timore, & ex iræ excitatione præuiderent, fore, vt totum hoc irascentis partis domicilium æstuosum, ac propemodum ignitum redderetur, subsidium illi, pulmonum forma aggenerata intenerunt, quæ mollis primum ac exsanguis, deinde cauernosa, spongię instar, ac foraminulenta est, vt spiritu, potuque excepto respirationem refrigeraret, æstumque mitigaret, ex consensu Hipp. & Platon. 8. de placit. Argumento illud esse potest, quod vt ait Galenus, in pulmone meatus tantum vnus adsit ad cor, hic enim est mos eorum membrorum, quæ alii præparant, neque enim ventriculo & intestinis, præterquam ad iecur, aliquod permeat foramen, & renes in vnā tantum vesicam vrinam transmittūt, sexto de placitis. Sensus vero talis fuit, quod pulmo neruos habuit minimos, quod melius fuit, sicuti etiam cor, lien, epar, & renes, septimo de vsu partium.

B Situs autem talis fuit, cum, inquit Galenus, arteria sublimis emergeret, ob eamque causam sine stabilimento sursum, ac deorsum per rotum thoracem, iter esset factura, natura securitati ipsius prospiciens, ipsum pulmonē

*Sensus.**Situs.*

*In pectoris
affectibus
parce astringen-
tibus est
utendum.*

*Locus pur-
gandi pul-
monem.*

velut fulcimentum quoddam ei suppositum. 15. de vfu partium, cum pulmo sedem habeat omnium cordi coniunctissimam, eique vasis quam maxime sit affinis, & fiat confluxus per maxima ostia in vtrunque sinum, celerrimam cordi, & omnium maximam noxam exhibet, 4. prælag. pullum, Qua situs ratione parcius ad pectus, quam ad alia astringentibus est utendum, quod talia humores, qui phlegmonem excitant, in pulmones, & cor nonnunquam reprimant, ac longe quidem magis in pulmonis phlegmone ab astringentibus est abstinendum, quando in eo ipsis quoque relaxantibus admiscendum aliquid acrius quodammodo, & euidenter calefacientium est, quippe foras trahere potius in eo, quam reprimere debemus, ut cucurbitula iis vtiliter, qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicetur 11. meth. Locus vero pulmonis expurgandi talis fuit, locus, inquit Gal. qua pectus expurgatur, & pulmones, est per alperam arteriam, & fauces, sicuti intestinalia deiectione raturum. 7. meth. in fine, qui quidem locus expurgandi per tussis, non aliunde quam ex forma particularum est desumptus, quod hæc nullum talem exitum habeant qualem uterus, vesica, sedes, aures, nasus, & os, hinc etiam fit, quod ventriculus vtrunque expurgari possit, sursum per vomitum, deorsum secundum naturam, quod genus indicationis ab instrumentalibus, quatenus instrumentalia, est sumtum, sicuti quæ siccandum esse

esse docent ab ipsarum similarium substantia.
 7. meth. Quoniam vero via longius abest, ubi
 expurgandum ex pectore & pulmone pus est,
 ob id excogitata a medicis sunt fortissima, quæ
 que maxime dissecant pharmaca, taliaque om-
 nino, quæ si vlcus in ventriculo esset, ipsum
 exacerbarent. 5. meth. Sequitur cor, quod hu-
 ius temperaturæ fuit. 6. de placitis Hip. & Plat. sic-
 cius sane, calidiusque iecore, ideo effectum
 est, ut & esset durius, & quemadmodum arte-
 riæ, duplici motione posset agitari, atque ita
 ex ea agitatione insiti caloris proportio aqua-
 bilis conseruaretur, ut in lib. de utilitate pul-
 sum a nobis dictum est, ex duritie vero firmitas
 visceri compararetur, qua assiduam illam mo-
 tionem, quæ interdum vehementer admodum
 a natura incitatur, toleraret, proinde neque
 proprius eius sanguis iecoris sanguini similis
 est, sed quo calidius viscus est viscere, eo fla-
 uior sanguis conspicitur, quem colorem sic-
 cioris sanguinis, sicuti humidioris ruborem
 proprium esse constat. Habitum vero validum,
 crassum, ac densum cur obtinuerit. 6. de usu
 partium ostendit: cum enim cor ex se mouea-
 tur, corpus validum ipsum habere oportebat,
 & crassum, & densum, pulmonem vero, ut qui
 a thorace moueatur, neq; grauem, neq; den-
 sum, sed lenem ac rarum esse præstiterat, cum-
 que quale est vnumquodque tali ipsum nutri-
 mento ali oporteat, iure optimo, cor quidem
 crasso, pulmo autem vaporoso sanguine indi-

*Cordis tem-
peratura.*

*Cordis san-
guis est fla-
uior iecoris,
Habitus.*

Operatio.

guit, Cordis vero operatio est, esse totius vite principium, tertio decimo de usu partium: quo in loco discurrit, quomodo natura locum, ubi continetur, undiq; munierit, & præsertim in partibus posterioribus, quod illic oculi non essent, dignitatem autem officii ipsius cordis, maximam esse, in fine septimi methodi, ostendit, quoniam, inquit, non par est actionum dignitas ad agros seruandos, sed alia magis his, alia minus utiles sunt, utique ad portionem actionum, dignitatis etiam, cuiusque partis prospiciendum est robori, maxima

*Dignitas.**Sensus.*

autem est cordis officii dignitas, atque agrotantibus maxime omnium necessaria. Sensus vero cordi in superficie, non in cavitae inesse ostendit lib. de dign. & medic. Cum, inquit, demonstratum sit, cor, iecur, & renes in concavitate non sentire, in superficie autem sentire (quoniam in superficie nervi sentientes feruntur, in concavitate vero nulli sunt) & sequens ostendit, quomodo cum nervus non penetret, dolorē persentiscant. An, inquit, quia grauaturs cavitae, ideo dolor exsurgit? extenditur namq; membrana, quæ foris est undiq; , q̃ cavitae interna sit repleta, & sic extensa membrana dolorem facit, in renū itaq; substantia dolor itidem generatur, quando concavitas ex lapide grauata est, & circumtenditur, profertq; consensione dolorem in superficie, quippe quæ nervos sentientes habeat & membranam: in meatibus autē urinae, ut qui nervosi sint, & sensibiles,

*Renum dolor.**Meatum
urinae dolor.*

sibiles, dolor fit sauiissimus: cur autem paucif-
 simis cor nervis indiguerit, rationem reddit
 6. de usu partium, quemadmodū, inquit, mu-
 sculis omnibus, quod actionis animalis instru-
 menta essent, magnis nervis opus fuit, ita &
 cordi nullam actionē animalem habenti, tan-
 tis nervis opus fuit, quantis prædictis visceri-
 bus singulis, epari scilicet, lieni, & renibus, ad-
 dam etiam & pulmōni, cōmuniter enim hæc
 omnia, ne sensu omni carerent, neue plantæ
 penitus essent, nervos etiam habuerunt, pri-
 uatim autem inter ea epar, & cor, quod & ipsa
 facultatum quarundam essent principia, illud
 quidem animæ cōcupiscibilis, hoc irascibilis.
 Sequitur cordis colligatio, cerebro enim col-
 ligatur, quot autem modis eis colligetur 2. de
 decretis ostendit in hunc modum, cor, inquit
 cerebro tria vasorum genera connectunt, ex
 iis inquam, quæ toti corpori cōmunia haben-
 tur, venæ, arteriæ, nervi, venæ, quæ iugulares
 appellantur, arteriæ quæ carotides, quasi tu
 soporarias dicas, nervi, qui his arteriis annexi,
 atque associati sunt, 2. autem de causis pulsū,
 cor inquit arterias cerebro, vinculum societa-
 tis transmittere, cerebrum nervos cordi. Et
 paulo post: nec iam, inquit, quicquā habet ad-
 ministrationis, si cum vniuersum nervosum
 genus coniunctum cū arteriis sit, singuliq; eo-
 rum ramuli sibi mutuo immixti, cōmunis ap-
 pareat affectus. Lib. autem de pulsuum præla-
 gitione cor citius, & magis pulmōni quam

*Cor paucif-
 simos nervos
 habet.*

*Cordis col-
 ligatio.*

Consensus.

*Partes cordi
inferuites.*

thoraci consentire inquit, minus atq; tardius
thoraci, quod neque magnis vasis, neq; vici-
nitate propinqua cū corde cōiunctus sit tho-
rax, quinimo ibidem, cor iocinori magis quā
thoraci consentire, inquit. Compactior enim
thorax est, quam qui fluxionem admittat, ie-
cur vero non ita compactum, & iocinori pro-
clivius cor, & si remotius quā thorax sit, vin-
culo cavæ venæ consentit, septo autem trans-
verso in hunc modum, ibidem ait, cōsentire,
præter omnes alias thoracis partes, quod ex i-
psa cavæ venæ in hoc venæ inferuntur. Quæ
autem partes cordi inferuiant, & quæ organa
cordi spiritum apparent, lib. de vſu partiū cor-
poris humani declaratur, hoc, inquit, primum
naturæ videtur esse laudandū, quod cor ipsum
aerem externum trahere instituit non protin-
us per fauces, sed vtriusque medium pulmo-
nem, quasi spiritus promptuarium quoddam
statuit, qui ambabus simul actionibus seruire
posset. Nam si cor dilatatum ex faucibus tra-
heret, rursusque in illas astrictum aerē emit-
teret, contentum esse respirationis cum pulſu
cordis, esset necesse, quam rem sequerentur
multæ, ac magnæ ipsius animæ offensiones,
nec deterius modo viveret, sed periculis etiā
utique esset. Nam si hæc ita haberent, verba **B**
continuari diu non possemus, ob idq; ipsum
vitam omnino degeremus impeditam, atque
laboriosam, simili ratione, & quod metu suf-
focationis urinare, mergiq; in aquā non pos-
semus,

semus, tū autem, quod sine inspiratione nunquam possemus fumū, vel puluerem, vel pestiferam aliquam aeris, ac venenosam qualitatem percurrere, putredinibus quibusdam animalium, aliisque occasionibus infecti, vitæ ipsi id promptissime officeret, ipsumque animal funditus labefactaret. Quod vero non ex faucibus, neque protinus extrinsecus, sed ex pulmone cor animā ducat, eamque rursus in pulmonem reddat, licitum fuit nobis, alias voce uti, & quidem diutissime, alias etiam nihil omnino inspirare, corde nihil impedito, neque offenso. Nam si cor statim per fauces spiritus extrinsecus hauriret, & rursus foras profunderet, ex duobus sane alterum necessario nobis accideret, vt vel aerem pestiferum intempestiue inspiraremus, vel omnino nihil inspirantes protinus suffocaremur. Quo in loco etiam paucis interiectis, cordis situm explanat. Nam ipsum, inquit, in medio omnino thoracis sinu natura collocauit, loco cum ad firmitatem aptissimo, tum autem ad æquabilem ex toto pulmone refrigerationem opportunissimo. Suscepit autem hominum vulgo opinio nō in medio ad amussim, sed magis ad leuam quodam pacto, cor esse locatum, deceptorū, eo qui ad sinistram mammam sentitur, sinistri ventriculi pulsu, qui illic situs est, omniumq; arteriarum est origo. Sed de iis, quæ circa locorum affectorum naturam sunt perpendenda, pro recte & conuenienter perficienda cu-

Cordis situm

III.
REMEDIVM

*Ars compo-
nendi medi-
camenta est
necessaria.*

*Medicamen-
ta varian-
tur ratione
substantia.*

rationis arte, hæcenus dictum sit. Sequitur, postquam ex tribus superius a nobis propo-
tis, ut ars curandi recte fiat (nempe affectus cognitione, loci affecti, & ipsiusmet remedii) duo percurramus, affectum scilicet, & locum affectum, ut remedium modo percurramus, & quæ in eo præcipue consideranda sunt, ut ars curandi finem suum assequi possit. Porro si medicus cognita, & distincta affectus natura, & loci affecti, medicamenta habuisset, quæ proportioni vnde quaque respondissent, scopis ab affectu & loco affecto desumptis, non indiguisset aliqua medicamentorum compositione & commixtione simul. At quoniam difficile est reperire medicamenta in natura, quæ vndique, & morbo & loco affecto satisfaciant, quæque non deuenient aut ratione modi substantiæ ipsius medicamenti nos impediens, aut ratione qualitatis, qua ratione necessaria fuit ars ipsa componendi medicamenta, & ratione modi substantiæ ipsius medicamenti, quandoque imbecillo robur addere, quandoque robustum & valentius minuere, tardo celeritatem iungere, celeri tarditatem, crasso tenuitatem, tenui crassitiem, denso raritatem, raro densitatem, graui leuitatem, leui grauitatem, insipido acrimoniam, aut fæluginem, aut amaritudinem, acri insipiditatem, veluti vstio, quæ vstis omnibus terreis atq; metallicis essentia tenuitate, & acrimoniâ addit, quibus rationibus

bus turbith, zingiber addunt, tanquam eius calcar, agarico, sal fossile. Atque hoc est illud, cur Galen. 11. de compo. med. phar. per loca. capit. 1. in vesicæ vlcere, ait, quod cum emplasticantibus, conglutinantibus, & astringentibus esset sanandum, hæc autem omnia cum essent crassæ substantiæ, consequenter inepta per se, & solitarie accedere ad vesicam, tenuia diuretica, veluti cucumeris semina admiscuit, vt crassâ illa medicamenta illuc deferri possent. crassâ vero admiscuit tenui in cōfectione arteriaca Lysia. 7. de compo. phar. per loca: in qua intentio erat, crassos & viscidos humores existentes in pulmone attenuare, & incidere, & abstergere, huiusmodi autem omnia cū fiant medicamentis calidis & siccis tenuis substantiæ, & talia postmodū medicamenta trachæam arteriā sui tenuitate exasperando incitēt ad tussim, admiscuit thus, & passum creticum, quod in thure adsit emplastica, & crassior substantia, in passo vero viscositas apta ad remorandum materiā in trāfitu, quæ applanet, & adæquet eius asperitatē. Duro vero admiscemus molle, vbi volumus medicamentum pertransire ad partes longinquas, quemadmodum facit Gal. qui species hyeræ picræ simplicis ex vino aut aqua potandas iubet, vt eius vis vltra iecur procederet. Lenia vero asperis quandoque, atq; hoc est in fluore alui orto a nimia humiditate requirente exsiccantia, & corroborantia q̄ fit aut

*Vesica. vl-
cus.*

*Arteriaca
confectio
Lysia.*

*Thus.
Passum.*

*Alui fluor
ortus ab hu-
miditate ni-
mia*

*Calculus
renum.*

*Medicamē-
torum va-
riatio ratio-
ne qualita-
tis primæ.*

corallis, aut huiusmodi aliis, timentes autem ne nimia sui asperitate nimis irritaret, admiscet emplastica, & quæ habent vim leniendi, veluti syrupum de iunibis, de mirtis, & in calculo renum exhibentes vitrum combustum, & contritum, timentes ne transiens per loca angusta exulceraret, admiscet emplastica, & lenientes medicinas, veluti mucilaginem seminum altheæ, citoniorum. Tarde vero operanti celeriter operans, & velociter, atq; hoc est illud, cur in medicamentis multis cathartici antiquorum videamus scammonium cum agarico, & colocynthide commixtum. Et facile resolubilibus admiscemus ea, quæ difficile resoluntur, veluti in pomo in peste conficiendo, ut odores illi non ita facile transpirent, gummi arabico, aut tragacantho odorata dissoluit, hæc quoad modos substantiæ. Ratione vero qualitatibus variatur ipsum medicamentum, & hoc vel ratione primæ, vel secundæ, vel tertiæ: ratione primæ, quoniam cum medicamentum non solum debeat esse contrarium, sed æquipollens recessui in tot gradibus, ubi medicamentum habebimus contrarium quidem, sed aut deficiens, aut superexcedens, ex compositione multorum eo peruenimus, & hoc dupliciter vel commiscendo plura similia in qualitate, in gradu solum dissimilia, veluti ex mixture medicamenti calidi in primo cum medicamento calido in tertio, resultare facimus medicamentum calidum in secundo a nobis intentum,

intentum, vel ex mixtione multorum dissimili-
 lium, non solum in gradu, sed etiam in quali-
 tate, veluti ex mixtione frigidi in primo cum
 calido in tertio, facimus resultare medica-
 mentum calidum in secundo a nobis intentum.

Eodem modo in secundis, ex comixtione rari
 cum condensante, & multum tensi cum valē-
 ter laxante, veluti condensantē, rarefaciētem,
 emplasticantem, abstergentem, incrassantem,
 incidentem, attrahentem, repellentem, indu-
 rantem, emollientem, & maturantem, aperi-
 entem, claudentem, & obstruentem, vniēte,
 veluti sarcoticam, glutinantem, & cicatricem
 inducentem, cum soluente vnitatem, doloris
 sedatiuam cum irritante, euacuantem cū ha-
 bente vim sistendi, veluti supprimentem, cum
 ea quæ habet vim excitandi fluxionem, quæ
 quidem simul implicari possunt, vel similes,
 vel dissimiles, vel contrariæ, de quibus quo-
 niam superius actum fuit, sequitur vt aggre-
 diamur variationē medicamentorum penes
 alias qualitates secundas, cuiusmodi sunt sa-
 por, odor, color, amplius & consistentia, inci-
 pientes a sapore, saporis enim erit habenda

*Ratione se-
 cunda qua-
 litatis.*

*Medicamē-
 torū sapor.*

B ratio, eius speciei maxime qua delectari solet
 æger, & hoc vt suauius medicamenta facta a vē-
 triculo melius comprehensa in actum dedu-
 ci possint, & ne nauſeam, aut vomitū, aut flu-
 ctuationes pariant, dummodo vis illius sapo-
 ris affectum curandum non augeat, veluti a-
 crem, salsum, amarum in calidis affectibus, vt

*Diamoron
stomachicu*

nec in frigidis acerbum, ob id ventriculo, quia amara sunt ingrata catapotiiis vel alia forma concludi solent, ut deglutiendo sensum sui non praebeant. Et 6. de comp. med. per locos ait, quod qui primus stomachicum diamoron composuit, succum mororum cum melle coxit, quamquam non solum id fecit, ut gratius illud redderet, sed ut diutius duraret, & hoc, ut praeter etiam tempus mororum eo uti liceret. Et lib. antidotorum docet Gal. mitridato & theriaca, propter amarorum iniucunditatem in eis existentium, vinum phalernum acre laudatissimum admiscere. Et Hip. 2. rat. victus acut. veratro nigro daucum, fœfeli, cuminum, anisum, non solum odoris, sed etiam saporis iucundi gratia intelligere possumus, cum horum duorum sensuum sensoria, substantia, situ, actione sint proxima, & in plerisque actionibus communia. Atq; hoc est illud, cur ante medicamento compositionem de sapore rogandum esse agrum medici velint, quo sapore maxime delectetur, & etiam qua forma, dummodo medicamento vires non solvantur, dum aut dulcedini, aut iucunditati studemus. Atq; hoc est illud, cur Gal. 4. sanit. tuenda, de oximellite ait oximel omnibus eadem aceti, mellis, & aquae mensura, non esse coquendum, sed pro cuiusque voluptate, quamquam unum plurimis naturis commune describi possit, sicut ibi scribit Gal. Odoris etiam est habenda ratio, atq; hoc est illud, cur. de comp. phar. 1. p. loca: ad capillos

Medicamentorum odor.

ad capillos in capite gignendos, succo radice
arundinis, muscis vstis, adipi vsino, oleo ce-
drino vinū aut passum affundit, vt odor obtū-
datur & pilos tenuantibus, & tergentibus, vt *Pilos generā-
tia.*
nitro, ossi sepiæ odorata miscet Gal. Atq; ibidē
Crito psilotra suauem odorem habere vole-
bat, atque vrina sanandis achoribus conue- *Achores.*
nienti propter odorem ingratum non esse v-
tendum. Et 5. de comp. med. per loca: cype-
rum addit capillos tenuantibus. Et 7. de cōp.
phar. per loca, facit dentifritiū odorum a- *Dentifritiū*
momo, aut cinnamomo, & absinthiū. 8. met.
quominus odore offēdat, aqua feruēte tin-
git, sic nostra cassia tanquā cinnamomo, quæ
sumuntur omnia aromatizamus, aut alio odo-
ramento, naturæ ventriculi, & aliarum partiū
familiari cum medicamenta omnia, præser-
tim purgantia ventriculum, & præcipue sto-
machum partem neruosam, & maxime sensi-
bilem, lædant, nisi iis odoriferis noxa eorum
obtunderetur, quinimo quod etiam medica-
mentis admouendis odorata miscent, q̄ de-
clarāt emplastra enodea, id est, suaueolētia, vt
ex lib. quos & quales, clarius patere potest. Se-
quitur color, cuius etiā est habenda ratio, atq; *Medicamē-
torum color*
hoc est illud, cur medici medicamenta foliis
auri tegant, vel vase ex materia non transpa-
rente veluti argenteo, vel stāneo. Atq; hoc est
illud etiā cur emplastra fiant ruffa, & coloris
cidoniorum, & cerussa quoq; addatur vnguē-
tis quibusdam ad coloris albi gratiā. recipiunt

*Consisten-
tia.*

*Asthma.
Orthopnœa*

*Diacharion
Diamoron.
Acetum.*

Euphorbiū.

*Sordium
crassitudo.*

Alopecia.

autē colores omnes optime ea simplicia, quæ
coloris omnis fere sunt expertia, vt aqua velu-
ti inodora omnes odores, velut balanus mire-
pfica, & insipida sapores omnes, veluti cucur-
bita. Sequitur consistentia, cuius etiam habē-
da est ratio in medicamentis. Crassa igitur æ-
grius cum deuorentur, & ægrius in corpus pe-
netrent, liquida fiant, & tenuia. Atque hoc est ²⁹
illud, cur bolos catharticos sæpe liquore dis-
soluamus, vt 8. meth. mel aqua exigua Gale. li-
quat, vt poros cutis obstructos ingredi ad de-
tergēdū possit, sic. 7. de cōp. phar. per loc. ad fi-
nē: in asthmate, & orthopnœa ab humore cras-
so, & lento siccātia incōmoda ait esse Gal. red-
dendis ex thorace excreationibus, ob id potū
vini largiorē admiscet, si adest abscessus, pau-
ciorem, & 4. tuen. sanat. vbi vult diutius medi-
camentū super vnito corpore manere, oleis,
ceram, & resinā addit, & parue cōsistentiæ fi-
unt linimēta, maioris vnguenta & cerata, du-
rissimæ emplastra, & 8. meth. diachariō ait esse
efficacius stomachicū quam diamoron, & 3. de
comp. phar. per gen. acetū ait, essentię tenuita-
tē medicamenta in altū ducere, & præsertim
cum est refrigerandum, & euphorbium cū est
calefactū, & 8. meth. masticen tusam oleo nar-
dino mixtā ad sordium crassitudinē, tenuita-
tē etiā medicamenti torrefaciendo exhibet,
ob id Gale. 1. de comp. phar. per loc. amigda-
las amaras totas cum corticibus vstas, & ni-
trum crematum alopeciæ adhibet, vt tenuiora
possint

possint vsque ad imam pilorum radicem penetrare, amplius tenuitatem efficiunt, terendo, & cribrando, ob id 4. sanit. tuen. In diacalaminthæ compositione, pulegium, thymū, petroselinum terit, & cribat ad vacuandum humores acres in tota carne cessantes, & vbi per venarū oscula medicamēta promte subire volumus, & in omnem partem ferri, qualia quæ sudores, vrinas, mentes moueant, obstructiones liberant epatis, lienis, renum, corporis habitus. Et ibidē cum vrinas ducere vult, *Vrinam mouentia.* nitrum, cuminum, piper tenuissimum facere docet, crassius vero, vbi aluus est delicienda, sic rhabarbarum, vbi aluum ducere negligenter, vbi vrinas, curiose terere facimus. *Aluiductio* Quandoque vero crassitudinis habenda est ratio, atque hoc est illud, cur in vlceribus asperæ arteriæ, & œsophagi crassa, & lenta efficiūt medicamenta vlceri idonea cum gummi tragacantha, quæ suo lentore medicamentum affectæ parti diutius affigant, & eodem modo in vlceribus intestinorum, vesicæ, vteri. 1. *Intestini & vlcera.* de comp. phar. per loc. & 6. sanit. tuen. in nocturnis venereorū imaginibus crassiores substantiæ vnctiones, seu cerota efficiebat, ne facile a corpore defluerent, & piper, zingiber, masticen, & huiusmodi alia integra deuorari iubent, cum ventriculum calefacere volunt, *Ventriculi calfactio.* citra epatis caliditatem, vbi vero etiam epas, *Epatis calfactio.* & longinquas partes calefacere volunt leuissime trita, & aliquo liquori mixta tenuissimo.

*Mirrha.**Medicamē
ta varian-
tur præpa-
ratione.**Ablutio.**Scabies.**Lixiuum
quid.
Infusio.*

Quandoq; vero habēda est ratio vtriusq; simul
tenuitatis & crassitudinis, quod alterū alterius
actionem meliorē reddat. Plerūq; ob id. 6. de
cōp. phar. per loc. ad diamoron addit crocū, &
mirrhā, quod virtus diamorō astringēs altius,
& in profundum magis ducatur a mirrha, & e
contra mirrha ab astringentib. magis impella-
tur. Præter hæc autem variatur medicamentū
præparatione, veluti ablutione, infusione, eli-
xatione, frictione, torrefactione, adustione,
incineratione, extinctione, & aliis pluribus
præparandi modis: abluendo quidem medi-
camentum, cum vel a medicamento vim ali-
quam auferre volumus: veluti in cadmia, cal-
ce, & omnib. metallicis fieri solet, vt ablutio-
ne auferatur vis mordicandi, & adurendi, &
exsiccatio sola relinquatur. Vel vt medicamē-
to vim aliquā addamus, velut medicamenta a-
ceto abluere solent, gratia excitandi medica-
mentorum vires, & terebinthinam, aut larici-
nam aqua salsa abluunt, vt addant falfedinem
ad extergendam scabiem, & exsiccandum effi-
cacissimam, vel gratia vtendi diluto tantū, ve-
luti lixiuio vti solent, quod est ablutio cinerū.
liquores aut quib. abluere solēt, sunt aqua dul-
cis, aqua salsa, vinū & acetū: infundendo vero,
cum ab vniuersa medicamēti substātia inten-
ti o est eiicere virtutes fini nostro, & scopo cō-
uenientes, contrarias aut dissimiles. Notanter
autē dixi, ab vniuersa medicamēti substātia, ad
differentiā ablutionis, quæ a superficie solū vi-
res

B

res abluit: at infusio ab intima rei substantia eiicit: veluti mirobolanos, rhabarbarū, aloen infundere solēt, quoties intentio est aperire duraxat partib. acrib. atq; igneis, abiiciēdo partes terrestres, in eoq; liquore infusionē efficiētes, quę scopo etiā respondeat. Elixatione vero, cū non tantū a medicamēti vniuersa substantia vires eiicere conamur, sed easdē trāsmutare volumus ad aliū terminū, ad aliū substantiæ modum, & qualitates alias, ad differentiā infusionis, quæ extrahit quidē succū a medicamento, non tamen alteratū, sed eundē substantiæ modū, & qualitates retinentem. Frictione vero in aliquo pingui, cum intentio est medicamento adhibere vim emplasticā & lenitiuam, veluti raphani radicem in tenuissima ramenta derafam in anserino adipe frigere solent, & renib. calculo affectis apponere. Assatione vero, seu torrefactione, cum intentio est partes intrinsecas medicamenti concoctas (Notanter dixi concoctas, non autem combustas, veluti fieri solet ab adustione, & incineratione) vel facilius conterere, veluti sericū olla prius torrefacere solent, vt cōteri possit, vel vt flatus inutilis exhalet, qua ratione pro capite refocillando auellanas torrefacere solent, ne flatu dolore capitis excitent, vel vt medicamēta diutius conseruent, vel vt a medicamentis diuerstarū substantiarū, eam quæ scopo nostro & vsui est inepta, exhalare faciam⁹, quēadmodū ad fluores alui, coercēdos rhabarbarum & myrobo-

*Elixatio.**Frictio.
Calculus renum.**Assatio.
Torrefactio.
Adustio.
Incineratio.**Capitis refocillatio.**Alui fluores*

lanos torrefactos, & cōtritos aliquo congruo liquore potandos exhibemus, vt vbi exhalarint partes tenues abstergentes, crassę duntaxat terreę, astringentes & constipantes, quę vñi nostro commodę sunt, remaneant solę.

Exstinctio.

scyrrihus.

Venarum fractura.

Dysenteria.

Vfus compositionis medicamentorum.

Exstinctione vero, cum intentio est, vel vapore tantum medicamentis exstincti vti, veluti in scyrrho curando Gal. lapidem pyriten accensum in aceto suffocandum esse iubet, vt ille vapor a lapide exstincto manans, scyrrho duritiem resoluat, qua ratione etiam ferrum candens in aqua exstinctum ad ventriculum, lienem, intestina corroboranda, & ad venarũ fracturas, vel vt vbi euaporarint partes tenuiores ipsius liquoris partibus duntaxat crassioribus liquoris remanentibus vtamur, veluti in dysenteria facit Gal. qui lapillos ignitos in lacte extinguere non cessat, donec pars tota serosa, ac pinguis diffarit, & casei substantia sola permanserit, quod cibi genus iis, qui dysenteriam patiuntur, exhiberi solet. Reliqui præparandi modi aromatariis possunt relinquere. Sequitur vt magis particulatim ostendamus quomodo Gal. ab huiusmodi arte quasi directus, ad vsum omnia fere, vel plurima reuocarit, atque hoc est illud quod ait i. de comp. med. secundum genera. Medicamentorum inquit compositione vtinur, cū medicamentum ad manum non habemus, quod eodẽ, quo affectus gradu, a mediocritate recedens molitur. Et paulo post, medicamenta inquit

inquit, etiã simul miscemus, quoties vel medicamentum in emplastrum adhiberi nõ potest sine alterius miscella, vel administrari nõ potest nisi retundatur, & mitigetur, vel quoties contrariis simul facultatibus indigemus, & repellendi, & digerendi, detergendi, ac leuigandi, vel attenuandi simul ac incrassandi, vel quoties volumus medicamentum, quod multis auxilietur. Et 2. de comp. med. per genera. Medicamentorũ, inquit, facultates non solum secundum genera, sed etiam quo ordine, quouis gradu aut excessu singula suas vires fortiantur, sunt cognoscenda, qua ratione si haberemus ceram solam, & æruginem, quibus cauum vlcus repleremus, cum cera sola vlcus sordes minime sit prohibitura, vt quæ nec detergere, nec exsiccare possit, ærugo autem per se adhibita, excitatura tum rosionẽ, tum phlegmonem, vtique horum vtrumque vitantes, medium ex ambobus facimus, imbecillius æruginẽ, cera valentius, ratione vero qua cera paulo interuallo relinquitur ab eo, quod administrari commodè potest, ærugo autem magno id ipsum excedit, ob id sane multæ ceræ modicam æruginem admiscet. Et ibidem, medicamenti exsiccantis vim, admixto melle intendit, remittit autem ex oleo, & cerato, vel oleoso quopiam. Et 4. de comp. med. per genera: Vlcera, inquit, non alia ratione a medicamentis sanitatem requirunt, quam quod in particula affecta, eam siccitatẽ inducant

*Vlcus cauum.**Cera.**Ærugo.**Vlcera.*

*Pilos gene-
rans.*

Thapsia.

*Pharmaca
vetusta.*

Aphtha.

*Incarnans
medica-
mentum.*

inducant, quam possidebat, ubi se habebat se-
cundum naturam: id quod erit, ubi nec fanies,
nec pus amplius producet, & 1. de comp. med.
per loca. In usu thapsia ad attrahendum pro-
bum sanguinem ad locum depilatum, quod
ratione nimie caliditatis exulcerationes & in-
flammationes excitare possit, eius vehemen-
tiam mitigat cerato, ex oleo aliquo, quam-
quam sola thapsia usum se etiam fatetur: sed
vehementi illius facultate larga aquæ affusio-
ne exsoluta, sicuti in debilibus medicamentis
laurinum oleum admiscet. Et ibidem: recen-
tibus medicamentis fortibus, veluti euphor-
bio & thapsia parcius vitur, antiquis vero li-
beralius. Quamquam pharmaca valde vetusta
fugienda sint, velut sunt metallica, quod suas
facultates amittant. Et ibidem, a medicamen-
tis lenioribus in alopecia auspiciandū esse do-
cet Gal. & respectu effectus, quem pharmacū
primo admotum produxit, sic facultatē eius
aut lenire, aut augere. Et 2. de comp. med. per
loca: medicamentum refrigerabat, ea in aqua ve-
hementer frigida collocando, quæ si non ad-
erat, niuem vasculo circumponebat. Et 6. de
comp. med. per loca. oleū, inquit, per se infe-
stissimum esse aphthæ affectui, veluti & chal-
citis, quandoquidem alterum quidem hume-
ctat, & sordes gignit, mordet autem vehemē-
ter chalcitis, verum moderata mixtura ipso-
rum optimum pharmacum efficit, quemad-
modum ex cera, & æruginē incarnans medi-
camen-

camentum effici solet, tametsi ambo per se sint contraria carni gignendæ. Et 8. de comp. med. per loca: In confectionibus stomachicis Andromachi ait: Porro, inquit, polychresta, *Polychresta* siue multi vsus medicamenta apparantur, cū vnum habere viginti affectionibus congruū malumus, quam tot numero alia, cum tamen ad singulas affectiones vnum aliquod destinatum, eo quod ad plures paratum est, melius existat. Et ibidem, in stomachicis Asclepiadis: dictum, inquit, mihi iam est, impossibile esse, vt inueniamus pharmacū ad affectiones multas optimum, multoque præstantius esse, quod singulis earum destinatur. Et in stomachicis Asclepiadis, in ea affectione, quæ sentientibus ardorē intēso singultu, & stomachi voluulosis dispositionib. facit, stupefacientib. inquit, veluti opio, misceri calefacientia, vt eorū malignitatē corrigant, eorumq; vires deducant. Coloris vero rationē habens 1. de comp. med. per genera. Medicamēto, inquit, vt cōcilietur color, cerussam medici immiscere solēt, quāquā etiā alia ratione, vt quandā astringēdi, refrigerādiq; vim medicamēto conciliēt. Et 2. de cōp. med. per genera, viridia medicamenta vt efficiantur, æruginē non modicā immittendā esse, inquit Gal. vt cætera in suū colorē permutter abigendo ab huiusmodi, miscella ea quæ *Viridia.* pertinaciter p̄priū colorē tuētur. Et paulo inferi°. Melina etiā, inquit emplastra sūt, & ruffa, *Emplastra ruffa.* quæadmodū plurima sūt viridia, sed viridia *Melina.*

*Stomachi
voluulosa
dispositio.*

*Viridia.
Emplastra
ruffa.
Melina.*

propter æruginem crudam fiunt. Melina propter mediocriter coctam, ruffa vero, vbi liberalius ea coquitur. Odoris vero rationem habens. 3. de comp. med. per loca: In diuite quodam, qui odoratum pharmacum exigebat, hederæ vlam excogitavit, ipsumque phalerno veteri diluit, & quam breui affectionem cura-

Ventris voluulose dispositiones.

uit. Et 7. de comp. med. per loca: voluulose, inquit, vëtris dispositiones esse per odorata curandas. Est, inquit, is curationis scopus, vt ad affectas partes odorata admoueamus, cuiusmodi sunt anisum, apium, daucus, cuminum & fesceli. Nam quemadmodum graueolentia omnia stomachum subuertere solët, sic odorata corroborare. Cōsistentiæ vero rationem

Inueteratus capitis affectus.

habens 2. de comp. med. per loca: In inueteratis capitis affectibus, vbi necessario aut pilos radimus, aut præsecamus vsque ad cutim, in rasis quidem admouebat pharmaca emplastica, liquida vero iis qui breuissime habebant præfectos capillos, quinimo etiam commoditatis habens rationem 10. de comp. med. per loca: Medicamentorū, inquit, quædam sunt, & complura, quæ pharmaco cui miscetur, vim nullam, aut præexiguam exhibent, commoditatem vero materiæ præstant, vt vel emplastri, vel cerati speciem referat, veluti est argenti spuma nullam insignem qualitatem, præter siccandi modicam habens. Præparationis vero rationem habes de comp. med. per genera.

Spuma argenti.

Medicamentum, inquit, varie præparatū varia efficit

efficit, ob id argenti spuma cruda, ac per se attritiones corrigit, ex aceto autē aut vino trita siccataque, vlcera quæ ob humiditatem ægre recipiunt cicatricem, remedium fit, quod si ipsam cupis rosionis expertem, elota vtitor aut vino aut aceto. Et ibidem : medicamentū vt sequax fieret, ac sibi continuum resinā, inquit, iniicere solent. Et ibidē: medicamēta, inquit, metallica, nisi plenius coquātur, emplastrū ex eis, constans adeo friabile redditur, vt adhærere cuti, absque ligatura non possit. Et 2. de cōp. med. per genera: Medicamentorum, inquit, ex aceto diebus pluribus contritorum morsus & acrimonia obtunditur, vires autē augentur. Et ibidē: medicamenta metallica ex combustionē, inquit idem efficiunt, q̄ medicamēta fortia aceto contrita morfu obtunduntur, viribus augentur, quæ cū nihil mordax, siue erodens præseruēt, elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Et ibidē: Lithargyrum, seu argenti spumā præparat Gal. intritū vino phalerno sub estu caniculæ, dein exsiccatur: In emplastro Hygieni ad vlcera vix cicatricē ducunt. Et 4. de cōp. med. per genera: medicamenta, inquit, cōbusta & lota, acrimoniā quā prius habebant amittunt, quibus vtendum in iis, qui molli sunt corpore, ad sentiendū p̄mti, necnō cacochymi, q̄ cū acredine vacēt morsum etiā inferre nō possint, nec plegmonem. Et ibidem : calx inquit ignem non experta, cū insigniter mordicet, exigua portione aliis

*Attritiones
Vlcera cicatrice inducēda.*

Calx.

K

medicamentis a nonnullis miscetur, extincta
 mediocre est pharmacū, elota prorsus lene, &
 mordacitatis expers. Et ibidem ait, metallica
 medicamenta, vbi magis siccādi vi prædita es-
 se volueris, & minus rodere, diutius sunt co-
 quenda. Et ibidē: subtiliora, inquit, sūt quæ ex
 aceto leuigantur, atq; ob id melius purgāt, at-
 tenuant, & siccant, verū ad cicatricē inducen-
 dam sunt ex vino trita meliora. Et 1. de comp.
 med. per loca, medicamento quod fluidū ni-
 mis apparebat, parū ceræ addebat. Et 4. de cōp.
 med. per loca, de pharmacis ocularib. loquēs, 3
Stribium. quod vero, inquit stibium vocatur, illotū qui-
 dem fortē astringendi facultatē ostentat, lotū
 autem exsoluitur, vt prope ad vim mordacita-
 tis expertum accedat, at q̄s vstū vehementem
AEs vstum. extergendi possidet facultatē, itemq; squāma
 eius, & sc̄los, nec minus efficax, sed minus mor-
 dacitatis expers est chalcitis vsta, quod si lauē-
 tur talia pharmaca, extersoria quidē adhuc ma-
 nent, tanto tamen imbecilliora, quantū ami-
 serint mordacitatis. Et 8. de cōp. med. per loca:
Chalcitis. In confectionibus stomachicis Andromachi
 loquens de hyera: Porro, inquit, ad vētris sub-
 ductionē illota aloe est aptior, elota autē mul-
 tum de medicamento sa vi amittit, quā etiā
Aloe. febricitantibus dare aliquis possit, si febris sit
 valde mitis. Hactenus decursis iis, quæ ad rectā
 curationis artem pertinere diximus, nempe
IIII. affectuum cognitione, locorū affectorum, &
Circum- remediorum: reliquum est modo, & de circū-
stantia. stantiis

stantiis nonnihil differamus. Nā tamen si quæ
 hæcenus dicta sunt vera sint omnia, & circa
 artem curandi magnum habeant momentū,
 eiusmodi tamen sunt, vt per seipsa considerari
 non possint, sed ad aliud referri, nempe ad vir-
 tutē ipsam, & reliqua quæ virtuti sunt annexa,
 quarū quidē circumstantiarū tanta vis est, atq;
 potestas, vt subinde totū id, quod cōcepimus,
 immutent, subinde intendant, vel remittant,
 quæ quidem ex hoc manifesta fient, incipien-
 do a virtute. Porro cum virtus tripliciter re-
 periri possit in curatione morborū, vel ex to-
 to fortis, vel ex toto debilis, vel medio quodā-
 modo inter fortem & debilem, si reperietur
 esse ex toto fortis, nihil immutabit eorū quæ
 concepimus a natura affectus, loci affecti, & i-
 pliusmet remedii, sed libere pmitter nos age-
 re tantum, quantum desumimus ex illis tri-
 bus, atque ambos oculos vertemus ad ipsum
 morbum, vt moderni dicere solēt. Sin autē ex
 toto reperietur debilis, immutandi vim obti-
 nebit ea omnia penitus, quæ ex natura affect^o,
 & loci affecti cōceperamus, atq; vterq; oculus
 erit vertendus ad ipsam virtutē, cum natura sit
 operatrix, nihil penitus respicientes ad ipsum
 morbū: qua ratione Gal. 12. meth. in syncope ex
 dolore nutrit in principio accessionis, negle-
 cto prorsus morbo. Si vero virtus medio mo-
 do se habebit, vt nec morbus ita sæuus sit, nec
 virtus ita debilis, tunc respiciendū erit altero
 oculo ad virtutē, altero vero ad morbū. Solēt

*Virtus in
 curatione
 morborum
 reperitur
 triplex ex
 toto fortis.*

*Ex toto de-
 bilis.*

*Syncope ex
 dolore.
 Virtus me-
 dio modo se
 habens.*

dicere moderni dextro respiciendam esse hoc casu virtutem, sinistro morbum, quod sane falsum est, quoniam cum virtus medio modo se habeat, aequaliter etiam vtrumque respicere debemus, nempe tum morbum, tum virtutem. Ex quo iam patere potest, quomodo virtutis tanta vis sit, atque auctoritas, ut quandoque immutare, quandoque vero remittere omnia possit, ut non ab re Gal. quandoque virtutem regi: membra principalia arcibus: corpus ciuitatis: agritudinem hostibus assimilarit: cui quidem regi, si contingat in ciuitate ab hostibus obsideri, antequam iustum, & legitimum, & periculo vacans praelium aggrediatur, consulere debet, an debilis sit, an fortis, & si debilem se esse cognouerit, ut periculum sit inire pugnam cum hostibus, pugnam omittere debet, interim vires suas augens, donec auctis viribus, praelium periculo vacans inire possit: sed haec de virtute. Sequuntur circumstantiae, quae virtuti sunt annexae, tot ferme, habitus corporis, animi accidentia, consuetudo, ars, tempus anni, anni constitutio, regio, & huiusmodi, quae & ipsa habet vim circumscribendi, & limitandi curationem nostram, ob id non exhibebo idem puero, quod viro, nec seni, id quod iuueni, nec debili id quod robusto, nec in maximis caloribus, id quod in minimis, aut in regione temperata id quod in intemperata, quorum omnium tantus est usus in arte curandi, ut tria illa, quae ad artem curandi requiri diximus tanquam

Circumstantiae virtuti annexae.

B

quam animus regere, ac moderari videantur, quod quidem manifestum fiet, agendo de instrumentis artis medicæ. Etenim etsi in iis quatuor capitibus initio huius operis a nobis propositis, vniuersa curandi ars consistat, quoniã tamen ars illa curandi in vsum descendere nõ potest absq; instrumentis: sequitur igitur, vt de instrumentis agamus, & qua arte a medico tractanda sint, quaque via, & ratione ars illa curandi ad instrumenta flectenda sit, vt quotiescunque opus erit alicui parti affectæ mederi, possimus, nullaque mora in promptu sint instrumentorum genera, atque ars, seu methodus illa tractandi, quã in arte curandi superius sumus persecuti. Cum autem instrumenta medicorum in tria præcipua genera collata fuerint, diætã, chirurgiam, & medicationem, cumque ex tribus iis instrumentis diætã maxima artis pars existat, & hoc, q; ea solũ vt plurimum curatio perfici possit, & tutissime (quod nõ contingit aliis duob. instrumentis, in quibus aliquod periculum inest) quamobrem nõ imprudenter Asclepiades omnes medicinæ partes ad hanc deduxit: cuius necessitas inde etiam desumi potest, quod ex tribus iis instrumentis si tollatur diætã, reliquis remanentibus, manca atque incoata ars medica existat, reliquis vero sublatis hac sola superstite, multoties ea sola curare possimus: quo fit, vt optimo quasi iure a diætã exordiedum sit, illud prænotando, quod etsi victus ra-

*Instrumenta
Medicorũ
sunt tria.*

Diætã.

*Diatetica
cneessitas.*

Alimētum.

*Aer habet
rationem
alimenti &
medica-
menti.*

*Alimentum
relatum ad
hominem
est quadru-
plex.*

tio, seu diata græcis appelletur, rectus, & con-
ueniens vsus earum sex causarum ita alteran-
tium corpus nostrum, vt sine illis esse nō pos-
simus, quoniam tamen ex illis sex rebus non
naturalibus, alimentū reliquis omnibus præ-
stantius est, nimirum quod hac cōditione in-
signitum est, vt non tantum secundum quali-
tatem, sed etiam secundum substantiā alteret
(nam tametsi aer quoq; spiritus nutrire videat-
ur, hoc tamen habet, quatenus alimēti ratio-
nem subit, quemadmodum ratione qua alte-
rat, vel ad frigidum, vel ad calidum rationem
medicamenti adipiscitur) Sequitur igitur, vt
cæteris omissis, de arte exhibendi cibum, &
potum pertractemus: etenim cū alimentum
præter conditiones proprias, aliorum quoq;
conditiones possideat, facile postmodum erit
vnicuique exemplo artis exhibendi alimen-
tum, aliorum quoque artem exhibendi trans-
ferre. At priusquam artē alendi aggrediamur,
multiplex alimenti significatum est distinguē-
dum. Primum autem illud erit notandum, ali-
mentum Gal. lib. de temperamentis 3. non di-
ci alimentum, nisi respectu animalis, cuius est
alimentum, cum id quod aliis animalibus est
alimētum, velut cicuta sturnis, hominibus sit
venenum: atque alimentum in relatione ad
hominem relatum tradit 2. de facul. natural.
quadruplex esse. Primo modo, cum iam vnitū
est membro, & assimilatum. Secundo modo,
cum est appositum, non tamen adhuc assimi-
latum,


latum, quasi proxime futurum alimentum. Tertio modo, cum sub forma sanguinis in venis existit, aut sub forma chili in ventriculo. Quarto modo, cum adhuc extra corpus existit, ut panis: Hoc loco aduerto intelligi alimentum debere quarto modo, veluti est panis, carnis, & huiusmodi, atque alimentum hoc quarto significato acceptum dupliciter adhuc considerari, vel pro materia, velut panis, & huiusmodi, vel pro modo, & arte illud administrandi, veluti considerando, qua arte materia illa panis sit administranda. Hoc loco monemus, sermonem futurum esse de alimento non pro materia, sed pro modo, atque artificio illud administrandi. Sed iam artem hanc aggrediamur, prius prænотantes quanti usus, & quantarum virium arti medicæ sit, ars ipsa alendi ægros.

IO. PAVLI PERNVNIA ³²

PATAVINI.

De Curationis arte.

LIBER TERTIVS.



VRANDI ARTE certis legibus iam stabilita, nunc sequitur quo fiat artis cognitio, vsusq; certior, vt particulatim in vnoquoque remedii genere

accuratius versetur, atque explicemus qua via, & ratione secundum artem iam declaratam instrumenta medicorum sint tractanda. Incipientes ab arte alendi ægros, tum quod, vt ait Gal. lib. de dign. & medic. Cum multa, inquit, sint quæ restaurare sanitatem possunt, ab alimento necessario incipiendū videtur mihi, nam aliis auxiliis non semper vtimur, sed alimento carere nullum animal potest, siue valeat, siue ægrotet. Et lib. de remediis paratu facilibus: tantam dignitatem in viuendi ratione exacta putat esse Gal. vt dicat non modo curandæ lippitudinis, verum etiam cuiusvis fere alterius ægritudinis primum, præcipuumq; curandi scopum consistere, in exacta viuendi ratione. Et initio libri de attenuante victus ratione, vim, & vsum victus attenuantis exprimens.

Alendi artis dignitas.

*Vis.
Vsus.*

mens. Cum, inquit, victus tenuās plerisq; diu-
 turnis morbis adeo cōferat, vt solo eo sine vl-
 lo alio medicamento sublatis sæpe fuerint, o-
 peræ pretium fuerit aliquid de eo distinctius
 præscribere : Sunt enim quos præstiterit sola
 victus ratione, sine medicamentis perſanare,
 vidi equidem non paucas arthritidas, quæ iam *Arthritis.*
 articulorū ossa nudarāt, alias quidē hac victus
 ratione in totū perſanatas, alias mitiores fuisse
 redditas. Vidi præterea, & eorum plerosq; qui
 spirandi difficultate (quam dispnoeam vocant) *Dispnoea.*
 sæpe præhenduntur, adeo leuatos, vt aut pror-
 sus releuarentur, aut longo saltem interuallo
 leniter affligerentur. Eadem etiā hæc tenuans
 victus ratio magnos lienis tumores, & epatis *Lienis tu-
 mor.*
 B scirrhum colliquat. Adhæc epilepsias paruas *Scirrhus*
 quidem, & etiam nunc incipientes penitus ſa- *Epatis.*
 nat, inueteratas vero, ac consumatas iuuat nō *Epilepsia.*
 mediocriter; tum etiam, quod cibus nō teme-
 re sit sumendus in morbo quamuis paruo, vt
 ait Hipp. 3. de mor. vulg. atque pauci medici
 recte præscribant victum in ægris, i. de diebus
 decret. Gal. etiam ob rationem forte, quam II.
 meth. assignat: vbi ait, victus ordinandi ſcien-
 tiam non leuiſſimam eſſe, quod cum ars ipſa
 tota sit magna, non leuiſſima eius pars est ſci-
 entia ordinandi victus. Sequitur igitur, vt artē
 alendi ægros percurramus. Quæ quidem alē-
 di ars cum ex arte curandi deſumi debeat, ſe-
 quitur igitur, vt prius memoriæ repetamus,
 quæ ad artem curādi neceſſaria fore diximus.

*Ars alendi
ægros a qua-
tuor deſumitur*

*I
Ab affectu.*

Febris.

Obſtructio.

*Solutio v-
nitatis.*

*Morbus per
ſe nihil indi-
cat de ali-
mento.*

*Alimenti
qualitas ha-
bet rationē
medicamēti*

Igitur cum ars curandi a tribus præcipue deſumi debeat, ab effectu, a loco ſeu corpore affecto, & ipſomet remedio, amplius & a circumſtantiis, ſequitur quod etiam ars alendi ægros recte, & conuenienter adminiſtrabitur, ſi ab iis quatuor erit directa: Igitur ars cibandi recte & conuenienter adminiſtrabitur, ſi horū præcipue habebitur ratio, Affectus primum (in affectu autem comprehendo tum genus ipſius affectus, tum affectus quantitatem, tum tempus ipſius affectus) quod genus cibandi ſumatur a genere affectus, cibandi autem genus attenditur penes qualitates, vt intēperies calida frigidam diætā, frigida calidā indicabit. Atque hoc eſt illud quod ait Hipp. victū humidum febricitantibus omnibus conuenire. Obſtructio vero cibaria poſtulat rarefaciētia, aperientia, incidentia, abſtergentia. Solutio vnitatis condenſantia, emplaſtica. Morbus enim quatenus morbus per ſe nihil indicat de alimento, ſed per accidens ſolum, quatenus æger ſine cibo durare non poteſt, ſed indicat p ſe, quod debet curari. Et ſi aliquid indicat, ex his quę circa cibū reperiuntur, qualitatem potius alimenti quā quantitatem, vel ſubſtantiam poſtulat, quę qualitas in cibo rationem potius medicamēti, quam alimenti poſſidet. Quod etiam expreſſit Gal. l. ſan. tuen. vbi docet, quando victus tēperamento ſit adhibend⁹ ſimilis, quādo cōtrarius, & prius reprehēdit aliquos, qui putabāt humidiores naturas ſemper

per esse siccandas: frigidiores, calfaciēdas: sic-
ciores, madefaciendas: calidiores, frigefaci-
endas, quippe inquit, similibus quēlibet ex-
cessum augescere, contrariis remitti, ac mi-
nui, vnoque verbo, contrariorum cōtraria ef-
se remedia: sed, inquit Gal. oportuit vero non
id modo legisse eos, meminisseque, sed & illa
quoque, in quibus ait humidam omnem vi-
ctus rationem febricitantibus esse vtilē, prae-
cipue vero puellis, & iis qui tali refici victu
sunt assueti: videtur n. in his, tria deinceps pari
inter se iure posuisse, morbū, ætatem, consue-
tudinē, atq; a morbo quidem contrarii adhi-
bendi indicationē accipit, ab ætate, & consue-
tudine similium, febri namq; cū morbo ca-
lido & sicco, humida cōueniūt: puellis vt qui-
bus ea ætas non morbus, sed secundum natu-
rā sit, id maxime est vtile, quod plane est, simi-
limū. Pari modo, & consuetudini, vtpote quæ
adscititiam, acquisititiamq; naturā in corpo-
ribus gignit, cōtraria dedisse in primis est no-
xium, atq; hæc merito. Quæ enim corpora se-
cundum naturam se habent, his seruari, custo-
dirique suum habitum decet: quæ morbo ali-
quo premuntur, iis ad contraria alterari, & ad
contrarium habitum trahi expedit, ac serua-
tur quide similibus vnum quodque, alteratur
contrariis: quo in loco manifestat, morbū po-
stulare viuendi rationem sibi contrariam. At
cum affectus non solum simplex sit, & solita-
rius, sed alteri affectui etiam implicitus, & si

*Morbus indi-
cat contra-
ria.*

*Ætas & cō-
suetudo si-
milis.*

*Febris quo-
tidiana*

*Hydrops cū
febre.*

*Febres col-
liquatua.*

Pituitosa.

Pestilentes.

implicitus, aut morbus causæ, aut morbus 33
morbo, quæ inter se contraria sint, veluti fe-
bris quotidiana, quæ ratione, qua febris est,
semper frigidis, & humidis alimentis erit tol-
lenda, ratione vero causæ, calidis & siccis esset
tollenda. Morbus vero morbo contrario im-
plicitus, veluti hydrops cum febre copulata,
quorum alter calidam, & siccam, alter vero
frigidam, & humidam diætam postulat: In his
igitur affectibus simul implicitis inter se con-
trariis, id erit agendum, quod iubet Gal. 9.10.
& 11. therap. perpendendum sane erit quid il-
lud sit, quod magis vrget, sique magis vrgebit
febris qualitas (febris cum sit calor igneus) fe-
bri duntaxat attendemus, & causam contem-
nemus, ut contingit in febribus colliquatiuis,
quas causones appellant. Vbi autem febres
non erunt ardentes, sed causæ februm erunt
periculosiores, sicuti contingit in febribus a-
liquibus pituitosis, in quibus cum humor sit
crassus, impedit operationes, & facit homi-
nes somnolentos, tunc omisâ febre causæ at-
tendendum erit, exhibendo calida & sicca, at-
que hoc est illud cur Gal. 1. ad Glau. & 11. the-
rap. aliquando diatrion pipereon exhibeat, &
in febribus pestilentibus, cum exsiccantibus
procedemus, respicientes summam putredi-
nem, quæ est causâ febris pestilentis, causâq;
attendemus, ne in tantum augeatur, ut homi-
nem statim perimat. In morbis vero implici-
tis simul cōtrariis, veluti hydrops cum febre,
illud

illud erit agendum quod iubet Gal. perpendē-
dū sane erit vter habeat rationē causā, & vter
eorum sit formidabilior, ac quinā sit qui aliū
foueat, illiq; attendendū erit, qui habebit ra-
tionē causā, q̄ eo remoto, facile etiā sequatur
rēmotio alterius: sed hæc de genere alendi æ-
gros. Sequitur quantitas alendi, quæ sane de-
sumenda est a quantitate affectuum. Nā sicut
genus cibandi a genere affectuū, ita sane quā-
titas cibandi a quātitate affectuū indicari de-
bet. Quantitas autem affectuum, & morborū
cum duplex sit, longa, & brevis, longa quidē
quæ & chronica appellatur, ea est, quæ protē-
ditur vsque ad quadragesimum diem: brevis
vero, quæ etiam acuta appellatur, multo citius
terminatur, & quartumdecimū non pertran-
sit, & brevis, seu acutus morbus temporaliter
adhuc diuidatur. Nam aut exquisitissime erit
brevis, seu acutus, & talis quarta die termina-
bitur (quinimo viginti quatuor horis quoq;
vt squinantia) aut erit acutus non tamē exqui-
sitissime acutus, & brevis, & talis terminabitur
in septima, aut erit simpliciter acutus, & talis
terminabitur in 14. diebus, quod tempus est
proprius acutorum terminus, & si quandoq;
continget quod protrahatur vsq; ad 40. non
amplius acutus simpliciter, sed acut⁹ per deci-
dentiā erit appellandus. Cū igitur morborum
quidā sint longi, quidā breues, sequitur quod
etiam alimentorū quædam debent cōuenire
morbis longis, quædā vero breuib; & acutis,

*Alēdi quā-
titas sumen-
da est a quā-
titate af-
fectus.*

*Quantitas
chronica.*

Acuta.

*Morbi acuti
triplices.*

*Alimentum
crassius lon-
gis, tenue a-
cutis conue-
nit.*

*Villus te-
nuis est tri-
plex.
Melicratū.*

*Succus ptisa-
nae*

*Ptisana hor-
deacea.*

*Ars alendi
applicata ad
nostra tem-
pora.*

Ex primū alimentū genus, quod longis morbis cōpetit, crassius appellatur, secundū vero ali-
mentigen^o breuib^o, & acutis morbis cōueniēs,
tenue appellatur. Et sicuti morborum acuto-
torū triplex est genus, vt supra ostendimus, a-
cut^o exquisitissime, qui in quarta terminatur,
acutus nō tamē exquisitissime, qui in septima,
& acutus simpliciter qui in 14. Ita & tenuis vi-
ctus, id est, cibi diminutio, tripliciter variatur,
& reperitur apud Hip. in tenuem, tenuiorem
& tenuissimū: tenuissima autem diætā apud
Hippoc. illa est, in qua nihil exhibebimus: te-
nuior illa est, in qua melicratum, id est, aquam
mulsam, quæ fit ex aqua cum melle decocta,
apud nos cum saccaro: tenuis vero, veluti pti-
sanae succus qui ab aliquibus cremor ptisanae
appellatur, seu ptisana colata, quæ fit ex hor-
deo excorticato in aqua decocto, quod cola-
tur, ita vt hordei substantia abiiciatur, & suc-
cus duntaxat sumatur. Nam vbi nō fiet expres-
sio, & colatura, sed in substantia exhibebitur,
tunc ptisana hordeacea a Galeno appellatur,
nec amplius sub tenuis diætæ ratione cōpre-
henditur, sed tenuem prætergreditur. Hactē-
nus habemus differentias viuendi penes quā-
titatem sumas a differētiis quantitatis ipsorū
affectuū ab Hipp. positis. Sequitur vt huiusmo-
di viuendi rationes ipsorū antiquorū castige-
mus, & reducamus ad rationē viuendi nostro-
rum temporū, & consuetudinem admodum
diuersam ab antiquorum consuetudine. Et
enim

B

enim cum ratio, & consuetudo viuendi nostrorum temporum diuersa sit a ratione viuendi antiquorum, sequitur etiam, quod vario modo sit instituenda. Vnde in primo gradu tenuitatis ipsius diætæ, in quo antiqui nihil exhibebant, nos mellicratum exhibebimus, qui est secundus tenuitatis gradus antiquorū: in secundo succum ptisanæ, qui est tertius tenuitatis gradus antiquorum. In tertio gradu, ptisanam non colatam exhibebimus, quæ secundum antiquos non comprehenditur sub tenui victus ratione, sed ipsam iam prætergreditur. Hactenus statuti viuendi differentiis penes quantitatem, ex quantitate morborū varia desumtis, & castigatis antiquorum viuendi rationibus, modo de ratione, & cōsuetudine viuendi nostrorum temporum sequitur vt loquamur, ostendentes cur victus exquisitissime tenuis, seu vera cibi diminutio, acutorum maxime propria sit, victus autem non ita exquisitus, cronicorum, & longorum morborū. Tota sane ratio sumitur a statu, quādo scilicet morbus reperiatur in summo. Ratio autē cur propter statum sumitur, a virtute est, quia eo tempore reperitur esse maxime occupata. Medicus autē omnia impedimenta remouere debet, vt natura causam morbi depellere possit. Nā tamen si in omnib. quatuor temporibus natura semper aliquid agit (otiosa enim nunquam manet) tamen omnem suū conatū in statu efficit, & ob id sequitur etiam, vt in

Cibus exquisitissime tenuis acutorum maxime proprius est.

*Cibi potusq;
quantitas
indicatur a
virtute.*

quocunque tempore, quinimo & ipso quoq;
principio, minuendus sit cibus. Atqui in statu,
vbi maxime natura est occupata, maxime mi-
nuendus erit, & cum in acutis status cito fu-
turus sit, sequitur vt citam etiam, & maximam
cibi diminutionem (ne natura occupetur) in-
dicet esse instituendam, atque hoc est illud,
quod ait Hip. 8. aph. & 10. Considerare, inquit,
oportet, quando status proxime futurus est, &
secundum mensuram illius status, vel longin-
quioris, vel propinquioris limitanda est ab ele-
ganti medico alimentorum tenuitas. Ex qui-
bus patet iam, cibi & potus diminutione in-
dicari a virtute oppressa ab ipso morbo, &
quantitatem limitatam, ac distinctam cibi &
potus, seu gradum, ac terminum, ad quem de-
ducendus est cibus, sumi debere a tolerantia
virtutis, non autem a morbo primo, & per se,
seu morbi statu, vt videntur aliqui velle, nam
tamen illud quoque verum sit, non tamen est
necessarium. Argumento illud est, quod si mor-
bus in quarta die, sit terminaturus, ratione ci-
tae terminationis, tenuem quidem dietam in-
dicabit, sed non illam indicabit recte, nisi sub hac
ratione, quod virtus adeo fortis sit, vt possit
sustinere tenuem ipsam viuendi rationem, quo-
niam si contingeret virtutem esse debilem, ne-
cessario aliquid esset exhibendum, scilicet quan-
doque mellicratum, quandoq; succus ptisanæ,
signum sane euidentissimum, quod quantitas
exhibendi cibum, non sumitur a statu necessario, 34
sed

34 sed a virtutis tolerantia, cum stante status pro-
 pinquitate, cogamur tamen quandoque vti
 victu pleno. Quod etiam expressit Gal. 8. & 11. *Quantitas*
 meth. 8. in hunc modum vbi docet quando *exhibendi ci-*
 sit vtendum tenuissimo victu. Ait enim, cum *bum non su-*
 in acumine morbus est, statim tum vltimos la *mitur a mor-*
 bores infert, tum tenui ad vltimum victu ne- *bi statu pri-*
 cesse est vti. Vbi vero non, sed licet liberalius *mo & per se*
 cibare, tantum est de vltimo remittendum,
 quantum morbus vltimis est mitior. 11. meth.
 Sed inquit, & nutrimenti modus hinc tibi est
 sumendus, quippe cum vires legitimū robur
 suum habent, & morbi summus vigor, breui
 futurus exspectatur, tenuissimovictu licet vti,
 cum sint infirmiores, non licet sine graui no-
 xa, sed adiciere ad nutrimenta tātum oportet,
 quantum est de robore virium imminutum,
 atque ex his scopis accipiendus est nutriendi
 modus. Et 10. meth. clarius cibandi febrientis
 consilia a duobus pendere ostendit. Sunt in-
 quit Gal. tibi a primo statim die in omni ægro
 spectanda duo illa, quæ Hipp. iussit, a quibus
 cibandi consilia petas, morbi summus vigor,
 & ægrotantis vires, postea si transiri summū
 incrementum sine omni cibo potest, in cibi
 abstinentia hominem seruabis, sin exiguum
 adminiculum requirat, abunde erit sola mul-
 sa, quod si maius desiderat, quam sit ex mulsā,
 prisana cremor satis erit. At si fas nō est mor-
 bi summum incrementum, aut tenui victu,
 aut media transmitti, id agendum, vt statim in

Ars cibandi
a duobus pē-
des.

L

*Confirmat
translationē
artis alendi
exemplis
Hippo.*

*Explicatio
quarti Aph.
prima part.*

Angina.

primæ accessionis inclinatione ager cibetur, aliquos vero, & cum inuasura adhuc est, & cū incipit, cibabis, veluti sunt ii, qui calido sunt, & sicco temperamento, tum viribus necessario imbecilles. Quo in loco apparet, omnem tandem indicationem limitandi cibum desumi a virtute, sicuti apparet in iis, qui calido, inquit, & sicco temperamento sunt, in quibus virtus necessario est imbecillis. Vt autem appareat artem hanc alendi agros ita a nobis institutā, non carere omni vetustatis exemplo, Hipp. aph. percurremus, illos disponentes secundū a nobis institutam ideam. Hæc igitur omnia hucusque a nobis enarrata Hipp. quoque deposuit, incipiens instituere victus rationem 4. aph. primæ particulæ aphorismorum. Victum tenuem, atque exquisitum, id est, perfectum, cui nihil deest, in morbis longis semper cauendum monet: in morbis vero acutis, in quibus non conuenit, esse periculosum. Nā, quod cauendus sit victus tenuis, scilicet nihil dare, vel exhibere mellicratū duntaxat in morbis chronicis, hoc tanquam manifestum est omittendum, si verum est, quod supradiximus, morbos chronicos protendi vsque ad 40. diem. Similiter etiam in acutis ait Hip. est periculosus, addens in quibus non conuenit, quoniam in quibus cōuenit, vt in exquisitissime acutis, sicuti est angina, quæ finitur in viginti quatuor horis, conuenientissimus est: nō conuenit autem in acutis illis, qui terminantur vsq; ad septimam

ptimam, & minus iis, qui vsq; ad decimāquar-
tam protenduntur. Rationem autem, cur hu-
iusmodi victus tenuis, atq; exquisitus sit pe-
riculosus, a suo opposito sumit Hip. Quoniam
inquit, etiā repletio ad extremū est periculosa,
sicuti etiam diata in summo tenuis, nempe
quod altera virtutem suffocet, altera vero vir-
tutem nimis debilitet. Non ignorandum autē
est, quod etsi per quartum aphorismum in te-
nui victu exquisitissime, acri delinquant, &
tutius sit, vt ait diuinus Hip. in 5. aph. in diata-
tione declinare ad plenum, quā ad tenuē, non
absolute tamē ad plenū est declinādum, quod
B vt diximus vtrunq; extremorum est pernicio-
sum, sed ad paulo pleniorē. Ratio autem est,
quoniam qui cibantur, habent virtutē ma-
gis fortem, continenterq; magis resistunt reb.
præter naturam, quam inaniti. Ex quo sequi-
tur peccatum in tenui victu, maius esse, quam
in paulo pleniori. Nam, etsi in sanis corpori-
bus, teste Hippo. victus tenuis est magis mo-
lestus, quam paulo plenior, nō tamen propter
hoc tenuis etiam, atque exquisitissima diata;
sicuti est, vel nihil dare, vel mellicratum exhi-
bere, penitus est ab arte alēdi abiiciēda. Quo-
niā vt inquit in 6. aph. in extremis morbis ex-
trema exquisitissime remedia cū optima sint,
extrema etiam, atque exquisitissima diata cō-
ueniens erit. Intellego autem per morbos ex-
tremos, non quidem morbos pessimos, & le-
tales (quod tamē præter multorū opinionem

*Peccatum
in tenui vi-
ctu maius
est quam in
paulo pleni-
ore.*

*Morbi ex-
tremi qui,*

*Morborum
extremorū
duas condi-
tiones.
Febris Ephe-
mera est a-
cuta.*

*Extrema
diata quib.
morbis con-
ueniat.*

affirmo) cū in morbis lethalibus mādet Hipp.
solis prognosticis agros esse relinquendos, q̄
secutus Gal. 12. therap. inquit non esse exhibē-
da morituris remedia, ne postea medicis
moris culpa ascribatur. Sed per morbos ex-
tremos intelligit Hipp. acutissimos, & admo-
dum præcipientes, qui motum vehementem in
suis accidentibus, & celerimum habent, cū
terminentur, & periculosi sint, ad vtramque
partem faciles vel ad salutem, vel ad mortem.
Quod enim morbi extremi semper acuti sint,
& duas conditiones possideant, motum velo-
cem, & vehementiam accidentium, ex 19. se-
cundæ particula manifestum esse potest: Vbi
ait Hipp. Febrem ephemerā licet habeat mo-
tum velocem, non tamē esse febrem acutam,
cum non habeat aliquam conditionem, nēpe
accidentium vehementiam: In huiusmodi i-
gitur morbis habentibus motum velocem, &
accidentia saua, adhibenda sunt extrema re-
media, nō autē leuia q̄ secundū magnitudinem
morborum, magnitudo etiam remediorū sit
applicanda, secundum regulas in arte curandi
superius a nobis positas. Postquam igitur pa-
tet extremam diætā aliquando conuenire,
id est nihil exhibere, vel melicratum dunta-
xat, quod in 6. aph. ab Hipp. positum fuit, se-
quitur utique ut ostēdamus in quibus, & qua-
libus morbis huiusmodi extrema diata cōue-
niens sit, quod & Hipp. 7. aph. persecutus est,
quod sane manifestum fiet ex fundamento iā
a b Hipp.

ab Hipp. 6. aph. posito. Nam si verū est, quod *Extremi morborum labores.*
 extremis morbis extrema diæta conuenit, at-
 que hi sunt extremi morbi, qui statim extre-
 mos habent labores, extremos autē labores
 habent ii, qui peracuti sunt, sequitur quod in
 morbis peracutis extreme tenuissimo victu
 sit vtendum. Vbi vero non, sed pleniorē victū
 cōtingit adhibere, tantum cibi, vt ait Hipp. in-
 dulgendum est, quanto morbus extremis est
 mollior: intelligo autem per labores morbo-
 rum symptomata essentialia, quæ necessario
 morbum insequuntur, & laborem inferūt, cu-
 iusmodi est dolor pungitius in pleuritide,
 tussis, febris continua, quæ quo magis sunt in-
 tensa, eo magis intensum suum morbum esse
 ostendunt: & hoc, quod sint accidentia essen-
 tialia huiusce morbi. Ratio autem cur in ex-
 tremo morbo, qui extremos habet labores,
 exhibēda sit tenuissima diæta, Galeno talis as-
 signatur: tū quod natura tunc cum materia
 pugnans nō sit ab opere suo impedienda, alio-
 qui multi sequerentur errores. Nam natu-
 ra fatigata, nec recte cibū concoquere posset,
 etsi posset necessario tamen, cum ab opere, &
 pugna auerteretur, morbus inualesceret, &
 fortior fieret, quæadmodū & Hip. & Galenus
 cōtra eos, qui plurimū victum ægris exhibe-
 bant, ostendunt, tum quod vt ait Gal. 4. apho.
 35 natura tunc sit defessa, atque adhuc a pugna
 cum morbo opprimatur qua ratione sequi-
 tur quod victus prope non statū ægris inde-

Labores morborum qui?

Extremis morbis extrema diæta conuenit

Victus prope statū ægris indebitè admini- stratur.

bite administratur. Verum est, vt ait Hipp. in vltima aph. parte, quod vbi morbus non erit prope statum, sed ab eo remotus, tunc quādo morbus non erit ita acutus, aut prope statum, sed mitior, vberiori victu erit vtendum, respectu victus tenuissimi. Et ratio est, quoniam cum virtus ea sit, quæ indicat rationem viuendi, atque ea ratione, qua est maxime occupata a morbo, maxime etiam, & extremam dietam expostulet, & tenuissimam. Sequitur, quod quanto virtus erit minus oppressa (erit autem tanto minus oppressa, quanto magis a morbi statu erit remota) tanto etiam vberior victus erit exhibendus, & hoc, vt illam conseruemus, quæ possit subinde in statu cum morbo fortiter pugnare. Eam enim vbi in principio non nutrimus, cogemur postea in statu nutrire. Igitur cum ars instituendi totam viuendi rationem penes quantitatem, sumatur a statu morbi breui vel longo, veloci vel tardo, & a virtute forti, vel debili futura, sequitur igitur necessariam esse artem præcognoscendi quando status morborum futurus est brevis vel longus, velox vel tardus, & quando virtus est futura fortis, vel imbecillis, cum ex horum exacta cognitione sequatur exacta cognitio instituendi rationem viuendi penes quantitatem, & ex horum ignorance sequatur etiam ignorantia institutionis ipsius victus. Id enim & Hip. 12. apho. persecutus fuit, cum videret non satis

Exacta cognitio instituendi victum secundum quantitatem, sumitur a statu morbi & virtute forti vel imbecilla.

tis esse scire, quod existente breui statu ipsius morbi, tenuis diata conuenit, & dum longinquus est status, crassa requiritur, nisi primo quoque die cognoscat medicus, quando morbi status futurus est breuis, vel longus, & virtus fortis ne sit, an imbecillis. Ex horum namque ignoratione necessario etiam sequeretur ignorantia institutionis ipsius victus. Ob id non ab re est ponere artem, ac modum cognoscendi, atque indagandi, quomodo status morbi, & paroxysmi, breuis vel tardus sit futurus, & quomodo sit cognoscenda natura paroxysmorum, idem enim persecutus est in 12. apho. Hippo. Pro cuius intellectione præcognoscendum est, quid sit constitutio morborum: cum autem pro cognoscenda morborum constitutione faciat etiam cognitio periodi, & paroxysmi, seu accessiones, sequitur igitur, vt hæc prius sint præcognoscenda. Porro periodum in morbis appello motum circula-rem totius morbi, & reditum eiusdem in idem: cuiusmodi est in febribus interpolatis, vt in tertiana interpolata, quæ affligit de tertio in tertium, totum illud spatium ab vna inuasionem ad aliam appellatur periodus, a nostris circulus, seu circuitus: tametsi etiam præter febres sint alii morbi periodici, cuiusmodi est epilepsia, podagra, & huiusmodi, in quibus reperitur humifmodi reditus, ac reflexio ad eandem affectionem. Accessio vero paroxysmus a græcis

*Periodus
morborum
seu circuli-
tus.*

*Accessio seu
paroxysmus*

*Constitutio
morborum.*

*Morborum
& paroxis-
morum cog-
nitio ex sig-
nis morbi
sumenda.*

*Cognito
morbo paro-
xismus est
iudicandus.*

*Morbi cog-
nitio ex tri-
bus desumi-
tur
1. Ex forma.*

dicatur, & est pars periodi determinata, quæ
deterior est, incipiens a principio inuasionis,
& durans vsque ad statum inclusiue, ita quod
paroxismus continet sub se principiū, augmē-
tum, & statum, non autem declinationem, cū
declinatio non sit pars paroxismi, sed tantum
periodi. constitutio vero morborum est pro-
gressus ille, quem alius seruat in tarditate, a-
lius in velocitate, alius in vehementia, alius si-
ne vehementia, ratione quorum dicemus, a-
lium morbum esse velocem, alium tardum,
aliū vehementem, aliū sine vehementia. **B**
His praeintellectis, sequitur vt ostēdamus mo-
dum, secundum quem habent cognosci con-
stitutiones morborum, & paroxysmorum, vt
ex horum cognitione possimus rectam victus
rationem ægrorum constituere. Porro cog-
nitio constitutionis morborum, & paroxismo-
rum ex signis morbi erit desumēda, vt ait Gal.
non autem vt aliqui medici faciunt, qui, dum
volunt morbum cognoscere, expectāt paro-
xismum, vt ex eo morbū ipsum, qualis sit con-
iiciant, cum tamen totum oppositum facien-
dum sit, vt ait Gal. 2. de crisi, vbi alia via metho-
dum docet cognoscendi naturam morbi, ex
cuius postea constitutionis cognitione duci-
mur in notitiam paroxismi, cuius cognitio ex
morbi cognitione depēdet. Porro morbi co-
gnitio ex trib. præcipue habet desumi, ex ma-
teria, ex forma, & ex loco. Ex forma quidem
videlicet ex illo quod morbum characterizat,
vt

vt tangentes febricitatem si percipiemus intensam & mordacem caliditatem, aut paroxysmum inuadentem vna cum frigore, iudicabimus ex huiusmodi forma esse febrem tertianam, vt videntes contractionem dicemus esse epilepsiam. At hoc non sufficit nisi materiam etiam morbi inspiciamus, ex iis quæ excernuntur cognoscendam? Etenim si viderimus urinam lucidam, citrinam, & penitus bilis colorem habere, poterimus dicere, materiam biliosam esse huiusce morbi causam, ita procedetes in reliquis excrementis. A loco præterea, quoniam propter materiae tenuitatem tertiana in caput grassari solet, & existente inflammatione in thorace, & in membrana costas succingente, locus manifestabit esse pleuritidem ratione cuius loci possumus iudicare constitutionem fore vel cito vel tarde terminabilem, vt patet de epilepsia & apoplexia. Et hæc sane sunt illa tria, a quibus sumi debet cognitio naturæ morbi, ex cuius cognitione assequimur deinceps cognitionem constitutionum, ac paroxysmorum. Secundum vero signum quo accessiones, & constitutiones cognoscimus, sunt anni tempora, & annexa, contingit enim morbum ex se longum esse posse propter tamen anni tempus breuem fieri, vt inquiunt Hip. & Gal. de quartana, quæ etsi ex se sit morbus longus, si tamen fiat in æstate ratione temporis calidi citius pertransit, & paroxysmi tertianæ qui per duodecim horas dū-

2. *Ex materia.*

3. *A loco.*

Pleurisia.

II.

Constitutiones morborum indicant etiam tempora anni.

Quartana. in æstate citius transit.

*Tertiana
paroxysmi
hyeme sunt
longiores.*

*Annexa
quanos dedu-
cunt in cogni-
tionem con-
stitutionis
morborum.*

*Tertiana in
regione &
temperatu-
ra frigida &
sicca.*

*III
Periodorum
incrementa.*

*Signa patho-
gnomica.*

taxat, ut inquit Gal. 2. de crisi, durare solent, si contingant in hyeme, ratione frigoris longiores euadunt. Et hoc est illud, quod ait Hipp. quod accessiones, & constitutiones morborum indicabunt, & anni tempora. Notandum autem est, annexa quoque; deducere nos in eorum cognitionem: cuiusmodi sunt ætas, cœli status & temperatura, quæ omnia sibi inuicem correspondent. ver enim pueritia, ætas iuuentuti respondet: item calida & humida temperatura, calida & sicca: amplius regio calida, & humida, & regio calida & sicca: ob id tertiana si contingat in temperatura frigida & sicca, quali præditi sunt, qui in ultimo senio sunt constituti, ratione temperature, iudicabimus tarde fore resolvablem. similiter, si accadat in regione frigida & sicca, longior & tardior efficietur tertiana. Tertium signum sunt periodorum incrementa, quæ penes moram distinguuntur. Etenim si videbimus incrementa esse longiora, longam etiam illius morbi constitutionem iudicabimus futuram. Atque hoc est illud quod ait etiam Hip. Et circuituum successiva incrementa. Non ignorandum tamen est illud quoque deprehendi posse ex signis quibusdam, quæ post apparentia nuncupantur. Etenim cum signorum quædam sint pathognomica (& sunt illa quæ morbum essentialiter manifestant, & ad quorum positionem statim ponitur morbus, sicut risibilitas semper hominem insequitur, & quorum altero posito, alterum quoque ponitur) quædam

quædam vero sint accidentia, quæ nō semper, sed sequitur post, cuiusmodi est habit^{us} philosophia, qui nō inest homini ab initio, sic & in morbis quædam huiusmodi sunt, vt iis cōstitutis illico eorū signa appareant, quædam vero appareant post principium morbi duntaxat, sicut inflammata pleura, cum sit mēbrana nervosa, consequēter sensibilissima, sequitur illico dolor, & cum inflammatio sit calor p^{ro}p^{ri}us exsistens, sequitur etiam necessārio intēperies calida, quæ febris dicitur, & quoniam est in mēbro faciēte ad respirationem, sequitur etiam anhelitus difficultas, & quia impeditur pulmo, sequitur etiā tussis. Vnde dolor, febris, respirandi difficultas, & tussis erunt signa pathognomica huiusmodi morbi, sequētia continue morbum ipsum etiam in eius principio. Et hoc genus signorum nō indicat, nec manifestat magnitudinē, aut paruitatē aut longitudinē, aut breuitatem morbi. Aliud genus signorum est, quod nō est morbo adeo essentialē, sed post apparēs appellatur, & hoc q^{ui} soleant apparere duntaxat post factum morbū, quæq; quandoque apparent, quandoque nō apparent, cuiusmodi est sputū in pleurisi, quod quandoque apparet, quandoque vero si pleurisi sit adeo pertinax vt hominē conducat ad mortem, non apparet, & hoc signorū genus quod post apparens appellatur, duo nobis manifestat, vt ait Hippoc. aut morbi malitiam (cum scilicet morbus superat

*Pleura inflā
mata signa
pathognomi
ca.*

IV
*Signa post
apparentia
aut morbi
malitiā aut
terminū in
dicant.*

*Morborum
malitia &
bonitas sa-
nitur etiā
ab opera-
tionibus.*

*Ab excre-
mentis.*

*A qualita-
te immuta-
ta.
Excremen-
ta per seces-
sum vacua-
ta possunt ef-
se triplicia.*

Concocta.

Cruda.

Affata.

*Cognitio
termini
morborum*

virtutem) aut morbi terminum. Notandum autem est, tria quoque alia adesse, a quibus sumitur huiusmodi malitia, & bonitas morborum, nempe ab operationibus, ut si quis in pleuritide non posset se continere quin dormiret, indicabitur morbum esse mali moris. Ab excrementis, & hoc vel naturalibus, ut quæ per urinam, per secessum, aut per sudorem exeunt, vel præter naturam, ut quæ per nares, vel in solutione continui, ut quæ in fluxu hæmorrhoidum, & huiusmodi excernuntur. A qualitate immutata, ut corporis nigredine, & huiusmodi. Notandum autem quod quæ ab excrementis sumuntur, illa præsertim, quæ per secessum euacuantur, triplicia esse possunt, aut concocta, aut cruda, aut affata: concocta, morbum boni moris indicabunt, cruda vero, aut erunt cum potentia, aut impotentia ut coquantur. Prima indicabunt morbum non esse ex toto malorum morum, sed medio modo se habere. Secunda vero morbum malorum morum, ægrum deducentem ad mortem. Sin autem fuerint affata, vel parum erunt affata, vel multum, quæ parum, indicabunt caliditatem non multum excedentem inter morbum medio modo se habentem, quæ autem multum, ut cum sunt nigra aut viridia, morbum indicabunt malorum morum, & hæc ea sunt, quæ indicant malitiam, & bonitatem ipsorum morborum. Sequitur ut ostendamus quomodo & quando ista indicant terminum morbi, an futurus sit longus vel brevis.

uis. Profecto si huiusmodi signa post apparen-
 tia, cito apparebunt, sicut in pleurisi sputum,
 indicabunt morbum futurum esse breuē, sin
 autē tarde, indicabunt morbū futurum lon-
 gum. Atque hoc illud est quod ait Hip. sed ex
 iis quæ mox apparent indicia sumuntur. No-
 tanter autem Hip. enumerauit signa duntaxat
 post apparentia, & dimisit pathognomica, &
 hoc, quod ista non indicent mores morborū,
 sed naturam duntaxat, & essentiam, mores au-
 tem a post apparentibus solum desumuntur,
 quæ quidem signa post apparentia secundum
 quod ad diuersa referuntur, diuersa etiam no-
 mina sortiuntur, nam relata ad morbum præ-
 sentem diagnostica appellabuntur, ad morbū
 futurum prognostica, ad morbū præteritum
 anagnostica, scilicet rememoratiua, quibus si
 addantur dies critici, in quibus signa ista appa-
 rent, pari passu indicabunt bonitatē, vel ma-
 litiam morbi præsentem, præteritam, & futu-
 ram, & signa critica appellabuntur. Hactenus
 de quantitate alendi. Quoniam vero in curan-
 di arte diximus applicationem quantitatis ip-
 sius remedii in eodem gradu dupliciter fieri
 posse, vel exhibendo remedium totum tantæ
 quantitatis, quantus est recessus, vniuersum,
 ac semel, vel pluribus vicibus paulatim reme-
 dium illud partiēdo, sequitur vt percurramus,
 modum instituendi rationem victus, statuen-
 do quot vicibus alimentum sit exhibendum,
 an semel in die, an bis, & an multū pro vice, an

*Signa dig-
 nostica.
 Prognostica
 Anagnosti-
 ca. Critica.*

*Quot vicib.
 & quantū
 alimenti
 sit exhiben-
 dum.*

*Alimenti
indigentia.*

*Alimenti
exsuperantia.*

*Alimenti
indigentia
sine morbo.*

parū, quod & Hipp. videtur enarrasse aph. 17.
vbi ait: Et quibus semel, aut bis, quod quidem
ex hoc manifestum fiet ex consideratione cō-
stitutionis corporis, in quo reperitur ægritu-
do. Etenim cū in corpore habeat esse neces-
sario, vel alimenti indigentia, vel alimēti exu-
perantia, & indigentia alimenti cū in corpore
esse possit aut morbum patiente, aut non pa-
tiente morbum: itidem alimenti exsuperantia
dupliciter in corpore esse possit aut bonorū
humorum, aut malorū humorū, & si malo-
rum humorū erit exsuperantia, aut crudorū,
aut adustorum: & si crudorū, aut potentium
coqui, aut impotentium coqui: & si adustorū,
aut subtilium humorum, vt serositatis sangui-
nis, aut partis chili subtilioris, quę in bilem fa-
cile vertitur, aut terrestrium, cuiusmodi sunt
humores melancholici: sequitur etiam: quod
non vno, & eodem modo vices exhibendi ci-
bum institui poterūt, sed multipliciter, sed in
corpore, vbi adsit indigētia alimēti, nihil aliud
præter naturam patiente, præter famem, cum
virtus non possit esse valida, si verum est, quod
virtus fundatur in spiritib. & bonis humori-
bus, multum alimentum nō indicat, ne suffo-
cetur: corporis autē indigentia multum cibū
postulat, quapropter vtriq; satisfaciētes, pa-
rum, & sæpe, seu pluribus vicibus alimentum
exhibemus, in eo quod parū virtuti, in eo ve-
ro quod sæpe corpori consulentes. In corpore
autem vbi non solum adsit indigentia, sed etiā
morbus

morbus præter naturam cum huiusmodi cor- *Cum mor-*
 poris constitutione virtus resoluatur, non so- *bo.*
 lum ab indigentia, sed etiam a morbo, maio-
 rem etiam indicabit restaurationem. Vnde vt
 vtrique satisfiat, non solum bis, sed etiam ter,
 & quater cibus erit exhibendus, partiendo a-
 limentum quod nec vnica, nec duabus vicib.
 exhiberi potest. Sin autem in corpore fuerit *Aliment?*
 superabundantia, eaque sit bonorū humorū, *abundantia*
 cum huiusmodi corpus plethoricum sit, & in- *boni.*
 tra venas plurimum habeat alimentum, indi-
 cabit parū alimenti esse exhibendum, & quo-
 ad vices semel in die, vel semel alternis diebus
 secundum quantitatem ipsius plethoræ. Sin
 autem fuerit superabundantia, sed ea sit malo- *Abundan-*
 rū humorū, tunc tale corpus indicabit tenuē *tia malorū*
 diætā, quæ virtutē repletā quoad vires re- *humorum.*
 spirare faciat. Atq; hoc est illud, quod ait Hip.
 corpora impura quanto magis nutries, tanto
 magis lædes: Quæ quidē superabundantia ma-
 lorū humorum si erit malorum humorū cru-
 dorum, possibilium tamen coqui, iudicabitur *Coqui pos-*
 tale corpus non esse alendum, vt ait Gal. 4. de *sibilium.*
 tuend. valen. quod tales egeant alimento exi-
 guo, quemadmodum etiā plethorici, & hoc,
 quod intra venas thesaurum secum gerant, in
 37 sanguinem conuertibilem. Sin autem supera- *Abundan-*
 bundantia erit malorum humorum crudo- *tia malorū*
 rum non potentiū coqui, sed potius exstingu- *humorum*
 entium calorē innatum, nec potentiū nutri- *crudorum.*
 re corpora, tunc alimentū sepe indicabitur, &

*Aduſtorum
& ſubtiliū.*

*Syncope ex
bile.*

parum eſſe exhibendum. Parum quidē, quia ſi multum exhiberetur, virtus ſuffocaretur, & calor, cum ſit imbecillis: ſæpe autem, nō autem raro, quia ſi parum, & raro exhiberemus, cum alimentum indicatum non habeant, ſed tantum pituitam acidam, & crudam, atque omnino concoctioni rebellem, calor, & virtus reſolueretur. At ſi ſuperabūdantia ſit malorū humorum aduſtorum, atque ſubtilium, indicabitur eſſe exhibendum alimentum, ſæpe & parum, ſæpe quidem, tum quod hic adſit indigentia bonorum humorum, tum quod habeant calorem igneum, a quo maxime reſoluuntur, tum etiam quod tales in ſyncope facile cadant, & hoc, quod bilis cum ſubtilis ſit, facile mouetur de loco ad locum, & facit ſyncopen, cum in huiusmodi conſtitutione fiant motus, & diuerſi, & contrarii motibus iis qui ſunt in fame naturali, quod vt ait Galenus ſecundo de facul. natural. membrum vicinum cum cogitur dare nutrimentum alteri mēbro vicino, non dat niſi id quod ſuperfluum eſt, & excrementitium, qua ratione ventriculus attrahens, trahit a venis meſaraicis excrementum, venę meſaraicę ab epate excrementum, epar a venis excrementum, venę ſimiliter a membris cum trahant excrementum, neceſſarium eſt transmitti ad ventriculum humorem duntaxat prauum, ex cuius agitatione cū etiam cor agitetur, ſequitur ſyncope, ob id Auiſen. 13. priui. Qui, inquit, tolerat famem, replet

plet stomachū malis humoribus, ex quo patet, tribus de causis huiusmodi patiētes sæpe, & parum esse alendos, tum ratione indigentia bonorum humorum, tum ratione caloris ignei resoluentis, tum ratione syncopis, vt nō ab re istius duntaxat ratione Galenus duodecimo meth. dicat. nos quādoq; in iis qui febri-
 citant, & syncopen patiuntur cogi in principio paroxilimi nutrimentū exhibere. Parū aut exhibebimus, q̄ virtus, & calor debiles sint, debiles aut sunt, quia humidum est resolutū, & a calore igneo dissipatum. Sin autem sit superabundantia malorum humorum adustorum, & terrestrium, eodem modo exhibendū erit alimentum sæpe, & parum: quemadmodum in biliosis diximus esse faciendum: sæpe quidem, quod adsit indigentia bonorum humorum, quibus nutriri possint, amplius quod humectatione indigeant, cum sint exsiccati. parum vero, quod virtus debilis sit, immo debilior quam in cholericis, & hoc q̄ cholericis siccitas solū calori ināto opponatur, in melancholicis autē tū siccitas, tū frigiditas. Nō ignorandum tamen est, q̄ etsi in hoc conueniant vtriq; tum cholerici, tum melancholici, vt alimentum eis exhibendum sit sæpe, & parum, in hoc tamen differunt, quod qualitas alimentorum in melancholicis calida, & humida esse debet, in cholericis autem frigida, & humida. Patet igitur, quomodo vices exhibendi alimentum, desumantur ab humoribus, & cau-

Fames longior replet ventrem nilū malis humoribus.

Adustorum & terrestrium.

Cholerici & Melancholici quomodo nutriendi.

Tempus idoneum exhibendi alimentum.

sis efficiētibz morbum. Haftenus ex tribus, quæ ab effectu desumi debent, duo absolui-
mus, sequitur tertium, nempe tempus idoneū

id.

exhibendi alimentum, quod sane cibi dandi
particulare tempus artis ciborum exhibēdo-

B

rū, maximū esse deponat Hipp. 4. acut. vbi ait,
scopum vnū esse, quod tempus illud, quo ci-

bis exhiberi debet, quamplurimum absit a
febris intensione, non in acutis modo, verum

quoque & in longis ait Hippoc. adiecisse au-
tem illum longis etiam in morbis notat ibi

Galen. quod in iis magis & forsan solis euidēs
sit scopus, in acutis enim morbis deprehēsa

*Quando in acutis sit nu-
triendum, &
quando in longis.*

in pedibus caliditas cibi tempestiue offerendi
signum sufficiens fuit. Non tamen in longis i-

ta nutrire oportet, sed melior declinationis
pars est expectanda, quod in acutis haud qua-

quam est expectandum timore cito futurae
accessionis: vt autem arte, & ratione institua-

tur idoneum tempus exhibendi alimentū, nō
erit recedendum a fundamento superius po-

sito. Etenim cū virtutis occupatio a morbo
maior, & minor, indicet maiorē, & minorē,

& exquisitiore viuenti rationem, vberiore
quidem vbi minus est oppressa, tenuiorem

vero vbi magis, vt hac ratione in statu, vbi est
magnitudo morbi, extrema diata conueniat,

sequitur quod eademmet ratione in iis mor-
borum temporibus, in quibus natura magis

*Status requi-
rit tenuissi-
mā diatam.*

erit oppressa, quod maxime etiam conueni-
ens erit tenuissimus, atq; exquisitissimus viuē-
di modus

di modus, cumque ex temporibus morbi status ille sit, cui maxime cōuenit exquisitissimus ac tenuissimus viuendi modus, q̄ vt ait Hipp. quando morbus in suo vigore constiterit, tunc tenuissimo victu sit vtendum: sequitur quod eademmet ratione in paroxismo cum virtus sit maxime oppressa, atque accidentia tunc temporis existant intensa, etiam in particulari morborum paroxismo nedum in statu a cibo erit abstinendum. Atque hoc est illud quod ait Hipp. in ii. aph. in accessionibus abstinere oportere: cibum enim dare nocuū, & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet: Intelligo autem per accessionem morbi paroxysmum, seu morbi inuasionem, in qua morbus fit acerbior, vt in periodicis febrib. contingit, quæ præscriptos habent terminos, in quibus exacerbantur, tempus accessionis maxime declinantes, & vbi aut quotidie fiēt accessiones, aut febres erūt continentes, ita vt nulla sit intermissio, aut adeo breuis vt non sufficiat ad exhibendum cibum, remissionis, tūc & inclinationis tempus erit eligendum. Haftenus ex quatuor

In paroxismo a cibo abstinendū

Accessio morbi.

Ars alendi agros.

I I.

Desumitur a loco affecta.

superius a nobis propositis, pro recte, & conueniēter instituenda ratione viuendi, vnū ab-
soluimus, considerationē sane ipsius affectus: sequitur secundum a nobis propositum, consideratio sane corporis, in quo reperitur affectus, cuius quidē temperatura, dū remouetur morbus semper erit seruanda, etiā quod esset

mala, vt ait Gal. in lib. therap. Etenim si febrē vellemus remouere, & temperaturam, quæ esset calida, & sicca, tunc duas subitas mutationes efficeremus, quas natura tolerare non posset. Etenim cum temperatura calida, & sicca ad æqualitatem reduci non possit, nisi cibis frigidis, & humidis, iisdemque depellatur ipsa febris, dubio procul etsi febris remoueat, corpus tamē non nutrietur, & hoc, quod vnumquodq; a suo simili nutriatur, quare dū

*In morbo-
rum depulsi-
one tēperatu-
ra corporis
seruāda est.*

morbi remouentur, temperatura corporis erit seruanda, atq; hoc est illud quod ait Hipp. victū humidum febricitantibus omnibus cōuenire, maxime vero pueris febre laborantibus, cum n. febris humidis depellatur, simul conseruatur corū temperatura, quæ existens calida, & humida, humido illo sustinetur, cū vnūquodq; sibi simili conseruatur, & nutriatur. At dubium est, quomodo corpus siccum

Dubitatio.

Solutio.

febre laborans, siccis alimentis sit seruādum, nam tunc morbum augeremus. Respondēdū 38 sane hoc casu alimentis esse vtendum, quæ actu sicca sint, potētia vero humida: atque hoc modo vtriusque, tum febrī, tum temperaturæ satis fiet: febrī quidem cum humiditate illa in potentia, temperatura vero cum siccitate in actu. Quando vero nō vno, & eodem modo,

*Victus ratio
variat pro
diuersitate
tēperaturæ.*

nec eadē alimenti quantitate corpora omnia sunt alenda, sed diuerso modo, quapropter sequitur vt percurramus diuersitatem victus in tēperamētis, quod etiā expressit Gal. 8. meth, quo in

quo in loco ait. Quæ sicca corporis natura est, sed in altera cōtrarietate tēparata, ea in lōginquioribus inediis gracilescit magis, quam quæ sicca est, & frigida, reficitur tamen facilius cū idoneum nacta est victum. Enimuero eiusmodi omnibus victus ratio alteranda est, multo profecto magis quam iis de quibus primum omnium est dictum, nempe calido, & sicco, item calido, & humido, quippe qui frigus, & humidus natura est, quoniam calido, siccoq; in vtraq; intemperie cōtrario modo est affectus, contrario nimirum vteretur victu, melius tamen est, non absoluto sermone cōtrario dicere, sed ex solius temperamenti indicatione, quoniam ex eo quod eadem febre febricitāt, non diuersam, sed omnino eandem sortientur indicationem. Dictum namque sæpe numero iam est, id quod secundum naturā est, similia semper postulare, quod præter naturam est cōtraria, siquidem quod naturaliter se habet, custodire, quod præter naturam est, tollere oportet. Porro febris omnis præter naturā est, ideoq; victus rationem frigideam, humidamque postulat, temperamenta vero ipsa alias postulant similia, alias vero contraria: quæ enim vitio carēt, similia perpetuo quippe quæ seruare expedit, quæ vitium habent (veluti in opere de tuen. val. est dictū) alias similia, alias contraria. Quoniā vero in cibi abstinentia nō omnes tēperaturæ eodē modo sunt seruandæ, quapropter aduertendum erit ad corporis tē-

Febris frigida & humidam diata postulat.

*In ipsa ac-
cessione quā
dōq; est nu-
trandum.*

*Inedia no-
cet calidis.
& siccis.*

peraturam, ratione cuius, cibandi quidā sunt,
& inualura febre, & incipiente, & accessione
etiam in ipsa, quod ostendit etiā Gal. 10 meth.
vbi postquam longam historiam de quodam
qui febre laborabat, narravit, ait. Ostendi ti-
bi, & in ipsa accessionis inuasionē eiusmodi
homines esse nutriendos, dico autē eiuf-
modi homines, in quibus corporis intempe-
ries ad siccum, & calidum cōuersa, febres ac-
cendit. Porro hoc quoque plerisque medi-
corum fortasse sit incredibile, sed siue rationi
ipsi fides est adhibenda, siue operibus, nos fi-
dem ambobus facimus, operibus quidē, dum
homines iis monstramus, qui si biduo patian-
tur inediam, necesse est febricitent: ita scilicet
vt nōnulli vbi cōcitati ad irā sunt, vel mœrore,
vel vigiliis affecti. Evidentissime enim tum in
conualescentibus ex diutino morbo talia fie-
ri cernitur, tum iis qui calido sunt, & sicco
temperamento: Quam vero ratio ipsa fidem
huic rei facit, alibi dicta est, dicentur tamē &
nunc eius rei summæ, vbi etiam reddit ratio-
nem huius per longum processum. Quæ autē
temperatura inediam tolerare possint, & quæ
cibum tolerare non possint, ex 8. meth. & 10.
habetur a Ga. inediam siccis, calidisque cor-
poribus noxiam tum sanis, tum agris ait 10.
meth. vbi ait: inedia siccis, calidisque corpo-
ribus, valentibus quidē noxia est, iis vero qui
in calida, & sicca æstate febre laborāt, quæ scili-
cet ex ystione aut labore imodico, aut vigiliis,
aut

aut comprehensis iam animi motibus sit cō-
tracta, non tantum noxia est, sed si quidquam
aliud, plane pernicioſa, quippe vel in febres
ardentes ex ea incidunt, a quibus (nisi prius
B mors occupet) in heclicas migrant, atque ab
his in maraſinum. Quæ autē ſint temperatu-
re, quæ in ediam tolerare poſſint, declaratur 8
meth. Vtilitatem inquit ex inedia ſentiūt po-
tiſſimum frigida, & humida temperatura, ab
hac quæ humida, tertio loco quæ frigida, quar-
to loco quæ ſicca eſt, & frigida. Et paulo poſt.
Siccā inquit, corporis naturā, ſed in altera
contrarietate temperatā, in longioribus ine-
diis gracileſcere magis quam quæ ſicca eſt, &
frigida, reſcitur tamē facilius, cum idoneum
naſta eſt victum; quod etiā paulo ante expreſ-
ſerat his verbis. Quibus inquit, in corporis
temperatura ſiccum praeualet humido, & ca-
lidū frigido, iis habitus gracilis, & ex longiori
inedia acerrimis, acutiſſimiſq; corripitiūtur fe-
bribus, a quibus promptus eſt in heclicas trāſ-
itus, atq; ab his rurfus in torridum maraſinū,
aut ſi os ventriculi facile iniuriis patet, in ſyn-
copen, id eſt, animi defectū. Haſtenus ex qua-
tuor ad artem viuendi recte inſtituendam, p-
poſitis, duo ſunt abſoluta, nempe affectus, &
natura corporis affecti. Sequitur alimentum,
in quo hæc tria præcipue erunt conſideranda.
Subſtantia ſeu modus ipſius ſubſtantiae, quan-
titas & qualitas. Modus autem ſubſtantiae tri-
pliciter cōſiderandus erit, penes alterationē,

*Temperata
ra qua poſ-
ſunt tolera-
re in ediam.*

*In alimento
tria cōſide-
randa ſunt.*

*Modus sub-
stantia pe-
nes alterati-
onem.*

*Penes motum
localem.*

*Penes nutri-
tionem.*

*Phasianorum
caro.*

penes motum localem, & penes ipsam nutri-
tionem. Et primum penes alterationē, vt quia
habet coqui in ventriculo, vtrum alimentum
illud sit facile coctū, velut ouum sorbile, an
coctū difficile, veluti caro bubula. Et quoniā
sicuti potest in ventriculo coqui, potest etiam
putreheri, hac ratione perpēdendum erit an
alimentum illud sit facile putrescibile, veluti
sunt fruct⁹ horarii, an difficile putrescibile, vt
caro bubula. Penes vero motum localem, q̄
possit supernatare in ventriculo, possit etiam
fundum petere, perpēdendum erit an alimē-
tum sit leue, an graue. Concocto vero cibo,
quia habet distribui per venas, perpendēdum
erit, an sit facile distribuibile, veluti sunt iuscu-
la, an difficile distribuibile, veluti est caro assa-
ta. Penes vero nutritionem, quod alterato, &
distributo alimento chymus ille in epate eli-
citur, potest esse bonus, & malus, multus, &
paucus, hac ratione perpendēdū erit an alimē-
tum sit boni, vel mali, multi, vel pauci nutri-
menti. Hæ sane sunt omnes differentiæ penes
modos substantiæ cōsideratæ. Quarū omnes
bonæ in aliquo alimento, simul complicatæ
reperiri possunt, veluti est caro phasianorum
quæ facile coquitur, non facile putrescit, pe-
tit fundum, facile distribuitur, & est boni, &
multi nutrimenti. Omnes etiam malæ in ali-
quo simul reperiri possunt, vt in fructib. hora-
riis quidā vero ciborū sunt intermedii, aliquas
habentes bonas, aliquas non habentes, &
aliquas

aliquas habentes malas, aliquas non habētes, de quibus omnibus in lib.alimentorum. Quæ ratione eligenda erunt alimenta, quæ proposito satisfaciunt vndique, aut si vndiq; non satis faciant, compositione erunt emendanda, alterando illud quod scopo non satisfacit, aut illud abiiciendo, & efficienda erunt medicamentosa secundum speciem determinatā affectus, qui aut sit morbus, aut sit causa, aut symptoma, & hæc aut solitaria, aut simul complicata: Considerandum etiam erit alimentū penes quantitatem, & sane vel molis, vel virtutis: molis quidem, veluti olerum libræ tres, quæ in multa quantitate sunt molis. pauca autem virtutis, quod in eis sit paucum alimentū, vel virtutis, non autem molis, veluti vinum nigrum, quod est multi alimenti. Qualitates etiā ciborum erunt perpendendæ tum primæ, 59 tum secundæ, tum tertiæ. Primæ quidem, vt si præter nutrimentum calfaciant, veluti est caro columborum, vel infrigident, veluti est lactuca, vel humectent, vel exsiccant. Secundæ vero veluti sapor, odor, color. Tertiæ vero, an rarefaciant, aperiant, incidant, abstergant, cōdensent, emplasticent. Etenim iis omnibus considerare oportet qualitates omnes, scopis ab affectu, & corpore affecto desumptis, quod vt ait Gal. 9. meth. in fine, is solus possit viuendi rationem summe commodam laboranti comparare, qui potestates indicationum examinet, & simul conferat, & ex collatione si-

II.

*Quantitas.**Vinum nigrum.*

III.

*Qualitas.**Columborū caro.*

*Ars alendi
agros.*

III.

*Variatur
circumstan-
tiis.*

Virtus.

Aetas.

Anni tēpus.

Regio.

Cōsuetudo.

Virtus.

mul facta, cuiusq; indicationis potestate diligenter considerata, omnibusque inter se collatis, vnam idonei victus summam laboranti commodam comparare possit. Quæ quidem quoniā ex horum cognitione perfecta, & absoluta nōdū haberi potest, nisi etiā recte prius examinata vi ipsarū circumstantiarū, sequitur vt circumstantias percurramus, & earū vim, & quid singula circa alimētū aut addere, aut detrudere possit, veluti est virtus, cuius tanta vis est, & auctoritas, vt possit penitus immutare, quæ morbus postulat. Hac enim ratione etsi in statu morbi nihil exhibendū, exsistente virtute forti, vbi tamen virtus erit imbecillis, etiā quod alia omnia oppositū indicarent, erit cibandum. Aetas, quod senes facillime ieiuniū ferant, secundo loco qui aetatem cōsistentem habent minus adolefcētes, omnium minime pueri, qui cibo sunt magis nutriendi. Aet, seu tempus anni, qua ratione hyeme cū ventres calidiores sint, copiosiora etiam alimēta erūt exhibenda, minus vero æstate, & aliis temporib. Regio, quæ si erit calida, & sicca, cū corpora magis resoluat, indicabit adhuc magis esse cibandum. Idē constitutio si fuerit calida, & sicca. Idē etiam consuetudo quod qui consueti sunt plurimū cibare, cū sani sunt, nō sunt in statu morbi alēdi mellicrato, sicut fieret in iis, qui parū sunt cōsueti cibare. Igitur vt a virtute exordiamur, eius habēda erit maxima ratio, quid. n. refert scire statū morbi ppe futurum,

rium, & paroxysmum, & morbum extremum existere, nisi præter hæc coniectemur, ut inquit, Hip. utrum virtus possit sufficere, ac sustinere tenuem illam dietam, donec morbus consistat? cum hucusque confusam quasi, & incoactam duntaxat cognitionem nobis indicarint affectus & corpus affectum, donec eorum indicationes a virtute præscribantur, ac limitentur: Et hoc, quod ex se nihil perfecte indicent, donec ad virtutem non sunt relata, cuius officium est immutare, quandoque vero præscribere dietam, ac dietæ gradum immutare quidem. Quoniam etsi nihil in statu morbi dandum sit, existente virtute forti, si tamen debilis sitque, etiam quod alia oppositum indicet, dandum tamen erit tantum quantum virtus requireret, tantum autem requireret, quantum sufficere poterit contra ipsum morbum. Cognoscemus autem *Quomodo cognoscendum, an virtus ferat, vel non sufficiat.* quando virtus sufficere non poterit, nec resistere usque ad statum, & quando sufferre poterit, considerando ut inquit Gal. virtutem ægri corporis, an picrocolum sit, calidum, & siccum, maxime abundans bile, præsertim circa ventriculum. Talia enim indicabunt, sæpe esse nutrienda, & hoc, quod huiusmodi corpora facile resoluantur, & difficile ieiunium ferant, ut in principio paroxysmi liceat & huiusmodi corpora nutrire. Amplius consideranda erit ventriculi temperatura, an calida sit, & sicca, & biliosa, quod tales etiam a principio paroxysmi sint alendi. Ex quo patet Hipp. dictum circa statum nihil esse dandum, si ad virtutem referatur, immutari

atque intelligi debere in his tantum, qui facile ieiunium ferunt, qualia sunt corpora calida & humida, quod a Gal. 8. meth. positum fuit, ubi ait, cum vires legitimum robur suum habent, & morbi summus vigor breui futurus exspectatur, tenuissimo victu licet uti: cum sint infirmiores, non licet sine gravi noxa, sed adiace- Bre ad nutrimenta tantum oportet, quantum est de robore virium imminutum, atque ex iis scopis accipiendus est nutrimenti modus. Et 10. meth. manifeste fuit explicitum: quo in loco ait, esse a primo statim die in omni agro spectanda illa duo, quæ Hip. iussit, a quibus cibandi consilia petat, morbi summus vigor, & ægrotantis vires. Postea si transiri summum incrementum sine omni cibo potest, in cibi abstinence hominem seruabis, sin exiguum adminiculum requirat, abunde erit sola mullâ, quod si maius desiderat, quam sit ex mullâ, prisanae cremor satis erit. At si fas non est morbi summum incrementum, aut tenui victu, aut medio transmitti, id agendum ut statim in primæ accessionis inclinatione æger cibetur. Aliquos vero cum inuasura adhuc est febris, & cum incipit cibabis, veluti sunt ii, qui calido, & sicco sunt temperamento, tum viribus necessario imbecilles. Sequitur ætas cuius etiam habenda erit ratio, quod ut ait Hip. aph. 13. senes facile ieiunium ferant. 2. loco qui ætatem consistentem habent: minus adolefcentes, omnium minime pueri, præsertim qui inter ipsos

2.
Ætas.

plos sunt viuidiore. Intelligo autem senectute- *Senium*
 tem, pro primo senio a 35. ad 50. annum, tum *primum.*
 quod ætas ea cum frigida facta sit, ex deficien- *Senes facile*
 tia caloris, senes minus etiam alimenti consu- *ferunt ie-*
 mant, cum etiam quod in venis habeant hu- *iunium.*
 morem pituitosum, dulcem, tenuem, & con-
 coctioni facilem, tanquam thesaurum ipsius
 nutritionis. Qua ratione etiam additum fuit,
 & inter pueros ii, qui viuaciores sunt, & hoc,
 cum viuacitas a caliditate proueniat, caliditas
 autem plurimum continue consumat, diffici-
 lius etiam cæteris ieiuniũ ferre possunt. Quã-
 quam alia etiam ratione hoc procedat, quod
 qui crescunt, plurimum habet caloris innati,
 iuuenes autem cum crescant, non autem se-
 nes, iuuenes etiam habent plurimum calidi
 innati: at qui plurimum habent calidi innati,
 plurimo egent alimento: huiusmodi cum sint
 iuuenes, cõsequenter maiori cum indigeant
 alimento, difficilius etiã ieiunium ferre pos-
 sint, quam senes. Atque hoc est illud quod ait
 Hip. apho. 14. qui crescunt plurimum habent
 calidi innati, plurimo igitur egent alimento,
 alioqui corpus absumitur, senibus vero parũ
 calidi innati inest, paucis propterea fomitibus
 egent, quia a multis exstinguuntur, quam ob
 causam febres senibus non similiter acutæ fi- *Febres seni-*
 unt, frigidum enim eorum corpus est. Sequi- *bus non fa-*
 tur aer, seu anni tempus, quod vt ait Hip. ven- *cile sunt*
 tres hyeme, & vere natura calidissimi sunt, & *acuta.*
 somni longissimi, quia per ea tempora copio- *3. Anni tẽ-*
 pus seu aer.

siora alimenta sunt exhibenda, quod tunc cum
 calor innatus plurimus sit, pluribus etiam egeat
 alimentis, indicio sunt ætates & athletæ, unde
 iis temporibus cibos facile ferunt, ob validam
 virtutis tolerantiam: æstate autem, & autum-
 no ut ait Hip. 18. aph. cibos difficilime ferunt,
 quos tamen hyeme facilime ferunt, secun-
 dum inquit locum ver habet, atque hoc est,
 illud, cur Gal. 1. de facul. aliment. rationem vi-
 ctus per singula anni tempora instituat, autū-
 no quidem melancholicis cibis, ac siccantib.
 abstinere, hyeme vero eis uti, quemadmo-
 dum sane æstate humectantibus & refrigeran-
 tibus, vere autem, quod medii sint tempera-
 menti, mediæ facultatis cibos edere. Et lib. de
 dign. & medic. hyeme inquit comedes pluri-
 ma, dico non ad tuas vires, sed aliorum anni tē-
 porum respectu, quemadmodum & Hip. æstate,
 & autumnno cibos difficilime ferunt, hyeme
 facilime, ver secundo loco est, idem alibi ait,
 ventres hyeme & vere calidiores sunt natura,
 & somni longissimi, in his itaque temporibus
 alimenta plura tribuenda sunt, si quidem ca- 40
 lor innatus multus est, ideo pleniori alimen-
 to indigent, indicio sunt ætates, & athletæ, bi-
 bendo aliorum anni temporū comparatione
 minimum, potusque sit album, & tenue vinū,
 quod admodum vetus non sit, obsoniaque hoc
 tempore assa ut plurimum, & hæc omnia ma-
 gna ex parte calida & sicca, & hoc propter in-
 temperiē, quæ ex anni tempore frigida est, &
 humida,

*Hyeme par-
 tius bibendum.*

*Vere vbe-
 rius.*

humida. Post ubi ver aduenit, potus vberior, dilutiorque, non tamē plurimus, nec aquosissimus, parum conducet, & esculenta molliora, paucioraque, quin & obsonia ex assis ad elixa commutabis. Plurimum autem, & aquosissimum æstate bibēdum, quod tempus hyemi plane sit contrarium, ver autem sicut medio loco est inter hæc duo extrema, ita mediā quoque rationem viuendi requirit. Hæc Gal. idem lib. de dign. & medic. quo in loco, viuendi rationem non confestim, sed paulatim mutandam esse docet. Nā ratione temporis, hyemis scilicet frigida & humida, calidam & siccam instituit viuendi rationem. & in vere potum dilutiorem, esculenta molliora, paucioraque, quin & obsonia ex assis ad elixa cōmutat, æstate autem vberiore, & aquosissimum potum præcipit, & hoc quod æstas hyemi sit plane contraria. Et addit, in hac viuendi ratione mutanda iuxta anni tempora efficienda, nō subito, sed paulatim transeundum esse, ne vniuersa illa & subita mutatio cōparet offensam, sicut traditum ab Hipp. est, plurimum atq; repente euacuare, vel replere, vel calefacere, vel frigefacere, siue quouis alio modo corp⁹ mouere periculosum, quoniam omne nimium est naturæ inimicum, quod vero paulatim fit, tutum est, cum alias, tum vero cum ab alio ad aliud transit. Sequitur consuetudo, quod vt ait Gal. victus vna species nō omnibus in cōsuetudine sit 7. meth. Nam sicut inquit nec aliarū

*Æstate
plurimum.*

*Autumno
medius
modus ser-
uandus.*

4.
Consuetudo

rerum, ita nec victus vna omnibus species in consuetudine est, cum aliis semel esse, aliis bis & aliis citius, aliis ad vesperam cepisse cibum motis sit. Iam cibus ipse aliis piscis plurimum est, aut denique aliquid ex mari, aliis olera magis aut deniq; horrentia, aliis poma, aliis legumina, aliis nuces, aliis aliud quidpiã, aliis quadrupedum carnes, atque harum aliis alia, aliis auium, atque aliis aliorum. Quinetiam caseo, & lacte alii vtuntur, nonnulli plus quam cæteris cibis, generaliter quidem caprarũ, vel bou: sunt tamen qui & aliorum animalium. Bibunt quoque alii calidum, alii frigidum, & vinum vel liberaliter, vel parcius, vel omnino nullũ, vel hoc genus, vel illud. Ad ea igitur reducendus quisque est quibus insuevit. Scriptum autem de consuetudine diligentius seorsum est, nunc illud dixisse abunde sit, magnam partem ad totius victus, medicamentorumq; inuentionem ex consuetudine sumi, cuius ratione cibari bis in die solitis maximo damno eis esse, nisi prandeant, ostendit Hip. 2. acut. vbi narrat etiam incommoda, quæ eis euenire solent, ita vt in laborante morbo frigido, & humido, qui consuetus sit vti cibariis frigidis, & humidis, semper necessarium sit aliquid frigidi & humidi cibarii exhibere: sed hæc de ætate, tempore anni, & consuetudine, quorum trium simul meminit etiam Hip. in fine 17. aph. quo in loco ait, condonandum etiam aliquid esse ætati, tempori, & consuetudini. Sequitur regio,
& anni

& anni constitutio: qua ratione si æger erit in *Regio.*
 regione calida & sicca, cum hæc resoluat cor-
 pora, indicabit magis adhuc esse nutriendum: *Anni cōsti-*
 idem anni constitutio, si fuerit calida & sicca, *tutio.*
 sed hæc de iis quatuor necessario requisitis,
 pro recte, & conuenienter instituenda vi-
 B uendi ratione, nempe affectus cognitione,
 corporis affecti, alimenti, & circumstan-
 tiarum, quæ singula quantum possint iam di-
 ligenter fuit enarratum. Quoniam vero pro
 recte, & conuenienter instituenda victus ra-
 tione, non solum sciendum est, quid indicent
 singula seiunctim, & solitarie capta, sed neces-
 sarium est etiam cognoscere, quid indicent si-
 mul complicata, quod vt ait Gal. 9. meth. in fi-
 ne idonea victus ratio methodo inuenietur
 ex indicationibus sumtis simul a morbo, tem-
 peramento, natura, consuetudine, ætate, anni
 tempore, statu cæli, quia ex omnium compa-
 ratione simul, vel similium, vel contrariarum,
 in quibus altera alteri detrahit, & ex recte p-
 pensis indicationum potestatibus viuendi ra-
 tio idonea inuenitur: cūq; præcipua indicat̃ia *Victus ratio*
 viuendi rationē sint morbus, & virtus, sequitur *pro compli-*
 igitur vt incipiamus a cōplicatione morbi cū *catione mor-*
 virtute. Vt autē res manifestior fiat, cū virtus, *bicum vir-*
 & morbus nō vno tantū modo, sed multiplici- *tute.*
 ter simul cōplicari possint, quapropter prius
 percurrem⁹ singulas cōplicationes, postea o-
 stendemus quantū alterū alteri in singula cō-
 plicatione detrahare posset. Igitur virtus vel *Virtus parū*
 N *urgens.*

N

*Virtus mul-
tum vrgens.*

*Maxime
vrgens.*

*Morbus pa-
rum vrgens.*

*Multum
vrgens.*

*Maxime
vrgens.*

non vrgebit, vel parum vrgebit, vel multum,
vel maxime vrgebit. Parū autē dicetur vrgerē,
vel ratione ætatis, vt cū puer, aut senex labo-
rat, aut cū corpora rara, & tenuiū humorū fe-
brib. corripuntur, aut cum irritantia adfunt
symptomata, vt pruritus ingēs, morsus in ven-
triculo ab acri humore, vigilia, ita intus coer-
cita, mœror. Multū dicetur vrgerē virtus, cum
ager iis perturbabitur symptomatis, quæ syn-
copin solent inducere, qualia sunt ventris
crebra deiectio corpus absumens, sanguinis
fluor immodicus, incessantes sudores. Maxi-
me vero dicetur virtus vrgerē, cū prope syn-
copin erit, q̄ ex pulsu, & facie certissime de-
prehendere poteris. Morbus eodem modo
tunc dicetur parum vrgerē, veluti cum ager
sitim patitur, aut cibos valde fastidit, aut si præ-
ter modū astricta erit aluus. Multū vero vrge-
bit, vbi aliquod sæuū symptoma afferet, vt cō-
tinuas vigilias, perpetuum soporē, aut coma,
aut fortem capitis dolorē continuum, aut diffi-
cilē anhelitum, delirium, aut cum vrina sup-
primitur, aut aluus nimis cietur. Maxime vero
vrgebit morbus, cum vltimos afferet labores,
hoc autē erit, quoties cum symptomatib. cō-
iuncta erit inquietatio, & angustia. Hactenus
distinctis virtute & morbo, quotupliciter re-
periri possint, sequitur, vt huiusmodi differē-
tias simul cōplicemus, atq; perpendamus, quā
speciem viuendi, & rationem singula compli-
catio indicet. i. Aut igitur virtus non vrgebit,
& morbus

& morbus non vrgebit. 2. Aut virtus non vrgebit, morbus parum vrgebit. 3. aut virtus non vrgebit, morbus vero multum vrgebit. 4. aut virtus non vrgebit, morbus autē maxime vrgebit. 5. aut virtus parum vrgebit, morbus vero nō vrgebit. 6. aut virtus parum, morbus parum. 7. aut virtus parum, morbus multū. 8. aut virtus parū, morbus maxime. 9. aut virtus multum, morbus autem nō vrgebit. 10. aut virtus multum, morbus vero parū. 11. aut virtus multum, & morbus multum. 12. aut virtus multū, morbus vero maxime. 13. aut virtus maxime, morbus nihil. 14. aut virtus maxime, morbus parum. 15. aut virtus maxime, morbus multū. 16. aut virtus maxime, morbus maxime. i. vbi igitur morbus non vrgebit, & virtus similiter se habebit, victum exhibebimus per ea quæ comeduntur. 2. virtus autem non vrgens cum morbo parum vrgēte sorbitionem indicabit. Sequitur virtus non vrgens cum morbo multum vrgēti: sed ante huiusmodi complicationem sciendum, medium quoddam reperiri inter morbum parum & multum vrgentem, qui quidem cum sit mediæ vehementiæ inter morbum parum & multum vrgētem, cumq; ex Hipp. morbo maxime vrgenti inedia conveniat, multum vero vrgēti pocula competāt, sequitur, quod vbi iis morbus mitior fuerit, quod tantundem etiā erit ascendendum versus victum crassiorē, cumq; morbus, qui multū, & qui mediocriter vrget, proximi sibi sint

Virtus & morbus non vrgens complicatio. i.

Virtus non vrgens 2. & morbus parum vrgens.

Morbus mediocriter vrgens,

vicinitate, & in cibariis post pocula crassior proxime victus sit tenuis sorbitio, sequitur quod tenuis sorbitio erit victus conueniens morborum mediocriter vrgentium: atque eadem ratione, qua morbus parum vrgens recedit a morbo mediocriter vrgente, eadem ratione, cum in cibariis recedamus proxime a tenui sorbitione ad crassam sorbitionem, quod crassa sorbitio erit morborum parum vrgentium. Et eadem ratione, morbo non vrgenti, ea quæ comeduntur erunt conuenientia, quapropter huiusmodi regula semper erit seruanda, quod vbi variaueris huiusmodi proportionem, agris maxime nocebis: atque hoc est illud, quod ait Hippo. victus tenuis, atque exquisitus in morbis quidem chronicis semper, & in acutis quibus non conuenit periculosus: per morbum chronicum intelligens morbum non vrgentem, cum morbi chronici symptomata non adducant, quorum ratione morbus vrget. Notandum etiam morbum chronicum febris continuitatem non admittere, cum continuitas morbum acutum constituat Hipp. & Gal. 1. predic. quia, si tenuem victum, qui secundum Hipp. lib. de prisca medicina, & lib. de mor. vul. 1. cō. 3. sunt crassæ sorbitiones, aut exquisite tenuē, qui est tenuis sorbitio, quam ex natura morbi competere diximus morbo parum vrgenti, si, inquā, morbo nihil vrgenti, aut non vrgenti exhiberēs, veluti est morbus chronicus, grauiter errares.

res. Sed hæc de medio inter morbū parum, & multum. Sequitur tertia cōplicatio. 3. Vbi virtus non vrgebit, morbus vero multū vrgebit, indicabitur victus per pocula: quoniā cum morbus multum vrgēs proxime minor sit morbo maxime vrgente; & morbus maxime vrgens indicet inediā, virtute nihil vrgente; sequitur quod morbus multum vrgens, victum illum indicabit, qui proxime recedit ab inedia. Huiusmodi autem est victus per pocula, qui in tenuitate cæteris inediæ magis appropinquat, quod & Hipp. iussit primo de ratione victus acut. vbi postea inquit, si dolor aut periculum aliquod comparuerit, sorbitionē dare oportet, nec multā, nec crassā, sed post septimum aut nonum, si validus sit. Per verbū validus, virtutis nihil vrgentis indicationem associans, per sorbitionem nec multam, nec crassā, victum per pocula intelligēs: Et paulo ante: vbi dolor aliquis vexauerit, oxymel bibendum dabis, per dolores intelligens non eos, qui secundū accessiones ægros torquent, sed de iis, qui assidui sunt, & ab inflammationibus ortum habēt, qui morbum multum vrgentem reddunt. 4. Vbi autem virtus non vrgebit, morbus vero maxime vrgebit, huic sola inedia conueniens erit, nam virtus non dissuadet id, quod morbus maxime vrgens indicat, & tandem hæc victus forma erit seruāda, quamdiu virtus, & morbus ita se habuerint, q̄ & Hip. præceptum fuit. 2. de ratione victus, v-

3. Virtus nō
vrgens &
morbū mul-
tum vrgens

4. Virtus nō
vrgens, mor-
bus maxi-
me vrgens.

bi nec inquit cum morbi vigent, feruoremq;
 habent, cibum licet dare. Et alibi. Vbi, inquit,
 pacatus morbus est, & statim extremos labo-
 res habet, extreme tenuissimo victu necessa-
 rium est vti, quo in loco per extremum victū
 Gal. in mediā exponit. Haftenus patet, quid sit **B**
 agendum secundum Hip. circa rationē victus,
 & qui victus conueniat iis, qui maxime, mul-
 tum, mediocriter, parum, & nihil vrgēt, mor-
 bis complicatis cum virtute quæ vrgēs nō sit.
 Sequitur, vt consideremus eas cōplicationes,
 in quibus ipsa quoq; virtus vrgere incipit. Sci-
 endū igitur, quod vbi virtus incipiet vrgere,
 incipiet indicare victum proxime crassio-
 6 eo, quem morbi dispositio indicabit. Igitur. 6.
 vbi virtus parum, morbus parū vrgent, in-
 7 dicabunt ea, quæ comeduntur. 7. vbi virtus
 parum, morbus multum, tenues indicabunt
 8 sorbitiones. 8. vbi virtus parum, morbus ma-
 xime, victus indicabitur per pocula, eadē ra-
 10 tione & via in tertia cōplicatione superius e-
 narrata. 10. vbi virtus multum, morbus parū,
 11 indicabunt quæ comeduntur, si ea coquere la-
 borātis natura poterit. 11. si vero virtus multū,
 & morbus similiter vrgent, huiusmodi com-
 plicatio crassam requireret sorbitionem, & hoc,
 quod cum virtus multum vrgat, & morbus
 multum, non solum morbus tenuem victum
 indicet, sed virtutis imbecillitas, tanquam se-
 cunda causa tenuitatis accedat. Atq; hoc est il-
 lud, q̄ ait Hipp. 4. de ratione victus. Quibus
 inquit,

inquit, per febres alius liquida est, & mens-
 turbatur, horumque multi floccos vellunt,
 nareſque fodiunt, & parum quidem interro-
 gatis reſpōdent, ſed ex ſe nihil, quod compo-
 ſitum ſit, dicunt, additque: His igitur ita ſe ha-
 bentibus; ſi venter liquidus eſt, fuerit, abſu-
 menſque & contabefaciens, ſorbtiones craſ-
 ſiores frigidioreſq; exhibēdas eſſe: quo in lo-
 co ex ſignis deſcribit morbū, & virtutē multū
 vrgentes, & in tali cōcurſu, ſorbtiones iuuat
 craſſas ait miniſtraſſe. 12. vbi vero virtus mul-
 tum, morbus vero maxime vrgēbunt, quāquā
 plures horum intereant, indicabunt tenues
 ſorbtiones. quod & Hipp. 3. de ratione victus
 iuſſit, cum de colliquantibus febribus ſermo-
 nē facit. Deiectiones, inquit, huiuſmodi ha-
 bent quidem, & alias, quæ graues ſunt, offen-
 ſas, neque enim hypochondriorū exſtinguūt
 ardorem, ſed excitant, inquietationemq; &
 membrorum iactationem faciunt, inteſtina
 etiam ſedemque exulcerant. Quibus verbis
 Hipp. morbum maxime vrgentem depinxit,
 & virtutem multū vrgentē ob maleficas de-
 iectiones. Et addit: Qui ergo in morbis huiuſ-
 modi, relictis ſorbtionibus, muſſa potius al-
 terius vice vtetur, iis multa feliciter cōſeque-
 tur, ſic ei nequaquam præter animi ſententiā
 ſuccedent multa: ſed vtrum intelligat tenues
 an craſſas ſorbtiones, Gal. in hunc modū ex-
 preſſit: in ſolis, inquit Galen. qui liquefaciūt
 morbis, vel in quib. hominum virtus ad mor-

12

*Febres collis-
 quatina quæ
 vultum po-
 ſtulent.*

Ars exhibendi potum a tribus præcipue indicatur.

bi usque indicationem sufficere non possit, ad pristinæ cremorem perueniemus, cremorem autem pristinæ renuem esse sorbitionem, alias ostendimus. Hæc satis de arte exhibendi cibū. Sequitur, ut eodem modo percurramus artē exhibendi potum, in quo exhibendo, etsi indicatio a pluribus desumi potest, veluti virtute, morbo, consuetudine, laborantis natura, & huiusmodi, tria tamen erunt præcipua, a quibus erit sumenda indicatio potus, nimirū, quod alia ad horum aliquod reducantur, veluti est laborantis natura, quæ consuetudini semper cedit, unde interuentu consuetudinis indicat. Quoniam si ægrotans sit frigida naturæ, & aqua potui assuetus, aquam, non autem vinum ministrabimus, sumta a consuetudine indicatione, & non a laborantis natura. rursus, si ægrotans sit calidæ naturæ, cōsue- 42 tus perpetuo potui vini, non exhibebimus aquam, sed vinum, ob id 8. meth. de calidis, & siccis naturis loquens, si quis, inquit, nō assuevit frigida, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina sanæ sanitate prius reddita. Ex quo patet consuetudinem, eā obscurare, quæ sumitur a natura laborantis, indicationem. Quo fit, ut tria præcipua sint indicantia potus ægrotum, virtus, morbus, consuetudo: sed ut ars amplior fiat, addamus & quartum, quæ singula ita per ordinē disponentur, virtus, morbus, consuetudo, natura laborantis. Sequitur, postquam inuenimus, quæ sint indicantia potum,

tum, vt ostendamus, quid eorum singulū indicet solitarie, & seiunctim separatū alterū ab altero, deinde quid indicent simul complicata. Porro virtus imbecillis ob imbecillitatē *Quem potū indicet virtus ob imbecillitatē vrgens.* vrgens, indicabit potum roborantē, quo possit roborari, & tale vinum est illud, quod omnium maxime corporis vires naturales, & vitales roborat: Morbus vero potum indicabit *Morbus.* curantem: curans autē potus ille est, qui morbo, aut eius causæ qualitate sit cōtrarius, qualis est acutis & vehementibus febribus aqua: quanquam vinum etiam in aliquibus morbis sit potus curans. vt 3. de ratione victus, & lib. metho. Consuetudo vero eum indicat potū, *Cōsuetudo.* cui æger est assuetus, vnde potum consuetum appellabimus, quem consuetudo indicat. Natura laborantis, seu temperies oppositam sui *Temperies.* exhibebit indicationem, vt 6. de mor. vulg. seu Hippoc. seu Thessalus eius filius fuerit, calidis naturis refrigerationem, aquæ potionem, tum quietē consulens: ex quo loco colligitur quod qui calida, & sicca sunt temperie (modo virtus non contra indicet) sed cum virium robore sit illa temperies, a sola calida, & sicca temperie indicari aquam vino esse commodiorē. Quoniam vero morbus, & virtus præcipue (quanquam etiam consuetudo) non vniiformiter sed quadrupliciter se habent, veluti virtus non vrgens, virtus parū vrgens, virtus multum vrgens, & virtus maxime vrgens: ita & morbus quadrupliciter medicis seipsum ostē-

*Consuetudo
maxima &
vini.*

dere solet, non vrgens, parum, multum, & maxime vrgens: consuetudo quinetiam duplex esse solet, maxima, & minor: maxima illa est, quando quis vni duntaxat, & non alii insuevit potui, vt si quis vino assuevit, sed citra aliud incommodum, si aliquando vtitur aqua, illa vtitur: totidem modis dicitur suum oppositum inlietum: si igitur virtus, morbus, & cōsuetudo vno modo duntaxat se habuissent, vnum etiam duntaxat potus genus arti medicæ suffecisset. At quoniā pluribus modis quotidie sese offerunt, necessarium fuit etiam arti medicæ, tot quæ sufficerent genera potuum reperire, vnde ratione virtutis, quæ quadrupliciter nobis sese ostendere solet, potus roborans quadrupliciter diuidetur in hunc modum, potus roborans vehementissimus, qui vinosus potus Hippocra. dicitur, quod est potentissimus: aquosissimus, & est ille, qui non manifesta calefactione, tenuitate, colore, & odoris carentia, aquæ similis existit: inter hæc duo extrema assignabimus tria media: alterum quod a vehementissimo minus, ab aquosissimo magis recedat, alterum e contra, quod ab aquosissimo minus, a vehementissimo magis recedat, & vnū mediū, quod non magis ad vnum, quam ad aliud accedat: primamque speciem horum potuū magis accedentem ad vinū, in quo vinum in mixture manifeste aquā euincat, consequenter quali-

Potus roborans. 1. vehementissimus. 2. aquosissimus.

qualitas vini, qualitates aquæ obscuret, vino-
 sius appellabimus: Alterā vero magis accedē-
 tē ad aquam, in quo aqua vinū superet, & im-
 becilliter calefaciat aquosius dicemus. Tertiā
 vero speciem mediorum vim vtriusq; extremi
 B æqualiter retinentem, vbi neutrum sensibili-
 ter euincit, nullumq; in ea vehementiæ vesti-
 gium appareat, nec imbecillitatis, neutrum ap-
 pellabimus. Notandum autem, quod etsi hu-
 iusmodi vinorū differentia, & species in sim-
 plici vinorū natura reperiri possint: & hoc se-
 cundum naturam vuarum, quarū aliqua effici-
 unt vinum vehementissimū, alia imbecilli-
 mum, alia medium, posset tamen etiam a no-
 bis fieri ex varia commixtione vini cum aqua.
 vt 3. de ratione victus in acu. ex Gal. desumi po-
 test: sed hæc de potu roborāte, & eius diuisione
 elicita ex vario modo ipsius virtutis. Ad eū-
 dē modum cū morbus quadrupliciter nobis
 sese offerat, diuidendus erit etiam potus curās
 morbum respiciēs, qui sane cum ratione qua-
 litatum sui indicationem exhibeat, & ratione
 qualitarum nunc se ostendat parum calidus,
 multum, & maxime calidus, & potus curans
 morbum calidum cum sit ipsa aqua, diuiden-
 dus erit pot⁹ aquosus in simpliciter aquosum,
 magis, & maxime aquosum, & eodem modo,
 quo diuiditur penes qualitates primas, penes
 alias qualitates etiā erit diuidēdus pot⁹ curās,
 secundum variū, & multiplicem modū ipso-
 rum morborum. Quoniā vero hæc quatuor

*Vinosior.**Aquosior.**Neuter.**Aquosi po-
tus differē-
tia.*

*Aquosum ro-
borans.*

*Complica-
tiones mor-
bi cum vir-
tute.*

indicantia, virtus, morbus, consuetudo, & natura laborantis, ita multipliciter distincta non solitarie duntaxat, sed simul implicita, & associata frequentius medicis sese offerunt, orta etiã fuit varia, & multiplex differentia in ipso potu, qui sane cum & virtutem, & morbum simul habeat respicere, & aquosum roborantem eum appellabimus, qui erit potus mixtus ex roborante, & curante, qui sane cum multiplicem differentiam capiat, a multiplici, & varia complicatione virtutis, morbi, consuetudinis, & naturæ laborantis, sequitur utiq; ut percurramus pri^o quotupliciter hæc quatuor simul complicari possint, ut singulæ complicationi determinatum etiam potus modum assignemus; ita vni complicationi convenientem, ut non aliis recte convenire possit. Quoniam vero ut supradiximus, natura laborantis interuentu consuetudinis indicare solet, quapropter de complicationibus horum trium principaliter agemus, virtute scilicet, morbo, & consuetudine, quanquam etiã de quibusdam complicationibus agemus, vbi ingredietur natura laborantis. Igitur in hunc modum procedemus, & quotupliciter simul complicari poterunt hæc quatuor, trademus: incipiamus autem percurrere, & reperire singulas complicationes, postea enim ostendemus quid indicent singulæ complicationes, incipientes a complicationibus morbi cum virtute. i. igitur aut neutrum vrgebit nec morbus, nec virtus,

tus. 2. aut vterq; multum vrgebunt. 3. aut morbus multum, virtus parū vrgebit. 4. aut morbus parum, virtus multum. 5. aut morbus multum, virtus nihil. 6. aut virtus maxime vrgebit. Sequitur complicatio ex morbo, & cōsuetudine, in quibus sane. 1. aut morbus, & consuetudo consentient. 2. aut morbus, & consuetudo dissentient: ita quod morbus maxime vrgebit cum consuetudine perfecta. 3. aut morbus imbecillis, cōsuetudo maxima. 4. aut morbus multum, consuetudo maxima. Sequitur complicatio virtutis cum consuetudine. 1. aut igitur virtus erit valens cum consuetudine cōsentiente. 2. aut virtus erit imbecillis cum cōsuetudine dissentiente. Sequitur complicatio virtutis cum natura laborātis. 1. aut virtus fortis cum natura laborantis. 2. aut virtus imbecillis cum natura laborantis nulli consuetudini astricta. Sequitur complicatio ex tribus simul, ex morbo scilicet, virtute, & consuetudine, in qua sane. 1. aut morbus multum, virtus multum, consuetudo multum: 2. aut morbus multum, virtus multum, consuetudo contraria, vt si sit aquæ assuetus 3. aut morbus, virtus, consuetudo dissentient omnes, ita vt virtus, multum, morbus multum, consuetudo erit potus ceruise. Sequitur complicatio ex singulis quatuor, morbo, scilicet virtute, consuetudine, & natura laborantis, in qua 1. aut virtus erit constans, morbus nihil vrgebit. 1. corpus sanum erit, consuetudo, natura laborantis.

Complicationes morbi & consuetudinis.

Complicationes virtutis cum consuetudine.
Cōplicatio virtutis cū natura.

Complicationes morbi, virtutis & consuetudinis.

Complicationes ex singulis quatuor.

*Indicatio-
nes.*

*1.
singularum.
complicatio-
num.*

2.

Hactenus percurrimus principales cōpli-
cationes. Sequitur vt percurramus quid indi-
cēt singulæ complicationes, incipientes a cō-
plicationib. morbi cū virtute. 1. Igitur si neu-
trū vrgebit, indicabitur esse exhibendum po-
tum illum, quo mediante virtus maxime ser-
uari possit, huncque, quandiu virtus & morb.
similiter se habuerint, nō mutabimus: & cum
duorum alterum variauerit, pro ratione mu-
tationis potum ministrabimus, q̄ iuxta mu-
tationem indicationum, victus etiam forma
sit immutāda, & ipsius potus. Neq; enim cre-
dibile est, medicum posse conicere victum &
potum, qui ægrotanti per totum morbi de-
cursum conueniat. 2. Sin autem vter-
que multum vrgebunt, tunc id quod est a-
quoso vinosius erit exhibendum, quod imbe-
cille appellauimus. Sic Hipp. vinosiores potus
iis administrare iubet, quorū virtutes multum
ob imbecillitatem vrgeant, signum quod sic
se habeant, est fluxus vētris contabefaciēs, ab-
sumenisque. Quia si multum vterq; vrgeat, &
virtus & morbus, dissentiantq; in indicatione
potus, præualebit a virtute indicatio: non ta-
men neglecta quæ a morbo sumitur, sic Hip.
4. de ratione victus: quibus inquit per febres
alius liquida est, & mens turbatur, horumq;
multi floccos vellunt, naresq; fodiunt, & parū
quidem interrogatis respondent, sed ex se ni-
hil, q̄ cōpositum est, dicūt, talia iis melanco-
lica esse arbitror. His igitur ita habentibus, si
venter

venter liquidus fuerit, absumensq; , & contra- *Alus per*
 befaciens, sorbitiones frigidiores, crassiores *feb es li-*
 que exhibendas esse puto, potusq; qui sistant, *quida.*
 vinosioresque, vel etiam astringentiores, qui-
 bus verbis descripsit & virtutem, & morbum
 multum vrgentia, ex iis quæ diximus, vinum-
 que non obstante delirio concessit in prædi-
 cta complicatione, causa virtutis multum vr-
 gentis, apposuit qui sistat ob alui liquidæ sym-
 ptoma, vinosioresque ob imbecillitatis ratio-
 nem. Sed aduertendum, quod nō vinosum iis
 concedit vinum, qui huiusmodi delirio labo-
 rant, sed aquoso vinosius. Postremo enim de
 aquoso vino sermonē fecerat, cum dixit in 3.
 cæterum vino albo tenui, paucifero, & inodo-
 ro. Cum ergo vinosiores potus scribit, ad a- *In delirio*
 quosum conferre, illum opinandum est: & eo *quale vinū*
 maxime, quod aquosum vinum in simili deli- *concedat*
 rio concesserat lib. 3. in expositione illius, (cū *Hippoc.*
 verò in huiusmodi morbis) imbecille igitur
 vinum, quod aquosum proxime subsequitur
 ad vinosum versus ipsum intellexisse arbitror.
 Sed quod idē rubrum esse oporteat, inde ma- *Vina rubra*
 nifestū est, quod in huiusmodi vinorū natura
 astrictio reperitur, ex quib. locis licet collige-
 re quantum sit aduersantibus indicationibus
 a prævalente detrahendum. 3. Sin autē morb. *3.*
 multum, virtus parū vrgeat, aquosum vinum
 erit ministrādū. Qua ratione picrocholis acu- *Picrocholis*
 ta febre laborantibus aquosum vinum propi-
 nabimus, ob id quod horum corporum sub-

stantia facile a leui occasione effluat, ob raritatem pororum, & succorum tenuitatem, & calidam eorum naturam. Vnde Gal. 8. meth. vinum inquit ipse conscius es, omnibus me huiusmodi naturis cōcedere, sed quod aquo-
 sum tum aspectu, tum viribus sit, id enim ad omnia vtilius est quam aqua, vt pote quod & concoctionē iuuat, & vrinas, & sudores pro-
 uocet: constat autem Hippocra. non in diariis modo febribus, sed etiam in acutis, ex iis quæ de acut. victu prodit, vinum dare: ex quibus verbis manifestum est, aquosum vinum in acutis concedendum picrocholis esse, ob futura eorum imbecillitatis timorem, quia aquosum vinum in huiusmodi complicatione erit ministrandum, videlicet modicum vini cum multa aquæ permixtione. i. in quo, aqua qualitate, & viribus multum in mitione superet, vinum vero gustatu modice solummodo offeratur. 3. Sin autem morbus parum, virtus multum vrgebit, medium potum exhibebimus, qualis est ille, in quo neutrum sensibilter in mixtione vincat, & erit potus potenter roborans. 4. Sin autem morbus multum, virtus nihil vrgeat, veluti in peracuto morbo, multumque vrgeat, aquam in potum exhibebimus, virtute robusta existente. 5. Sin autem virtus maxime vrgebit, obscurabit indicationem a morbo desumptam. Virtus enim maxime vrgens indicabit eum potum esse exhibendum quo maxime laborantis natura seruari possit,

*Picrocholis
vinum dan-
dum est in
febribus
acutis.*

fit, neglecta omnino indicatione, quæ a morbo sumitur, quod ex Galeno ostendimus, cum de victus forma loqueremur. Sequitur, ut percurramus, quid indicet complicationes, ex morbo, & consuetudine. i. si igitur morbus, & consuetudo consentient, tunc ministrandus erit victus ille, quem indicant, absque alia consuetudine: ut laboranti acuta febre Lusitano cum virium robore, aquæ potui assueto, aquam hordei, quam morbus & consuetudo indicat, ministrabimus: quod si pugna in indicatione fuerit, quod viribus superius est, in indicatione præualebit; nempe morbus, si multum aut quam maxime urgeat: aut consuetudo, si morbus parum, aut nihil urgeat. atque hoc est illud, quod ait Gal. 8. meth. Si quis, inquit, frigida non assuevit, huic per febrem dare illam non inceperim, nisi pristina sanitate prius reddita. 2. Sin autem morbus, & consuetudo dissentient, ita quod morbus maxime urgeat cum consuetudine ad oppositum absoluta, hoc casu magnus & vehemens morbus consuetudinis indicationem obscurabit. Nam laboranti acuta febre vino assueto, eum ministrabimus maxime potum, quem agritudo indicabit, virtute nequaquam dissuadere, ut ex Gal. 9. meth. colligitur, ubi de continentium febrium curatione agit. quo in loco frigide potum post concoctiones exhibet, a consuetudine nullam sumens indicationem. Et ibi hunc in modum scribit, cum ergo coctionis humorum in iis notas videris, de quibus,

Indicationes complicationum morbi & consuetudinis.

Potus aqua frigida quando & quibus febribus concedatur.

Q

abunde in libris de crisi dictum est, audacter frigidam dabis, & addit statim, quod si etiā frigida assuetus ager sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis: ac si velit id, quod eodem in libro scripsit in hæc verba. Siquidem, inquit, cum sæpe iam vidimus non paucos ex iis, qui febribus ardentibus premerentur, cum iam mediocriter concocti humores essent, statim ex frigida potione a febre liberatos, quavis potioni illi parū assueti fuissent; quare multo, arbitror, magis in iis, qui assueverunt, vtilitatē fore citra noxam vllā speramus. Vnde non ob id, q̄ aqua assuetus non sit, ab ea desistendum est, nisi cum aliquod effatu dignū incōmodū naturæ ab eius occurſu timemus. ob id opposui, virtute nequaquā dissuadente. Idē II. meth. colligitur, quo in loco in febribus continuis absolute citra consuetudinis considerationē, vinum prohibet, & frigidam exhibendā cōsultat. Sin autem fuerit morbus imbecillis, & consuetudo maxima, morbo existente imbecilli, & diuersum ab eo, quē consuetudo indicat potum exposcente, quæ a cōsuetudine sumitur præualebit indicatio, vt patet ex Gal. 8. meth. Qui cum vinum vtilius esse quam aquā dixisset ad coctionē, & vrinæ ac sudorum prouocatio ē, statim subiūgit. Ego igitur censeo eius generis naturas, & dum valent, huiusmodi potione, aqua scilicet, magnopere iuari, nec in diaria febre, iis quib. in vsu fuit, eā circūcido. si quis vero nō assueuit, huic p̄ febrim dare non

dare nō inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Quare cum morbus, & consuetudo diuersos potus indicāt, si morbo magnitudo accesserit, morbi indicatio obīcurabit eam, quę a consuetudine sumitur: quod si morbo nulla effatu digna accesserit magnitudo, aut vehementia scito indicationem a consuetudine tunc praualeere. De robore autem virtutis, & morbi magnitudine diximus, agentes de forma victus, quarto. Sin autem morbus multum vrgebit, & consuetudo maxima maxime dissentiet, veluti si adsit homo acuta febre laborans, qui vino sit assuetus, aquaque nunquam fuerit vsus: cum hic morbus aquā indicet, consuetudo fortiter dissuadeat: hoc casu morbus in indicatione, eo quod multum vrgeat, praualebit, consuetudine tamen non neglecta, & tali exhibendū erit vinum aquosum. consuetudini enim aliquid indulgendū esse vult Hippocrates in tali complicatione, & constitutione. Quod autem in tali complicatione non sit concedendum plus consuetudini, ex Hippocrate 3. de ratione victus elicetur, vbi ait; cum vero in huiusmodi morbis fortem capitis grauitatem, vel mentis lēSIONEM suspicatus fueris, a vino penitus est abstinendum, aquamque dare oportet vel vinum aquosum, flauumq; tunc & prorsus nodorum. In quibus verbis depingit morbum multum vrgentem, & in tali morbo iubet a vino penitus esse abstinendum, &

*In acuta febre cum a-
ger vino est
assuetus
datur vinū
aquosum.*

aquam exhibendam. Et addit, vel vinū aquo-
sum, vbi profecto, cum non eadem sit aquæ &
vini aquosi natura, opinandum est, aquam vel
vinum aquosum non vllum ideo dixisse, ac si
vellet citra discrimen vllum, vtrouis æque nos
viri posse. q̄ ex his verbis, quæ statim sequun-
tur, manifestum est, cum ait; Atque ab ipsius
potione, aquæ exiguum superbibendum est,
quod hoc modo vini potētia caput minus tē-
tet. quare cum vinū aquosum sit alterius natu-
ræ quā aqua, ab eisdem indicantibus vtrumq;
indicari non potest: modo cū tria sint illa, quæ
potum indicant, morbus, virtus, & consuetu-
do, & stante eadem morbi constitutione, v-
trumq; cōsuluerit potum, necesse est aut viriū
robur, aut consuetudinem mutationem acce-
pisse. Proinde cū obseruemus in scriptis Hip-
pocratis, Hippocratem solitum esse, vbi indi-
cationē a virtute vult desumere, ea signa sem-
p̄ recēlere: quæ vires laborantis imbecilles ef-
fe ostendant, velut in quarto libro, vbi in si-
mili morbi constitutione imbecillitatis, viri-
um causas opponit dicens. Si venter liquidus
fuerit, absumens, & contabefaciens, in qua
morbi constitutione potus vinosiores ratio-
ne imbecillitatis virtutis administrat, sequitur,
cum hic non ponat signa ostendentia virium
imbecillitatem (quod tamen facere consue-
uit) & iubeat aut vinū aquosum iis esse mini-
strandum, necessario intelligi de iis, qui vino p̄
sanitatem perpetuo sunt vli, minime aqua.

Quare

Quare patet, quod cum consuetudo morbi multum vrgentis indicationi dissentit, cū esse exhibendum potum, in quo minimum sit cōsueti, multum vero curantis. Notandum autem hoc mirum non esse debere, cum Hippocratem tribus in locis vinum in acutis concessisse reperiatur, primum. 1. de ratione victus, ratione morbi, cū ait: mulsam aut vinum, vtrum magis auxiliaturum putaueris, secundū, 4. de ratione victus, quod fecit ratione imbecillitatis virtutis, vbi ait; His habentibus, si venter liquidus fuerit, corpus absumens. Tertiū in 3. de ratione victus, ratione consuetudinis. atque hoc est illud quod ait Gal. 8. meth. Constat autem & Hippocratem nō in diariis modo febribus, verum etiam in acutis, ex iis, quæ de acutorum victu prodit, vinum exhibere. Sequitur complicatio ex virtute, & consuetudine, in qua si virtus erit valens cum cōsuetudine consentiente: tunc, cum virtus sit valida, consentient in indicatione potus consuetudini, & concedendus erit potus ille, quem consuetudo indicabit. Sin autē virtus erit imbecillis cum consuetudine dissentiente, tunc quandoq; dissentiet. vnde ægrotāti frigida affucto, modicum vini, quo eius natura roboretur, concedemus. Sequitur cōplicatio ex virtute & natura laborantis. Si igitur erit virtus fortis, nulla imbecillitate laborans cum natura laborātis: tūc relicta virtute a sola corporis tēperie naturali indicatio pot⁹ erit sumeda, vt

vinū in acutis Hipp. tribus in locis concessit.

Indicationes cōplicationū ex virtute & consuetudine.

Ex virtute & natura laborantis.

vt sentit 6. de mor. vulg. seu Hippocrates, seu
 Theſſalus eius filius, calidis naturis refrigera-
 tionē, aque portionē, tum quietem conſulens.
 Ex quo loco colligitur, iis, qui calida ſunt, &
 ſicca natura cum robore viriū, aqua vti cōmo-
 dius eſſe quā vino. Sin autem virtus fuerit im-
 becillis, cum natura laborantis nulli cōſuetu-
 dini aſtricta. Si natura laborantis fuerit calidi,
 & ſicci tēperamenti, ſalubrius erit aquoſo vi-
 no vti, quā aqua. Nam ratione qua aquoſum
 calidæ naturæ conueniet, vt vini facultatē ha-
 bet, imbecillitati ſubueniet. ob id qui calida e-
 runt & ſicca natura, habitu gracili, tenuiū ſuc-
 corū, q̄ cito eorum corpora in halitum ſoluā-
 tur, & imbecilliores fiant, vino aquoſo p̄ ſani-
 tatē cōmodiſſime vtuntur. quod aſſeruit Gal.
 8. meth. cum ait; vinū conſcius es me omnib.
 huiusmodi naturis cōcedere, ſed q̄ tum aſpe- 46
 ctu, tū viribus ſit aquoſum, id enim ad omnia
 vtilius eſt quam aqua, vtpote quod concocti-
 onem iunet, & vrinas, ac ſudores prouocet.
 quare a virtutis imbecillitate gen⁹ pot⁹, id eſt,
 potus vini indicatur: ſed ſpecies vini determi-
 nata, vtrum ſcilicet aquoſum, an imbecille, an
 medium, circumſcribitur a natura laborantis.
 Natura enim corporis habet determinare de-
 terminatā vini ſpeciem; quonia calidū & ſic-
 cum temperamentum imbecille vinum ex-
 poſcet; ii vero, qui frigida erunt natura, craſſo
 habitu, pingui abdomine, tardi, potēs aut vi-
 num: quicunq; atrabilioſi, & medię inter hos
 natura

*Temperies
 determina-
 tam vini
 ſpeciem cir-
 cumſcribit.*

naturæ, medium. Sequitur complicatio ex morbo, virtute, & cōsuetudine. Si igitur morbus multum, virtus multū, consuetudo multum dissentiet a morbo, & consentiet multū virtuti: vt si quis assuetus sit bibere vinum, qui laboret febre acuta, cum virtute ob imbecillitatem multum vrgente, in tali constitutione duo eorum in vnum vini potum consentiant, nempe virtus & consuetudo, morbus vero vtrique dissentiat: quarendus erit potus, qui virtuti, & morbo multum vrgentibus conueniens sit. Tale autem erit illud, quod imbecilliter roborans erit, cuiusmodi est vinum imbecille. Et quoniam aliquid est addendum, ratione indicationis ipsius consuetudinis: sequitur, quod in tali cōstitutione potus aliquātulū fortior imbecilliter roborante conueniens erit, cuiusmodi est vinū, quod imbecillo parū vinosius exsistat. Sin autem morbus multum, virtus multum, & consuetudo multū consentiat cum morbo, & multū dissentiat a virtute; vt si quis sit assuetus aquæ potui, qui febre acuta laboret, cuius virtus multum vrgeat ob imbecillitatem, cum consuetudo, & morbus in vnum consentiant, potus genus adhibendus erit potus, qui morbo, & virtuti multū vrgentibus consentiens sit, & aliquid erit detrahendū ratione ipsius consuetudinis. Vnde cū ratione morbi & virtutis potus cōueniens habeat esse ille, qui imbecilliter roboret; cumq; ratione cōsuetudinis aliquid sit demendū, sequitur: q

Indicationes complicationū ex morbo virtute & consuetudine.

potus, qui conueniet huic complicationi, erit potus, qui aliquantulū sit infirmior potu imbecilliter roborante. Sin autem virtus multū, morbus multum, consuetudo multū vrgeāt, ita quod singula tria simul dissentiant, nec vllum sit eorū, quod simul inter se cōsentiāt: veluti, si quis assuetus sit bibere aliud potus genus a vino, & aqua, sicuti sunt ii, qui cereuisiā bibunt: cū hic adsit pugna inter omnia indicantia, nempe q̄ morbus aquam vt potū curantem exposcat, sub aquæ autem appellatione, eas etiam potiones intelligo, in quibus semina, herbae, aut radices sunt decoctæ, veluti aqua hordei, capillorū veneris, liquiritiæ. Nā etiam, qui aquæ potui assueti sunt, iis potus aquæ hordei insuetus dici non potest, etsi ea vltus fuerit nunquā. Igitur cum morbus aquam & potum curantem exposcat, virtus ob imbecillitatem vinū roborans, cōsuetudo nullū illorum admittat, sed cereuisiā ob assuetudinē petat, in hac cōplicatione, & omniū concursu simul dissidentium, aut simul erunt miscendi singuli tres hi potus pro ratione indicantium, aut vini modicum seorsum semel aut bis, aut quoties expediet, ad roborandā naturam, erit exhibendū, deinde mixtū ex cereuisiā, & aqua, secundū simmetriam, & morbo, & cōsuetudini correspondētē, potum exhibētes. cōsuetudinis n. etiam est habenda ratio semper, q̄ vt ait Gal. repentina a cōsuetudine digressio corpora nō parū offendat. Sequit̄ cōplicatio,
ex omnibus

Ex omnib. quatuor simul: vt si virtus fortis sit, itaq; nihil vrgeat, morbus etiam nihil vrgeat, id est, si sit corpus sanum, consuetudo, natura laborantis: tunc habenda erit ratio de consuetudine, & proprio corporis temperamento, & in horum duorum consideratione perpendendum erit, vtrum proprium corporis temperamentum indicet eundem potum quē cōsuetudo, an alium: & si indicabunt eundē potum vtraque, citra dubiū exhibendus erit potus ille, quem simul consuetudo, & temperamentum indicarunt: quod si alium & diuersum indicabunt, cum pugna fiat inter duo indicantia, hoc casu faciendum erit, vt hanc litē dirimat ætas: vt in homine citra annum quadragesimum quintum temperamento consentiemus; si vltra, cōsuetudini: & hoc, quod cum omnis mutatio magno viriū robore indigeat, cumque magnum virium robur vltra quadragesimum quintum annum raro repariatur, & in omni mutatione duo adsint labores; nempe rei consuetæ demissio, & ad insuetam transmissio: quare senes consuetis potius erunt fouendi: qui autem senes non erunt, cōperamentum eorum erit inspiciendum. Quoniam vero ad absolutam artem præscribendi victum non solum ea quatuor; (quanquam ea principaliter) nempe virtus, morbus, consuetudo, & natura laborantis, sed etiam alia consulenda sunt, veluti ætas, tempus anni, regio, & huiusmodi: sequitur, vt omnia simul com-

*Indicationes compli-
cationū ex
morbo vir-
tute cōsue-
tudinē &
natura la-
borantis si-
mul.*

*Mutationes
sunt periculosa.*

*Complica-
tio comme-
moratorum
cum ætate
tempore an-
ni & regio-
ne.*

plicata percurramus, & videamus quomodo omnibus consentientibus vna prorsus victus species constituatur. dissidentibus vero inter se, quæ valentiores ac plures sint præferamus, ita vt victus species, quam hæ præscribāt, præferatur; sic tamen, vt ne contraria sit neglecta: quod sane facile pceperimus, exemplo a Gal. 8. meth. in fine proposito. Pone, inquit, Gal. correptos febri esse duos homines, in regione natos, educatosq; temperata, nunc in ea non esse, imo alterum in calida, & sicca, alterum in humida, & frigida. præterea, eosdem diuersos esse tum temperamento, tum statura, tum cōsuetudine, tum ætate, etiam sub diuerso (si placeat) & anni tempore, & statu cœli ægrotare, sic vt alter calidus, siccusque natura sit, ac tali victus rationi in totum insueuerit: præterea, iuuenis sit, & hyeme ægrotet, idque in humida, & frigida regione, ac statu cœli simili: alter humidus, & frigidus, simili victu assuetus, tum puer ætate, ac æstate, in calida, siccaq; regione, ac simili cœli statu laboret: quænam igitur in vtroq; horum sunt indicationes? nempe quæ a febricitando sumitur communis amborum est, ac quæ refrigerent, & humectent, desiderans: reliquorum nulla est, præterea cōmunis: siquidem priori, & propter naturam, & propter ætatem, quæ simili sibi victu fuere assuetæ, siccioris calidiorisq; temperamenti cibus idoneus est, idemq; propter & anni tempus, & statum cœli, & regionē conuenit. Nō enim quæ

quæ ab his suppeditatur indicatio, similia de-
siderat, sed contraria alteri ex propositis pro-
pter ætatem, & naturam, & consuetudinē, &
similia ipsis exhibenda indicantur: propter æ-
tatem quidem humida, modiceq; calida: pro-
pter naturam, & consuetudinem, humida &
frigida: propter regionem, & anni tempus, &
statum cœli contraria; quæ & ipsa nimirū sunt
tanto tēperatis frigidiora, & humidiora, quā-
to regiones ipsæ sunt calidiores temperatis, &
sicciores: a cōsuetudine enim semper indica-
tio est similium, quoad scilicet ægrotant ho-
mines. At ab ætate, natura, regione, anni tem-
pore, & statu cœli, ubi temperata hæc sunt, si-
miliū præsidiōrū est indicatio, siue valeāt ho-
mines, siue ægrotent. Cōtra ab intemperatis,
anni tempore, statu cœli, & regione, contra-
riorum est indicatio. Caterum ab ætate, & na-
tura non absolute; sed cum cōsuetudine? Por-
ro nihil in contrariis indicationibus tam con-
uenit expendi, quam magnitudinē eorū, quæ
ad indicationem coierunt: quam utique in li-
bris de sanit. tuen. duplicem esse ostendimus,
alteram, quæ ex ipsorum, quæ indicantur, dig-
nitatibus censeatur; alteram, quæ ex ipsorū (ut
sic dicamus) propriis substantiis spectetur, quas
ex cōferendo cū mediocri, & q̄ secundū natu-
rā est, accipiendas esse testati sumus. Nisi enim
ita quis indicationū potestates examinet, ne-
queat sane mēsuram victus inuenire. Cum e-
nim refrigerādū, humectandūq; esse febris

*Magnitudo
eorum quæ
ad indica-
tionem coi-
erunt, du-
plex est.*

perpetuo indicet, reliquorum vero quodque pro vt dictum est, vbi concors eorum indicatio est, nullum exhibetur negotiū: vbi discors, pro pluribus, ac potioribus formari victus ratio debebit: si quidem in modo propositis, ex eo quod febricitant, communis refrigerantium, & humectantium indicatio præstatur, non tamen ex cæteris, sed cuius tum ætas, tum temperamentum vna cum cōsuetudine, tum regio, tum anni tempus, & cœli status humectantia, refrigerantiaque exhibenda indicant. Hunc sane haud dubium est non solū humectandum, refrigerandumque esse, sed etiā nec leuiter hæc, nec vtrunque facienda esse, imo plane magnopere, ac vehementer, omnibus scilicet indicationibus idem dictantib. Cuius vero reliqua omnia refrigerantem, humectantemque victum, quemadmodum febris non indicant, sed contrarium ipsi, calfacientē scilicet & siccantem, vtiq; ambiguitas, pugnaq; indicationū inter se oritur: quo casu magnopere opus est tum numerū indicationū, tum magnitudinem simul conferas: quippe quæ a febris sumitur, ea reliquis, quādo omnes contrarium faciendum præscribunt, numero quidem inferior est, magnitudine tamen quæ ex dignitate, aut potestate, aut quomodocunque appellasse libet, spectatur, vtiq; superior est; potissimum si longe a natura recessit; quippe duplex tum magnitudo illi accedit, & quæ ex febris genere prouenit, quæ omnibus est cōmunis

In contrariis indicationibus & numerus & magnitudo indicationum simul conferenda est.

46

munis, & quæ propria suaque ipsius est: siquidem & quia febris plus cæteris omnibus sollicitos nos habet: & quia præterquam quod febris etiã magnitudo notabilis illi accessit: idcirco contrarias indicationes inducit, atq; obumbrat. Sin parua fuerit, fas est reliquas omnes vna coniunctas cum ea conferri, atq; expendi: ac siquidem pares videãtur, neq; febris indicatio præferetur, sic vt humectandum, & refrigerandum sit, neque etiam reliquorum, sic vt calfaciendum, & siccandum sit, imo media victus ratio, vbi ita se corpus habet, eligenda erit: Sin altera indicatio superet, tãtum recessisse a temperato, & medio victu par est, quantum ea quæ pollent sua cõtraria superãt. Ergo tum exercitatũ in his omnibus, tum natura prudentem esse medicũ conueniet, quo cuiusque indicationis considerata potestate, omnibusque inter se collatis, vnã idonei victus summã, quæ laboranti sit commoda, cõparet. Hæc Gal. vbi victum omnium intemperiei generum idoneum, quomodo methodo possim⁹ inuenire docet ex indicationib. sumtis a morbo, temperamento, natura, consuetudine, ætate, anni tempore, statu cœli: & quomodo ex comparatione omnium simul vel similium, vel cõtrariorum, in quibus, altera alteri detrahit, & ex recte perpenſis indicationum potestatibus viuendi ratio idonea inueniatur. Sed hæc de arte & ratione alēdi ægros. Quoniam vero corporis, excrementa & hu-

*Sola dieta
inedia
non possunt
omnes hu-
morum vi-
tia emen-
dari.*

mores eousque a naturali constitutione per-
sape recedunt, vt neque victu, neque altera-
tione sola emendari, neque natura, calorisq;
beneficio in pristinam bonitatem reduci pos-
sint, nisi auferantur: eici autem e corpore, &
vacuari cū possit humor vitiosus qui in venis
consistit, at non syncerus, sed utilis sanguini
permixtus, vel solus utili relicto, ex quib. alter
phlebotomia, alter vero pharmacia euacua-
tur: sequitur igitur vt hæc alia duo infra scripta
percurramus, quibus materia, quæ victus ra-
tione pristinæ suæ bonitati restitui nō possunt,
euacuantur: cum temere putent aliqui viuen-
di ratione sola atque inedia posse vnde quaque
humorum vitia emendari. quod & Gal. de in-
edia loquens lib. de venæ sectione contra Era-
sistratum sensit. Quorum inquit Erasistratus,
nihil animaduertens, cæcorum more, qui am-
plā, compendiosamq; & planam viam in pro-
pinquo habentes, sæpenumero angustā, ac as-
perā, prolixamq; errabundi ineunt, & ipse tā
propinquā, satisque expeditam, & amcenā se-
mitam spernens, ad impeditā illā, ac longā se
contulit: quippe qui hoc tantum cōsiderauit,
num quo ipse tendit via, eo vergat, non autem
an cōpendiosē, & sine periculo ducat. Nam q;
vel inedia ad plenitudinis euacuationem con-
ferat, ego quoq; consentio, verum lōgo tem-
pore, magnoq; cū nocumento eam efficere id
dico. Quare sequitur vt artem euacuandi per-
curramus, incipientes ab eo genere vacuādi,
quo

quo non solum humor vitiosus, sed etiā utilis humori permixtus euacuatur, quod sanguinis missione fieri solet. Tametsi enim venam secare perdifficile quidā existimauerint, vt ait Gal. initio lib. de sectione venarū: ridicula tamē, ait Gal. sunt, quæ Apemantes Stratoque protulerunt, vterque enim perdifficile esse venā secare, vel ob internotionem valis, vel ob arteriæ incisionem, nocumentum quippe ilico ingens imminere, si quando loco venæ arteria diuidatur: his addit, quod quandoque aliquis præ timore mortuus sit: & alter etiam ante valis sectionem, alter vero eo iā secto referri nūquam potuerit: tum quod quidā irreparabili sanguinis fluxu defecerit. sed prætereo illa quoque quæ a reliquis dicuntur. nam alii quidē eorum asserunt euacuationis mensuram coniectura assequi multo esse difficilimum, ideoq; necesse esse, vt aut diminute euacuant nihil plus contingat, aut mediocritatem excedenti maxima impendeat noxa. quid enim vt illi aiunt, venæ sectio modum exsuperans a cæde differt: alii vero dicunt, quod cum transfusus spiritū (græce paremptosis) ex arteriis in venas fiat, necessario inanitionē sanguinis per osculorum resectionem ipse spiritus sequatur. Sunt & alii qui affirmant venarū euacuationē inflammationis affectu in arteriis iā constituto plane superuacaneam esse. Atqui vniuersa talia quanquam credibilia alicui videantur, sunt tamen reuera falsa, indignaq; quib. fides

Phlebotomia.

*Vena sectionem quā veterum & quibus rationibus improba-
rint.*

adhiberi debeat, tum quod plurimi sectionis
vsum probauerunt. Missa inquit Gal. faciamus
nunc Hippocratis monumenta, alio enim tē-
pore totam illius de euacuatione artē decla-
rare constituimus: quin potius transferamus
nos ad illos, quorum aliqui empiricam, ratio-
nalemq; sectā vna sunt amplexi: quandoquidē
ex iis a venæ sectione inuenio abstinere nemi-
nem. Nam iterum dogmaticos, Dioclem, ac
Plistonicum, Dieuchemque, ac Praxagoram
vna cum Philotimo, atque Herophilo, & A-
sclepiade venæ sectione vfos fuisse compertū
habeo: quanquam Asclepiades contentionis
adeo studiosus fuit, vt omnia ferme priora do-
gmata laceffiuerit, neque alicui prioris seculi
homini, imo ne Hippocrati quidem peper-
cerit, hucq; adeo veterum medēdi rationem
mortis meditationem nominare non sit veri-
tus. Atque neque hic eo impudentiē venerat,
vt venæ sectionem e medicinalium auxiliorū
numero explodere auderet, quin etiam neq;
inter recentiores, aut vetustiores aliquis, non
Athenæus, non Archigenes, neq; Agathinus:
tum denique neq; ex empiricorū cœtu quis-
quam. Hi enim cum nihil eorum obseruent,
quæ rationi consentanea sunt, omniaque ex-
perientia sola decernant: tamen ex his nemi-
nem proferre mihi poteris. Quando autem
isti in omnibus aliis rebus fere dissentientes,
in hac sola conueniant, mihi plane concordia
suspicionē vacanti nihil magis fide dignum
esse

esse videtur. Sed ne prætestium multitudine opera naturæ obscuriora reddamus, mittamus hos si libet. Nonne vides plures rationes in Galeno hoc probantes? Firmato iam vsu istius instituti, sequitur, vt percurramus quib. in casibus liceat vti hoc instituto. Ait Gale. 9. meth. Quoniam venæ sectio sanguinis vacuandi causa adhibetur; sanguis autem naturæ inutilis est, vtiq; probe hanc administrare conueniet, sic vt quod inutile naturæ sit, emittat. Fit autem sanguis naturæ inutilis bifariam, vel cum propriam qualitatem ad vnguem nō seruat, nec amplius nutrire sicut prius cum utilis esset, potest: vel ita multitudine creuit, vt aut vires premat, aut tum venas, tum arterias, vel distendat, vel findat, vel obstruat: ac in iis quidem missio sanguinis utilis est, ceu vacantiū præsidiorum vna: in aliis ceu quod vehementiorem impetum ad diuersam partē reuocet, vel per propinqua deriuat, postulat autē semper valentes vires, quæ modo vacationis eius respondeant. Ad hæc igitur respicientes sanguinem detrahimus, alias semel, alias bis, vel ter, vel sæpius, initio autem libri de curâdi ratione per sanguinis missionem ponit, quæ veniant consideranda speculâti de sanguinis missione. Qui, inquit, de sanguinis missione speculatur, vnū sibi proponât oportet, nempe, vt quæ corporis affectiones euacuatione indigeant, considerent: ac deinde alterū, quæ nā ea, quæ fit sanguinis detractio, nam multi sunt

sanguis bifariam fit natura inutilis.

Scopi mittendi sanguinem.

affectus, qui alia quapiam euacuatione quidē indigeant, sed non missione. Tertio post hæc diiudicent, qui innoxie hanc ferre euacuationem possint, quippe cum sæpe fiat, vt affectio venæ sectionem desideret, cæterum laborans eam ferre nequeat, siue propter ætatē, siue propter anni tempus, siue propter regionis naturam, siue ob os ventriculi vitiatum, quod per sæpe per abusum stomachū appellitant. sed & sunt, qui tamen vel maxime, quod ad morbum pertineat, sectione venæ indigeant, ob totius tamen corporis habitū ferre nequeant. Atq; eodem in libro ponēs, quid indicet sanguinis missionem, & quod non a sola plethoria indicetur, sed a passionis, quæ sit suspitione: ait enim; sanguinis mittēdi scopos plenitudinē primum non comprehendere, sed passionis quæ sit suspitionē nam, inquit, si eā magnā fore apparet, omnino sanguinem mittemus: etiam si nulla existat plenitudinis nota, tātum inspecta ætate, viribus, & regione, quæ sola in propositis de ratione victus recenseri conspiciuntur: vigentē enim propter pueros & senes indistinctionem assumpsit. Etenim primi principesq; mittendi sanguinis scopi sunt, morbi magnitudo, & laborantis robur. Et paulo post magis explanans, quid intelligendū sit per passionis suspitionem ait: Quippe, inquit, non solum vbi iā adsit morbus grauis sanguinis detrahendi tempus est, sed vbi futurū verisimile est. Et paulo post. Itaq; inquit tria sunt, quæ agnitio-

nitionē continent, morbi magnitudo aut præ-
 sens aut imminens, ætas florens, & virium ro-
 bur. Quinimmo addit, plethoricam plenu-
 dinem non esse numerandā inter scopos mit-
 tendi sanguinē, sed indicare vacuationis quā-
 titatem. Definitis itaque, inquit, tribus mittē-
 di sanguinis scopis, nempe morbi magnitudi-
 dine aut præsentē aut imminente, aut incipi-
 ente; ætate florente; virium robore. Vacuatio-
 nis vero quantitas non ex istis modo, sed ex al-
 liisprehenditur, ea sunt plethorica vocata
 syndrome; aeris nos ambientis temperies, in-
 tempus & locum diuisa, ea; quæ in antea acta
 acciderunt vita, circa comestorū tū quantitātē
 tū qualitatem, excretionesq; ac motiones, aut
 factas aut non factas. Quē autē affectum curet
 sanguinis missio 13. meth. ponit, vbi ait: Ergo
 plethora tū sanguinis missione curatur, tū fre-
 quenti balneo, tū exercitatione, tū frictione:
 præterea digerentib. medicamentis, & præter
 hæc omnia, inedia, succorū vitiosorū purgati-
 one, quæ cuiq; superanti succo sit accommodata,
 corrigitur. q. 2. de elemētis secundū Hip. initio
 magis expressit, vbi ponit, quib. noxia sit venæ
 sectio. Ait enim contra Asclepiadē: Ita, inquit,
 se res habet: nam si tentaueris bilioso homini
 dare medicinam, quæ apta sit purgare pituitā,
 non sine magna (vt certu habeo) noxa dogma
 experietur, q. si medicinæ purgantes sola ra-
 tione euacuationis iuuāt, cur nō secam⁹ venas
 omnīū hominum? siue sint tenues, siue crassi,

*Plethora
 non est nu-
 meranda
 inter scopos
 missionis
 sanguinis.*

*Vacuatio-
 nis per phle-
 botomiam
 quantitātē
 qua indicet.*

*Plethora
 curatio.*

siue morbo regio, siue attrabile laborant, sed horum quidem plurimis, qui sufficienter sunt extenuati, non parum profuit noxii humoris euacuatio. si quis vero his sanguinem auferre tentasset statim occidisset. Atq; hoc est illud, qd et si ex ii. meth. saluberrimum sit in febribus venam incidere, non continuis modo, verum etiam aliis omnibus, quas putrescens humor concitat, vbi præsertim nec ætas, nec vires prohibent: in febrientibus tamen cum cruditate & stomachi offensa, ex 12. meth. sanguis nō est mittendus, qd nulli talium sanguis mitti sine maximo dispēdio soleat. Sed hæctenus de genere affectus, a quo debet sumi indicatio mittendi sanguinem. sequitur vt percurramus ea, quæ quantitatem mittendi sanguinis perscribere debent. Sciendū igitur, qd in hoc remedii genere, quod sanguinis missio dicitur, hoc præcæteris vtile habemus, qd nec impossibilitatē, nec difficultatem vllam habemus in æstimanda eius quantitate. Nam lib. de curandi ratione per sanguinis missionem; Nihil, inquit, æque artem medicā in agendo coniecturalem efficit, vt cuiusque remedii quantitas. Etenim cum frequēter compertum habeamus, tempus instare exhibendi aut cibi aut potus, eiusque aut calidi aut frigidi, quantū tamen dandū sit, certo haud nouimus. idē vsu venit in purgātibus medicamentis. nam qd laboranti præbendum sit medicamen aut bilem tum flauā tū atrā aut pituitam, aut serosum excrementū euacuans,

In febricitantibus cum cruditate, sanguis non est mittendus.

Ars medica coniecturalis est.

euacuans, exacte nouimus: ceterum quātum præberi debeat nescimus. Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit. nam quod semel in ventrem deuoratum est medicamentū, quominus omne deuoratum sit, fieri non potest: neque possibile est, vbi plus quam conueniat iā purgetur homo, partem oblatis auferre. At in sanguinis missione summum id bonum est, euacuationē, dum voles, posse sistere, ac rursus quo videatur tempore, fluere sinere, quoadusque recte habere appareat. huius autē sanguinis mittendi quantitatē ex auctione scoporum mittendi sanguinis augeri, lib. de curandi ratione per sanguinis missionem hunc in modum declarat. Primum, inquit, omnium scire *Sanguinis mittendi quantitas.* conuenit, dum propositi scopi huius præsidii augentur, maiorem indicari euacuationē: dum vero exsoluuntur, tantum detrahendū de sanguinis missione, quāto illi minores euaserint. Morbi itaq; magnitudo cum virium robore primi erant mittendi sanguinis scopi: ille quidē quæ facienda sunt indicans, hic tanquā illū haud prohibens, id quod contra indicare iuniorū medicorum quidam appellant: deinde considerandū, quæ naturalis sit hominis temperies. Nam quibus amplæ sunt venæ, quiq; modice graciles sunt, nec cādidi, neq; tenera carne præditi copiosius euacuabis: cōtrarios autem parcius, quippe qui exiguum habeāt sanguinis, carnemq; facile transpirabilem. Hac ratione nec pueris venā tūdes vsq; ad 14. ætatis

annum, post quē si multus congestus sanguis
 appareat, tempusq; anni vernū fuerit, regioq;
 natura tēperata, & pueri natura bene sangui-
 nea, sanguinem minues, multoq; magis, si aut
 peripneumoniæ, aut angine, aut pleuritidis,
 aut alterius acuti grauisque morbi periculum
 incumbat. Quoniam vero in arte curandi di-
 ximus, remedium aut semel vnica vice, quan-
 tum est exhiberi, aut pluribus vicibus partiri:
 Sequitur, vt percurramus quando sanguinis
 missio nō semel sit facienda, sed partienda: &
 quando subito ac semel facienda: & si semel,
 quando vsq; ad animi deliquiū, & quæ in mit-
 tenda quantitate vniuersa semel vsque ad ani-
 mi deliquium sint obseruāda. Ait enim eodē
 libr. de curandi ratione per sanguinis missio-
 nem: vbi, inquit multa euacuatione est opus,
 verum vires in his sunt imbecilles, in his eua-
 cuationem partiri expedit, vti nimirum & me-
 fecisse vidistis in his, quibus crudorum inerat
 humorum copia. Nam pauculo sanguine de-
 tracto protinus mellicratum exhibeo probe
 coctum cum incidentium medicaminū quo-
 piā, instar hyssopo, origano, ac sic rursus san-
 guinem minuo, vel ipsum eodē nōnunquam
 die, interdū postero, in quo rursus exhibito
 propositorū medicamentorum quopiā, iterū
 de sanguine quid aufero, ac rursus tertio die
 similiter bis. Et paulo post ostendit, quādo se-
 mel, subito, ac simul facienda sit euacuatio, &
 ait; Ceterū vbi feruescētis inest sanguinis ple-
 nitudo

*Sanguinis
 missio quādo
 partiēda sit.*

*Quando se-
 mel & si
 mul.*

nitudo, acutissimam accendens febrē, subito ac semel euacuare expedit, eamq; inanire tentādū vel ad animi deliquium vsq; , virium modo inspecto robore. Et paulo post sequens ait: Nam in quib. tibi sanguinis feruētis copia apparet, quam otiosissime eos vacuare conator, priusquā in principem aliquam partē ingruat. Et sequēs ostendit, quando ad animi vsq; deliquium mittendus sit sanguis, atq; sic itaque affectis agrotis, vt diximus, expedit ad vsq; animi defectum sanguinē educere. vtilem autē inquit, pulsū diminutioni animi aduertere, tangendo eos sanguine etiamnum fluente, sicut in aliis omnib. dum sanguis mittitur, facere cōsueui: ne videlicet nobis nec opinatibus pro animi deliquio mors occupet. quod sane tribus euenisse medicis noui: vt proinde inquit fatius sit a tam copiosa vacuatione abstinere, nisi magna incubat necessitas. Quin addēs, inuamentū partitionis & numeri detractionum, nō solum in euacuatione, sed in reuellendo sanguinis missionē tanto reuellere efficacius tradit, quanto in maiorē numerum aucta fuerint detractiones. ait etenim: Quin & reuulsionē nō leue & ipsam auxilium, quæ saepe secta adhibetur vena. Quanto enim maiorem in numerū particulares auxeris detractiones, tātō efficaciorē effeceris quinimo, ne aliquid deesset præscribendæ terminatæ quantitati sanguinis, terminū. 2. morb. acut. adiecit, præsertim in euacuatione inflammationū sed in-

Quando ad animi vsque deliquium institueda sit.

Partitionis commoda.

Reuulsio per missionem sanguinis.

Missionis sanguinis terminus.

*Sanguis in
phlegmone
qualis sit.*

*TEMPVS
missionis
sanguinis*

quit, quod vacuandi sanguinis terminum coloris mutationem poluerit: deinceps est dissecrēdū. Quidquid ergo sanguis in phlegmone cōtinetur, id caloris abundātia colore permūtatur, reliquū autē in partibus omnibus simile manet. eam ob causam sanguine, qui in totū spargitur corpus, pituitosiore existente, rubicundior sane erit, qui in eo, quod phlegmone obsideretur, latere cōtinetur. Quod si sanguis in totū corpus diffusus rubidus fuerit, is proculdubio qui ad phlegmonē est adustus assatusq; in nigrum permūtabitur, liuidus autem in ea, quę sit a rubido ad nigrum transeunte, mediū obtinet. coloris igitur mutatio sanguinis ex particula inflammata translationem sufficiēter commōstrat, virtutis tamen semper est habenda ratio, si sanguinis tantum vacuare prohibeat. ob id Hippocrates ponens, quando sanguis sit auferendus vsq; ad coloris, seu consistentię mutationem, ait eousque auferēdum esse, donec rubidior multo, vel pro puro liuidus fluxerit, nam vtrumque contingit. Hactenus de quantitate huius remedii. sequitur, vt pręstetiamus tempus applicandi hoc remediū. In febribus igitur obseruanda erit febris declinatio, non autē hora matutina, vt quidam dixerunt. Sanguis enim, inquit Galenus, mittendus est quauis diei noctisque hora modo respicias in febribus particulariū circuitū declinationē. & ibidē ponit, quę obseruanda sit hora in morbis febre carentibus. In quibus,

quibus, inquit, aut ob oculorum lippitudinē, aut aliud simile citra febrem, hoc opus est auxilio, non declinationem omnino, non præsantis febris, sed magnitudinem aut doloris, aut totius affectus, in quo secta opus est vena, inspicere conuenit. Cum autem nihil huiusmodi aut vrgeat, aut prohibeat, præstat mane venam incidere, haud protinus ex somno excitis, verum circiter horam vnam iam antea vigilantibus. Et sequens addit, quando venæ sectio die eodem sit iteranda, & quando postero. Iterata, inquit, detractionis tempus, in quibus simpliciter vacuare conamur, eodem die esto. at in quibus reuellere, si vel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. Sequitur locus, qui & ipse sane est obseruandus, quod, ut ait Gal. missio sanguinis non ex qualibet vena tantumdem valeat. ait enim: De venis quæ sitū est, multum nihil ne referat, quam quis secare venam volet (veluti omnes sectæ omnibus æque affectibus profint) an sicut Hippocrati, ac prope medicorum clarissimo cuiq; visum est, multum intersit, hanc an illam incideris. Quæ ratione 2. ad Glau. vbi de inflammatione agit: Si ad genu, inquit, fluxus deferatur, atque hoc subito plurimum attollatur: tibi vero totum corpus plenū sanguine appareat, & valida laborantis vis, tempus autem anni sit ver, regio temperata, æger vero sit adolescens, aut iuuenis: is sanguinis euacuatione ex superioribus partibus indiget, oportetque eius incidere, in

*Quando
venæ sectio
eodem die
iteranda
sit, & quan-
do postero.
Locus sectio-
nis vena.*

*Circumstā-
tia.*

*Virium ro-
bur.*

cubito venam, aut scilicet interiorē, aut me-
diam. sin vero aliqua pars superior pateretur,
per inferiora sanguis est educendus. Semper
enim fluxionis motū ad contraria trahere ex-
pedit. Sequuntur circumstantiæ, quæ pro re-
cte exercenda sectione venę sunt obseruandę:
& primum virtus sane, quæ vt ait Hipp. valida
esse debet. qua non existente valida, quæ in-
cōmoda sequuntur narrat Gal. 12. meth. Quip-
pe medicus, inquit, quidam quinquagenarius,
cum iam septimam noctē agrotaret, nec viri-
bus admodum valentibus esset, dolore illi ca-
pitis vehementi in dextro potissimū tempore
oborto, non exspectans quod amicorum
quispiam ad se veniret, sibi ipsi nocte venā in-
cidit, itaq; dolor illi protinus conquieuit. cæ-
terum longo tempore tum decolor, tum viri-
bus imbecillis, tum exilis mansit, aliq; corpus
eius desiit (atrophiam græci vocant) sic vt
vix pristinum habitum receperit. Quinimo
9. meth. tempus mittendi sanguinē non attē-
di debere in febribus, quo ad numerum die-
rum, sed vni virium robori, quippe quod in-
quit si seruatum est, nō solum sexto, septimo-
ue, sed etiā sequentibus dieb. sanguis est mit-
tēdus. Et hac ratione vel septuagenariis sangui-
nē mittēdum esse vult Galenus, si affectus iu-
bet, dūmodo vires validę sint. q̄ ex pullū ma-
gno, & vehementi cum æqualitate deprehē-
des, quanquā illud notandū sit ait Galenus:
sanguinis tamē minus mittendū esse senibus,
eti

et si robusti videantur, quam iuuenibus ætatis
florentis. Sequitur ex circumstantiis ætas, de
qua 4. acut. Gal. Nō senes, inquit, propter vir-
tutis imbecillitatem, at certe pueri quanquā
vitali facultate valeant: tamen neque ii susti-
nent sanguinis missionem. Promte enim eo-
rum substantia tum propter humiditatē, tum
propter temperati caliditatē euaporatur. De-
tractione igitur sanguinis non egent qui insitā
naturalemq; habent vacuationem. Et ii. met.
Pucro qui quartum decimum annum hæte-
nus non attingit, mitti sanguis non debet, quod
cum calidi pueri & humidi sint, plurimū cor-
poris substantiæ his quotidie defluat, ac dige-
ratur, ita quod ex incidenda vena molliēdum
49 nobis fuerat, id vltro nobis ex curati corporis
natura præstatur. Et sequens ostendit in quib.
corporibus decimum quartum ætatis annum
excedentibus parum vel nihii sanguinis sit
detrahendum. Et ait, quod si corpus decimū-
quartum annum excesserit, æstimandum est
qualitatem eius natura sit, num gracilis, & spif-
sa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra: atq;
ita in priori missionem sanguinis adhibebis,
in secunda nequaquam. Sequitur vt aggredia-
mur secundum institutum vacuandi per me-
dicamentum purgans, si prius illud notaueri-
mus, vbi vtraque vacuatione indigebimus:
ordinis etiam habendam esse rationem, quo
scilicet prius, & posterius vtaris. quod lib. de
dign. & med. Gale. hunc in modum expressit.

Ætas.

*Sanguinis
missio debet
precedere
purgationē.*

Non oportet, inquit, simul venam secare, & purgare, verum prius sanguinem detrahere, deinde virtutem pulcre refocillare, quoniam ipsa nos gubernat, & medicamentis auxiliatur. Huc præterea accedit, quod vna cum sanguine multum etiā de vitali spiritu excernitur, quo excreto refrigescit totum corpus, & opera naturalia deterius obeuntur. Ea propter virtutē prius refocillare oportet, deinde medicamentum purgās exhibere. Et paulo post rationem reddit huius ordinis: Quoniam, inquit, vbi quatuor humores abundabunt, potius vena incidenda est ante purgationem, quam e cōtra. Quoniam, si per sanguinis missionem corpus prius fuerit vacuatum, purgans medicamentum exhibitū venas, & arterias, & inanes corporis regiones inuenit non oppletas, quo fit vt absque impedimento in totum corpus manet ad attrahendum succos, facillimeque fiet eorum vacuatio, propter vasorum spatia, & incisionem, tenuitatemque succorum. Nam, si vasa sanguine repleta sint, & purgatiuum dederis, non poterit propter plenitudinem in corpus deferri, vnde fit vt substet, & nihil efficiat, aut si quidquam facit, male faciat. Sequitur euacuatio per medicamentū purgans, quæ sane a quib. indicari debeat, narrat Gal. 4. met. medendi. Postquam enim posuit ea, quæ indicant sanguinis missionem, eaque non esse sanguinis redundantiam, sed morbi magnitudinem, ac virium robur, paulo inferius ait: Ad eundem

eundem modum nec purgatio in sola vitiosi *Quanam*
 succi abundantia conuenienter suscipitur, sed *indicet pur-*
 sicut missio sanguinis, vel propter ipsius ab- *gationem.*
 undantiam, vel propter morbi magnitudinē:
 ita purgatio & propter abundantiam alterius
 cuiusque succi, & propter vim morbi adhibe-
 tur. Ac de sanguinis missione tū in alio libro
 egimus, tum vero in sequentibus agemus, de
 purgatione in hoc libro disseram. Desiderant
 enim agri hanc non modo, vt quod noxiū su-
 peruacuum, quo vrgentur, educant, sed etiam
 vt quod tum ad diuersum trahat, tum vacuet.
 Atque ob eam rem Hippocrates, tum in reli-
 quis omnibus operibus, tū in eo quod de vl-
 ceribus prodidit, etiam morbi magnitudinē
 ad purgationis indicationem considerat, pur-
 gatio, inquit, per aluum plurimis vlcere-
 rum prodest: præterea vulnerib. quæ in capite sunt *Vulneribus*
 accepta: item quæ in vëtre, & articulis: ad hæc *& vlcereb.*
 iis, in quib. ossi caries impendit: præterea quæ *purgatio*
 suuntur, & quæ exeduntur, & herpetibus, & *utilis.*
 reliquis, quæ diuturna vlcera reddunt, & quæ-
 cunq; deliganda sunt, per aluū purganda sunt.
 His verbis clare docuit, vlcerebus omnibus, &
 vulneribus, quoties præualida sunt, purgatio-
 nem esse vtilem. Cum enim trifariam nō hæc
 modo vitia, verum etiam omnia reliqua gra-
 uia, magnaue reddantur: nempe vel propter
 afflictæ partis præstatiā, vel propter affectus
 magnitudinem, vel propterea quod sunt ca-
 coethe: cuiusque horum videtur Hippocra-

tes mentionem fecisse; utique in capitis, ventrisque vulneribus præstantiam læsæ indicans partis. Ventrem autem hoc loco nō solum inferiorem intelligendum esse, sed etiam superiorem, patere cuius arbitror. Et per longum processum discurrens, quomodo morbi isti ab Hippocrate enumerati magni sint, concludit. Quare in omnibus his non sine ratione purgare per aluum iubet. Et quibuscumque interiectis ait. Hinc, inquit, illud docere volo, tum ipsam morbi siue vim, seu magnitudinem appellare velis, pro indicatione quadam sanguinis detrahendi, vel purgationis adhibendæ statuendam esse: tum vero Hippocratem hanc omnium, quos nouimus primum indicationem adinuenisse. Nam cum triplici genere morbus quisque sit grauis, aut propter præcellentiam partis, aut propter affectus magnitudinem, aut propter ipsius cacœthiam: omnium horum meminit Hippocrates, ubi de purgatione egit. Ad hunc enim modum confert purgatio: quia si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & leuiter ferunt: contraria vero grauitur. Atque hoc est illud, cur purgatio sanis corporibus sit molestissima. quod & Gal. libro quos purgare conueniat, expressit. Qui, inquit, sano corpore sunt, si purgentur, molestias sentiunt. Nam & vertigines, & tormina patiuntur ægreque purgatio succedit, & cum hoc etiam celeriter exsoluuntur. Causa autem horum omnium medicamen-

*Quilibet
morbus tri-
plex sit
grauis &
magnus.*

*Purgatio sa-
nis corpori-
bus molesta
est.*

dicamentum est, quod cum sibi obnoxium humorem educere cupiat, nec ipsum reperiatur, sanguinem & carnes colliquat, ut ex eis quod suum est eliciat. Quando autem vitiosi humores purgante medicamento sint vacuandi, libr. quos purg. docet. quo in loco ait: Postquam locutus fuit de humoribus turgidis & concitatis, cum vehementi motu agitantur, modo ab vno loco ad aliud confluentes inter principia morbi hominem vexant, doloresque ac titillationes afferendo, ægrum quiescere non permittunt. Hos ergo, inquit humores euacuare conuenit in motu, agitatione, & fluxu positos. Et sequens docet, quando cauenda sit purgatio: & ait: Qui vero aliqua in parte corporis confederunt, neque vlllo alio auxilio, neque medicamento prius vacuandi sunt, quam concocti fuerint: tunc enim & naturam euacuationi adiutricem habebimus. Hæc enim simul atque concoxit humores, excernere, atque superflua refecare conspicitur. Quo tempore indicatio quoque morbi, quam crisin appellant, celebratur. Tempus autem anni incommodum purgationi expressit Galenus eo in loco, sub cane, & ante canem, quod exusta natura non ferat purgantium medicamentorum acrimoniam, & purgatio praua fiat, cum calor aeris ambientis partem trahat extrinsecam contrariam ei, ad quam medicina ducit humores. Locus autem purgandi cōmodus, æstate per superiora,

*Quinam
humores
purgandi
sint.*

*Purgatio
quando ca-
uenda sit.*

*Tēpus pur-
gationi cō-
modum.*

*Locus pur-
gationi cō-
modus.*

hyeme per inferiora. Sed de his suo loco vberius agemus: cum hæc dicta Galeni hic simul collegerimus tanquam materiam futuræ eorum, quæ ex mente Galeni interpretaturi sumus.



IO. PAULI PERNVNIA
PATAVINI.

De Curatione causæ antecedentis.

LIBER QVARTVS.

NACTENVS dictū sit de arte curandi in vniuersali, ac de instrumentis artis medicæ, quib. ars illa curandi perfici potest. Sequitur, vt artē illā ad vsum applicemus singulorum affectuum quarumcunq; partiū corporis humani. Quod vt clarius fiat, & vt res a suis principiis videatur orta, hinc exordiēdū esse putamus. Quid in nobis consistit aut est pars corporis, aut in corpore cōtinetur, aut functiones sunt ex corpore proficiscentes, aut excremēta corporis: quorum cuiusque naturalis status, sicuti sanitas est, & constitutio secundum naturam: ita vitium cuiusque, & de naturali statu lapsus, affectus

affectus est, & constitutio præter naturã, quãquam non eodem modo: nimirum quod partium corporis vitiosa constitutio (quod primum & per se functiones euertat) proprie morbus eorum, quæ continentur morbi causa: functionum vero atque excrementorum vitium symptoma est dicendum. Horum sane omnium constitutiones præter naturam, quæ arte pristinae suæ sanitati restitui possint, nõ omnimodo assequemur, si prius illud prænotatum fuerit, ex his tribus, nempe morbo, causa, symptomate, symptomatum nullam esse curationem: & hoc quod ad remotionem causarum, & morborum statim desinant, nisi talia sint, vt trahant ad se curam. Sed tunc ratione aut morbi, aut causæ cum subeant, curatione morborum & causarum remouentur. Quapropter sequitur, vt de curatione duntaxat aliorum duum generum sit agendum. Quoniã vero morbos partis corporis humani, cū recentes abhuc sunt, ita vt nulla adhuc firma, stabiliq; constitutione inhæreant, etiam q; causæ tollantur, curare nõ licet, nisi prius causa, dein genitus affectus sum moueatur: & hoc vt ablata causa, nihil deinceps eius repullulare possit. Quapropter a curatione contentorum exordiemur. Hæc autem contenta, cum duplicem rationem ad morbum habere possint, vel morbo proxime adhære scere, & connexa esse, & hoc, modo causæ cõtinentis, vel morbum fouere, & continentem efficere,

*Morbus.**Morbi causa.**Symptoma.**Symptomatum nulla est curatio.*

Q

Causa antecedens.

Causarum evidentiū nulla est artificiosa curatio.

Contentorū naturalis constitutio consistit in tribus.

Auerſio.

ac mouere: vnde antecedentis causæ nomen delinquit. cumq; continens ex antecedente nascatur, sequitur vt prius a curatione causæ antecedentis exordiamur. (Nam causarum evidentiū nulla est artificiosa curatio, nisi quod si morbo similes sunt, remouendæ sunt, aut alterandæ ad qualitatem contrariā; aut si eas morbo cōtrarias reperimus, illas nō remouemus, sed quales sunt, tales etiā persistere iubemus.) Igitur contentorum constitutio naturalis, cū penes tria potissimū existat; penes permanentiam in suo loco a natura sibi deputato; penes qualitatem, & quantitatem: sequitur etiam q̃ tria summa vitiorum genera reperiētur, quoties vel loci, vel qualitātū, vel quantitatis modum a natura sibi statutum non obtinebunt: vnde etiam orta fuerunt tria summa remedium genera, auersio, alteratio, euacuatio. quorum singulum qua arte administrandum sit, non incommode assequemur, si prius quid sit vnumquodque percurremus: incipientes ab eo remedii genere, quod contentorum exagitationem, & præcipitem motū respicit, auersionis nomine appellari solet. Auerſio porro est TRACTIO humoris de vno loco ad alium locū oppositū; & p̃cul ab affecta sede existentē, recte & conueniter facta, vt locus affect⁹ tutus esse possit. Igitur autem dicitur auersionem esse tractionem humoris de vno loco ad alium, quod mutatio localis sit vniuersale genus, quod de attractione, repulsione,

pulsione, deriuatione, & auersione dicitur.
 Et quod sequitur; DE VNO LOCO ad alium
 locum oppositum, facit differre auersionem
 a repulsione: quod repulsio a loco affecto fiat
 versus alias partes: auersio autem fiat in loco
 opposito ipsi loco affecto. Et quod sequitur; *Auersionis*
 PROCVL ab affecta sede existentem, facit *& repulsio-*
 differre auersionem a deriuatione, quæ trahit *nis differē-*
 a loco affecto ad alium locum affecto loco vi- *tia.*
 cinum. quod postmodum additum fuit in de-
 finitione; ideo fieri auersionem; VT LOCVS *Auersionis*
 affectus tutus esse possit, notat causam fina- *ab deriua-*
 lem, propter quam institutum fuit huius re- *tione diffe-*
 mediigenus: cum auersio tutum reddat locū *rentia*
 affectum duplici ratione: tum quod fluxionē *Auersio rea*
 sistat, tum quod ab affecta parte prius putrem, *dit locum*
 & inquinatum humorē & sanguinem, quā ex *affectū tutū*
 reliquo corpore benignū, atq; sincerum de- *duplici de*
 trahat: & hoc ratione directionis partē phle- *causa.*
 mone obsessam magis quam alias respicien-
 tis. qua ratione positū fuit in definitione RE-
 CTE, & conuenienter facta. quod quidem to-
 ties erit, quoties non sola differentia localis
 opposita erit, sed simul cum oppositione dif-
 ferentiarū localium aderit, venarum & fibra-
 rū cursus rectus: nimirum q̄ ubi adest fibrarū
 rectitudo, expeditius etiā & plus sanguinis ab
 his partib. expietur, in quas fibræ diriguntur,
 dum naturā habemus nobiscū auxiliariā, re-
 ctis tractioni destinatis, quēadmodū in expel-
 lendo trāsuersis expulsionī destinatis uti solet

Q 2

*Pleuritis
dextra.*

*Cruris dex-
tri inflam-
matio.*

*Qua vena
in quibus
morbis secā-
da.*

amplius ipsorum humorum rectitudo con-
ueniens est. Nam esto, quod venę nihil trahe-
rent, humores tamen in recto fibrarum cursu
melius auersioni cedunt, cum sponte per
rectitudinem defluant, neq; in angulis hare-
re possint. Atq; hoc est illud, cur in pleuritide
dextra non secemus latus sinistrum, sed dex-
trū. Nam tametsi dextrū sinistro, ratione dif-
ferentię localis, oppositum sit: ratione tamen
recti cursus ipsarum fibrarum, in recte & con-
uenienter auersione efficienda, requisiti, vt a
loco affecto, & phlegmone occupato plus san-
guinis, ac celerius, quā a cæteris partibus hau-
riatur: cum non sit oppositū, nulla vena e dex-
tro latere rectis fibris in sinistrum concedē-
te, secamus latus dextrum, non autem sinistrū:
atq; eadem ratione fulciti, inflāmate crure
dextro auertimus, secantes sinistrū. Et hoc, q
hic adsint simul associatę & oppositio localis,
& communis etiam, atq; directā venarum so-
cietas, per quam sinistrum crus incisum euo-
cat e dextro. Quibus rationibus nixi, qui pra-
xim exercēt, partib. corporis humani laborā-
tibus, quę supra clauiculas sunt, reuellere so-
lent, incisione venę humerarię, si morbi iam
præsentes sint: sin autem sint imminentes, se-
ctione illius rami in manu, qui inter pollicē &
indicem excurrit. Ex partibus vero, quę inter
clauiculas & renes, sectione interioris, & r-
mi illius, qui inter annularē & minimum digi-
tum porrigitur. Partibus vero vtrisque labo-
rantibus

rantibus, auertunt sectione venæ mediæ, ex v-
trifq; vim obtinēte reuellendi, quod ex com-
munibus exterioris, & interioris ramis ortum
trahat, atq; ex partibus, quæ subter renes sunt,
reuellunt, secta poplitis vena, & in malleolo
saphena. Renes vero, quia ancipites sunt, su-
perioribus & inferioribus pariter iuuari po-
terunt. Atque hoc est illud, cur in morbis ca-
pitis ex pleuritide, tum interioribus, tum ex-
terioribus, phrenitide, delirio, apoplexia, ver-
tigine capitis vitio oborta, capitis dolore, ocul-
lorum, aurium inflammatione, parotidibus
gingiuarum, dentium calidioribus affectibus, *Gingiuarū
affectus.*
angina, reuulsio fiat, secta humeraria eius-
dem lateris. In pulmonum autem inflamma-
tione, sanguis reiectione per ruffim, tabe, cor-
dis palpitatione, aliisque huiusmodi vitiis re-
uellat secta vena interior cubiti sinistri. In *Pulmonum
inflamatio.*
pleuritide autem, tum interna, tum externa
pectoris, diaphragmatis inflammatione, vl-
ceribus sanguinem sputo fundentibus, inflā-
mationibus quæ vel axillas, vel humeros ma-
le habeant, reuellat secta interior eiusdem
lateris, modo inflammatio brachii flexum nō
pertingat. Tunc enim, cum tutum non sit
sectione proritare, secta manus reuellet, ieco- *Iecoris inflā-
matio.*
core inflammato, interior dextra reuellet: lie- *Lienis &
uteri af-
fectus.*
ni succurret interior sinistra: in renum inflam-
matione ex inferioribus, vena vel in poplite,
vel in malleolis: in vteri affectibus, si menses
præter modum fluant, secta interior cubiti

impetū coarcebit: quemadmodum & cucurbitula subter mamas, vel etiam vmbilico affixa: menses vero suppressos instate purgationis tēpore, vena poplitis, aut malleoli incisa mouebit. Vteri autē inflammationem, si simul adsit plenitudo, secta interior cubiti reuellet, e qua fluxionis exordiū sumit: si sine pleuritide erit, secta interior in poplite, aut in malleolo directā reuellet. fluxū hæmorrhoidum sistet secta

Hæmorrhoidum fluxus.
Suppressio.
Podicus & partium vicinarum inflammatio.

cubiti vena: suppressionem vero secta in malleolo euocabit, inflammationem vero vel podicis, vel partium obliænarum, vel vesicæ, vel inguinum, si aderit plenitudo comes, superiorum primo fiet incisio: si plenitudo non aderit, satis erit inferiorum sectio. similis est in crurum inflammatione ratio. Amplius volentes reuellere in intemperie calida & humida cerebri sanguinea dolorem causante, vrimur sectione venæ cephalicæ lateris dolentis, prius tamen basilicæ aut communis, si comes erit plenitudo:

Capitis dolor ex intemperie calida & humida.
Dolor capitis ex intemperie calida & sicca.
Ex intemperie cerebri frigida.

in eiusdem intemperie calida & sicca causante dolorem, auertunt sectione venæ lateris eiusdem, & pauci sanguinis extractione, in intemperie autem frigida cerebri causante dolorem, auertunt deorsum pituitæ ascendētis impetum tum purgatione, tum acribus balanis, & clysteribus, tū partium extremarum vinculis dolorificis, frictionib. validis & diuturnis ab omoplatis inferna versus. in obstructione cerebri a materia sanguinea, a qua perueniat amissio sensus & motus, auertet basilica pri-

Cerebri obstructio a materia sanguinea.

mum

mum, præsertim si adest plenitudo magna; de-
 in cephalica, corporis totius frictiones, ligatu-
 ræ artuum dolorificæ, lotiones calidæ, cucur-
 bitulæ primum lenes, deinde cum scarificatu
 in partibus infernis primū, si adsit magna ple-
 nitudo. In obstructione autem cerebri a ma-
 teria pituitosa, auertent enemata acria, respi-
 cientia caput, balani longæ digitos sex, filo li-
 gande, vt retrahi possint, frictiones totius cor-
 poris, ligaturæ artuum dolorosæ, cucurbitulæ
 natibus, & lumbis affixæ, totius corporis fri-
 ctiones, ligaturæ artuum dolorificæ, ac etiā te-
 stium. Ad eundem modum in paralyti auertēt
 materiā defluentē ad spinalē medullā, clyste-
 res, sternutatoria, errhina, apoplegmatisimi,
 gargarismata, præsertim post multas corporis
 vacuationes. Eodem modo in cōuulsione fiet
 auersio materiæ ad inferna clysteribus, & post
 totius euacuationem, frictionibus, errhinis,
 sternutatoriis, gargarismis, apoplegmatisimis.
 Ad eundem modum epilepsie materia clyste-
 ribus, balanis, frictionibus auertetur, purga-
 tione per medicamentum purgans. In cerebri
 inflammatione, veluti est phrenitis, auersio fiet
 sectione venæ cephalicæ: sin autē fluenti ma-
 teriæ associata erit plenitudo, primū vena cu-
 biti interna, dein cephalica erit secāda. Ampli⁹
 auersio fiet medicamento purgante, ante etiā
 coctionē in hoc casu, quod periculū sit, ne fiat
 absolutū erysipelas, enemata, artuum frictiones,
 ac ligaturæ ad articulos dolorosæ, cucurbitulæ

*A materia
pituitosa.*

Paralysis.

Convulsio.

Epilepsia.

Phrenitis.

quinetiā ceruicibus, & omoplatis affixæ. In in-
 tēperie cordis a materia calida, a qua pueniat
 tremor cordis, auersio fiet materiæ ad partes i-
 gnobiles, sectione venæ malleoli, frictioni-
 bus, ligaturis dolorosis partium extremarum,
 clysteribus, cucurbitulis. In intemperie autē
 cordis frigida cum materia frigida, a qua iti-
 dem tremor cordis, frictiones auertent. In
 intemperie calida pectoris, aut pulmonum
 cum materia calida, a qua, exempli gratia, pro-
 ueniat tussis, cum ob distantiam pulmonis, &
 asperarū arteriarum ab intestinis, & negatam
 viarum communem, medicamento pur-
 gāte materia calida difficile auerti & euacuari
 possit: cum Rasi, & Auic. materiā a capite flu-
 xuram auertentibus, purgantibus & errhinis
 utemur, & a purgatione abstinēbimus. Si eiuf-
 dem intemperies sit a materia frigida, eo-
 dem modo auersio fiet. In obstructione autē
 pulmonis aut pectoris, facta a materia pitui-
 to a crassa: aqua proueniat difficultas anhel-
 tus, & asthma, auersio itidem fiet errhinis, a-
 pophlegmatismis, & cæteris in catharro fieri
 solitis. In pectoris inflāmatione, quæ pleuritis
 appellatur, præter auersionē materiæ facturæ
 phlegmones incrementū, sectione venæ cu-
 biti internæ eiisdē lateris, factā. Auertet etiā
 materia (præsertim si materia repat ad vētrē)
 medicamento nō tamē valenter purgāte, prius
 tamē præparata. Eodē modo in peripneumo-
 nia. In ventriculi intēperie frigida & humida,
 aut

*Cordis int-
emperies a
materia ca-
lida.*

*Tremor cor-
dis.*

*Tussis a ma-
teria calida*

*Tussis a ma-
teria frigida*

Asthma.

Pleuritis.

*Peripneumo-
nia.*

aut intemperie calida, a qua ventriculi imbecillitas procedat, auersionem quasi instituemus, & fuga euidentium causarum, & earum remotione, quæ morbum augere possunt. In
 52 ventriculi vero inflammatione auersio fiet, sectione venæ cubiti internæ. In hepatis intemperie calida, in hepatis obstructione, in eiusdē inflammatione, reuulsio fiet materiæ paratæ fluere ad hepar, tum sectione venæ internæ
 vel communis, tum ligaturis, frictionibus, cucurbitulis in artus ipsos impactis. At calida lienis intemperies, obstructio, inflammatio, auertetur venæ lienaris, aut eius, quæ inter minorem & annularem digitum, incisione. In renum obstructione & calculi præcautione re-
 trahent pituitam genitam ad intestina, ne ad renes ruat, clysteres in renum inflammatione fiet, vt ait Gal. in lib. de missione sanguinis, auersio materiæ fluentis, sectione venæ cruris
 e directo renis patientis: eius scilicet, quæ in poplite, aut certe quæ in malleolis est: aut si multitudo sanguinis comes aderit, vt ait Gal. & inflammatio recens, sectione venæ ex cubito. At vteri obstructio, a qua menses suppressi, auertetur frictione partium infernarum,
 cucurbitulis coxis internis ad venam poplitis affixis. Eiusdē inflammatio auertetur, sectione venæ superioris. In visione imbecilli auersio fiet ad partes infernas, aut posticas, vt capitis reuersi pexu multo occipitium versus, vt clysteribus, balanis, ligaturis, frictionibus, fo-

Ventriculi imbecillitas

Ventriculi inflammatio.

Hepatis affectus.

Lienis affectus.

Renum obstructio.

Calculi præcautio.

Renum inflammatio.

Mensium suppressio.

Vteri inflammatio.

Visio imbecilla.

Q 5

Cauterium.

mento extremorum ex decocto capitali, apophlegmatismis, errhinis, cauterio post aures, vel in commissura coronali, cuius vlcus apertum diu tenendū est, vel in collo fetone (quē vocant) infixio, cutem colli forcipe apprehendendo, donec sensus tactus habeat: postea acufilum aliquod crassum habente perforando: vt in vulnere ablata acufilum maneat, q̄ vlcus diu apertum seruet, ac per id materiæ multæ vacuationem moliatur. Diuinitus apud quosdam practicos fili loco ablata acu annulū aureum æqualiter apertum immittitur: postea ne excidat, eius extrema adducuntur; & identidem quotidie dimouetur, vt dolore & attritu materia trahatur, & vacuetur multa, mane & vespere quotidie tergendō. Amplius post pastus sumendo ea, quæ vapores in caput ferri prohibent, vt panem tostum, cidoniātū. In

suffusio.

*Catarrhus
ex materia
calida.*

suffusione auersio fiet præter vacuationes, acribus clysteribus, & balanis, frictionibus, & fotibus per aquam calentē partiū extremarū, & earū ligaturis dolorosis, & cauterio in coronali, aut prope aures, aut fetone ceruicibus affixo e regione oculi affecti, & cucurbitulis primū lenibus, deinde cū scarificatu, manuū clausione sæpe & diu, vt largius sudet, & sudoris terfione, omnia capitis & thoracis vitia materialia multum iuuante. In catarrho vero auersione vtūtur frictionibus, ligaturis extremorū, cucurbitulis in natib. & spatulis, errhinis in calida materia ex aqua violarū, vel hordei,

dei, quæ nares dilatent, vt viâ dent liberâ materiae per has effluxuræ. In frigida vero materia errhinis ex aqua maiorana, succo foliorû & radicum betæ, decocto melâthii, & iis fortiore succo ireos & ciclamini: sternutamētis etiâ ad nares trahentibus, quâquam amborû vltus non sit tutus ante factam totius corporis vacationem: cauterio etiam in commissura coronali imposito, materiâ largâ per vlcus semper apertum salubriter vacuante: vel apertione post aures. In hamorrhagia e naribus, in a- *Hamorrhagia e narib.* uersione spes curationis omnis fere reposita, vt brachiorum & crurum ligaturis dolorificis, frictionibus, fotibus ex aqua calente, cucurbitulis, hypochondrio e regione naris sanguine fluentis appositis, & interscapulio sine scarificatione, vel sectione venæ in id efficacissima. Ad fluoris impetum in contraria reuocandum, basilicę sane aut cephalicę, aut communis lateris eiused. In cholera morbo, bal- *Cholera* neo ad cutim trahente, ligaturis dolorificis, & frictionibus, in fluxu hamorrhoidum, sectio- *Fluxus hamorrhoidū.* ne venæ basilicę dextræ, & eiꝑ̄ larga vacuatio- ne, cucurbitulis hypochondrio dextro, interscapulio humero affixis, frictionibus, ligaturis, brachiorû fotib. Sed hæc de eo remedii genere, q̄ cōtentorū motui præcipiti succurrere solet. Sequitur vt aggrediamur artē depellēdi vitia causæ antecedentis penes qualitates ob- *Affectus penes qualitates oborti sunt multiplices.* orta. Quoniâ vero vitiū penes qualitates obortum multiplex est, quoddâ primas, quoddâ

secundas qualitates respiciens: primas, veluti si humores nimis quā par sit, sint calfacti aut refrigerati, aut exsiccati, aut humecti: secundas, velut si nimis rari, tenues, acres, aut nimis densi, lenti, crassi: vnde plura remediorum genera sunt orta, quæ huiusmodi vitia penes qualitates immutare possint, & eas pristinis suis qualitatibus restituere: calfactos quidem refrigeratio, frigidos calefactio, humectos exsiccatio, raros condensatio, tenues incrassatio, acres & nimis separabiles illinitio & glutinosatio frigida, densos rarefactio, lentos abstersio, crassos vero emendabit incisio. quorū sane omnium communissimum genus cum sit ipsa alteratio: sequitur igitur, vt ab alteratione exordium fiat. ALTERATIO est immutatio vnius status ad alterum statū ab alterante factum, vt amissa contentorum qualitas pristinae suae qualitati restituatur. Ideo autem dicitur, esse immutationem vnius status ad alterum statum, quod immutatio sit cōmune genus tū alterationis tū generationis, auctiois & motionis secundū locū. Et quod sequitur: Alterationē fieri ab alterante, notat causam effectiuam ipsius alterationis, & huiusce determinatæ immutationis, cuius finis est introducere qualitates, quod postmodum declaratur per ea, quæ sequuntur. Quod enim ait; vt amissa contentorum qualitas pristinae suae qualitati restituatur, notat causam finalem, ratione cuius distinguitur a cæteris mutationem generibus

ALTERATIO.

Alterationis causa effectiua.

Alterationis causa finalis.

bus: nimirum, quod generatio & corruptio aliam substantiam in subiecto, quod immutat, inducat; auctio quantitatem: motio secundum locum alium locum; alteratio autem aliam qualitatem. Sed de alteratione in vniuersum habemus, ex cuius cognitione non multo negotio deueniemus in cognitionem specierum alterationis penes primas qualitates. Nam si alterans qualitate calida erit insignitum, calidam qualitatem inducet; si frigida frigidam: si humida humidam: si sicca siccam. Sequitur, ut aggrediamur mutationes penes secundas qualitates, incipientes ab ea alterationis specie, quæ raritatem emendat (condensatio appellatur) si prius tamen prenotatum fuerit, huiusmodi qualitates secundas appellari eo, quod oriantur a primis: vel ob hoc, quod postquam primæ operationes suas ediderunt, secundas postmodum producant: veluti calidum calfacit, postea aperit: frigidum vero infrigidat, postea condensat. CONDENSATIO est incrassatio rei raræ atque humidæ, facta a frigiditate moderata, & siccitate etiam astringente: ut id, quod rarum est, solidius fiat. Ideo autem dicitur, condensationem esse incrassationem, quod incrassatio sit proximum genus ipsius condensationis, per quod differt a rarefactione. Et quod sequitur, fieri a frigiditate, notat causam efficientem ipsius condensationis. quoniam vero obstructio quoque species quædam erat condensationis & incrassationis, ob id, ut ab ea sciun-

Alterationis species.

Qualitates secundæ.

CONDENSATIO.

Condensationis & obstructionis differentia.

Frigiditas. geretur, additum fuit in definitione, frigiditatem, quæ est causa efficiens cōdensationis, moderatam esse debere: & hoc, q̄ quæ frigidiora sunt, meatus obstruant, & in superficie dumtaxat cōdensationē inducant, raritatemq; in profundis partibus relinquāt, dum nimia frigiditas, qualis est acerborum, ob substantiæ crassitudinem penetrare nō potest: nimia vero siccitas inane potius, quā solidum efficit, dū 53 nimis exasperat, & propriū membrorū humorem exhaurit. quare optime dictū fuit cōdensationem fieri a frigido moderato, sicco, & astringente, qualis est hypocistis, radix rubi, lentiscus, acacia; non tamen ea, quæ prunis est adulterata. Et quod sequitur: Cōdensationē fieri a frigido moderato, ut id, quod rarum est solidius fiat, notat causā finalem huius speciei mutationis, differentem ab usu aliarū specierum mutationis. Sequitur illinitio, & glutinofatio, seu emplasticatio. Nam incrassatio, quæ tenuitatem emendat, eadem fere videtur esse cum cōdensatione. EMPLASTICATIO est incrassatio materiæ male in se cohærentis, facta a moderato calore humiditati associato, & materia crassa, & tenaci, ut materia, quæ nimis separabilis est, uniri possit. Illud primo non est ignorandum, duplicem reperiri emplasticationem: aliam quidem respicientem corporis partes: & huiusmodi emplasticatio, quæ poris corporis illinitur, tenaciter harena: proprie appellat̃ oppletio, siue obstructio ipsorū meatuum:

*Siccitas.**Condensationis finis.**Incrassatio. Emplastificatio.**Emplastificatio duplex est.*

tuum: aliam vero humores respicientē, & hac
 pprie magis incrassatio appellari potest. Qua
 ratione in definitione positum fuit, emplasti-
 cationem esse incrassationem, ad differentiā
 abstersionis, quæ veluti quædā rarefactio est, *Absterfo.*
 & inanitio. Et quod sequitur: Emplasticationem
 fieri a moderato calore humiditati asso-
 ciato, notat causam efficientem ipsius empla-
 sticationis. Ideo autem dictum fuit, calorem
 moderatum esse debere, quoniam si excede-
 ret, resolveret, nimis aperiret, & inaniret:
 quod oppositum est ipsius incrassationis: No-
 tanter autem additum fuit: calorem modera-
 tum humiditati associatum esse debere, quo-
 niam siccitas exsiccando inaniret: humidum
 autem acreum, præsertim calori moderato
 associatum penetrationem adiuuans, est pro-
 xima causa emplasticandi: cuiusmodi est cera
 lythargyrium, oleum recēs, amilum, gummi,
 chondrus, oriza. Quod autem sequitur: Em-
 plasticationem fieri: ut materia, quæ nimis se-
 parabilis est, unitatem acquirat, notat usum
 emplasticationis. Sequitur rarefactio, quæ
 densitatem solet emendare. **RAREFACTIO** **RAREFACTIO**
 est attenuatio rei solidæ ac crassæ, facta a cali- **CTIO.**
 ditate humida, vel saltem moderata, & sub-
 stantiæ tenuis, ut id, quod solidum est & cras-
 sum, rarum fiat, tenue, & spongiosum. Ideo
 autem dictum fuit: Rarefactionem fieri a ca-
 lido, non autem a frigido: & hoc quod
 calidi sit aperire, attenuare; & rarum effi-
 cere: frigidi vero astringere, & condensare.

*Caliditas
intensa con-
densat.*

*Moderata
aperit.*

**ABSTER-
SIO.**

*Abster-
sionis causa
efficiens.*

Quod autem sequitur: Caliditatem humidā, vel moderatā esse debere: eo pertinet, vt no-
retur, non cuiusque caliditatis esse rarefacere,
cum caliditas intēsa adurens, per adustionem
potius condenseret & astringat, quam quod ra-
refaciat: sicuti patet in rebus assatis, & torrefa-
ctis. At si caliditas moderata sit, aperit sibi vias,
& quod obstat ingressui, mediocriter per hali-
tum discurrit: velut est aer balnei, & continen-
tis tēperatæ caliditatis, & aqua tepida. Et quod
sequitur: Calidum substantiæ tenuis esse de-
bere, eo pertinet, vt nolet calidū crassum non
posse perfecte aperire, cum ratione crassitiei
ad fundum ipsius rei aperiendæ penetrare nō
possit, sicuti facit id, quod tenue est. Sequitur
absterfio, qua mediante humorum lentorem
solemus emendare. **ABSTERFIO** est rarefa-
ctio, ac veluti inanitio quædam locorum op-
pletorū, facta a virtute exsiccatiua tenuis sub-
stantiæ, aut cum caliditate, aut frigiditate non
excedentibus associata, vt id, quod nimis est
vnitum, separabile fiat. Ideo autē dicitur: Ab-
sterfionem esse rarefactionem, ad differentiā
emplasticationis, quæ veluti quædam increassa-
tio existit: absterfio autem veluti quædam ra-
refactio esse videtur; cum sit veluti quædam a
sordib. expurgatio. Et quod sequitur: Abster-
fionē fieri a virtute exsiccatiua, notat causā
efficientem ipsius absterfionis, modo non ita
valide exsiccet, aut multum astringat: nimirū
quod multa astrictio meat^u coarctaret excre-
mento-

B

mentorū, & impediret exitum. Qua ratione additum fuit; exsiccationem cum tenuitate substantiæ esse associandam, ne crassitudo transitum & exitum impediat. Et quod sequitur: Virtutem exsiccatiuam tenuis substantiæ, aut cum caliditate, aut cū frigiditate associatā esse posse, notat essentiale esse ipsius potestatis exsiccatiuæ tenuis abstergere, seu modo cum caliditate, aut cū frigiditate sit associata. *Absterſio nis essen- tiale.* Qua ratione videmus hordeum, farinam fabarum, fursures, succum limonum, quæ frigida sunt, abstergere: eundemq; effectum produci a nitro, sapone, & omnibus amaris, & salis: quinimmo ab aliquibus moderate acris dulcedini admixtis, veluti est mel, & saccharū, quæ calida sunt. Notanter autem additū fuit, vim exsiccandi aut cum caliditate, aut cū frigiditate, quæ moderatæ sint, esse associatam: & hoc, quoniam, si caliditas nimia esset, ac intensa, attraherentur nouæ materiæ: si vero frigiditas esset multa, obstruerētur meatus. Quod postmodum sequitur: Absterſionem fieri, ut id, quod nimis cohæret, separabile fiat, notat *Absterſionis vsus.* vsum ipsius absterſionis differentem ab vſu ipsius emplasticationis. Sequitur incisio, qua mediante nimia crassitudo solet emēdari. *INCISIO.* INCISIO est diuisio facta a calido intenso, saltim vsque ad tertium gradum tenui substantiæ associato, ut id, quod crassum est, euadat tenue. Ideo autem dicitur, incisionem fieri a calido, quod diuisio, & penetratio sint propriæ ipsius

R

caloris. Et quod sequitur: Huiusmodi caliditatem intentam esse debere, ad id tendit: ut notet ea duntaxat, quæ frigida sunt & crassa, incisione indigere. Ut autem facile penetrare possit, additum fuit; huiusmodi caliditatem intentam in substantia tenui fundari debere; veluti est anisum, ammi, carum, fœniculum, selseli, cassia odorata, cinnamomum, piper, ginger, & huiusmodi. Incrassatio vero, quæ est opposita ipsi attenuationi, ab opposita causa fiet: a frigidis sane crassarum partium, veluti sunt malicorium, balauustum, galla. Sed hæc de

Incrassatio.

*Bilis vitia.
Bilis calidior
& feruor
quomodo
obundatur*

vitiis, & modis, quibus remoueri possunt vitia contetorum, penes qualitates oborta. Sequitur ut ostendamus, quomodo practici his rationibus, & fundamentis innixi, & veluti principiis quibusdam directi praxim exerceant. Qua ratione videntes bilem, ubi in qualitate vitia contraxit, peccare caliditate, & feruetia, acrimonia, & tenuitate, unde huc illucque momento, & repente, modo in caput, modo in aliud membrum rapi: pro alterandis huiusmodi qualitatibus utuntur refrigerantibus, & emplasticeis, ut materia incrassata, & acrimonia, & tenuitas aliquo modo obtusa, non tam repente huc illucque moueri possint: idque præsertim si adsit cum peccato humoris symptoma aliquod associatum: quemadmodum si ex eius raptu ad caput causaretur phrenitis. Atque hoc est illud, cur pro tollenda calida, & sicca cerebri intemperie causante

*Phrenitis
biliosa.
Capitis dolor
ex intemperie
calida
& sicca.*

fante dolorem, refrigerantibus, & humectā-
 tibus vtantur, exhibentes potum aque. aut.
 † vini aquosi, & aqua multa diluti, aut pomatii,
 piratii, imbecillis, fructus crudos, poma, pira-
 acida, lactucā, portulacā, intiba, oxaliden, spi-
 nachia, lac, caseum recentem, aphrogalacten,
 panem lotum, vel hordeaceū, pisces, aut par-
 tes animalium neruosas: aerem frigidū, & hu-
 midum: qualem machinari docet Galenus 9.
 & 10. merh. calidis omnib. prohibitis: & in cu-
 biculum illaris liquoribus, & refrigerantibus,
 & humectantibus plantis, quietē, somnū lon-
 giorē, animi tranquillitatē, fugam iræ, cura-
 rum, inæroris, studiorū, & amorum. Et in ca-
 tharro a calida materia, refrigerante vtuntur
 diæta, vitando austrū, affectus animi calidos,
 & inflammantes, cibos calidos, vegetos odo-
 res, & iubentes dormitionem in ventrē ma-
 gis, vt catarrhus in nares fluat. Ad eundē mor-
 dum in cerebri inflāmate illa, quæ phre-
 nitis appellatur; iubent victus rationē refrige-
 rantem, & astringentem, vt humores densā-
 ti, & coacti, in caput ægrius confluant, & te-
 nuem victus rationē, cuiusmodi est aqua hor-
 dei ptisania colata, & non colata, seu tota vt iu-
 bet Hip. lib. de ratione victus in morbis acu-
 tis: cremorem alicæ, vel hordei farinam cū a-
 qua coctam; ad dentes ad astringendū grana-
 torū, limonum, aranciorū, citreorum, cidoni-
 orū succo, aut omphacio, aut aceto, aut simi-
 li: aerē si frigid⁹ natura nō est, arte parātes, ve-

Aer frigidus & humidus quō modo inducendus?

Catarrhus a materia calida.

Phrenitis.

Cordis tremor ab in-temperie calida.

*Tussis.
Ventriculi in-temperies calida & in-
flammatiō.
Iecoris in-
flammatiō*

*Astringen-
tia & ape-
riētia atq;
tergentia.*

luti aqua rosarū, aceto, & aliis superius enar-
ratis. Ad eundem modum in in-temperie cor-
dis calida, a qua, exempli gratia, proueniat tre-
mor cordis, cibum exhibent refrigeratū oxa-
lide, aceto, omphacio, succo aranciorū, citrio-
rum, limonum Auic. laudatorum in febribus
acutis. Pro potu, hordei decocto, vitando vi-
num, præsertim generosum, vel si aliqua cir-
cumstantiarū vinū postulet, aqua diluatur: aut
bibant decoctum coriā dri præparati cum iu-
lep violato, aut rosato; atque in cæteris eodem
modo sumendis, admouendis, educendis, fa-
ciendis, contra causæ qualitates semper pug-
nantes. Ad eundem modū in in-temperie pectoris
aut pulmonis, a qua proueniat tussis; & in-
temperie ventriculi calida & eius inflammatione,
atque in-temperie hepatis calida. In inflāma-
tione vero iecoris victum non solū frigidum,
sed stipticum etiā & repellentem materiam ad
hepar fluentē, & fluxurā prohibentem, astri-
ctis hepatis poris & meatibus angustis, sed mi-
riorem, ne viis hepatis contractis obstructio
in eo excitetur, aut nimis refrigerando, ex
phlegmone scyrrhus efficiatur, aut sanies ex
phlegmone hepatis prohibeatur; ob id vtrif-
que satisfaciētes, & vitio, & membro, exhi-
bent clementer frigida, & stiptica, hisq; admi-
scent, quæ modice aperiunt, & tergent, velu-
ti syrupū rosatum ex hepatica, ex euaporato-
rio, ex succo oxalidis, cidoniorū cum aqua so-
lani, intibi, oxalidis, foliorū & radicū plan-
taginis

taginis, quæ refrigerat, siccatur, astringit sanguinis profluvia; & si quid aduratur refrigerat, addita aqua cichorii, adianti albi, quæ etiâ aperit, & terget. Ad eundem modum in intemperie lienis calida, & lienis inflammatione, eandem administrant viuendi rationem, velut in intemperie calida, & inflammatione iecoris. Ad eundem modum in renum intemperie calida, & eorum inflammatione: atque in vteri calida intemperie, a qua proueniat suppressio, & in vteri inflammatione. Sed hæc de modis, & materiis, quibus vitia extrinsecus emendari solent. Parum ab hoc viuendi genere & modo differt modus viuendi in morbis, ubi peccet sanguis, veluti fieri solet in cephalalgia sanguinea, ubi victus rationem refrigerantem, sed siccantem exhibere solent, veluti cibum, panem lotum, hordeaceum, miliaceum, pisces friabiles; fructus austeros, olera intiba, cichoreum, lapathum, portulacam, cucumer. cucurbitam: eodem modo aerem iubentes aquilonem spectare, & refrigerari floribus, & foliis salicum, vitium, iuncorum, arundinum per aerem sparsis, vt 9. & 10. meth. turbam hominum ingredi prohibentes, quæ inspiratu aerem non calfacit solum, sed etiam inficit: condimentum ex omphacio, aceto, succo aranciorum, aut limonum, aut citreorum, aut oxalidis: potu aquæ pluuiæ, aut cum hordeo coctæ; aut si vel imbecillitas, vel consuetudo vel mor-

Lienis intemperies calida & inflammatio.

Renum intemperies.

Vteri inflatio.

Sanguinis vitia.

Cephalalgia sanguinea.

bi paucitas vinum postulet, oligophorum, imbecille, & aquosum, & his omnibus actu frigidis, vt 7. metho. Gal. tradit, nisi ventriculi frigiditas obsistat: quietem corporis, & animi somnum parciorem. Veneré nullam, nec irā, nec furorem. Si præter caliditatem ipsius sanguinis adsit simul cū caliditate nimia raritas, ratione cuius facilis sit admotum, & ab inuicē separari, & ad aliquod membrū lēsum defluere: tum viuendi ratione non solum refrigerāte, & humectante, sed etiam astringendi vim habente vtuntur; quemadmodum in phrenitide contingit, in qua cibū exhibent, cremorem alicæ, vel farinā hordei cum aqua coctā, addito succo granatorū, limonum, aranciorū, citreorū, cidoniorū, aut aceto, aut omphacio, aut simili, quib. humor densatus, & coactus in caput ægrius confluat. Aerē eadē ratione, si frigidus natura non est, industria refrigerant, & humectant aqua rosarum, aceto, cāphura, foliis vitis, rubi, salicis, nimphææ, violarū. Ad eundem modū influxione, veluti in hamorrhagia e naribus, refrigerantem, & simul vim astringendi vias habentem, viuēdi rationem, astringendi scilicet vias, per quas fertur sanguis, veluti cibum glutinosum; pedes scilicet & capita vituli, veruccis, & aliorum animalium, paratum succis superius enarratis, habentibus vim astringendi, caseum recentem pinguem, oua dura, quæ paucū, & crassum gignant sanguinem, præsertim parte alba, aquam chalybeatam

Phrenitis.

Aerem frigidum reddentia.

Hamorrhagia e narib.

Oua dura.

beatam potui mixtā, & obsonia in eadē aqua decocta: aerem paratum eodem modo, quo in phrenitide: quietem & corporis & animi, quod vtriusque motus humores exagitet ad fluendum. Ad eundem modum in sputo sanguinis, exhibentes viuendi rationem, habentem vim complicatam plurimarum qualitatum simul, veluti refrigerantē, siccantē, astringentem, & etiam emplasticā, seu glutinosam: quemadmodum pro cibo, lac coctum, cū farina hordei, aut amilo inspersis malorum punicorum granis, panibus azymis, piscibus glutinosis, anguilla, ciprino, tinca, extremitatibus animalium, & aliis partibus neruosis, cartilaginosis, casco recenti, lacte acido, milio panico, oriza, aqua ferrata, seu chalybeata, per se, aut cum iulep rosato: aere eodem modo quo supra parato; quiete corporis & animi, silentio, & somno fluxiones prohibente. In cholera morbo acuto, victus ratione varia, aere calido, frigido, temperato, parū luminoso, quod lumen, & calor humores exagitet, & spiritus resoluat: tenebræ contra sedent, & quietos reddant: frigus vero quanquā spiritum resolui prohibeat, quia tamē materias intro ad vētriculum ex corporis habitu protrudit, noxiū est, odoribus bonis spiritus nutrientes, & instaurantes, cibo pauco, coctu facili. In fluxu hamorrhoidum, victus ratione frigida, & astringente, & emendante sanguinis vitium, veluti omphacio, succo rhois, rosarum,

Sputum sanguinis.

Cholera.

Hamorrhoidum fluxus.

55

R 4

Pituita vitia.

*Cerebri inter-
peries humi-
da & frigida.*

cidoniorum, & ex iis ac similibus syrupū con-
ficientes. Sed hactenus de iis, quibus vitia san-
guinis emendari solent. Sequitur humor pi-
tuitosus, qui frigidus cum sit, solet etiā ac-
quirere crassitudinem, lentorem, seu glutinosita-
tem, & adhaerentiam talem, ut tarda cum fiat,
ratione harū qualitatū ipsi expulsiōni, his qua-
tuor ut plurimum indigere videtur; calfactio-
ne, exsiccatione, attenuatōne, abstersione &
incisione. Atq; hoc est illud, cur practici in in-
terperie cerebri frigida & humida, subeant talē
victus rationem: veluti panem fermentatū &
salsum, anisatum, & melanthiatū, vel aroma-
tarum, vel saccharatum, vel biscoctum: carnes
animalium musculosas, & natura non excre-
mentosorū, & prater hæc probe exercitorū,
allas, & sumtas cum sinapio, vel simili viribus
condimēto: oleribus, apio, salvia, hyssopo, sa-
tureia, thymo, maiorana: aromatū catalogo,
vinum generosum calentibus herbis medica-
tum, aut aromatibus, sed parum, præsertim
purgato iam corpore: omniaq; hæc alimenta
pauca & rara esse volunt: & hoc, q̃ inedia etiā
huic causæ salubris sit, nedum victus iste te-
nuis & tenuans: Atq; ad huius similitudinem
aerem quoque eligunt æstiuum, calfacientem
scilicet & siccantem: etsi est hyems, eum calfa-
ciunt & siccant igne luculento, & suffitu aro-
matū: ut cinamomi, garyophyllorum, cortice
citri, maiorana, rore marino, satia, stœchade,
& aliorū similiter calidorum & siccorū: mo-
tum

tum celerem, robustum, vehementem totius corporis, ieiuni præsertim: aere calido & sicco, veluti z. san. tuend: vigilias, irā, curas, mœrorem, & similes animi affectus corpus omnino siccantes, & sæpe calfacientes, si nō per se, per aliud tamen. Ad eundem modū & in catarrho a causā frigida, septentrionem fugere iubentes, somnum longiorem, & supino corpore dormitionem: quod in catarrho in vētrem magis sit dormiendum, vt catarrhus in nares fluat, quod est communē catarrho, tum ex materia frigida, tum calida, ex apta corporis figura remedium. Ad eundem modum, in obstructione cerebri a materia pituitosa, in qua prodeat apoplexia, & in paralyfi, eandem victus rationem calfacientem & siccantem, & aerem, & reliqua sumenda, adinouenda, educenda, facienda, facultatem naturalem calfaciendi & siccandi sortita. Ad eundem modum in conuulsione: Ad eundem modum in epilepsia cibum exhibent calfacientem & siccantē, modo paucus sit, nec vaporosus: præsertim cœnā, q̄ ex multo alimento vapor mult⁹ tollatur, qui accessionem epilepticam, & alia capitis vitia accersat, vitando herbas frigidas & humidas, sumendo calidas, saluiam, maioranam, & præ aliis hyssopum: qua sola decocta, cibis largiter mixta, testatur Serapio se multos curasse. vinum vitādo, aerem eodem modo calfaciunt & siccant Cariophyllis, cortice citri, igne luculento, & similibus: cauentes semper

*Catarrhus
a causa
frigida.*

*Apoplexia.
Paralyfi.*

Epilepsia.

R s

*Tremor cor-
dis ab intem-
perie frigi-
da.*

ne caput repleat, aut materiã exagitet. Ade-
undẽ modum in intemperie cordis frigida,
a qua tremor enascatur: illud tamen aduertẽ-
tes, in affectibus cordis, aeris præcipuam esse
habendam rationem, vt qui inspiratus ad cor
mox penetret, citoq; iuuet vel noceat. Ob id
alterant aerem rore marino, maiorana, origa-
no, ambra, moscho, & similiter calidis odora-

*Tussis ab in-
temperie pec-
toris aut
pulmonis
frigida.*

mentis: eodem modo reliqua iubentes. Ad e-
undem modum in intemperie pectoris, aut
pulmonis frigida, a qua tussis proueniat. Et in
obstructione pectoris, aut pulmonum a ma-

*Asthma.
Ventriculi
imbecillitas*

asthma, eandem viuendi rationem calfacien-
tem & siccantem & in intemperie vetriculi fri-
gida & humida, a qua ventriculi imbecillitas
procedat, alimenta iubẽtes delicata, coctu fa-
cilia, parũ humida, coctioni prospicientes ex-
ercitatione, somno, taciturnitate, & silẽtio, &
admotis caloricis siccantibus. Ad eundem

*Hydrops.
Ascites.*

modum in intemperie hepatis frigida & hu-
mida, a qua imbecillitas, & hydrops. Et in hy-
drope sane & ascite, alimenta pipere condiũt
gariophyllis & similibus aromatis, paucaq;
exhibent cibaria (si vires valent) vt calor natiuus
aquas illas interea resoluat; vinum albũ sed
paucum vinosum tamẽ, nisi fuerit a causã cali-
da aqua semper est fugiẽda. In tympanite ea-
dem victus ratione calida sicca, sed præter hæc
flatus resoluẽte, & fuga eorũ omniũ quę flat⁹
gignunt.

gignunt. Ad alimēti similitudinem aerem eligunt calidum & siccum, natura partis anni, aut industria ignibus luculētis: & suffitibus aromatum, exercitationem & vigiliam largiorem, quiete & somno magis salubrē, nisi magna ex tumore spirandi difficultas prohibeat.

Ad eundem modum in hepatis obstructione *Epatis ob-*
structio. victus ratione tenuem & attenuantem, præsertim vbi multus & crudus est succus, post coctionem vinum album tenue, cappares, radices petroselini, cichorei, apii, fœniculi, fugā vinorum crassorum & dulcium omnium, & acerborū, & crudorum, & caterorū crassum & lentum succum gignentium: somni item diurni, præsertim mox a cibo, & diurni.

Ad eundem modum in intemperie frigida *Lienis intē-*
peries frigi-
da & obstru-
ctio. lienis: & obstructione: & in renum intemperie frigida, ad quā renū sequitur obstructio, & calculus, cibos exhibent euchymos, & par-

cius quam pro appetentia, vitando ea omnia, quæ pituitam calculi materiā in corpore augent, qualia sunt alimēta crassa, frigida, lenta, & caseum omnē, præsertim glutinosiorē, aues

aquatīcas, partes animalium pingues & albas, vt extremitates, præsertim intestina, cibū largiorē, venerem, somnum, laborē, & huiusmodi.

Ad eundem modum in vteri intemperie frigida, a qua proueniat mensium suppressio, *Mensium*
suppressio.

& vteri obstructio. Ad eundem modum in appetentia immoderata a pituita multa frigida acida, victus ratione calida sicca omnibus *Appetentia*
nimia a pi-
tuita acida

Vifio imbecillus a multa humiditate.

Suffufio. Lumbrici.

Melancholici humoris vitia.

pituitofis affectibus communi, præterquam quod actia, vt capæ, allia, porri, linapi, acidæ pituita incidendo, tergendo, tenuando profunt: fed cum appetentiam excitent, ob id ratione fymptomatis hoc cafu funt fugienda, aliis tamen pituitofis funt falubria. In vifione imbecilli ab humiditate multa, victus ratione calida, tenui, ficcante, vt acre natura partis anni, & ventorum ficcò, aut industria per ignem luculentum, per fuffitus aromatum, vt garyophyllorum, foliorum ficcorum rofismarini, maioranæ, lauri, & proba cibi & potus parci coctione in ventriculo, atque eius vacuatione per deiectoria potius, quam vomitoria pharmaca, & fumtione poft paftus eorum, quæ vapores in caput ferri prohibent, veluti panẽ toftum, coriandrum toftum vel conditum, cidoniatum, atque efu lentis multo, vifionẽ ab humiditate larga imbecillam iuuante Gal. i. alim. Eadem in fuffufione, in lumbricis eadem viuendi ratione calida, ficca, acri, & amara, in quantitate parca. Sed hæc de modis & materiis, quibus qualitates humoris pituitofi diuerfos affectus efficientis in corpore humano, immutari poffunt. Sequitur humor melancholicus, qui fane cū fit frigidus, & ficcus, calfactione & humectatione reducendus erit. Atque hoc eft illud cur practici in melancholia iubeant viuendi rationem temperatã potius quam calidam, temperatam fcilicet & humectantẽ: pro cibo capos, gallinas, phafianos, hædos,

hædos, verueces elixos non assos nec frixos,
 adiecta portulaca, lactuca: aërem eodem mo-
 do alterationis per vaporem decocti maluæ,
 altheæ, violæ, per odores gratos, & blandos
 somnum concilians, frictionibus, fotu par-
 tium extremarum diuturno, & capitis modi-
 co, ex decocto lactucæ, foliorum salicis, semi-
 nis papaueris albi, seminum lactucæ, syrupum
 papaueris post cœnam exhibentes, frontem &
 tempora vngentes oleo violato, & nimphæa,
 vnguento populeo, clysteribus ex simili ma-
 teria, per quæ si somnus non conciliatur; trā-
 seunt ad opiata clementia, præsertim viribus
 imbecillibus. Sed hæc de modis & materiis
 alterandi, & restituendi causam antecedentē
 penes qualitates immutatas pristinis suis qua-
 litatibus. Illud modo non est ignorandū, præ-
 ter viuendi rationem syrupis etiā alterari pos-
 se: atque hoc est illud, cur practici pro bilis al-
 teratione, succo citri, seu syrupo de acetosita-
 te citri vtuntur, qui valet ad omnes ægritudi-
 nes biliosas, & ex purâ bile natas, & pestilētes,
 & symptomatibus biliosis, vt siti vehementi,
 & huiusmodi aliis, cum subduplo aquarū inti-
 bi, lactucæ, cichorii, plantaginis, portulacæ,
 lupuli. In ventriculi autem inflammatione, &
 bile repleto, atque in magnis æstibus ad leuā-
 dam sitim, & in febribus biliosis, & vomitu ex
 bile, syrupum de agresta: vbi autem & refrige-
 rare, & aliquantulum astringere, ac non nihil ab-
 stergere volunt, melle rosaceo vtuntur, Pro

*Somnum
concilians
tia.*

*Bilis alte-
ratio per
syrupos*

*Syrupus ace-
tositatis
citri.*

*Sitis vehe-
mens.*

*Ventriculi
inflamma-
tio.*

*Febres bi-
liosæ.*

*Vomitus
ex bile.*

*Pituita al-
teratio per
symples.
Nervorum
agritudines
frigides.*

*Oxymel
scyllitium.*

*Melancholia
alteratio.
Mania.*

*Cutis mor-
bi a salsis
& adustis
humoribus.*

alteratione vero qualitatum pituitæ, syrupo de corticibus citri, syrupo de stœchade, quo vtuntur ad omnes agritudines neruorum frigidas, veluti est paralyfis, epilepsia, spasmus, tremor, incompleto quidem vtentes cum nō multum, completo autem cum multum calfacere volunt, oximellite simplici, oxysaccharo, oxymellite composito valentiori ad agritudines longas, aperiente, incidēte, & abstergente, oxymellite scyllitico valentissimo pro materiis valde frigidis, valde glutinosiss, valde tenacibus, & vbi in locis sunt, a quib. difficile euellūtur. Pro alteratione vero melancholiæ, syrupo de pomis: ob id in mania & melācholia eo vti solent: syrupo de fumo terræ, quo vtūtur in morbis cutis a salsis & adustis humoribus pendentibus: syrupo de epithymo, quo vti solent ad atrabilarios, & adustos affectus, quique calidior est, quā is, qui de fumo terræ, cum duplo aquarum buglossi, vtriusque inti-bi, icolopendriæ, fumariæ, lupuli. Sed hactenus de alteratione humorū, vbi solitarie sunt vitiati. Quod si humores vitiati erunt plures vno, qui simul sint permixti, si duo erūt, cibaria erunt componēda secundum naturā duorū humorū: & si tres, cibaria erunt cōponenda secundum naturā triū humorum, aduertētes semper dominiū vnius humoris ad alterū: & in compositione cibariorū tanto plus ponentes illius cibarii, quanto magis prædominabitur humor alteri humor. Atq; hoc est illud, cur

cur practici vbi adfunt simul materiæ calidæ & subriles, & materiæ crassæ, & glutinosæ simul, vtutur syrupo acetoso simplici satis facientes his duobus contrariis humorib. simul, diuersis qualitatibus, quibus pollet: nimirum cum ratione aceti incidat, alteret materias crassas & glutinosas, eas attenuando: ratione vero aceti quod frigidū est, vitiiis bilis succurrit: subtilitati scilicet & caliditati. Vnde tametsi huiusmodi syrupus non videatur valere in materiis frigidis & crassis, ratione frigiditatis: valet tamen ratione incisionis, quanquā etiā possit, vt ait Mesue, tolli ab eo virtus infrigidandi, nō remota eius penetratione, addentes non nihil calidi, veluti cinnamomū, aut radices calidas aperientes, quæ non solum frigiditatē remouent, sed etiam ad penetrationem, & resolutionē adiuuāt: vtuntur etiam syrupo acetoso completo, seu de duabus radicibus, veluti fieri solet in febribus biliosis nothis. amplius syrupo de quinque radicibus, quiauctorem nō habet, & syrupo bisantino in materiebus crassis, glutinosis, & obstructionibus magnis; in hisce syrupis hunc ordinem obseruantes: in aperiendo vt primus sit acetosus simplex: secundus, de duabus radicibus sine aceto: tertius de duabus radicibus cū aceto: quartus, de quinque radicibus: quintus, bisantinus sine aceto, sextus, bisantinus cum aceto. His omnibus sane pelluntur vitia causæ antecedētis penes qualitates, quæ quoniā viuendi ratione maxime

*Syrupus
acetosus.
Simplex in
materia ca-
lida, tenui
& crassa
glutinosa.*

*Febres bi-
liosæ nothæ*

*Obstructio-
nes magnæ.*

*Alimenta
temperata,
simplicia.*

*Pro altera
tione san-
guinis.*

Bilis.

Pituita.

immutari possunt: sequitur ut pro clariori superiorum doctrina, alimenta præcipua enumeremus, quæ in usu frequentius esse solent, tum simplicia, tum composita pro immutandis qualitatibus humorum in humano corpore existentium; incipientes ab alimentis & cibariis temperatis. Porro alimenta temperata erunt panis optimus, vinum mediocre: ex carnibus, pulli, capo, perdix, phasianus, hœdus, vitulus, capreolus, aues minutæ, & ouum, albumen scilicet cum vitello: hismet alimentis aliquantulum alteratis uti poterimus pro immutandis vitiatis qualitatibus ipsorum humorum. Et primum sanguineis: Panis enim optimus seminibus frigidis alterari poterit: vinum potest omitti, & eligi aqua hordei, carnes eadē, quæ temperatæ: & hoc, quod carnes distemperatæ aut nullæ aut paucæ reperiantur: unde etiam alterari poterunt in decoctione lactucæ, & huiusmodi aliis: pisces laudabiles friabiles ex aquis currentibus, cum sint frigidi, & humidi: saliti vero omittendi: ouum simul cum albumine, pro ferculis olera omitto, & hordeum eligo: acetarium ex lactuca, endiuiæ cum aceto & oleo omphacino: ex fructibus pira, & citronia. Hæc eadem vitiato sanguini deputata: eadem bilis immutationi convenient, dummodo tum panis, tum cætera fere omnia enumerata frigidioribus alterentur. Qualitatibus vero pituitæ panis optimus seminibus anisorum alteratus, potus vini, quod calidum est & siccum,

ficcum, carnes eadem, sed alteratæ in deco-
 ctione: quāquam aues ex seipsis ad caliditatem
 & siccitatem videantur declinare: pisces salsi *Aues.*
 potius quam recentes: ex granis cicer albū re-
 cens, sed ficcum: ex herbis petroselinum, ace-
 tarium ex menta, salua, borragine, & cappari-
 bus: ex fructibus ficus, phislici, ex agruminib.
 seu acribus allium, cœpe, porrum, anisum, fe- *Melancho-*
 nculus, cinnamomū, piper, garyophylli, gin- *lia.*
 giber, crocus. Qualitatibus vero melancholiæ
 panis optimus, vinum album, carnes eadem
 temperatæ, præsertim gallina: in calida & hu-
 mida, castratū: porcina calida & humida recēs,
 si eius viscositas remoueatur, pisces omitto:
 ex olerib. borraginem eligo, ex quibus aceta-
 rium confici poterit, quamuis acetū nō videat-
 ur conuenire, nisi gratia præparandi, vt inci-
 dendi, aperiendi, & huiusmodi: ex fructib. vuā *Vua matu-*
 maturam, quæ calida est in 1. humida in 2. agru- *ra.*
 mina fugienda: ex aromatibus eadē quoquo-
 modo, quæ in phlegmatica, præsertim saccha-
 rum conuenit. Hæc de simplicib. cibariis. Sci-
 endum modo, quod non solū iis simplicibus,
 sed etiam compositis alimentis vti possumus *Alimenta*
 pro immutandis qualitatib. vitiatis causæ an- *composita*
 tecedētis. Et primū in ægitudinibus a sangui- *in ægitudi-*
 ne, cum panis bonus temperatus sit, si deco- *nibus a san-*
 quatur cū aqua simplici, sit cibarium quoddā, *guine.*
 quod vulgo panata dicitur, euadens frigida, & *Panata*
 humidæ complexionis in primo. Ad eundem *quid.*
 modum si fiat ex iure pulli, cum aqua a pullo

S

*Oui altera-
tio.*

Ptisana.

*Ius consum-
tum.*

*Ius non con-
sumtum.*

*Alteratio
bilis per ali-
menta com-
posita.*

nullam recipiat caliditatem, si commiscebitur ouum cum panata, remouebitur inflammatio ouia frigiditate panata: quanquam potest etiã ouum in aqua frigida infundi per tres horas, aut aqua endiuia, aut rosarum, secundum diuersitatem scoporum. Poterit etiam panata misceri cum seminibus maioribus frigidis, & alterari etiam, si in ea ebulliant, aut succus granatorum, aut aranciorum, aut omphaciũ, aut olera frigida. Ad eundem modũ, si hordeum decoquatur cum aqua simplici, aut pulli iure, fit ptisana: vbi timebitur viscositas, addendum erit saccharũ: vbi maiori frigiditate opus erit, alteranda erit cũ magis frigidis: si virtutis erit habenda ratio, ius erit exhibendum cum carne contusa, alteratum ad frigidum secundum quod opus erit. Quod quidem ius dupliciter fieri potest: altero modo ex ebullitione pulli vsq; ad separationem carnis ab osse, & appellatur ius consumtum: altero modo ex ebullitione pulli ad dimidium consumptionis, & appellatur ius non consumtum. Acetarium conuenit ex lactuca, borragine, & endiuia in aceto decoctis: carnes nullæ conueniunt, vbi peccat sanguis, sed magis pisces laudabiles, rationem tamen consuetudinis habendo, exhiberi solent. Sapores varii confici poterunt, ex vino granatorum, succo aranciorũ, aut limonium, mororum, aut prunorum. Sequitur, vt agamus de alimentis compositis pro immutandis qualitatibus ipsius bilis: panata eadem quæ

quæ in sanguineis conueniens erit, magis alterando compositionem, secundum quod opus erit: ptisana eodem modo. Poterit autem infundi hordeū per quatuor horas in aqua frigida antequam igni apponatur, reddiq; poterit frigidior ex permixtione rerum acidarum, & herbarum: ius consumtum, & non consumtum eodem modo. Carnes etsi non conueniant per se, alterata tamen erunt conuenientes, præsertim pedes animalium, veluti vitulorum in aceto maceratorum: pisces laudabiles, acetarium idem, sapor ex omphacio idem: potus erit aqua hordei, syrupus acetosus simplex, iulep violatum, iulep rosatum, aut vinum pauciferum, secundum quod opus fuerit.

Composita vero medicamenta pro immutandis qualitatib. humoris pituitosi, quia ratione, qua solet efficere ægritudines longas, alimenta etiam magis nutribilia postulabit, veluti panatam in iure pulli, ptisanam cum modico sacchari, & cinnamomi, cōtusum ex carnibus aut temperatis, aut calidioribus, aut arte alteratis: ex herbis fœniculus, borrago, mētha, saluia, quibus etiam alimenta poterunt alterari, abiiciendo folia, quæ male digeri solent: ex granis, cicer rubeum in iure decoctum: & vbi præter hæc opus erit apertione aliqua viarum, veluti earum, quæ mictioni deseruiūt, decoctio erit siēda cū ciceribus, cū radice fœniculi, & petroselinii: & ex iisdē herbis fieri poterit compositū, quod Torta vulgo

*Pituita per
alimenta
composita
alteratio.*

Torta.

appellatur, cum ouo, lacte acetoso, & caseo recenti parum salito. ex fructibus ficus sicca, pineoli, amygdalæ, vua bene matura, pirū cū aniso comestum: potus, aqua decocta cum saccharo, aut aqua hordei cum saccharo, qui variandus postea erit pro variatione ætatis,

*Melancho-
lia qualitatū
immutatio
per alimen-
ta compesi-
ta.*

*Morbi chro-
nici sunt
etiā ab hu-
more Melā-
cholico.*

complexionis, consuetudinis. Sequuntur ali-
menta completa pro immutandis qualitati-
bus melancholiæ: panata primū, ptisana, con-
tusum, ius non consumtū, & consumtum, q
etiā ab hoc humore morbi chronici fieri so-
leant, & eodem modo paranda, quomodo in B
pituitæ qualitatibus immutandis; hoc dunta-
xat variato, quod in pituitosa, omnia debent
declinare ad siccitatē, in melancholica ad hu-
miditatem: quanquam etiam in gradu quali-
tatum actiuarum videatur esse aliqua differē-
tia; quod pituita dicatur esse frigidior melan-
cholia. Ex herbis borago, ceteris omnib. me-
lior: in progressu sceniculus, petroselinū, oua:
ex carnibus, carnes temperatæ, & declinātes
ad calidum, & humidum: quoad modum sub-
stantiæ elixæ, assis meliores: pisces petrosi eli-
xi, cum speciebus conditi, de quibus in me-
lancholia: acetariū ex boragine. Nam tametsi
acetum non videatur competere ratione si-
milis complexionis, multos tamen alios vsus
habet. vt ex Mesue patet cap. de syrupo aceto-
so. sapor fieri poterit ex succo pomorum dul-
cium, saccharo cū aceti modico: ex fructib. v-
ua bene matura suspēsa, poma dulcia, præfer-
tim

tim apia, & pira omnia decocta, vt humiditas excrementitia tollatur: potus aqua saccharata, aut hordei aqua cum saccharo; & melior aqua mellis, in proportionē decupla: potusq; nō sit multum actū frigidus, vinum non stipticum, aut ponticum, sed ad dulce potius tendens, coloris albi. Hæc sunt alimenta tum simplicia, tū arte cōposita, quorum præcipuus, & frequentior vsus in praxi esse solet, pro immutandis qualitatibus humorum solitarie peccantium. Quoties modo affecti humores nō erunt solitarii, sed simul associati: si duo erunt humores peccantes, alimenta erunt simplicia commiscēda, quæ faciant pro immutandis qualitatibus vtriusq; humoris. eodem modo si tres fuerint, semper aduertentes dominium vnius humoris ad alterū; & in compositione alimentī illius tanto plus ponētes, quanto magis prædominabitur humor alteri humori. Hæc hætenus de modis pellendi vitia causæ antecedentis penes qualitates oborta, & de rationibus viuendi diuersis penes qualitates præcipue consideratis. Nam de substantia alimentorum, & quantitate suo loco a nobis pertractatum fuit, cum affectus præter naturam nō indicent substantiā alimenti, seu nutriendum esse, sed qualitatē solam, quæ se tenet ex parte medicamenti. Sequitur vt aggrediamur tertiū remedii genus, q̃ vitium contentorum penes quantitatē obortum emēdat: vacuatio appellatur; præsertim cū humorū vitia adeo a

*Vacuandi
duo sunt
genera.*

Purgatio.

*Euacuatio
quid.
Purgatio est
euacuatio
particularis
Phleboto-
mia, uni-
uersalis.*

naturali constitutione recedunt, vt neq; viuendi ratione, neque alteratione sola emendari, & in pristinam bonitatē reduci possunt, nisi penitus e corpore eiiciantur. Quoniam vero eiici, & euacuari poterat humor vitiosus in venis contentus duplici modo, vel solus vtili relicto, vel associatus, & vtili humori permixtus, ortum etiam habuerūt circa ipsam vacationem duo præcipua vacuandi genera; alterū quidem purgationis, qua mediante id solum quod vitiosum est, & qualitate peccat, e corpore eiicitur; alterum vero quo mediante, vitiosus simul cum vtili permixtus euacuatur; phlebotomiæ nomen adeptum fuit: quorum singulum est percurrendū, incipientes a purgatione. PURGATIO porro est euacuatio particularis eius repletionis, quæ virtuti corporis vim infert, facta medicamento recte & conuenienter exhibito, vt amissa contentorum proportio, pristinæ suæ naturali cōstitutioni restituatur. Ideo autē dicitur purgationem esse euacuationem, quod euacuatio sit commune genus tum pharmaciæ, tū phlebotomiæ. Euacuatio autem nihil aliud est, quā depulsio, seu excretio humorū in corpore peccantiū. Et quod sequitur: Purgationē esse euacuationem particularem, ad id spectat vt sciūgatur a phlebotomia: cū phlebotomia sit quidem euacuatio: sed euacuatio omniū humorum æqualiter: pharmacia vero sit euacuatio determinati humoris dūtaxat. Quotuplex autem

tem sit huiusmodi purgatio particularis, inferius fiet manifestum, vbi agemus de differentiis euacuationis per pharmacū. Quod postmodum sequitur: Purgationem esse euacuationem particularem eius repletionis, quæ virtuti corporis vim infert: notat affectum, quæ purgatio sanare debet, in qua non adest peccatum omnium humorum æqualiter, sed alicuius duntaxat humoris determinati, vel quantitate, vel qualitate peccantis. Et quod sequitur: Purgationem esse euacuationem particularem eius repletionis, quæ virtuti corporis vim infert, facta medicamēto, notat materiā, seu instrumentum, quo mediante huiusmodi repletio euacuari potest. Euacuat autem medicamentum humorem vi sua, quæ nihil aliud est, quam similitudo quædam, vt ait Gal. 3. de simp. facul. quæ imbuens ventriculum sui facultate attrahendi, facit vt vētriculus cogatur, interim ppria eius actione sopita, ad seipsum violenter attrahere, nūquamq; desistit quoad vis medicamenti resoluta fuerit, & a naturali calore deuicta. Atq; hoc est illud, cur Hippocrates, corpora purgāda fluida pri^o esse faciēda voluerit, & nō licere medicari nisi cōcocta, tū vt vasa, per quæ trāsituri sunt humores qui trahūt, aperta fierēt, tū vt humores, si crassi sunt, & crudi, absterfione, & attenuatione pparati facili^o trahi possent: aut si humor nimis acris esset, obtūderet, ne in trāsitu abraderet, & partes excoriaret, p quas violēter attrahit humor.

*Purgantia
quomodo
euacuent.*

*Concocta
tantum me-
dicari licet.*

*Ad artem
purgandi
quatuor re-
quiruntur.*

*Crisis abso-
luta condi-
tiones*

*1
Quando sit
purgandum*

2

3

4

Quod postmodum sequitur: Pharmaciam fi-
eri medicamento recte, & conueniēter exhi-
bito, notat artem purgandi, quæ quidem ar-
te fiet quoties ars illa curandi prioribus lib.
declarata, ad hanc particularē actionem me-
dicā purgandi humores flectetur. Ars autem
illa curandi, cum recte & conuenienter fiat, si
trium præcipue habeatur ratio, affectus, loci
affecti, & ipsiusmet medicamenti: amplius, &
circumstantiarum, sequitur etiā quod ars pur-
gandi ex horum quatuor obseruatione recte
fiet. Primum tamen antequam hæc percur-
ramus, considerandum erit, vtrum sit pur-
gandū, necne. erit autē tunc purgandū, cum
indicatio integra non erit. integra autem non
erit ex deficientia alicuius harum sex condi-
tionum necessario requisitarum ad absolu-
tam crisin. Primum quidem, aut si non eua-
cuetur totum, quod euacuari debebat a natu-
ra: tunc enim euacuāda erunt reliquæ, quæ
superfunt: quod quæ relinquuntur in mor-
bis recidivas facere consueuerint, vt ait Hip-
pocrates: aut si materia non erit concocta.
Tunc enim concoquendum erit, epicrasis
facienda, incrassando, attenuando, & singu-
lis omnibus per oppositum naturam sem-
per adiuvantes: aut si per debitos locos a na-
tura non fiat: veluti si pituita, quæ inferius e-
duci deberet, per vomitum educeretur, &
emiseret symptomata sæua, tentanda erit e-
uacuatio per aluum: aut si alius humor eua-
cuetur

cuetur a natura ab eo qui euacuari debebat, vt si peccāte, vel bile, vel pituita, tempore indicationis erumperet sanguis, vel per nares, vel per hāorrhoides. Tunc enim frictionibus diuertendum erit ad oppositū, quod nullus fluxus ex toto, vt ait Auicēn. sit reprimendus, nisi qui deducturus est ad casum virtutis: aut si recto tramite a natura non fieret:

B veluti si in purganda materia in hepatis concavo existente, natura per vrinam euacuare vellet, cum ille rectus trames non sit: & hoc, quod opus sit vt ascendat ad hepatis gibbum; adiuuanda erit natura, vt illam vacuet, vel per vomitum, vel per intestina: & hoc, quod concavum hepatis colligantiam habeat cū mesaraicis; mesaraicæ autem cū intestinis. Sed hæc de primo, quod obseruandum est antequam purgatio fiat. Sequitur vt percurramus artem purgandi, a curationis arte directam. Porro cum affectus primum sit inuestigandus: (affectus autem nomine complector tum naturam affectus, tum ea, quæ necessario consideranda sunt pro recta cognitione ipsius affectus) sequitur quod etiam in purgatione perpendendum erit quid sit purgandum, seu euacuandum per medicamentum purgans. Quod quidem indicabitur ab eo humore qui peccabit, aut bile, aut pituita, aut melācholia, si simplex erit humor, qui peccabit: aut ab humoribus qui peccabunt simul commixtis, vt bile pituita, bile melācholia, pituita melācholia, bile

5.

*Quid sit
purgandū.*

*Purgandi
quantitas
vnae peten-
da.*

*Validitas
aut imbecil-
litas purgan-
tis unde in-
dicetur.*

*Corporis
tres prae-
cipuae sunt se-
des.*

pituuta melancholia. Haec autem omnia signis propriis fient manifesta: de quibus in arte cognoscendi affectus omnes praeter naturam, verius a nobis actum fuit. Post inuentam humoris purgandi naturam, considerata postmodum erunt ea, quae necessario consequuntur affectum: nempe quantitatem affectus, & tempus. Quantitas autem cum elicienda sit ex quantitate affectus, & situs, in quo reperitur affectus: ut supra in arte curandi notatum fuit: sequitur etiam, quod quantitas purgandi erit elicienda ex quantitate humoris peccantis & ab humoris situ. illud tamen non erit ignorandum, quod etsi quantitas purgandi indicetur a quantitate humoris peccantis nunquam tamen licere, vlla medicamenti specie vique ad syncope impurgare, quemadmodum licet in missione sanguinis. Quam valido aut imbecillo medicamento hoc sit peragendum indicabitur ab humoris situ, validius, & minus validum eligentes medicamentum, pro varia trium sedium corporis regione; & hoc, quod non quodlibet medicamentum e quouis corporis loco humorem detrahat: sed pro varietate sedium corporis, varia etiam medicamenta sint eligenda. sedes autem corporis cum tres praecipue sint, alia quidem, quae primam corporis regionem possidet; ventriculum sane, intestina, venas mesaraicas, hepat, & lienem complectens: secunda vero, quae vasa maiora: tertia vero, quae habitum, & singulas

singulas corporis particulas respicit: sequitur
 etiam quod humores, exsistentes in prima re-
 gione, mitiori medicamento erunt purgan-
 di: mediocri vero e vasis maioribus: valentio-
 ri vero ab vniuerso corporis habitu vt non ab
 re secundum tres corporis regiones, tres et-
 iam purgantium medicamentorum ordines
 accommodari possint. Ex his sane quãtitas pur-
 gandi præfinita deduci poterit, quanquã illud
 sit aduertendũ, humorum repletionẽ seu quã-
 titatem, & humorũ situm, confusam purgan-
 di quantitatem indicare: certam autem & de-
 finitam, a virtute, & annexis virtuti circum-
 stãtiis sigillari; vt infra patebit. Sequitur tem-
 pus purgandi, quod quidem a duobus indica-
 bitur, a morbi, seu materiæ morbi concocti-
 one; fiet autem concoctio calidis in primo
 gradu, seu exterius, seu interius sumtis: nimi-
 rum quod, vt ait Galenus, post concoctionem
 purgantes, plura habeamus purgationem ad-
 iuuantia: primum, quod repleat bonum a
 malo separatum: secundo, quod eo tem-
 pore natura vtatur expulsionẽ post conco-
 ctionem, consequenter trahendi medicamẽ-
 to auxilietur, & a morbi impetu defendat. E-
 rit autem morbi impetus, vbi morbus acutus
 erit, & cum periculo, cuius sæua sympto-
 mata sint, & materia turgens & factiosa, & in
 motu oberrãs. Licet n. tũc in principio (prin-
 cipiũ autẽ intelligo nõ illud, in quo incipiunt
 apparere concoctionis signa) sed pro primo,

*Purgantiũ
 sunt tres or-
 dines.*

*Purgandi
 definita
 quantitas
 vnde suma-
 tur.*

*Purgandi
 tempus a
 duobus in-
 dicatur.*

*Concocta
 purganda
 sunt.*

*Morbi im-
 petus.*

*Tempus anni
purgationibus aptū.*

*Dies purgationi com-
modus.*

*Locus purgationi com-
modus, indi-
catur.*

*1. A natura
humoris.*

aut secūdo, aut saltem tertio die, purgare licet medicamento. Ob id Hippocrates, In acutis, inquit, passionibus raro, & in principiis medicamentis purgantibus uti: & hoc cum præmeditatione faciendum. De temporibus autē anni, purgationi aptissimum erit ver, dein autumnus, aut quæ illis similis sit constitutio temperata: dies non aquilonia, sed austrina, quæ & corpora laxat, & humores liquefacit. Dies autē purgandi commodus cum ex viribus ægri habeat summi: vires autem melius se habent in die tranquillo quam in perturbato: utpote quod a morbo ægri minus fatigetur: atque in febrium intermittentium quiete medicamentum tāto ante accessionem præbendū erit, quo possit purgatio compleri: ubi autem accessiones quotidie fient, aut febres erunt continentes, nullaque sit intermissio, aut adeo brevis sit, ut non sufficiat nec ad cibum, nec ad medicamentum exhibendum, remissionis & inclinationis tempus erit eligendum. Hactenus de affectu. Sequitur locus, seu viæ per quas purgandus est humor affectus. Porro indicabitur locus purgationi commodus tum ex natura, seu inclinatione humoris purgandi, tum a facultate expultrice illius humoris, tum a vasorum consensu, per quem materia inclinans, & a natura expulsa duci debet: a natura quidem humoris: veluti pituita frigida cum sit crassa, consequenter grauis, per secessum potius quam per vomitum erit ducenda. Eodem modo hu-

mor melancholicus cum terreus sit: bilis autē flaua cum lenis sit, oppositum habens motū, consequenter per vomitum, & per superiora erit ducenda veluti etiam sanguis si subtilis sit, per eruptionem sanguinis narium, si crassus, per hæmorrhoides, & inferiora ducendus erit, atq; hoc est illud, quod ait Hippocrates: hyeme a vomitu cauēdū esse, æstate vero maxime esse adhibendum. A natura vero virtutis expultricis, quod medicus illac materiam ducere debeat, quo virtus expulsiua noxium humorem expellere tentat: vasorum quinetiam debet esse consensus, qui cæteris magis necessarius esse videtur. Nam esto quod natura humoris inclinaret ad aliquam partē: esto quod natura illum pelleret eo, quo inclinat: si tamē non aderit vasorum consensus, per quæ materia est ducenda, diuertēda erit natura ad locum vbi sit consensus: quamquam vasorum affinitas & consensus a duobus impedi possit: a loci nobilitate, nimirum quod per locum nobilem materia non sit ducenda, sed aliorum vertēda: & a morbo, qui purgationis vias intercipiat: nimirum quod noxius humor nūquam per affectam sedem sit ducendus, atque hoc est illud, quod ait Hip. 21. Aphorismo. Et per conuenientes regiones materiam esse ducendam. Quibus fundamentis innixi qui praxim exercent: esto quod ventriculus, & præcordiorum partes summæ ratione affinitatis vasorum vomitione sint expurganda: nisi ta-

*Hyeme cur
sit cauē-
dum a vo-
mitu.*

*2. A facul-
tate expul-
trice humo-
ris peccan-
tis.*

*3. A consen-
su vasorum.*

*Vasorum
consensus a
duobus im-
peditur in
indicādo.*

*Ventriculus
quando vo-
mitu purga-
ri prohibeat*

*Intestina non
semper cly-
stere purgā-
da sunt*

*Renes &
vesica quā-
do per uri-
nas purgari
non debent.*

*Purgationi
præmittenda
est præpara-
tio, quæ du-
plex est.*

*Humores
subtiles et
in coctione
indigent.*

men imbecillis sit ventriculus, aut syncopiam pati soleat, vomitionem non cient: intestina quin etiam maxime crassa, etsi alui perfusione vacuētur, si tamen intestina aut vlcere aut inflammatione laborent, bilis aliorum erit pellenda. Renes vero & vesica, tametsi per urinæ vias expurgētur, si tamen renes sint inflammati, aut exulcerata vesica, non amplius per urinam, sed ad intestina introrsus humor erit conuertendus. His omnibus sane recte perpen-
B
pensis, habebitur locus & via, per quam commode purgatio fieri possit. præter hæc tamen cuiusque purgationi præmittenda erit antecedens sua præparatio, quæ quidem duplex est; altera corporis seu viarum, per quas ducendus est humor, altera vero vacuandorum humorum. Corporis autem præparatio fiet, quoties viæ in aluum patentes erunt. Atque hoc est illud, quod ait Hippoc, Corpora, qui purgare voluerit, oportet fluida facere. Vacuandorum autem humorum præparatio fiet, crassos incidendo, attenuando, viscidos abstergendo, subtiles velut bilem, non quidem in crassando, quod semper subtiles humores euacuationi apti sint, non tamen propter hoc credendum erat, coctione non indigere, ut male opinatus fuit Rasis: melancholicos, cum crassi sint, incidendo, & calfaciendo, & humectando rebus calidis & humidis. De quibus sane præparandi modis satis superque egimus in arte depellendi vitia contentorum penes qualitates ob-
orta

orta. Sed hæc de affectu, & loco per quem descendus est humor affectus, necessario requiritur pro recte & conuenienter purgatione fienda. Quoniã vero iis solis nõ adhuc plene, perfecte, ac cumulate ars euacuandi per medicamentũ purgans haberi potest: sequitur, vt circumstantias percurramus, quæ conditiones superius enarratas, tanquam animus regere ac moderari debeat, incipientes a virtute. Virtutis autem nomine intelligo non solum vitale (quanquã hanc præcipue) sed & animalẽ, & naturalẽ. Virtus igitur, cũ erit purgandũ, vel erit valida, vel imbecillis: & si valida, vel erit cũ multa, vel cũ pauca cacochymia associata. Si igitur virtus erit valida, & cacochymia multa: & si copia humoris indicet multũ esse purgandũ, & virtutis robur: vniuersa tamen semel & affatim non erit detrahenda, sicuti plethora, venę sectione; & hoc q̃ in purgatione multę cacochymię vniuersim facta, necesse sit corpus grauitè concuri, humores varie permisceri, torsiones molestas inferri, ac spiritus dissipari, tandẽq; vires concidere ac prosteri. Atq; hoc est illud q̃ ait Hippocrates: Enacuationes omnes extremas periculosas esse. Et alibi: Empii aut hydropici cũ vrũ aut secatur, si pus, aut aqua vniuersim effluerit, omnino moriuntur. Sin aut virtus cõstas sit, & pauca cacochymia, vniuersa semel & affatim detrahi poterit, præsertim vbi erit cõcocta aut tenuis, ab eaq; viẽ pateat in aluũ. Sin aut virtus debilis erit aut erit

*Purgandi
artis varia-
tio per circũ-
stantias.*

*A virtute
valida cum
multa caco-
chymia.*

*A virtute
valida cũ
cacochymia
pauca.*

*A virtute
imbecillis ex
aggravatio-
ne.*

*A virtute
debili ex re-
solutione.*

*Purgandi
artis varia-
tio per aeta-
tes.*

*Per habitū
corporis.*

debilis ex oppressione naturæ ipsam oppri-
mentis, aut ex resolutione: si erit imbecillis ex
aggravatione, cum hic adsit repletio quo ad
virtutem, non autem quo ad vasa, cōsequēter
nō possint adesse boni spiritus, nec multa vir-
tus: non tolletur quidem indicatio euacuādi:
sed cum virtus hoc non toleret, parum erit
euacuandum, & ad reliquum epicrasis erit fa-
cienda. Sin autem erit imbecillis ex resolutio-
ne, cum purgationem virtus non toleret, epi-
cralis solum erit facienda. Gal. 8. meth. Veluti
si acres sint humores, refrigerantibus, & hu-
meſtantibus erunt contemperandi, vt inte-
rim natura instaurata vel ipsa euacuet, vel nos
simul cum illa: quāquam Auic. laudet semper
cum aliquo leniente aliquid materiæ esse sub-
trahendum, non quidem purgante, sed leniē-
te, veluti cassia, aut rhabarbaro. Aetas sequitur
ratione cuius, etsi omnes condiciones purga- 60
tionem postularent, tamen fortibus & malig-
nis medicamentis nec puerum nec senem, si-
cuti constitutos in aetate media, purgare po-
terimus, sed benignis dumtaxat: quod altera
humida sit, consequenter vaporabilis: altera
vero iam euaporarit. Ad eundem modū præ-
gnantis erit habenda ratio, ratione fœtus, quē
intus gerit. Habitus quinetiam corporis. Si n.
macilentus erit, aut nimis rarus, etiam quod
vires integræ forent aliquantulum, infra erit
subsistendum, & ex hoc quod eiusmodi cor-
pora pati soleant virium exsolutionē. Ad idem
pertinet

pertinet corpus morbo, humorumue copia *Per corporis*
 pressum, & qui circa imū ventrē extenuatur, *affectus.*
 & quibus abscessus in interioribus partib. ex-
 sistit, vel in pulmonibus, vel icore, vel liene,
 vel renibus. In his enim pro purgatione con-
 uenit inedia, victuque opportuno blandiri,
 aut sublata morbi portione ægrum leuare,
 quā expurgationis vi ægrum labefactare, qui
 facile concidere posset: Qui etiam accidenti- *Per animi*
 bus, & animi accidētibus subiecti sunt, a pur- *accidentia.*
 gatione nimia sunt cauendi, q̄ in illa facile in-
 cidere possint, nisi fuerit spasmus ex repletio-
 ne: cum melius sit euacuare, quā apoplecticū
 fieri. De tempore anni nec æstate nec hyeme: *Per anni tē*
 æstate quidē quod paucus & acer humor adsit, *pōra.*
 qui cum foras euocetur motu contrario illū
 mouemus: hyeme vero, q̄ corpus densum sit,
 & astrictum humores coarctati, qui ægre de-
 mittuntur. Ad eundem modum respiciendæ *Per regionē*
 erunt, regio atque anni constitutio, ne aut ni- *& constitu-*
 mis calidæ sint, aut nimis frigidæ. Sed hæc o- *tiones anni.*
 mnia moderata esse debēt, quod corpora sol-
 uant, laxent, & aluum humectent. Consuetu- *Per consue-*
 do quinetiā: quod cum assueti minus non as- *tudinem.*
 suetis a medicamento lacessantur, minorē et-
 iam purgationem postulēt. Ars itidē: nam ars *Per artem*
 laboriosa leuiusculā purgationem aspernabi-
 tur. Hæc omnia sane ubi conuenerint, impos-
 sibile erit quin sequatur felicissima purgatio.
 Hactenus ex quatuor in arte curādi proposi-
 tis: in arte purgādi tria expediui⁹, nēpe affe-

T

*Purgatio
quid sit.*

*Purgationis
duo sunt pra-
cipua genera*

*Prioris ge-
neris tres
species.*

*Sanguis nō
expurgatur
medicam.
cathartici.*

etum locum seu viam per quam ducendus est affectus, & circumstantias. Sequitur medicamentum: quo mediante purgatio fieri debet. Quod quidem cum multiplex sit pro diuersitate peccantis humoris purgandi: Sequitur vt prius percurramus differentias purgationis, quarū numerus determinatus ex cognitione naturae purgationis, seu quid sit purgatio manifestus fiet. Porro si verū est purgationē esse euacuationē particulare eius repletionis, quae virtuti corporis vim infert, sequitur etiam q̄ quotuplex erit repletio virtutem molestans, totuplex etiam erit purgationis species. At cū repletio quo ad virtutem fieri possit, vel ab vno humore tantū, vel a plurib. vno: igitur duo quoq; erūt purgationis p̄cipua genera: alterū simplex purgans humorem vnum duntaxat aut quantitate aut qualitate peccāte: alterum vero compositum, ita dictum, quod plures vno humores peccantes a corpore detrahat. Prioris igitur generis tres purgandi species erunt, secundū quod tria solū reperiri possunt humorum genera solitarie peccantia: veluti purgatio bilis, pituitae, melancholiae. Nam sanguis inter hos humores, qui medicamentis cathartici subduci possit, non est dinumerandus: tum quod modi extrahendi sanguinē hi fere sint, venae sectio, cucurbitula, scarificatio, sanguisuga, frictio intra nares: reliqui omnes modi attrahēdi sanguinē p̄ medicamento vim perniciosi sint & lethales, p̄ter eos qui fiūt ad sanguinē

sanguinem prouocandum ab hæmorrhoidibus, & mensib. mulierum. Amplius quod non
 B reperiantur medicamenta cathartica sanguinem educantia, quæ diuersa sint ab iis, quæ attrahunt alios humores, sed eademmet, quæ alios humores purgant, si copiose insumantur, sanguinem deniq; subducunt, & hoc in fine semper post aliorum humorum a sanguine subductionem. Ichores autem a reliquis humorib. *Ichores quo modo educantur.* distinguendos non esse arbitrati sumus: & hoc, quod omne medicamentum, quod humorem quæpiam educit, illius quoq; humoris aquositates educere sit aptum. Quo fit ut tria solum sint prioris generis humorem vnum duntaxat purgantium medicamentorum genera, posterioris vero generis humorum complicatorum quatuor erunt genera; tria quidem ex complicatione duorum humorum simul, bilis pituitæ, bilis atræbilis, pituitæ atræbilis: vnum vero ex complicatione singulorum trium humorum, bilis, pituitæ simul atræbilis, ut in vniuersum purgationum differentiarum septem sint, nec plures *Purgantium humores complicatos quatuor sunt genera.* nec pauciores: tres simplices, tres ex complicatione duorum humorum simul, & vnica ex complicatione omnium. Sequitur ut percurramus medicamenta, atq; instrumenta, quibus singulæ purgandi species in usum descendere possunt, si prius tamē prenotatum fuerit, vniuersalē hanc purgationem, qua id solum quod vitiosum est & qualitate peccat vtili relicto ducit ab vniuerso corpore, aut certe maxima illius ex parte,

tripliciter fieri posse (nunc enim habetur sermo de purgationibus illis & medicamentis, quæ ab vniuerso corpore habent subducere, non autem a partibus corporis, quoniam de iis, quæ a partibus habent subducere, inferius agetur, vbi de curatione causæ cōtinentis agemus) vel alui deiectione, vel alui perfusione, quæ clyster dicitur, vel vomitione. Singulo enim istorum vniuersales sunt corporis purgationes. Nam clyster etsi plurimum & valide regionem vnā dumtaxat intestinorū, cæteras tamen etiamnum consecutione quadam licet parcius exinanit, neque solum inferiora, sed superiora quoque consecutione quadam exonerat. Vomitio præterea etsi primum noxios humores ex ipsis fontib. sinceris elicicat, & vacuet omnem, quæ in ventriculi capacitate, eiusue tunicis hæret, illuuiem in primis expurget: regionem hanc tamen prætergressa & præcordiorum etiā membranis, & cauis iecoris ac lienis, & ex pācrea omnis generis superuacuos humores sinceris elicit, quod in ventriculū ex iis locis viæ breues, ac expeditæ magis quam in aluum directæ sint, per quas facilis est vomitio: ac quāquam primū ab interioribus eliciat, consecutione tamē caput, reliquumq; corpus leuat. Ex quo iā manifestū esse potest, hosce tres purgandi modos: alui scilicet deiectionē, clysterē, & vomitionē, vniuersales esse, ad differētiā particulariū purgationū, quæ partem aliquam corporis determinatam dū-

*Clyster est
vniuersalis
purgatio.*

Vomitio.

*Purgationes
particula
res.*

taxat expurgat: cuiusmodi sunt cerebri per palatum & nares expurgatio: excreatio: quæ pulmonum & pectoris vitia excutit: arenularum aut puris e renibus emictio; sanguinis ab utero, aut hæmorrhoidib. profusio, & huiusmodi. Sequitur ut percurramus instrumenta, seu medicamenta, quibus vitii humores isti e corpore eiciuntur, incipientes ab iis, quibus humores simplices purgari possunt: Et primū ab iis, quibus bilis sola peccans purgari potest. Porro bilis rhabarbaro educetur, vel in catapotia redacta, vel in puluerē ex vino cretico, aut pulli iure, aut infusum aqua vi ignis eliquata: quandoq; etiam in ientaculis & placentulis melle subactis pro pueris. Cassia quin etiā (quanquā hæc emolliendo bilem educat, rhabarbarū vero comprimendo) uti licebit, præsertim cum bilē in viis existētem, aut etiā in propinquiore venis, educere scopus erit, vel in bolo, vel in aqua vi ignis eliquata, vel in iure pulli, modo aut cinnamomo, aut gingibere, aut aniso flatuositas eius corrigatur. Manna quinetiā vsq; ad uncias. aut in iure dissoluta. aut aqua vi ignis eliquata. Quanquā n. etiā edⁱ poterit nō dissoluta: eius tamen flatuositas eodem modo erit corrigenda. Tamarindus etiam, qui, ut creditur, ratione saporis acerbi, & astringentis, per compressionem euacuationem molliuntur, qui sunt ex medicamentis frigidis aluū ducētibus, antiquis ignotis, corrigendaq; eorū frigiditas ascēdens ad

Bilis purgatio

Rhabar.

Cassia.

Manna.

Tamarindus.

secundū ordinē intensum, aromatibus, præfer-
 rim in ventriculo frigido, quod illi obesse
 possint. quorū vnc. duæ substantia ipsorū pa-
 stillo subactæ, & per cribrū eliquatæ, & ex sac-
 charo in bolum redactæ, vel vnc. vna in decē
 feri vnc. ad duarum vnc. consumptionem ebul-
 liat, quia nimia coctura vim tamarindis au-
 fert, per linteū densum excolata, & potui ex-
 hibita: quanquam possit etiam in iure deco-
 qui, & ius præberi bibendum. Syrupus etiam
 rosatus solutius ad quatuor vncias in aqua
 endiuia dissolutus, qui creditur nō solum cō-
 primendo: sed etiam leniendo aliquammodo ra-
 tione roris, & sacchari euacuare. Sebesten et-
 iam quas mixtas dicūt, vsq; ad triginta in iure
 decoctæ, & ius bibendum præbere: tenuissi-
 mum tamen est medicamentum. Lutei quin-
 etiam mirobalani vsq; ad drachmas tres, pue-
 rulis vnā; nonnunquam in rotulis, & placē-
 tulis ex saccharo conformatis; nonnūquā in-
 fusi: aliquando in puluere redacti, & in vino
 cretico, aut iure gallinaceo ebibiti: qui sane
 sunt tutū medicamentū, & lene, quodam es-
 raicis, & a iecore, nō autem ab extremis par-
 tibus subducāt, ventriculum roborant, iecur,
 & intestina. Scammonium quinetiam, præ-
 fertim in cotoneo, & pasta, vt sit a Galeno p-
 paratum, vsque ad grana decem, seu semiscru-
 pulum cōfectum in rotulis cum aromatibus,
 saccharo, cīnamomo, gingibere, garyophillis;
 quanquā eo vtendum nō esse suadeo, nisi cum
 medi-

*Syrupus ro-
 satus soluti-
 us.*

Sebesten.

*Mirobalani
 lutei.*

Scammonii

medicamenta alia negliguntur, & cum a longinquis, & penitioribus partib. est trahendū.

De compositis autem nullum est, quod puram bilem educere possit. Sequitur pituita:

per pituitam quamcunq; speciem pituitæ intelligo, præter falsam, quæ medicamēto chologogo est detrahenda, quæ quidem & chebulis mirobalanis, præsertim in delicatis, educi poterit, vsq; ad duas drachmas in catapotia re-

Pituita purgatio.
Pituita falsa.

ductis, vel in infusione in aqua saluiæ, vel amaraci, vel rutæ, vel in iure vsq; ad sex vncias iuris,

& quatuor drachmas summo mane: aut in puluere vsq; ad drachmas duas in vino cretico,

aut aqua eliquata, aut cassia, aut saccharo rosaceo. Deficientibus chebulis, emblicis, &

belliricis poterimus uti. Agarici quinetiam in pueris scrup. ij. vsque ad drac. vnam: in adultis

Agaricus.

drach. vna, & media exhibetur, Mesue duas, in forma pilularum, vel ex diaphinicone, vel ex despumato melle formato, vel mixto aromati-

cato rosato, aut saccharo rosaceo, vel ex aqua endiuivæ si febriat. Hyssopo præterea medica-

Hyssopus.

mento satis leni, vsq; ad drac. iiij. uti licet, pulveris intra ficus, aut siccas, aut recentes, aut in mortario contusas simul cum puluere. Cycl-

Cyclamen.

minis etiam medicamenti lenis semuncia in acetario communi. Thymi etiam manip. vnus

Thymus.

in decoctione vsque ad sex decoctionis vncias

Epithymum.

pituitam ducet: quanquā eius capillamētum, quod epithymū appellat, atrā bilē subducatur.

De compositis nullū est, quod pituitā educat

*Melancholia
expurgatio.*

solam. Sequitur melancholia, quæ quidē my-
robalanis indis in forma catapotiorum deco-
cto, infusione, & in substantia suntis: in forma
catapotiorū ad duas drachmas ex diacatholi-
cone confectorū: in decocto drac. iij. & vn. vj. in
infusione drac. quinq; in vnc. vj. aquæ fumi-
terre per horas decem, postea exprimere, &
expressum saccharo dulcorare: in substantia
drac. iij. in libra vna feri, & calidum bibatur:

Origanum.

aduertentes semper vt in omni forma, cinna-
momi, gingiberis, salis gemmæ scrup. medi-
um apponamus. Origano quinetiam ole-
rum modo in iure cocto, in puluere ad semū-
ciam in iure, præsertim si sit Cretense; quod
herbæ Cretenses cæteris totius orbis vt ait

Epithymū.

Gal. sint præferendæ, præsertim calidæ. Am-
plius epithymo nunc in decocto vsq; ad vnc.
duas in infusione, idq; vel in iure pulli per
horas decem, vel in aqua violarum, vel lacte
caprino, vel bubulo, & infusionis cū iure vnc.
sex, vel communē paterā sumere. in pilulis,

*Lapis arme-
nus.*

in puluere cum iure, & etiam ex saccharo ro-
faceo, aut violaceo. Amplius lapide armeno
loto ac præparato; & est vehemens medica-
mentū; sed non facit eam molestiā, quā facit
elleborū nigrū, Aui. nō est excedēda drachma.

Eleb. niger.

insumi poterit in forma pilularū modo cor-
rigatur, veluti lapidis armeni præparati
scrup. i. camphuræ, anisorū, cinnamomi, gin-
giberis, mastices ana gr. vj. misce, & cū succo
saluiæ, aut diacatholicone reformetur pilulæ
quinq;

quinq;. Potest eius puluis in iure præberi: sed diligenter erit terendus, q; ob sui grauitatē in pateræ fundum descendat, potest etiā præberi cum vnc. i. sacchari borraginati, pueris in ientaculis, in placentulis, in vino odorato, vt vino cretico. Amplius lapide lazuli cū cyaneo eisdem modis, & eodem pondere exhibito, quo diximus præbendum esse lapidem armenum.

Lapis lazuli.

Amplius elleboro nigro: neque enim verum est quod tanta molestia educat: quinimmo præberi potest, & cum aliis roborantibus mixtis, & etiam solus: & hoc, quod tametsi Gal. in lib. quos, & quando. elleborū in raphano ponat, & raphanum in oxymellite, illud tamen est intelligendum de albo elleboro, quod vehementer commoueat, & ventriculum mire perturbet: potest præberi in puluere in hunc modum: Ellebori nigri scrup. ij. gingiberis, mastice, rosarū rubearum, cinnamomi, anisorum, dauci, caphuræ an. gr. iij. misce, & fiat puluis subtilissimus, qui iure bibatur. potest in oxymellite præberi, in aqua borraginis, & acetosæ, huncmet puluerem possumus in catapotia digeri facere: præbere etiam cū saccharo borraginato, etiam in infusione, in placentulis etiam hoc modo: Ellebori nigri scrup. ij. cinnamomi, gingiberis, anisorum, an. gr. decē, pastæ fermentatę vnc. ij. misce, & despumato melle subigatur, in furnoque coquatur, & integra sumatur vna vice placentula. pondus tamen in omnibus his formis drachmam nō ex-

Elleborus niger.

Ellebori nigri præparatio in puluere.

In placentulis.

Sena herba.

cedat. pueris præberi potest ad scrup. vñum in
ientaculis, vel placētula ex pasta saccharo sub-
acta. Amplius lena herba mirifica, Atabibus
inuenta, in infusione vnc. j. & duabus pateris
iuris vna ebullitione ebulliri facere, additis
floribus corroborantibus ventriculum, & eā
corrigentibus; vt flores borraginis, buglossi,
violatum, rosarum ana drachmas duas, gingi-
beris scrupulum vñū, & mane patera vna den-
so linteo excernatur, & saccharo dulcoretur,
& bibatur. Nam est similis infusioni senæ: hoc
differt, quod ratione iuris est magis emolliti-
ua. In decoctione etiam ad vnc. iij. Potest etiā
eius puluis ad duas drachmas in iure bibi, in
ouo sorbili, in ientaculis pro puerulis, in in-
tinctu, in sinapio. De compositis quæ atram-
bilem solam apta sint educere non reperitur
nisi dialena, & infusio senæ. Sed hæc de instru-
mentis, quibus humores solitarie peccantes
purgari possunt. Illud modo non est ignoran-
dum, quod poterimus ex his simplicib. enar-
ratis efficere medicamentum compositū lene,
mediocre, vehemens, vehementissimū quan-
to plura horum cholagogorum, vel phlegma-
gogorum, vel atrabiliorum simul commisce-
bimus. Sequitur vt percurramus medicamen-
ta simplicia, quib. humores simul complicati
purgari possint. Hoc autē nemini mirū videat-
ur, quod reperiatur simplex aliquod medica-
mentum, quod & duos humores, & tres etiā
simul subducere possit. Neq; enim vere sunt
simplicia

*Simplicia
medicamē-
ta humores
complicatos
purgare pos-
sunt.*

simplicia, sed ex diuersis oppositis, ac pugnantibus partibus composita; ratione quarum diuersarum substantialium similitudinum diuersos etiā educere possunt humores. Illud autē prænотandum est, quod etiam commune est singulæ humorum complicationi, vt semper aduertamus in complicatione, an vnus humor alium superet; & ratione huius exsuperantiæ cum multa simul libuerit commiscere, semper illud medicamentum augere, quod humorem illum attrahit, qui aliū superat. Sed etiam simplicia prius percurramus, quibus complicata bilis cum pituita purgari possunt. Porro etsi rhabarbarū inter biliaria positum sit, secundo tamen pituitam etiam trahere sollet. Aloe quinetiam bilem primo, pituitam secundo, sed a propinquis partibus, vnde stercorearium appellari solet. Cassia quinetiam etsi bilem primo, secundo tamen pituitam subducit, vt Arabes censent. Agaricus quinetiam etsi inter phlegmagoga positus sit, biliaris tamen etiam est Arabibus. Scammonium quinetiam etsi bilem primo, pituitam etiam secundo attrahit Dioscoridi. cuius præparati in cotoneo, & pasta (diagridium appellatur) scrupulum vnum, vel etiam semidrachmam præbemus: quanquam Galenus neque scammoniū præparatū, quod intus cōtinetur, sed pastā ipsam præbere videt. Cōposita vero medicamenta purgantia hos duos humores sunt diaphinico, pilulæ cochiae, & alia infinita.

Omnia simplicia medicamenta sunt composita.

Bilis cum pituita expurgatio.

Rhabarbarum. Aloe.

Cassia.

Agaricus.

Scammonium.

Diagridium.

*Bilis cum
atrabile
purgatio.*

Serum.

Fumaria.

*Pituita &
atrabilis
purgatio.*

*Mirobalani
chebuls.*

At bilis, & atrabilis simul associati, paucis simplicibus subduci poterunt, præterquam fumaria, & sero: sero quidem vsque ad duas, & tres libras; quanquam Galen. 10. simp. med. facul. non dicat quod bilem, & atram bilē subducatur, sed abstergere, & abluere sine mordacitate intestinorum acrimoniam, & adhiberi subducendi ventris gratia, & per clysteres iniici. Dioscorides tamen enumerat melancholicos morbos, quibus ait serum conferre. Fumaria vero, etsi Dioscorides de bile tantū meminerit, apud Mesuen tamē atrabiliaria quoque est. Poterit præberi huius herbæ (nam tota herba infumitur cum floribus, radicibus, & seminibus nonnunquam) succus ab vncia semis, vsque ad duas, Mesue, in infusione vncia vna herbæ infusa ab vnciis quatuor vsque ad decem: in decoctione ab vnc. decem vsque ad quindecim; quod habeat maiorem vim in infusione, quā in decoctione: & hoc, quod amplam non patiat decoctionem. In puluere a drach. tribus vsque ad quinque: Mesue in catapotia, in iure, in mellicrato, vt insumebat plebeius: Galenus in iure caulium, in placentulis, in ientaculis. Composita autem sunt electuariū de psillio, & puluis senæ. Sequitur vt percurramus instrumenta, quibus pituita, & atrabilis simul associati humores purgari possunt. Porro chebuli mirobalani, etsi inter euacuātia pituitam solam sint enumerati: Serapioni tamen Arabum auctoritate, quod Græci

B

Græci de mirobalanis nullam habuerint cognitionem, etiam atrabilem subducent, vsq; ad drac. quinq; in infusione in sex vnciis oxymellitidis simplicis, & pessularum vncia media, vel in sero caprino, aut alio tali infundendo. In puluere ad drac. duas, vel in iure, vel sero, vel oxymellite, vel etiam in catapotia redacti. E- *Epithymum*
 pithymo etiam Diosc. cum melle pote, in acetabulo ad quatuor drachmas cum melle, & sale, & aceti exiguo: in puluere a drachmis duabus vsque ad quatuor: in iure, vel lactis sero in infusione vncia in oximellite secundum artē infusa, postea expressa, & saccharo dulcorata: poterit etiam infundi in serum, in ius, vel aliquam aquam vi ignis extrusam. Amplius lapis *Lapis ar-*
 de armeno, & lapide lazuli. nam tamen Me- *menus.*
 fues de atrabile solum meminerit, glutinosos *Lapis lazuli.*
 tamen etiamnum, & pituitosos purgare experientia comprobauit. De catapotiiis nullū est. *Bilis, pituita*
 Sequitur vt percurramus instrumenta, quib. *& atrabilis*
 singuli humores simul cōplicati purgari possunt: bilis, pituita, atrabilis. Porro elleboro nigro educi poterunt. Nam etsi Dioscorides de atrabile non meminerit, illud omisit vt notissimum, quod eius tempore prouerbium exstabat: fatuos & melancholicos in Anticiram *Helleborus*
 esse mittēdos, vbi maxima ellebori nigri aderat copia. Polypodio etiam: nam etsi Diosco- *niger.*
 rides de atrabile non meminerit: ab experientia tamen, & a Mesue id comprobatur, quamquam etiam Galenus neq; ventris subductiuū *Polypodium.*

ipsum esse aduerterit. verum est, quod præmittere ea solet, quæ a Dioscoride scripta sunt. Potest in puluerem redigi vsque ad quatuor drachmas in aqua multa, vel sex in iuris ebullitione, vel in infusione vsque ad vnciam.

Epithymū.

Epithymum etiam habet vim educendi hos tres humores, quamquam primo atrabilem educere videatur, secundo bilem, tertio pituitam.

Sena.

Sena quinetiam. Nam etsi Græcis bilem & pituitam ducat, Arabibus tamen atrabilem & adustos humores subducit: quæ quidē etsi vario modo sumi possit, in infusione tamē potius videtur vim suam ostēdere, quam alio modo. Catapotia vero sunt, cōfectio hamech, pilula aggregatiua, & alia multa. Hæc sane sunt simplicia & catapotia, quibus tuto humores & solitarie peccantes, & complicati simul purgari possunt: quibus mediātibus purgatio

*In omni
purgatione
quæ præco-
gnosenda.*

peccantium in humano corpore humorum fieri debet. Pro qua purgatione feliciter fienda, hæc perpetuo erunt animaduertenda: vt seu facienda sit purgatio a corpore vniuerso, siue ab aliqua corporis determinata parte, primum sane perpendamus, utrū simplex sit humor qui peccat, an implicitus: & si implicitus, utrū æqualiter superabundent, an inæqualiter, ita vt vnus alterū excedat: & si alter alterū excedet, tanto plus etiam medicamentum in compositione excedere debebit. Ita in complicatione triū, utrū æqualiter superabundēt, an inæqualiter: & si inæqualiter, vtrum duo
æquales,

æquales sint, alter inæqualis, an vero omnes inæquales, ita vt vnus duos superet, & alter reliquum: nec vnquam exhibendum erit medicamentum nisi prius considerata diligenter humorum proportione. Amplius considerandum erit circa medicamentum ipsum: ex medicamentis aliud alio vehementius esse, & tunc de magis vehemēti minus erit adhibendum, vt minus vehemens æquet. Qua ratione in educenda bile; si leniter id erit faciendum, mirobalanis luteis: si mediocriter rhabarbaro: si vehementer, scammonio, pro educēda pituita in leni educatione mirobalanis chebulis: in mediocri, agarico: in vehemēti, turbith. si atrabilis, in leni mirobalanis indis, in mediocri polypodio, aut epithymo, in vehemēti lapide lazuli aut nigro elleboro. Nec hoc sufficiet, nisi etiā quo ad humores ipsos cognoscamus, eorū aliquos facilius educi, alios difficilius vehemētiore, veluti bilis, quæ facile educitur: pituita vero glutinosa difficilius. Amplius considerandum erit, vtrū humor aut humores purgandi sint ex propria hominis natura, & temperamento, an non: quoniam qui erūt ex propria natura corporis purgandi, vt in bilioso corpore, bilis difficilius educet: qui vero nō sunt ex propria natura, vt in pituitoso corpore bilis facilius euacuatur. Et præter hæc considerandum etiam erit situs humoris purgandi, an sit in primis viis, an in secūda, an tertia regione: quoniā q̄ erit educendum a prima via, leuiori medica-

Bilis euacuatio lenis, mediocris & vehemens Pituita euacuatio.

Atrabilis euacuatio lenis, mediocris, & vehemens.

*Medicamē-
ta directo-
ria ad ca-
put.*

Ad hepar.

*Iuncturis.
Lienem.
Renes.
Vescam.*

mento educi poterit : quod a secunda, vhe-
mentiori, quod a tertia, vehementissimo erit
trahendum. Amplius cum quo affectu sit asso-
ciatus humor purgandus: quoniam si compli-
catus erit cum febre, medicamentum erit cō-
miscendum cum aliquo frigido, veluti aqua
endiuiæ aut cichoreæ. Et hæc eadem conside-
randa etiam erunt vbi voluerimus euacuare
ab aliqua corporis determinata parte: adden-
dumque erit medicamēto aliquid, quod me-
dicamentum ad membrum illud conducatur, ac
dirigatur: veluti si a capite humor sit ducendus
(quicumque is sit) si erit calidæ temperiei, &
tempus æstiuum, medicamento erit addendū
hordeum, viola: in temperie frigida & hyeme
scylla: si ab hepate, in frigida & hyeme spicam,
eupatorium, absinthiū: in calida & æstate en-
diuiam, lactucam, santala: si a iuncturis in æsta-
te succum caulium, in hyeme scyllam: a liene
in æstate tamaricem, hyeme capparin: a reni-
bus, & vesica quinque radices aperientes,
videlicet petroselini, fœniculi, apii, asparagi,
rusci: in æstate peponum semina: a cantharidi-
bus cauendo, quod extrinsecus potius quam
intrinsecus sint adhibenda: at vero in æstate ca-
pilli veneris, hyeme & frigida temperie pule-
gium, calamentum. Sed quoniam de his diffu-
sius a nobis suo loco agatur in curatione cau-
sæ continentis: sequitur vt postquam egimus
de modo, quo vitium humorum penes quan-
tatem obortum emendatur, illo sane, quo
euacuatur

euacuatur vitiosus humor utili relicto, vt ag-
 grediamur modum, quo vniuersus sanguis, &
 omnes humores sanguini admixti euacuari
 possunt phlebotomia appellatur; PHLEBOTO-
 MIA est euacuatio vniuersalis eius, quod cor-
 pus replet, venæ sectione recte & cōueniēter
 facta, vt amissa humorum proportio pristinae
 suæ dignitati restituatur. Ideo autem dicitur
 phlebotomiam esse euacuationem, quod
 euacuatio sit genus vniuersale ipsius phlebo-
 tomie, & pharmacie. quod quidē, tum ex ef-
 fectu, tū ex ipso fine patere potest. Ex effectu
 quidē, q̄ secta vena statim sequatur ipsius ha-
 bitus euacuatio. Ex fine vero, q̄ nunquā me-
 dicus iubeat venæ sectionem, nisi vt euacuet.
 Quoniā vero euacuatio multiplex est: alia par-
 ticularis, qua mediante id solum euacuatur q̄
 noxiū est, utili relicto, quod purgatione fieri
 diximus: vnde purgari proprie dicitur sanguis,
 quando est infectus aliquo malo humore: alia
 vniuersalis, qua mediāte equaliter omnes hu-
 mores euacuantur e corpore, non autem sola
 bilis, aut pituita, aut melancholia, aut duo tā-
 tum, aut tres istorum, sed simul omnes. Quod
 quidē ipsi phlebotomie cōuenit, nullo autem
 modo pharmacie. qua ratione, vt ab eua-
 cuatione, quę sit per pharmacū, seiungeretur,
 additū fuit phlebotomiā esse euacuationem
 vniuersalē. Quoniam vero aderant alia quoq;
 euacuationes vniuersales, quę tamē phleboti-
 mie nō sunt, cuiusmodi sunt exercitiū, balneū,

PHLEBO-
TOMIA

est euacua-
tio vniuer-
salis.

Euacuatio
duplex est
Particula-
ris &

Vniuersalis.

inedia, frictiones, quæ omnes humores equaliter euacuât, ob id vt ab huiusmodi euacuationibus vniuersalibus seiungeretur phlebotomia, positum fuit in definitione, phlebotomiâ esse euacuationem vniuersalem venæ sectione factam, vt per hanc particulam seiungeretur ab aliis euacuationibus vniuersalibus, quæ phlebotomia non sunt. Et quod sequitur, phlebotomiam esse euacuationem vniuersalem eius quod corpus replet, notat affectum existentem in ipsis humoribus, qui repletio appellatur. Quod postmodum additur, phlebotomiam esse euacuationem vniuersalem eius, quod corpus replet, venæ sectione recte & conuenienter facta, notat artificium administrandi huiusmodi instrumentum. Recte aut & conuenienter fiet ex obseruatione eorum, quæ in arte curandi diximus esse obseruanda: ex affectu scilicet, loco, & circumstantiis. Nam quo ad instrumentum nihil circa ipsum est consideratione dignum, cum nulla mala qualitate sit insignitum, nec erosionem aut exsiccationem, aut aliquid tale in corpore inducat, veluti pharmacica facit. Ab affectu igitur primum sumetur ars tractandi hoc instrumentum, quod genus euacuationis indicetur a genere repletionis: Quantitas etiâ euacuandæ a quantitate affectus etiâ repletionis, & distincta species, & determinata quantitas euacuandæ, a determinata quantitate repletionis. Temporis autem electio in phlebotomando non multa necessitatis esse videtur

Recte & conuenienter facta phlebotomia requiritur.

Ab affectu.

A quantitate affectus & repletionis.

Videtur quod vt ait Gal. 8. Ther. quocunq; tē-
pore possimus phlebotomare, modo nō exsi-
stat cibus in ventriculo crudus. Vt autē res i-
psa clarior euadat, hinc exordiedū. Euacuatio *Phleboto-*
vniuersalis omnium humorū per phleboto- *mia vel sim-*
miā, vel erit simplex, vel composita. Simplex *plex est vel*
aut erit euentatiua, aut diuersiua, aut deriuati- *composita.*
ua, aut euacuatiua. Euentatiua illa erit, in qua *Simplex aut*
euentare ac refrigerare nimiam sanguinis cali- *euentatiua*
ditatem opus erit, diuersiua vero impetū san- *Diuersiua-*
guinis aut fluentis aut fluxuri, aut inflāmati- *Deriuatiua*
onē minantis, aut aliquid simile respiciet. deri- *Euacuatiua*
uatiua vero finis erit trahere humorē fixū ad
partē corporis proximā. euacuatiua vero finis
erit repletionē nimiam detrahē, de qua qui-
dem diligenter est tractādum. Porro si ade- *Quando phle-*
rit repletio simplex quo ad vasa, vbi quan- *botomia ad*
titas sola peccet absque vitio qualitatis, re- *syncopin pro*
cte & conuenienter fiet, si vsq; ad syncopin fi- *trahenda.*
et phlebotomia: & hoc, q̄ vbi adest peccatum
in sanguine quantitatis duntaxat, multā etiam
virtutem eos habere necesse erit. Atq; hoc est *Febris syno-*
illud, cur Gal. in synocha sine putredine san- *cha sine pu-*
guinē mittat vsq; ad syncopin. Locus autē se- *trudine*
cundus, & via per quā sanguis est ducendus in
repletionē, cui nullius partis affectus comes
sit, illa erit, quē a fonte plurimum detrahē
poterit. Nam tamen si plenitudinē, cui nullius
partis affectus comes sit, qualibet vena citra
delectū detrahat, cōmodius tamē ex interiore
cubiti dextri euacuatio fiet: & hoc, q̄ a caua

*Februm en-
ratio.*

*Febris quar-
tana.*

*Febres pura
intermittē-
tes*

*In febris
pestilentib.
cur venam
non facimus*

plurimum, & a iecore validissime proliciat. Quo fundamento innixi, qui praxin exercent in februm curatione, synochum tum simplicem, tum putridam, febrem ardentem, pestilentem, simplicem, tertianam, & quotidianā continuam euacuant sectione interioris cubiti dextri: sola quartana continua variat, quæ internam sinistri brachii postulet. Eadē ratione in puris intermittentibus venam deligētes, quoties aut plethora, aut symptomatū læuitia eam aperire postulabunt. Sin autē repletio talis erit, ut & quantitas & qualitas omnium simul sit vitiata, profecto cum etiam in huiusmodi repletionem non tollatur indicatio euacuandi. cumq; ex alia virtus non toleret, illud erit eligendum, quod iubet Gal. 9. 10. & 11. Therap. parum sane erit euacuandum: & ad reliquum facienda erit epicrasis. Ob id in pestilentibus cucurbitulis euacuabimus, venam autem non aperimus, ne spiritus exeant. Si vero repletio eiusmodi erit, ut & quantitas peccet, & simul aliquis determinatus humor vitiatus, tunc ulterius erit perpendendum: an humor ille determinatus vitiatus non multum recedat a natura sanguinis, an vero multum recedat. sique non multum recesserit, sola sanguinis missione erimus contenti: & hoc, quod reliquum a natura concoqui possit, & educi vel per sudorem, vel per urinam. Si vero multum recedet, considerandum erit, an multum recedat secundum quantitatem, an secundum qualitatem, an vero vtrumq;

trumq; simul.& tunc his omnibus,tum medicamine, tum phlebotomia succurrendum erit. Incipiendum tamen erit in singulo istorū a purgatione: & semper erit aduertendum, in huiusmodi euacuationibus mixtis, in quibus & plebotomia, & purgatione est succurrēdū, vt nunquam mittatur sanguis in quantitate, quā indicatur a quantitate humoris peccantis: & hoc quoniam, si phlebotomia sit euacuatio generalis, quæ omnes humores euacuat, cū tamen plus sanguinis euacuet, quā cæterorum humorū:& hoc, quod in corpore humano semper plus sanguinis adsit, quam cæterorū humorum:sequitur, q̄ si prius fieret venæ sectio ante purgationem, q̄ humor ille superabundans aut pituita, aut bilis, etiam q̄ essent naturales, & quātitate sola peccātes, effrenitarēt.atq; hoc est illud, quod ait Arabs ille:cum vis phlebotomare, mundifica prius sanguinem a cholera, dein phlebotomes.Sed hætenus dictum sit de simplicib. phlebotomiis.Sequitur,vt aggrediamur phlebotomias mixtas, quib. scilicet mixtum officiū fieri solet. Nam simplicium officiū, præsertim eius, quæ euacuatiua dicitur, hætenus manifestū fecimus. Sequitur igitur,vt percurramus cōpositas,quæ quidē tot ferme sūt: Euacuatiua & diuersa simul:euacuatiua,deriuatiua: vel singulæ tres simul,euacuatiua,diuersiua, deriuatiua. Etenim si aderit repletio, seu plenitudo,& impetus aut præsens, aut futurus fluētis

Purgatio debet precedere phlebotomiam.

Phlebotomia composita species.

Euacuatiua & deriuatiua.

*Euacuati-
ua & deri-
uatiua.*

*Euacuati-
ua & di-
uersiua.*

*Euacuati-
ua & deri-
uatiua.*

*Euacuatiua
diuersiua &
deriuatiua.*

humoris, euacuatiua etiam & diuersiua simul
vtemur. Aduertendum tamē semper erit hu-
iusmodi complicatione, præcipuam intentio-
nem esse reuellere: secundā vero intentionē
esse euacuare. Quinimmo in huiusmodi vitiiis
cōplicatis simpliciter est reuellendum a loco
maxime longinquo: & vt satisfiat plenitudini,
multum sanguinis erit reuellendum. Euacua-
tiua autem & diuersiua simul vtemur, quoties
erit intentio minuendi multitudinem sangui-
nis, & præter hæc sanguinem, seu materiā flu-
xam deriuare: in qua complicatione incipien-
dum erit prius ab euacuatiua, quam a deriua-
tiua, eligentes venas hepatis propinquiores.
Etenim si inciperemus a deriuatiua, quæ deri-
uat a venis affecto loco propinquis, plus attra-
heremus ad locum læsum, quā euacuaremus.
Singularis autē trib. vtemur: euacuatiua scilicet,
diuersiua, & deriuatiua: veluti si materia præ-
cipitata sit ad aliquem locum, ad pleuram ex-
empli gratia, & continue etiā præcipitetur in
corpore, quod sit repletum: cū hic adsint tres
scopi simul, nec rectius, nec magis cōueniēter
fieri poterit, quam si vnico ictu satisfaciamus
scopis singulorū: quod sane fiet sectione venæ
eiusdem lateris vsq; ad syncopim. Etenim cum
locus & via, per quā fit euacuatio sit medius,
& media participant naturā vtriusq; extremi, B
secantes venam brachii eiusdē lateris, ratione
qua sumus in aliqua distantia, reuellimus: ea
vero ratione qua non secamus in maxima di-
stantia,

stātia, deriuamus, & scopo deriuatiuæ facim⁹
 satis: quatenus vero iubemus missionem san-
 guinis vsq; ad syncopin esse fiendam, multitu-
 dini, & repletioni & scopo phlebotomię eua-
 cuariuæ facimus satis. Atque hoc est illud, cur
 Hippocrates 4. reg. acut. & Gal. in commento
 iubeant missionem sanguinis in pleuritide vs-
 que ad syncopin esse fiendam. Sequitur vt
 percurramus circumstantias eas, quæ tanquā
 animus, artem recte phlebotomandi regere
 debent. Ita enim & Hipp. fecisse videtur 4. de
 ratione victus Aph. 14. vbi ait: Nunquam re-
 cte, & conuenienter exerceri phlebotomiam
 posse, nisi adsint hæc tria simul: nimirū mor-
 bi magnitudo, virtutis cōstantia, & ætas. Intel-
 ligo autem per morbi magnitudinem, vel
 præsentem, vel futuram, vt exponit Galenus
 libro de sanguinis missione. Quapropter
 hæc tria simul adesse debent in missione san-
 guinis: morbi magnitudo, virtus, & ætas. qua
 ratione si morbi magnitudo adesset, & vires
 validæ; si tamē ætas esset puerilis, phiberetur
 sanguinis missio, quod plurimū pueri diffle-
 tur, vt hac ratione nullus audeat infra decimū
 quartum phlebotomare, aut saltim intra se-
 ptimū: a quo tamē in pharmaco nō cauemus.
 Anni quinetiā temp⁹ id phibere solet, regio,
 symptomata, & prægnatio. Quæ ratione nec
 in dieb. canicularibus, aut maxime calidis, nec
 in regionib. calidissimis, nec vbi adsunt sym-
 ptomata, veluti ventriculi imbecillitas, nec in

*In pleuriti-
 de mittimus
 sanguinē ad
 animi vsq;
 deliquium.*

*Scopi princi-
 pales missio-
 nis sangui-
 nis tres.*

*Plebotomia
 scopi securi-
 darii.*

*Grauida
quando sint
phlebotomanda.*

vt eri gestatione phlebotomare possumus, præsertim octauo, & nono mense, quod fœtus tunc maiore egeat alimento, & cōsequenter sanguis minus redūdet. Initio vero, & medio etiā gestationis tempore, quod sanguis magis redūdet, & fœtus minore egeat alimentō secare licebit, nō solum vbi adsit plethora, sed etiā vbi aut pleuritis, aut alia inflammatio vehementius vrgeat, venas sane in cubito, quod ex inferiorum sectione, impetū deorsum conuerso, menses citantur, & fœtus præcipiteretur. Atq; hoc est illud, cur Celsus in venæ sectione, virium duntaxat morbiq; magnitudinem animaduertendam esse censuit, atque ætatem, & prægnationem, de quantitate duntaxat decernere voluit. Sed de arte curandi causam antecedentem satis sit. Sequitur, vt aggrediamur curationem causæ continentis.

IO. PAULI

IO. PAULI PERNUMIA
PATAVINI.

De Curatione causæ con-
tinentis.

LIBER QUINTVS.

CAUSÆ antecedentis confinio proxi-
me iuncta est, atque connexa con-
tinens causa: cum quodāmodo pro-
pago, & soboles sit antecedentis causæ. Pro
cuius curatione eadem fere curandi series erit
obseruanda. Etenim cum in hoc duntaxat dif-
ferant, quod cōtinens ea appellatur, quæ mor-
bo proxime adhaerescit, & connexa est: ante-
cedens vero ea, quæ morbum fouet, continē-
tem efficit, ac mouet: sequitur igitur, quod cū
idemmet humor, prout proximior est, & lon-
gius a morbo, & loco affecto distans, duplicē
rationem causarum subeat, iisdem etiam vi-
tiorum generibus affici, & vitari dicatur: se-
quitur, quod iisdē etiam remediorum gene-
ribus erit depellendus; nempe mutatione de
loco ad alium locum, alteratione, & vacuatio-
ne. In hoc solum differre videntur, quod loci
mutatio, alteratio, vacuatio causæ antece-
dentis vniuersales sunt, respicientes corpus

*Causa ante-
cedentis &
continentis
differentia.*

*Curatio continens
causa quae remeabilis
est.
Curatio
eius quae remeabilis a
loco non est.
Curatio
causa continens quae
medio modo
se habet.*

vniversum:causae vero continens particula-
res sunt, dum partem duntaxat corporis de-
terminatam, & non aliam tentant. Quoniam
vero causa continens non vno tantum modo,
sed multiplici in loco reperiri potest: vel enim
ita liquidus est humor in loco existens, vt ab
eo loco remeare possit: vel adeo infarctus in
loco, vt omni fluendi, remeandiq; habilitate
sit orbatus: vel medio, quodam modo reperi-
tur esse, ita vt eius pars remeare possit, pars ve-
ro alia remeare non possit: Ars etiā recte cu-
randi non vnum tantum, sed multiplicem de-
pellendi modum excogitauit, causamq; con-
tinentem adhuc remeabilem a loco, repulsio-
ne, & deruatione, eandem omni fluendi, re-
meandiq; habilitate orbata, mollitione, ma-
turatione, digestionē, vi fomentum, & em-
plastrorum, aut si nec his humor dissipari po-
test, loci ipsius incisione: materiam vero me-
dio modo se habentem mistis remediis de-
pellit, repulsione scilicet, & digestionē. quo-
rum vnum quodque, si recte, & conuenien-
ter administrari debet. quid sit est aperien-
dum, incipiendo a repulsione. **R E P V L S I O**
est mutatio de vno loco ad alium locum pro-
cul a repellente, facta a frigiditate, vt pars affe-
cti vitiatō humore subleuctur. Ideo autē dicitur,
repulsionem esse mutationem de vno lo-
co ad alium, quod mutatio localis commune
quoddam genus sit repulsionis, attractionis,
deruationis, & repulsionis. Et quod sequitur:
Repul-

Repulsionem fieri procul a repellente, facit
 differre repulsionem ab attractione, quæ ver-
 sus se ipsam trahit: repulsio autem versus alias
 partes a se pellit. Quod postmodum sequitur:
 Repulsionem esse mutationem de vno loco
 ad alium procul a repellente facta a frigiditate,
 notat causam efficientem ipsius repulsionis,
 quæ sane magis, & minus repellet, secundum
 quod erit maior frigiditas, & acerbitas in ipsis
 rebus. Quæ ratione validissime repellent ce-
 russa, plumbum, plantago, galla, balauftium.
 Quæ vero alterum tantum habebunt, pro-
 portione virium repellere poterunt. Ob id
 alumen quamuis frigidum non sit, validissime
 tamen repercutit, quoniam acerbissimum est:
 & e contra succus solatri, & semperuiuæ, ta-
 met si acerbæ non sint, quoniam tamen frigi-
 dissimæ sunt, efficacissimæ sunt ad repellen-
 dum. Sequitur vt enumeremus morbos o-
 mnes, in quibus practici huiusmodi remedii
 genere vti solent. Porro repulsione vtendum
 erit in intemperie cerebri calida, & humida
 cum sanguine fluente: in intemperie calida, &
 sicca cum bile fluente. In intemperie autem
 cerebri frigida, repulsione non vtuntur, ne-
 que in cerebri obstructione, a qua proueniat
 exempli gratia apoplexia, aut materia fit san-
 guinea, aut pirituosa; Etenim etsi initio vide-
 rentur conuenire ad repellendum, tuta tamen
 non sunt, vtpote quod incrassando, & vias co-
 trahendo obstructionem possint, vel excitare,

*Repulsionis
causa effi-
ciens.*

*Repellentia
Alumen.*

*Succus sola-
tri & sem-
peruiuæ.*

*Cerebri in-
temperies
calida &
humida.*

*Repulsio
quibus mor-
bis conue-
niat & non
conueniat.*

*Pectoris &
pulmonum
intemperies.*

Obstructio.

*Pectoris in
flammatiō.*

*Renum ob
structio &
inflammatiō.*
110

*Capitis do-
lor ab in-
temperie ca-
lida & hu-
mida cere-
bri.*

vel factam conduplicare: nec in paralyfi, nec
in conuulsione, nec in epilepsia, in cerebri ta-
men inflammatione repulsione vtuntur; in
intemperie cordis calida, aut frigida vice re-
pulsione corroborare solent. Eadem est ratio
seruanda in intemperie pectoris & pulmonū,
aut calida sit, aut frigida; vbi vice repulsione
corroboramus pectus, & reddimus excremen-
tum pulmonibus conceptum, veluti sputum,
expulsioni facile: eodem modo procedentes
in obstructione pectoris, & pulmonis inflam-
matione. Nam in pectoris inflammatione, ve-
luti dolore laterali, nemo veretur a frigidis ef-
ficie abstinendū. Repellunt in vetriculi inflama-
tione, in hepatis inflammatione, & inflammatione
lienis. In obstructione autē renū nō repellunt:
in renū tamē inflammatione quoquo modo
repellere solent, & in inflammatione vteri. Se-
quitur, vt ostendamus quomodo in praxi in
morbis iis, in quibus est repellendum, vtantur
frigidis, & non aliis, quemadmodum in defi-
nitione positum fuit, causam efficientē ipsius
repulsione esse frigiditatem. Qua ratione nixi
qui praxim exercent, in intemperie cerebri
calida, & humida, seu sanguinea, a qua seque-
tur capitis dolor, repellere solent sanguinem
in caput fluentem iis, quæ non tantum actu,
sed potentia quoq; frigida sunt, & præter hæc
astringentia, vt fortius materiam in partes vi-
cinas regerant, & simul caput robovent, ne tā
promte nouam fluxionem admittat, vtentes
aqua

66 aqua rosarū, si valentius repellere volunt succo rosarum, intiborum, lapathorum, plantaginis, portulacæ, semperuiuæ, lactucæ, solani, singulis per se, vel mixtis cum aceto, vt vterius in caput descendāt; veluti ex olei rosati vncia. j. aceti albi vnc. ij. mixtis cum succi rosarū vnc. iiij. vbi volunt maiorem penetrationem, faciunt hæc ex alto cadere, vel pannos his humoribus actu frigentibus imbutos raso sincipiti admovent, donec incalescant, iterum novos actu frigidos restituentes. Aduertendum tamen est a repellentibus abstinendum esse, vbi aderit febris; & hoc, quod vetet vaporem febrilem transpirare, consequenter febrim augment. Amplius ab iis erit cauendum, vbi tota materia in caput fluxerit, quod iam transierit in naturam materiæ, quæ remeare non potest: & vbi adesset catarrhus calidus, quia tunc astringentia materiam augerent compressam: iisdemmet sane in intemperie cerebri calida, & sicca pendente a bile, ad quam dolor sequatur: iisdem etiam vtentes in curatione illius inflammationis cerebri, quæ phrenitis appellatur, vt vias contrahant, per quas materiæ ascendunt, materiam cogant, incrassent, & ad motum ineptam reddant, caphuram etiam naribus apponentes: eisdem etiam repellentibus in curatione ophthalmiæ procedentes, ad motis fronti, si fluxio sit per venas, & arterias extra cranium, cum hæc tunica a pericranio perducatur, albumine oui, corticibus gra-

*Repellentia
& astringē-
tia nocent
si adsit fe-
bris.*

*Item si ma-
teria tota
in caput flu-
xerit.*

*Item in ca-
tarrho cali-
do.*

*Repellentia
quibus mor-
bis conue-
niant.*

Phrenitis.

*ophthalmia
quando flu-
xio sit per
venas &
arterias ex-
tra craniū.*

*Quando in
tra craniū*

Collirium.

*Stupefaci-
entia.*

Narcotica.

Cynanche.

natorum, balauftiis, & similibus, cum frigidis illis superius enarratis, modo cataplasmatibus admotis ut vias contrahant, per quas materia fluunt. sin autem per venas, & arterias intra cranium materia fluat, nocent hæc repellentia, cum materias versus nervos opticos impingant: sed repellunt gosapio, aqua lactucæ, aut potius rosata imbuto, oculis superposita, ligatura deinde laxæ, & continentis media adhibita: oculo autem ipsi immittunt aquam rosam albo oui permixtam, vel lac ex mamma emulctum: collirium quoque vel siccum, vel liquidum in cote medica ex aqua rosarum, vel simili pertritum ex corallio rubro, gummi arabico, tragacantho, pompholige, cerussa lotis, ne oculū morfu suo lædant. quibus si dolor non vincitur, etiam opii, vel opiati aliquid ad sensum tactus oculi stupefaciendum addunt, aut quod repellendi simul, & stupefaciendi facultate polleat, ut aqua rosarum, cui incoctum sit semen papaveris albi, & addito oui albo, immissa oculo per se, vel ex mica panis eo decocto imbuta, quæ si dolorē non lenient, ubi dolor erit vehementissimus, nullis cedēs remediis, narcoticis utitur Rasis: quarum tamē vsus Galeno semper fuit suspectus, aph. 31. lib. 6. præcipue in oculo, & partib. capiti vicinis frigidis natura, & etiam morbo: iisdem etiam repellentibus utuntur in cynanche, materiam fluentem, & cynanchem augeri prohibentibus, iubentes, ut in vltimis faucibus

faucibus illa teneant, vt partem roborent, &
 vias contrahant, per quas affluit materia; velu-
 ti succum potius quam aquam plantaginis, so-
 lani, lactuce, oxalidis, rosarum, nucum viri-
 dium, mororum, granatorum; vel syrupum
 granatorum, rosarum, oxalidis, omphacii, vel
 omphacium ipsum, acetum cum aqua rosata,
 & hæc omnia actu frigida: aduertentes tamen
 perpetuo, ne foris adhibeamus repellentia,
 quia tunc materiam intro ad partem inflam-
 matam protruderent. Ad eundem modum in
 ventriculi inflammatione progrediētes, oleo
 inungentes, in quo absinthii, aut malum co-
 toneum decoctum sit, admixta simul masti-
 che. Amplius succum cotoneorum, aut piro-
 rum, adiectis rosis purpureis, hordei farina,
 fantalis, bolo armena, & similibus, cerato
 ex iisdem confecto: quinimmo quod eo tem-
 pore, vbi nihil amplius afflueret, solis relax-
 antibus, & discutientibus vti non licet, nec
 in ventriculo, nec hepate, sed semper astrin-
 gentia, quæ robur ventriculi conseruare va-
 leant admiscenda: & hoc ob eius actionis ne-
 cessitatem, vt 7. & 11. & 13. metho. discurret
 Galenus. Ad eundem modum in hepatis in-
 flammatione frigidis stipticis repellentibus
 materiam ad hepar fluētem, & fluxuram pro-
 hibentibus, astrictis hepatis poris, & meati-
 bus angustis, quanquam mitioribus erit vt en-
 dum, ne viis hepatis contractis, obstructio in
 eo excitetur, aut immoderati⁹ refrigeratio ex

*Ventriculi
inflammatio.*

*Hepatis in-
flammatio-
ni clemen-
ter frigida
& stiptica
conueniunt.*

*Tergentia
& aperien-
tia.*

*Radix plan-
taginis.*

*In lienis in-
flammatio-
ne repellen-
tia quomo-
do adhiben-
da.*

phlegmone scirrhus euaderet, aut morbus in-
sanabilis, neue sanies ex phlegmone hepatis
vacuari prohibeatur, & in hepar regeratur.
Quare repulsio in hepatis phlegmone frigi-
dis quidem, sed clementer frigidis, & stipticis
erit fienda, iisque erunt admiscenda quæ mo-
dice tergeant, & aperiant, siue sumantur, siue
admoventur: sumendo quidem, veluti syru-
pum rosatū, ex hepatica, & eupatorio, ex suc-
co oxalidis, cidoniorum cum aqua solani, in-
tibi, oxalidis, foliorum, & radicū plantaginis,
quæ refrigerat, siccatur, astringit sanguinis pro-
fluuiā, & si quid aduratur refrigerat, addita a-
qua cichorii, adianti albi, quæ etiam aperit, &
terget: admouendo vero, veluti linimentū ex
oleo rosato, & cidoniorū, fotum ex aqua ro-
sarum, plantaginis, solani cum linteo, sacculū
ex tribus lantais, malicorio, balauistiis, rosis
trititis, additis capsuræ granis quatuor, aut sex,
si valentiori remedio erit opus. Ad eundem
modum in lienis inflammatione medicamē-
ta astringentia adhibētes, quæ id quod influit
reprimere, & lienis firmitatē conservare pos-
sint, astringentibus admiscētes ea, quæ citra
evidentem calorem extenuant, incidunt, &
relaxant; ne scilicet crassus in eo succus obtu-
ratus vehementius incrassescat, quemadmo-
dum Galenus optime discurret 13. metho. in
cæteris eodem modo procedentes, & in fo-
mentis, & cataplasmatibus, quo modo diximus
in hepatis inflammatione esse procedendum;
hoc

hoc semper obseruato, vt his semper acetū, & quidpiam, quod lieni gratum sit, eiusq; robur peculiariter tueri possit, admisceamus. Ad eundem modum in renū inflammatione, cata- *Renum in-*
 plasmatis, fomentis, linimentis, emplastris, & *flammatio.*
 similibus, quæ mediocrem refrigerandi, & leniendi vim habeant, fabacea, fœnogræci, lini semen, & similia in iecoris inflammatione superius enarrata. Ad eundem modum in vteri *Vteri inflā-*
 inflāmatione extrinsecus lana ex oxirhodino *matio.*
 madefacta, pubi & lumbis erit imponenda, palmulę quoq; , aut mala cotonea in vino decocta, & rosaceo admixta erunt admouenda, lana cum rosaceo, aut melino oleo, aut succo portulacę in vteri sinū immittenda: cataplasmata etiam ex farina seminum lini, & ex superius dictis confecta. Ad eundem modum in glandularum inflammatione iuxta linguam, circa initia gargarismis erit vtendum astringentibus, & repellentibus, vt ait Celsus, veluti ex rosarū, aut palmarum decocto mixtis, aut lenticulis, aut ipsius etiam furfuris, ac reliquorum, quæ in principio inflammati gurgulionis assumuntur: in principio a melle in gargarismis cauentes, ne per acrimoniam malū irritetur, vt ait Aetius: sed, remittente, & decrescente inflammatione mel gargarismis cōuenit. Ad eundē modū in inflammatione gur- *Gurgulionis inflāmatio cum moderato influxu*
 gulionis localibus reprimentibus fluxionem, quæ sint astringentis facultatis, magis & min⁹ astringentibus, secūdum quod maior aut mi-

nor erit influxus, in moderata quidem fluxione austeris, in vehementiori vero acerbis, quod debilius astringant, austeris, vehementius aut acerbis. 4. simpl. & lib. 6. de comp. med. veluti collutionibus moderatis, ubi moderatus fuerit influxus, ex palmulis decoctis, quandoque sola aqua, quandoque melle adiecto, vel ex rosarum decocto, pampinorum vitis, rubi, citinorum, radicum mori, & malorum austerorum, veluti sorborum, pisorum, ubi vero vehementior erit influxus, mirri & baccarum eius decocto, ex acerbis cotoneis malis, mespilorum, cornorum, & gallarum, omnium generosissimo, rhois culinarii, ac coriarii: & hoc decoctum gargarizandum praeberet, secundum Gal. lib. 6. de comp. med. per loca: Et ubi frigidior fuerit fluxio, aloe, cyperus, & iunci rotundi odorati flos conferet. quare repulsoriiis his semper utendum, nisi dolor etiam vehemens adsit, quod tunc simul cum repulsoriiis aliquid ex mitigatoriiis etiam & discussoriiis erit utendum.

Cum dolore In parotidibus vero, aut paucum sit quod influit, aut multum, aut malignum, aut benignum, aut corpus repletum, aut vacuum, nunquam repellentibus erit utendum, Gal. 3. de comp. med. per loca: et si praecessisset vniuersi corporis euacuatio, quanquam Celsus interdum ea admittat. Quapropter, ut ibidem ait Gal. non solum non est utendum repulsoriiis, quinimo oppositis potius utendum est, habentibus vim attrahendi, praesertim, ubi non vehementi impetu influxus

Cum influxu vehementiori.

Cum fluxione frigida.

In parotidibus repellentibus nunquam conueniunt.

influxus irruat, vt affligens humor ex profundo ad cutem trahatur. Et vbi hæc nihil memorabile efficiant, cucurbita etiam erit affligenda, notanter autem dixi: vbi non sit vehemens influxus attractoriis esse vtendum: quod vbi vehementior adsit influxus, mitigare potius, & non humorum influxioni opitulari conueniat per cataplasmatum maxime lenientium vsum: quod, vbi attractoriis vteremur, aut cucurbitis, periculū esset ne adeo vehemens dolor hominem apprehenderet, qui & vigilias & febres, & virium exsolutionem induceret, vt ait Galenus. Ad eundem modum in oculorum inflammatione, pharmacis repulsoriis initio vti solent, quæ tamen non vehementem sortita sint astrictionem, sed tum propria substantia moderata, tum lenitiuorum liquorum admixtione ita confecta, præsertim vbi vehemens dolor adsit. Nam quæ vehementē astrictionem sortita sunt, cum tunicas exasperent, maiorem dolorem inferunt, consequenter influxum potius augēt, quam quod repellendo eum minuire possint. Quapropter frons illiniri solet ex plantaginis, solani, aut semperuiui succo: oui candido, rosaceo oleo, vel aqua, bolo armeno, ac pauco aceto. In ischiade tamē a repellentibus etiā esse cauendum, quod cū coxendicum iunctura in profundo sita sit, sanguinē ex vicinis & ambientib. valis ac musculis ad illā cōpellerēt, Gal. 10. de comp. ed. per loca. Ex quibus iam patere potest recte

*Attractoris
in influxu
vehementio-
ri non sunt
vsurpanda.*

*Oculorū
inflammatio*

*In ischiade
a repellenti-
bus est ca-
uendum.*

dictum fuisse in definitione: Repulsionē esse mutationem de vno loco ad alium procul a repellente, facta a frigiditate, vt pars affecta a noxio humore in partem fluente subleuetur.

Sequitur aliud remedii genus, quo, mediante causa continens, quæ adhuc retrocedere potest, trahitur a loco affecto ad alium locū affecto loco vicinum: deriuatio appellatur.

II.
DERIVA-
TIO.

DERIVATIO est tractio humoris ab eo loco, vbi illapsus est humor, ad alium locum illi vicinum, recte & conuenienter facta, vt affecta pars a noxio humore subleuetur. Ideo autē dicitur: B

derivationem esse tractionē: quod tractio sit vniuersale genus auersionis, deriuationis, & attractionis. Et quod sequitur, esse tractionem humoris ab eo loco vbi illapsus est humor, ad alium locum illi vicinum, eo spectat, vt seiungatur ab auersione, in qua tractio humoris fit in maxima distantia, & procul ab affecta sede.

*Deriuationis
& auersio-
nis differen-
tia.*

Et quod sequitur, recte & conuenienter facta, notat artem illam exercendi; quæ quidem in iis duobus potissimum existit, primum, vt ante eam præcedat auersio, quæ fluxionis impetum vniuersi corporis sedet, & suspensionem recentis & inopinatæ fluxionis, vtque humor existens in parte affecta, liquidus adhuc sit, & ab ea remeare potis. Nam quoties ita parti erit infarctus, vt omnem fluendi ac remeandi habilitatem omiserit, non amplius repulsionē, nec deriuationē, sed alio remedii genere erit vtendum, veluti mollitione, digestionē,

*Deriuandi
artis due cō-
ditiones.*

stione, & incisione loci. quorum singulum est percurrēdū, si prius manifestauerimus, quomodo, in singulis morborum generibus, huiusmodi artem superius descriptā practici obseruent. Recte igitur & conuenienter, secundum ideam propositam, in capitis affectibus scapularum atq; humerorum scarificatione, iniectisq; cucurbitulis, & sanguinis p̄fusione enaribus, deriuatio fiet: quemadmodum etiam in phrenitide, delirio, & apoplexia, in qua p̄ vacuatione materiæ, quæ iā fluxit in cerebrū, & ipsius ventres, corpusq; obstruit 4. loc. aff. c. 2. sectione venæ cephalicæ, vel frontis, quam affectus capitis omnes a sanguine persanare affirmat Auic. cap. de cephalalgia: apud Rasim vero, sectione venarum iugularium. qui tamē in hoc non est sequendus, quod sine periculo non sit, tum quod ante sectionem fricare, & ligare cum opus sit, vt iugulares tumore & tensione se prodant, cerebrum magis repleamus, tum etiam, quod ex earum sectione hæmorrhagia fiat multa, & quæ difficile cohiberi potest & glutinari. Vertigines vero capitis vitio obortas, atque inueteratos capitis humores calidos, spiritusque plenos, deriuabunt præcisæ, quæ penes aures sunt, arteriæ: dolores priora capitis obsidentes deriuabit aperta frontis vena: occiput vero & posteriora cucurbitulæ ceruici humerisque appositæ: Aurium inflammationē, & parotides vena sub aures, gingiuarum, maxillarum, & dentium

*Deriuatio
in quib. mor-
bis vsurpetur*

*Capitis af-
fectus.*

*Phrenitis.
Delirium.
Apoplexia.*

*Rasis error
in cephalal-
gia.*

Vertigines.

*Capitis do-
lores.*

*Aurium in-
flammatiō.*

*Maxillarū
affectus cali-
di.
Pectoris in-
flammatiō.*

*ALTERA-
TIO.*

*Causa con-
tinentis &
antecedētis
in curatio-
ne differen-
tia.*

Calidiores affectus, quæ sub labiis est: angina, quæ sub lingua cernitur: pulmonū inflammationem, pleuritidem, pectoris, diaphragmatis inflammationē, eadem quæ reuellunt, pariter etiam deriuabūt: e iecoris cauis in aluum fiet deriuatio, e gibbis in vrinas. Sed hæc de modis, quibus materia remeabilis a loco motione locali fugatur. sequitur, vt aggrediamur secundum remedii genus, quod alteratio appellatur, quo mediante qualitates causæ continentis penes qualitates ortæ, eadē fere & tot numero sunt, quot sunt vitia in qualitatibus causæ antecedentis existentia: sequitur, quod iisdemmet ingeniis, & immutandi modis reducere poterimus. calfactos quidem refrigeratione, refrigeratos calfactione, humectos exsiccatione, siccatos humectatione, raros cōdenstatione, tenues incrassatione, nimis separabiles illinitione seu glutinositate, densos rarefactione, lentos abstersione, crassos vero incisione. in materiis solum differre videntur quoquomodo, q̄ cum causā continens in determinato morbo contineatur, etsi etiā iisdemmet, quibus causā antecedens immutari possit, ratione tamen proprietatū totius substantiæ, existentium in medicamentis determinatis membris familiarium, ex Gal. in libr. simpl. passim & repugnantium, quæ sola experientia noscuntur, cogimur diuersis materiis vti, aut commiscere hæc iis, quæ alterant, qualitatib. manifestis, ea quæ occulta quadā vi ad

ad determinata membra, iterans illud vni-
 uersale, cōducere valēt. Quā ratione, etsi oxy-
 mel pituitam coquat, incidat, tenuet, vacuet: *Oxymellitis*
 cum tamen ex æquo in omnib. corporis par- *ad determi-*
 tibus hoc efficiat, cum betonica tamen & pæ- *nata mēbra*
 onia coctum, id valentius in capite præstabit: *præparatio.*
 cum capparibus autem, aut tamarice in liene:
 cum eupatorio in hepate. Et hoc, quod medi-
 camentorum alia sint, quæ omnibus partibus
 conducant, alia vero, quæ etsi aliis quoque
 profint, vni tamen magis quam alteri con-
 ducere dicantur. atque hoc est illud, cur a- *Medicamē-*
 pud practicos plurima medicamenta a par- *ta quadam*
 tibus sint nominata: quorum alia cephalica *a partibus*
 appellantur, veluti ex calidis simplicibus be- *nomen for-*
 tonica, ex frigidis simplicibus viola, ex com- *tita sunt.*
 positis frigidis diambra, aurea Alexandrina: *Cephalica.*
 alia pneumonica, thoracica, pleuritica. valent *Pneumonica.*
 ex calidis simplicibus glycyrriza, ex frigidis *Thoracica.*
 simplicibus hordeum, ex calidis compositis *Pleuritica.*
 linctus de pinu, ex frigidis compositis saccha- *Cardiaca.*
 rum violatum: alia cardiaca, veluti ex calidis
 simplicibus crocus, ex frigidis simplicib. san-
 tala, ex calidis compositis diambra, ex frigidis
 compositis diarrhodon sine speciebus: alia
 stomachica, veluti e calidis simplicibus ab- *Stomachica*
 sinthium, cinnamomum, ex frigidis simplici-
 bus rosa, ex calidis compositis diacidonium
 Galeni, ex frigidis compositis saccharum ro- *Hepatica.*
 faceū: alia hepatica, veluti ex calidis simplicib.
 absinthium, ex frigidis simplicibus cichoreū

Splanica. omne, ex calidis cōpositis diaciminum, ex frigidis compositis diarrhodon abbatis sine speciebus: alia splenica, veluti ex calidis simplicibus chamēdris, ex frigidis simplicib. asplenū seu cetrach, ex calidis compositis diacalaminthe, ex frigidis compositis diasanthalon: alia
Nephritica. nephritica cystica, veluti ex calidis simplicib. radix apii, dauci, & etiam fœniculi, ex frigidis simplicibus semina magna peponū, melopeponū, ex calidis cōpositis oxymel scylliticū: ex frigidis ceratum santonicum: alia i
IctERICA. cterica, veluti ex calidis simplicibus pulegiū, ex frigidis simplicibus nymphæa, ex calidis compositis aromaticum moscatum, ex frigidis compositis ceratum santonicum: alia ar
Arthritica. thritica, veluti ex calidis simplicibus scilla, ex frigidis simplicib. acetum, ex calidis compositis oleum de been, ex frigidis compositis oleum rosatum. Quare, etsi eadem vivendi ratione, qua diximus alterutri vitia causæ, antecedentis penes qualitates contracta, vitia etiam causæ continentis immutentur, iisdem tamen recte immutari non poterunt, nisi commixtis cum aliquo possidente vim respiciendi magis partem vnam, quam aliam. Sequitur igitur, vt percurramus materias, quibus ii, qui praxin exercent, vti solent, varias, pro varietate partium corporis humani. Ob
Obstructio cerebri a materia pituitosa. id etsi in cerebri obstructione illa pendente a materia pituitosa, a qua pueniat amissio sensus & motus, non vtatur vt plurimum preparantib.

rantibus:& hoc, quod morbus non det inducias, sed ante concoctionem & præparationē euacuent per medicamentum purgans: in pa- *Paralysis.*
 ralyfi tamen, in qua pituitam prius præparant & coquunt, tenuantibus, tergentibus, vti solent melle rosaceo colato vsque ad sexcunciā cum duplo aquarum saluix, & betonicæ, a clementioribus transeuntes ad validiora, ad mel
 B rosatum, aut oximel simplex, aut syrupū acetosum simplicem, syrupum stæchados cū aquis prædictis, postremo ad syrupum stæchados solum cum dictis aquis, cauentes tamen *In paralysis acetata fungienda sunt.*
 in huiusmodi affectu ab aceto & acetatis omnibus:& hoc, quod etsi ad pituitā crassā tenuandā, & lentam incidendam sint efficacia, *Nervis quæ inimica.*
 neruis tamen, quorum affectus est paralysis, nocent, vt frigida & mordacia cætera. Ob id eo rarius vtendum & parcius, præsertim solo: additū enim mel rosaceum noxam ab eo prohibet. iisdē etiam in conuulsione vtentes, præ- *Aceti correctio.*
 sertim vbi morbus non sit vehementior, nec *Conuulsio.*
 dolorem afferat magnum, qui vires proster-
 nat. Tunc enim citra coctionem vacuandum est etiam potentibus remediis, ne interdum, dum coctio fieret, vires deficerent, & moreretur æger, vt hoc casu cucurbitula etiam parti conuulsæ applicata leui, si spasmus est paruus, cum scarificatione vero, si est magnus, vti possint. Ad eūdem modum in epilepsia, in inter- *Epilepsia.*
 missione causam alterantes genituram epilepsiam, quæ fere est ipsa pituita, melle rosato

*Cerebri in-
flammati-
o.
Phrenitis.*

*Cordis tre-
mor a ma-
teria cali-
da.*

*Cordis tre-
mor a ma-
teria frigi-
da.*

*Syrupi pe-
ctorales.*

coquentes, oximellite simplici, composito, scyllitico, syrupo stæchadis cū aquis capitalibus, præcipue hyssopi. In cerebri autem inflammatione illa, quæ phrenitis appellatur, præter viuendi rationem tenuem, refrigerantem & astringentem, syrupis præparantibus non vtētes, sed non apparatam materiam, quod turgat, aut vacuari suapte natura sit habilis maxime, nec morbus det inducias, euacuantes, quod periculum sit, ne phrenitis, quæ est erisipelas meningum cerebri, confirmetur, & fiat absolutum apostema. In intemperie autem cordis calida a materia calida crassa, a qua exempli gratia proueniat tremor cordis, appa- rantes materiam crassam calidam syrupo violato, intibi, ex succo oxalidis, ribes acetoso: & ubi valentius refrigerare volunt, syrupis maxime cardiacis, ex succo acido limonum, aut potius citrorum, cum aqua rosarum, portulacæ, lactucæ, intibi, solani, plantaginis. In intempe- rie autē cordis frigida a materia frigida, a qua cordis tremor: pituitosam materiam inciden- tes, tenuantes, tergētes melle rosato, oximel- lite simplici, composito, scyllitico: & ubi valē- tioribus indigent, syrupo de duabus & quin- que radicibus, cum aqua betonicæ, scabiosæ, mellisophylli, quæ sanguinem cordis humore melancholico expurgat: vtentes etiam ad idē syrupis pectoralibus, glycyrrhizæ, hyssopi, præ- sili, syrupo de thymo, de epithymo, de pomis a Melue scriptis in melācholia: syrupo sumariæ cum

cum aquis buglossi, vtriusque fumariæ, scolopendrii: aduertentes semper in, apparâdis materiis causantib. cordis affectus, ne aut calida aut frigida immoderata sint, vtraq; enim moderata esse debent, ne cor pars princeps, & vitæ fons, ab immoderate tam calidis quam frigidis in contrariâ intemperiem præcipitetur: quin immo in calida intemperie, frigidis aromata quædam calida admiscenda, vt frigidorum aditum sibi densando præcludentiū, vim ad cor ipsum deducât, nisi magnum sit cordis incendium: vt in causo, in quo solis frigidis est pugnandum, quales trochisci de caphura Rasis. In intemperie autem pectoris calida, aut pulmonum cum materia calida, a qua proueniat tussis, materiâ calidâ & tenuem fluere paratâ apparantes frigidis & crassantibus, sed lenientib. vias, nō autē materiâ pulmoni affigētib. & inculcantibus, velut syrupis, quos appellant pectorales, cuiusmodi sunt violatus, & iuiubarum, aut decocti hordei vncias quinque aut sex. In intemperie vero pectoris frigida pendente a materia frigida, a qua itidem tussis proueniat, syrupo glycyrrhizæ melle rosato etiam terforio, syrupo hyssopi, terforio magis, & syrupo marrubii, maxime horum omnium tergente, cum duplo aquarum scabiosæ, hyssopi, prassii, fœniculi, adiathorū, vel decocti horum simplicium, & glycyrrhiza, dactylorū; quod etiam per se (dulce enim est) mane calens dari potest. Amplius materiam pulmonibus cō-

Causus.

Tussis a materia calida.

Tussis a materia frigida.

Materia pulmonibus concepta ad expuendum præparatio.

*Pulmonis
in phthisi
roboratio.*

*Asthma ab
obstructione
pulmonis
aut pectoris.*

ceptam exipui facilem reddentes (in quo studio curationis pars est præcipua) calidam quidem & tenuem pulmonibus immerfam crassantibus, ut efflatione expellatur, non autem tussim ob tenuitatem eludat, nec dissiliat, elegmatis quibusdam lentis, veluti de papauere, diacodione, saccharo violato, iulep, & syrupo violato, e dragacanto, decocto hordei saccharato, quæ cochleari sumta in faucibus paulatim deglutiantur, lib. de usu partium, ut portio eius quædam in asperam arteriam deerret, ubi nobis edentibus, & bibentibus, cibi & potus portio tenuior eodem transferatur, vel potius inspiratu violento in asperas arterias trahantur, & aliquanto post tussi reiiciantur, foris autem thoracem oleo violato inungentes. Existente autem materia frigida elegmate sano, & experto, vel ex pulmone vulpis a Mesue scripto in curatione phthisis miro in pulmone roborando, syrupo glycyrrizæ sæpe sumendo, ut prius cochleario per se, vel cum decocto vuarum passiarum, ficuum, glycyrrizæ, & aliorum pulmonariorum: item penidiis e diariis Nicolai ad ciceris magnitudinem: foris illinendo oleo amygdalarum dulcium per se, aut etiam cum butyro recenti non falso, & croco pauco, vel etiam oleo, & mucagine seminum lini, scænugræci, maluæ, althææ. In obstructione autem pulmonis, aut pectoris a materia pituitosa crassa, a qua proueniat exempli gratia, difficultas anhelitus, velut asthma, apparantes materiam

materiam in pulmone collectam, calfacientibus, humectantibus, incidentibus, tenuantibus, tergentibus, iisque præsertim, quæ familiaritatem, & proprietatem cum his partibus habent: qualia sunt syrupi glycyrrizæ, hyssopi, prassij, & his valentioribus de duabus & quinque radicibus, oxymellite item simplici, composito, & valentius scyllitico, cū duplo aquarū hyssopi, feniculi, vel decoctis radicis helenii, vuarum passerarum, daëtilorum, adianthorum, & cæterorum thoracicarum: illud semper aduertentes, ne multum calidis initio utamur, ne tenui resoluta, crassum exspuitioni ineptū relinquatur. Amplius promotione sputi causam continentem eicere conatur: quod quidem efficiunt roborando thoracem, arterias asperas dilatando, & incidendo: simplicibus in hunc modum, glycyrriza, uis passis, ficis siccis, mixis, ziziphis, adianthis, hyssopo, scabiosa, radicibus helenii, aristolochiæ rotundæ foliis, & semine vrticæ, & cæteris dulcibus, nitrosis, salis, amaris, acris, vel compositis ex his & similibus, syrupis, electuariis, elegmatis, quale ex brassica, & pulmone vulpis factum, ab omnibus scriptoribus celebratū proprietate pulmones iuuare, uti pulueris erycii syluestris drachmis duabus sæpe sumtis, radice ari cruda, vel potius elixa, aut sub cineribus asfata, trita, & syrupis thoracicis mixta, sputum efficacissime promouente, veluti ad semiunciam, cum elegmatis de pinu, & de pulmone

*Sputū pro-
mouentia.*

vulpis ana drachmis sex, cū syrupo glycyrrizæ commixtis, addendo secundū quoddā vuas passas purgatas, ficus, dactilos, peniciā, hyssopum, adianthum: foris autem illinendo oleo amygdalarum dulcium, butyro recēti, cū pauco croci, & linteis asperis molliuscule fricādo, vt per poros apertos aliquid materiæ exhalet.

Pleuritis.

In pectoris autem inflammatione illa, quæ **B** pleuritis appellatur, apparatus calida materia tenuis, & biliosa, a qua pleuritis frequenter fieri solet (nisi turgat) quod frequenter est. Nam tunc mox erit vacuanda, syrupo violato, ziziphorum, cum duplo aquæ hordei, vel aquæ coctæ, & saccharatæ. Cauendum enim a reliquis, veluti lactuca, & portulaca valenter refrigerantibus, & hac ratione sputum prohibentibus. Syrupi autem acetati, quamuis eadem præstent, præsertim in bile crassa, thoraci tamen nocent: sed vtendum erit decocto violatum, ziziphorum, mixorum, hordei, cū syrupo glycyrrizæ, ziziphorum post tertium, aut quartum diem. Amplius apparabitur redditione sputi facile fluidi: nimirum, quod sputum materiæ pleuritidem committentis, & in pulmones exsudantis facile, & fluidum reddentibus, variando syropos per varia eius tempora, veluti syrupo violato, & ziziphorum ad quartum vsque diem, dein syrupi violati vnc. j. cum vncia media syrupi glycyrrizæ, cum aquæ saccharatæ, aut decocti hordei vnc. tribus, violatum semper proportionē dimi-
nuentes:

Syrupi acetati nocent thoraci.

Preparatio materia in pleuritide.

I.

nuentes:apparando etiam materiam iis, quæ
retinentur in ore, habentibus vim promouē-
di sputum, veluti saccharo albo, saccharo can-
do, & violato, iulep violato, diatragacantho
per se, aut iulep violato excepto, diabuglossa-
to quoque ad cordis robur. His ad diem
quartum perfectis, syrupo glycyrrizæ per se,
vel elegmate de pinu, vbi aderit vehemens
febris, cauendum erit a calidioribus, & mi-
nus calidis erit vtendum. Apparabitur etiam
huiusmodi causa continens, illinitione foris
facta ad quartum vsque diem, cerato ex cera,
& oleo violato, & amygdalarum dulcium,
postea ex amygdalino solo, vel camomellino.
Ad eundem fere modum progredientes in
peripneumonia, in intemperie ventriculi
frigida humida, a qua proueniat hoc sympto-
ma, exempli gratia, quod imbecillitas ven-
triculi appellatur: apparabitur materia inci-
dendo, attenuando, tergendo: si materia fri-
gidior ventriculum reddiderit laxum, syrupis
stomachicis erit corroborandus. Quorum
præstantissimi sunt syrupus absinthii Ro. &
hepar roborans, syrupus, seu miuacidonio-
rum aromatica, syrupus menthæ cum duplo
aquæ menthæ, & absinthii præcipue, vel læ-
niculi, betonica. Intemperies vero calida a
causa calida, syrupo cidoniorum, rosato, ex
succo oxalidis, e ribes, cum duplo aquæ rosa-
rum. Intemperies sicca lacte, balneo, & cate-
ris habentibus humectandi vim. Ad eundem fe-

2.

3.

Peripneumonia.

Ventriculi imbecillitas

Ventriculi laxitas a materia frigida.

Ventriculi intemperies calida a causa calida.

Ventriculo inter sicco.

*Præparatio
materia in
obstructione
hepatis.*

*In obstru-
ctione he-
patis a ma-
teria frigi-
da.*

*In obstru-
ctione hepatis
a materia
& pituita*

*Præparatio
materia in
inflammatione he-
patis.*

*In intem-
perie lienis.*

re modum procedentes in intemperiebus hepatis. In hepatis obstructione apparatus materia, si bilis erit crassa, frigidis quidē, & tenuantibus, & aperientibus, veluti intibo hortensi, & agresti, cichorio, & omni seridis, sonchii, hypericii, chondrillæ genere, syrupo cichorii a Nicolao scripto, cum rhabarbaro, aqua foliorum, & radicum plantaginis, decocto quinque seminum communium frigidorum, rhabarbaro. In obstructione vero a materia frigida incidentibus, tenuantibus, tergentibus materiam, veluti melle rosaceo, oxymellite, syrupo bizantiorū, radicum duarū, aut quinque, cum aquis fœniculi, cassiæ, eupatorii, asparagi. Vbi pendebit a materia mixta ex bile & pituita, temperatis erit apparanda, veluti lupo salictario, vuis passis, glycyrriza, adiantho albo trochiscis rosarum, vel eupatorii: vel calidis, & frigidis prædictis certa mensura mixtis, ut dialacca, diathecuma, prassij decoctū, trochisci rhabarbari cum aqua cichorii, intibi, diarrhodo. In hepatis autē inflammatione apparatus materia mixta cū iis, quæ semper astringentibus sint associata, ad partis principis robur seruandum, veluti syrupo rosato, ex succo oxalidis, e ribes. si pituita aderit melle rosato, oxymellite simplici, syrupo de duab⁹, & quinque radicibus, præsertim si phlegmon aderit in gibba hepatis, & cocta iam sit, & corpus reliquum purum: si melancholia, syrupo fumarie, & de pomis simplici. Intemperies vero lienis,

lienens, quacunque illa sit, aut calida, aut frigida, vt intemperies hepatis erit emendanda. In obstructione lienis iisdem etiam procedentes, quæ obstructionem tollant, quibus materiam iecur obstruentem leuari diximus; quod vtrunque viscus similibus genere medicamentis indigeant, quoad præparationem, & etiam euacuationem. in hoc solum differunt, quod lien tanto fortioribus eget, quanto crassiore vtitur alimento. In inflammatione autem lienis eodem modo etiam procedentes, & in fomentis, & cataplasmatibus, veluti in hepatis inflammatione dictum fuit. dummodo semper admisceamus ea, quæ citra euidentem calorem extenuant, incidunt, & relaxant: & hoc, ne crassus in eo succus obturatus vehementius incrassescat, quemadmodum 13. meth. discurret Galenus. In obstructione autem renum, & calculi præcautione, materia pituitosa in rene existens tergentibus erit apparanda. atq; hoc est illud, cur practici multum confidant in ciceribus, glycyrriza, saccharo; veluti decocto cicerum cum glycyrriza, & saccharo ab vncijs sex ad octo, accepto pridie medicamento leniente ex cassia. Amplius iure galli decrepiti saccharato, aqua lactis caprini, parietariæ decocto, vel aqua, vel succo residente purgato, & saccharato. quanquam hæc omnia non solum causam continentem præparent, sed illam etiam e rene, quod vretica sint, extrahere, & vacuare valeant. In renū aut inflammatione appa-

In obstructione lienis

In inflammatione lienis.

In obstructione renum in præcautione calculi

In inflammatione renum

Y

rabitur materia, si ea, quę refrigerandi, leniendi quoque vim obtineant, vt fomenta, lini-
menta, emplastra, pręter vim refrigerandi,
modicam tamen leniendi quoque obtineant
vim, veluti si cōfecta sint ex oleis rosaceo, co-
roneorum, camomillino; farinis hordeacea,
fabacea, scęnogręci, lini semine, & similibus
in iocinoribus inflammatione fieri solitis. In in-
temperie autem vteri frigida, a qua proueniat

*In intempe-
rie frigida
vteri.*

*In suppres-
sione men-
sium.*

*In intempe-
rie calida
vteri.*

*In obstru-
ctione ute-
ri, a qua
mēsiū sup-
pressio.*

1.

2.

3.

exempli gratia mensium suppressio, appa-
bitur materia pulegio, thymo, calamento,
abrotano, dictamo, radice iridis, cassia, acoro,
asaro, & sauina; e quibus decocta, & fomenta,
& alia parari possunt. In calida autem intem-
perie suppressionem causante, victu erit ap-
paranda humectante, vtpote ptisanę, & alicę
sorbitionibus lacte, oleribus, lactuca, balneo,
& ceteris heclicis conuenientibus. At in v-
teri obstructione, a qua mensium suppressio,
parabitur materia, si sanguinis erit multitudo,
venę sectione poplitis, aut malleoli: & hoc,
quod sectio materias exagitet, locoq; moueri
cogat, aut sit sanguinis crassitudo, aut etiam
nimia pituita. si erit ratione crassitudinis san-
guinis, & lentoris, tenuandus erit, inciden-
dus, tergendus, liquandus syrupis bizantino,
duarum aut quinque radicum, hyssopi, cum
aquis apii, scęniculi, petroselini; trochiscis
quoque de rubia, & qui a Rasi scribuntur: sin
erit a pituita, iisdemmet erit apparanda, foti-
bus etiam & sacculis pectini, & lumbis ad-
motis,

motis, in fessu ex decocto pulegii, origani. Sed hæc de modis pellendi vitia causæ continentis penes qualitates oborta. Sequitur, vt aggrediamur tertium remedii genus, quod vacuatio appellatur. Quo mediante eiicitur penitus e corpore humor in membro contentus, incipientes a vacuatione per pharmacum. PURGATIO PARTICVLARIS est euacuatio eius repletionis, quæ virtuti alicuius membri particularis vim infert, facta medicamento recte & conuenienter exhibito, vt actiones læsæ pristinae suæ dignitati restituantur. Ideo autem dicitur: Purgationem particularem esse euacuationem, quod euacuatio sit commune genus tum phlebotomiæ, tum pharmaciam, & vniuersalis, & particularis. Quod sequitur, esse euacuationem eius repletionis, quæ virtuti corporis vim infert, facit differre huiusmodi purgationem particularem a quocunque phlebotomiæ genere, tum vniuersali, tum particulari. Quod autem sequitur, esse euacuationem eius repletionis, quæ virtuti alicuius membri particularis vim infert, eo spectat, vt seiungatur a purgatione vniuersali, quacunque ea sit, quæ destinata est ad expurgandas vias communes, ac publicas corporis regiones, per quas vniuersum corpus expurgari potest. At particularis hæc purgatio limitata est, & contracta ad expurgandas determinatas aliquas corporis humani partes, excrementis subiectas, quæ nec late dimanant, nec in

III.
Vacuatio.

Purgatio
particularis.

Purgationis
particularis
& phlebotomia
differe-
rentia.

Purgationis
particularis
& vniuersalis
differe-
rentia.

*Materia
purgationis
particularis*

vniversum corpus influunt, cuiusmodi sunt cerebrum, pulmones, renes, & vterus. Quod postmodum sequitur: huiusmodi particulare purgationem fieri medicamento recte, & conuenienter exhibito, ad id spectat: vt notet instrumentum, quo mediante fienda est huiusmodi particularis purgatio, atq; artem tractandi illud instrumentum. Instrumentum autem & materiae, quibus membrum aliquod particulare ab humorib. sibi molestis expurgari poterit, aliud non erit, quam eademmet medicamenta, quibus superius diximus purgari, ac eiici posse e corpore antecedentem causam: in hoc solum differunt, quod iisdemmet medicamentis ducentibus a corpore vniverso, vbi commiscuerimus aliquid, quod respiciat particulare aliquod membrum, illud magis euacuabitur a parte illa, quam ab aliis corporis partibus ratione medicamenti, medicamento associati magis dirigentis medicamentum illud ad vniam partem, quam ad aliam; veluti si bilis sola purganda erit, & detrahenda ab aliquo membro determinato, aut pituita sola, aut melancholia sola, aut duo humores simul, veluti bilis pituita; bilis melancholia, pituita, melancholia; aut omnes tres simul, bilis pituita melancholia, iisdemmet medicamentis, quibus diximus purgari causam antecedentem, iisdemmet causa continens purgari poterit, dummodo aliquid addamus illi medicamento, quod ad partem illam determinatam medicamentum

mentum illud magis quam ad alias conduce-
re possit: eaque quæ medicamento adduntur
non solum partis determinatæ familiaritatē,
sed etiam temperamentum, & anni tempus,
& alias circumstantias respiciant. In hunc
modum, si pituita erit purganda a capite, aga-
rico purgari poterit, & aliis, quibus diximus
pituitam purgari posse, dūmodo illi addamus,
si patiens erit calidæ temperiei, & tempus
æstiuum, caphuram, santalos rubros, ac lute-
os; si vero est temperiei frigidæ, & hyems ad-
esset, nucem miristicam, stæchadem, hyssopū,
spicum nardi, & lignū aloes: quod huius-
modi omnia cum caput respiciant, magis et-
iam apta sint medicamentum illud ad caput
potius, quam ad alias conducere. Sin autē pi-
tuita a pectore erit ducenda, & sumens sit ca-
lidæ temperiei, & tempus æstiuum, medica-
mentū erit associandū capillo veneris, violis,
hordeo, amygdalis dulcibus, passulis: sin aut
erit frigidæ temperiei, & hyems vigeat, cōmiscē-
da erūt iris, nasturtiū, myrrha, aristolochia,
prassiū, hyssop⁹, cardamomū, scylla, sin ab he-
pate intentio sit educere intemperie frigi-
dæ, & hyeme, spica erit conducendum medi-
camentum eupatorio, absinthio, amygda-
lis amaris, cinnamomo: in temperie calida
& æstate, spodio, fumaria herba, endiuiā, la-
ctuca, & santalis. Cum vero a iuncturis erit e-
uacuandum in æstate associandum erit traga-
cantho, succo caulium, & similibus: hyeme

*Pituita a
capite pur-
gatio in tē-
perie calida
& tēpore æ-
stiuo.*

*In tēperie
frigida &
hyeme.*

*Pituita a pe-
ctore edu-
ctio*

*Pituita ab
hepate du-
ctio.*

*Pituita a iū-
cturis va-
cuatio.*

*Aliena**Arenibus
& vesica.**Ab utero.**Ars recte &
conuenien-
ter exercen-
di purgatio-
nem parti-
cularem.*

vero scylla, polio, cardamomo, assaro, acoro, scordio, amomo, chamædri, chamepithi. Si a lient, in æstate thamarice, salicis cortice, agnocasto, daucor in hyeme vero & frigida temperie, cappari, scylla, scordio, scolopendrio, assaro, spica, salgemma, calamentho, marrubio, eupatorio, absynthio, aniso. Sin a renibus & vesica, in quacunque temperie, quinque radicibus aperientibus erunt commiscenda, videlicet petroselini, fœniculi, apii, asparagi, rusci, saxifragia, atque milio solis. In æstate vero & calida temperie peponum seminibus ac cucurbitarum, a cantharidibus cauendo, quod extrinsecus potius quam intrinsecus sint applicandæ. Ab utero vero, in æstate capilli ueneris erunt commiscendi, pimpinella, rubia tinctorum: in hyeme vero & frigida temperie pulegiam, calamentum, sabina, ruta, matricaria, iuniperum, myrrha, & huiusce generis alia, atque hæc omnia, quæ in pituita educenda ab aliqua corporis parte determinata dicta sunt, traducenda erunt etiam ad aliorum humorum purgationem: bile scilicet, atrabile, atque aliis humorum differentiis simul complicatis. Et hoc, quod simplicia iam enarrata cholagogum medicamentum æque deducere valeant ad illa membra, ut ducere possunt phlegmagogum, & atrabilem euacuare aptum. Arte autem particularis purgatio exercebitur & recta & conuenienti ratione, ex obseruatione earum condicionum, quas

quas diximus esse seruandas in purgatione
 causæ antecedentis: nimirum ex consideratio-
 ne humoris, seu quod genus humoris a mem-
 bro sit purgandum, & hoc, quod a determi-
 nata specie humoris, determinatum medica-
 menti genus eligatur: quantitas medicamenti
 itidem ex quantitate humoris, atque eius situ:
 tempus purgandi materiam conuenientem,
 & vtendi particulari purgatione commodum
 & arte factum erit, si prius reliquum corpus v-
 niuersali præmissa aliqua purgationis specie,
 probe fuerit exinanitum, prorsusque excre-
 mentis vacabit: ne dum euacuatur membrum
 aliquod particulare, aliunde noxii humores in
 affectam sedem rapiantur. Vnde semper vni-
 uersalis curatio particulari est præmittenda.
 Loca vero & viæ, per quas commode materia
 & causa continens erit educenda, ex locis &
 viis sumenda erit in affectam sedem e directo
 ferentibus. Ob id pro cerebri purgatione qui-
 praxim exercent, errhinis atque apophlegma-
 tismis vti solent: errhinis quidem per nares vel
 vel immixtis, vel haustis, a cerebro purgantes
 superuacuum pituitam, non eam quidem, quæ
 in ventriculis, cum a ventriculis nulla via ex-
 currat in nares, sed eam, quæ circa cerebri sub-
 stantiam, circumque meninges colligitur &
 fluitat, iubentes, vt prono capite hauriatur, &
 hoc, vt recta per os & homoides feratur, nec
 recidat in fauces. Similis est sternutamenti ra-
 tio differens vi maiori: quod ratione vehemētis

*Purgatio
 vniuersalis
 debet præce-
 dere parti-
 cularem.*

*Pituita cir-
 ca memir-
 ges collecta
 purgatio
 per errhina.*

*Sternuta-
 menti ab
 errhinis dif-
 ferentia.*

*Apophleg-
matismis
vitendi tem-
pus.*

*Pituita a
capite pur-
gatio per
Errhina
blandiora
& valen-
tiora.*

*Per apo-
phlegma-
tismos.
Per garga-
rismata.
Apophleg-
matismi &
gargarisi-
mata qui-
bus nocent.
Paralyfis.*

succussionis, ratione cuius non modo cere-
brum expurgat, sed & quæ in partem eius po-
steriorem, atque etiam in fauces irruunt, vali-
do incussu reuellit. Apophlegmatismis vero **B**
seu mansu, seu gargarizatu, quibus saluam at-
que pituitam ore deducunt, quibus vis maior
inest expurgandi cerebri ventriculos: & hoc
ratione viæ ab illis declinuis in palatum: aduer-
tentes tutiorem esse istorum vsum confecto
iam cibo, quam cum crudus venter est, ciboq;
turgens. Atque hoc est illud cur practici in in-
temperie capitis frigida & humida a pituita
pendente, post vniuersi corporis euacuatione
volentes a capite pituitam vacuare, sternuta-
toriis & errhinis illam vacuare nituntur, blā-
dioribus primum, veluti aqua vel succo maio-
ranae, betæ foliorum aut radicum: deinde vbi
opus est, valentioribus, veluti puluere piperis,
struthii, ellebori albi cū succo betonicae, me-
lisophilli, rutæ, radicis cyclaminis, apophleg-
matismis vero ex mansu mastices, vuarum no-
strarum elibano siccatarum, baccarum oxia-
canthes, pirethri, staphidosagriæ: gargarisma-
tis denique expurgante aliquo prius dicto in
aqua quapiam capitali soluto: aduertentes ta-
men cum Auicenna apophlegmatismos, &
gargarismata noxia esse propensis ad cathar-
ros, & affectus alios pulmonis, & thoracis, ob
id hæc in his esse vitanda. Ad eundem modū
in paralyfi procedentes pro auertenda in con-
trarium materia, sternutatoriis, errhinis, apo-
phleg-

phlegmatifinis, & gargarifmatis ante dictis: iif- *Conuulfio.*
dem etiam in conuulfione progredientes, iif-
demmet in apoplexia. Pro pulmonis autem, *Apoplexia.*
pectoris, & interiorũ thoracis expurgatione, *Thoracis*
bechicis procederes; quod ex his partibus etfi *expurgatio.*
non nihil detrahi poffit in alium, per exiguũ
tamen fit: eaque in lentam & craffam medica-
menti formã, qualis elegmatis eft, aut fyrupi,
adminiftrantes, vt diutius fubfifteria, ac fau-
cibus obhærẽtia maiore portione fubire pof-
fint in afperam arteriam, nec ita præpropere,
ficuti fi liquida effent, in ventrem illabi. Atq;
hoc eft illud, cur practici in intẽperie pecto-
ris, aut pulmonum cum materia pulmonibus
cõcepta, tuffim caufante, in calida quidẽ vtunt̃ *Tuffis a ma*
elegmatis quibusdam lentis, obtinẽtibus vim *teria calio*
incraffandi materiã, vt efflatione expelli pof- *da.*
fit, & tuffim fui tenuitate nõ eludat: veluti ele-
gmate de papauere, diacodione, faccharo vio-
lato, fyrupo violato tragacãtho, decocto hor-
dei faccharato: aduertentes vt paulatim deglu-
tiantur: & hoc vt aliqua portio in afperã arteriã
deerret. In frigida vero elegmate fano & ex- *Tuffis a ma*
perto, vel ex pulmone vulpis Mefuæ, fyrupo *teria fri-*
glycyrrhizæ, & huiusmodi. Ad eundem mo- *gida.*
dum procedentes in obftructione pulmonũ,
aut pectoris facta a materia pituitofã craffã, a
qua proueniat anhelit̃ difficultas, veluti afth- *Ahma ab*
ma, fputum promouere nituntur. Sputum *obftructione*
autem promouent roborando thoracem, di- *pulmonum.*
latando afperas arterias, & incidendo, hisque

*Sputum pro
mouentia.*

que vel simplicibus, veluti glycyrriza, vuis pal-
lis, ficis siccis, adianthis, hyssopo: vel cōpositis,
quale elegma ex brassica, & ex pulmone vul-
pis, radice ari cruda, vel potius elixa, & syrupis
thoracicis mixta, sputū efficacissime pmouē-
te. Ad eundem modum procedentes etiam in

*In pleuritide
sputi promo-
tio.*

pectoris inflāmate illa, quæ pleuritis dici-
tur, reddendo sputa facile fluida: veluti syrupo
violato, ziziphorum, vel vtroq; simul mixto,
cum aque saccharatæ, aut decocti hordei vnc.
tribus: sputum quinetiā promouentes iis, quæ
habent vim eliciendi sputum: veluti saccharo
albo, saccharo cando & violato, diatragacan-
tho per se, aut iulep violato excepto. Pro renū
autem, & vesicæ purgatione vreticis vtentes.

*Renum &
vesicæ pur-
gatio.*

Atq; hoc est illud, cur practici in obstructione
renum, & præcautione calculi, volentes eua-

*Pituita in
obstructione
renum va-
cuatio.*

cuare materiam pituitosam a loco renū, vre- 72
ticis illā vacuare nituntur: veluti decocto ci-
cerū, præsertim cum glycyrriza & saccharo,
ab vncis sex ad octo: accepto pridie medica-
mento leniente ex cassia: id enim decoctū re-
nes & vesicam multum terget, ciceribus, gly-
cyrriza, saccharo: vel iure galli decrepiti sac-
charato, & aqua lactis caprini. Ad eundē mo-
dum in renum inflāmate, cōcocta scilicet
ac sedata inflāmate, q̄ ex doloris remissio-
ne cognoscetur. Neque enim initio ea, quæ v-

*Renum in-
flammatiō*

*Diuretica
nō conueni-
ūt in princi-
pio inflama-
tionis renū*

rinam mouent, medicamenta sunt bibēda ex
Gal. 13. met, q̄ mordaces humores inflāmati
partibus inducant, & vehementer oblādant:
quin-

quinimo ab euacuatione per medicamētum purgans initio est cauendum, sed clysteribus mollibus solum est vtendum: per vrinam puocantia postmodum purgare solent, quod a concoctis inflammationibus vrinae prodeant multa & crassa, veluti fœniculo, apio, & pistaciis probe percoctis. Ad eundem modum in iecoris phlegmone, præsertim in parte iecoris gibba, vrinam mouentibus, quod materia, quæ simam occupat, deiectione sit vacuanda, dum modo utrobique pauca adsit materia: quæ ubi multa est, etiam per intestina Gal. 13. meth. purgatio sit suspecta. Qua ratione non sunt pertranscunda cassia, manna, rhabarbarū infusum pro vacuatione bilis, ubi abundabit, quod non trahant a longinquo, nec materias exagitando ad fluendum incitent. Pro vteri autem purgatione hysterice vtentes. atque hoc est illud, cur in vteri obstructione: a qua proueniat mensium suppressio, ubi præterrim vasa in vterū desinentia clausa sunt, mercurialem herbā tusam linteo inuolutam pessimo modo noctu immittant appensam filo, vel melanthii farina, vel mithridati drachma vna, cū mastices scrupulo vno: quæ hæc non solum repellat, sed etiā valentius attrahat, quod apophlegmatismo probat: ubi hæc non suffecerint, opoponax, galbanum, sagapenū, ammoniacū, eupatoriū parū pectini adinouenda, vel pessō immittēda. Pro alui autem purgatione balanis & clysteribus procedunt: hoc modo

Iecoris phlegmone.

Vteri purgatio.

Mensium suppressio.

*Ars recte
purgandi
materiam
continentē.*

*Appetentia
canina.*

Hiera.

Pica.

sane & ex iis locis purgatur materia continētes, in diuersis locis contentæ. Quoniam autē in purganda materia continente in determinatis corporis partibus existente, ad plura respicere oportet pro illius euacuatione, cum non solum materiam purgandam, sed & morbum, & symptoma, & locum affectum respicere debeamus. Quapropter vt purgatio materiae continentis recte & facile haberi possit, medicamenta purgantia proponemus, quæ habita ratione causarum, morborū, symptomatum, & locorum affectorum materias illas e diuersis corporis partib. purgare possint, incipientes a materiis purgandis ab ipso ventriculo. Porro si materia purganda, sit humor acidus frigidus, morbus autem intemperies frigida, symptoma appetentia canina, locus affectus os ipsius vetriculi, in quo materia illa cōtineatur, huiusmodi medicamento conuenienter euacuabitur, ex hieræ drac. ij. ex vino cū aqua calida diluto, quod hiera extrahere ex profundo oris ventris imbibitum humorem, & per aluum inferne euacuare possit: & hoc ratione materiae: ratione vero intemperiei in ventriculo inductæ, non tantum calfacere, sed etiā desiccare possit: ratione vero loci affecti, ventriculi scilicet, ventriculo robur addere possit, ne nocuum humorem suscipiat: vel in hunc modum. ℞. hieræ drac. j. β. agarici trochiscati. scrup. ij. formentur catapotia. Ad eundem modum in pica, vitiosus humor vomitu

mitu vacuandus erit, aut acris sit humor, aut
 B acidus, aut salſus: ex aqua tepida: & vbi diffi-
 cilius erit vomitus, adiuuandus erit pauculo a-
 ceto, aut ſyrupo acetoſo, & vbi materia erit
 craſſior & viſcidior, rafani decocto cum aceto
 mulſo, vel hoc purgante ex picra Gal. Atque
 ipſo rhabarbaro, ſeu agarico pro ratione re-
 dundantiæ humoris peccantis. Aduertendum
 autem eſt in mulierib. grauidis, quæ hoc ſym- *Pica graui-*
 ptomate affligi ſolent, alia via quam per vom- *darum.*
 itum non eſſe tentandum humoris exitum, cū
 huiusmodi affectio potiffimum primis men-
 ſibus contingere ſoleat ex Hippocratis ſentē-
 tia. Sin autem morbus ſit calida & ſicca intē- *Sitis ex bile.*
 peries, materia ſit bilis, ſymptoma ſit ſitis, eua-
 cuanda erit per vomitum copioſa aqua tepida
 addito aut pauculo aceto, aut ſyrupo acetoſo,
 prius exhibendo humectans alimentum, ve-
 luti ptifanæ cremorem. Vbi autem difficilis *In vomitu*
 erit vomitus, per inferna lenientibus medica- *difficili per*
 mentis erit purganda, veluti caſſia fiſtula, aut *inferna pur-*
 ſyrupo ex plur. inſuſ. viol. cum tamarind. deco- *gandum eſt.*
 cto. Sin autem materia erit pituita ſalſa, ptifa-
 na ac eius cremore, melle roſaceo, aut diluta
 aqua mulſa. Sin autem ventriculus & inteſtina *Lienteria*
 laborabunt intemperie calida, materia acris & *ex intempe-*
 mordaci associatis cū hoc ſymptomate, quod *rie calida.*
 lienteria appellatur, prius præparandus humor
 hoc medicamento, dein erit purgandus: ℞
 corticum mirab. citrin. drac. iij. tamarin. drac.
 vij. facto decocto in aqua cichorii, accipiendo

*Lienteria ex
intemperie
frigida.*

*Ventriculi
coctio dimi-
nuitur.*

*Qui vomere
non potest
non est co-
gendus.*

prædicti decocti quantitatem sufficientem,
atq; in eo dissoluendo syrupi ex plurib. infus.
ros. rub. vnc. iij. rhabarbari in parte prædi-
cti decocti macerati drac. j. fiat potus. Materia
vero existente pituitosa, & intemperie frigida,
ad quam sequatur lienteria, aut vomitu erit
vacuanda: si in ventriculo existet, aut si in inte-
stinis, deiectione hoc medicamento fienda: ℞
corticū mirab. cheb. drac. iij. infusis in aqua
melissæ & borraginis, & facta forti expressio-
ne in ea dissoluendo syrupi ex plurib. infus. ros.
psic. ʒ. ij. agarici ʒ. j. fiat potio: vel pillulis for-
matis ex pul. hieræ simpl. Gal. ʒ. iij. agarici ʒ. ij.
In coctione vero diminuta, abolita etiam i-
pſius ventriculi, vbi pendeat ex multitudine
alimentorum, quæ concoqui nequeat: consi-
derandum erit, si alimentum sit diminute cō-
coctum, & existat in superiori ventriculi par-
te, ita vt concoqui possit, & tunc adiuvandum
erit exhibitione diatrionis piperis simplicis-
simi, modo a Gal. 4. san. tuen. scripto: aut eius
loco tantundem piperis longi aut albi, aut ni-
gri: aut si difficile possit coqui, si in ventriculo
erit, & æger facile vomat (quod cogere eū qui
vomere non possit sit absurdum ex Gal. 1. loc.
aff.) vomitus promouendus erit potu aquæ te-
pidæ multæ, pauco aceto, aut oxymellite, aut
si vomere nō poterit, aut quod nutrimentum
ad inferiora ventris sit motum, p sedē erit eii-
ciendū, eius expulsionē adiuvando aut glande
subdita, aut leni p clysteres infusione 8. meth.

Vbi

Vbi vero ventricul⁹ inflatione seu flatu torque-
bit, vomit⁹ erit ciendus vomitoriis supra ad-
ductis, & per inferius glandibus ex rebus fla-
tum discutientibus formatis, veluti est rutæ
semen, & ciminum æquali pōdere, cum mel-
le cocto, aut ex rutæ foliis contusis, ciminio
paucō, sale, & caricis simul inuolutis balanos
conficere: aut hoc clysteri: ex foliis rutæ, flo.
camom. pulegii, & calaminthæ an. man. s. se-
minis anisi, fœniculi dauci & cumini an. scru.
iij. fursuris pu. j. caricarū numero iij. fiat de-
coctum secundum artem, cuius accipe lib. j.
adiiciendo vnc. iij. olei anethini, camom. vel
rutacei, mellis rosacei vnc. ij. confectionis de
dactilis drac. iij. benedictæ tantūdem & paucō
sale, fiat clyster. Vbi vero laborabit ileo, qui e-
rit ex stercoreū multitudi-
73 ne obstructionē cau-
sante, mollientibus, & humectantib. stercus,
quale erit hoc. Ex foliis maluarum, violarum,
mercurialis, althææ an. m. j. flo. camom. fœni-
graci m. s. salis cōmunis parum, bulliant in
iure aliquo: accipiendo prædictæ decoctionis
quantitatem suff. & addendo olei com. amygdalarū
dulcium, aut camom. aut anethini vnc. iij. mellis
rosacei vnc. ij. & fiat clyster. Ita enim
durities stercoris ab humido, & pingui tollitur,
addendo aliquod medicamentum purgās
vbi non euacuabuntur. Per os vero (præfer-
tim vbi ægri ventriculus valeat) olei cōmunis
vnc. iij. vel lib. s. aut tantundem olei amygd.

*Ventriculi
inflatio.*

Ileus.

*Duritiæ ster-
coris emol-
lien cly-
ster.*

*Decoctum
Camomeli.*

dulcium, vel decoctum camomeli: quod ut si
quid aliud hypochondriis, ac reliquis visceri-
bus est gratissimum, cum rarefaciat corpora
condensata, emolliat indurata, relaxet tensa,
doloresque sedet ac mitiget Gal. 3. simp. med.

*Nausea &
vomitus a
viscosis hu-
moribus im-
pactis ven-
triculo.*

qua repida, & oleo calido, & iure pingui pota-
to. Vbi vero ventriculus torquetur nausea,
& vomitione pendente a vitiatis humoribus
stomacho impactis, vomitu materia erit ei-
cienda ex aqua mulla, Gal. 7. meth. aut mulla,

*Decoctum
absinthii.*

in qua incoctum sit absinthium, cum ab hoc
medicamento Gal. tenues succi, quicunque in
ore ventriculi continentur, commode pellat-
ur deorsum. Vbi vero vomitu eiici non pote-
runt, aut quia ager vomitui difficilis sit, ido-
neis medicamentis erit vtendum, quæ scilicet
modice purget; sic ut eorum vis super ventri-
culi, & intestinorum loca non ascendat: qualia
sunt illa, quæ ex aloe componuntur, aut aloe

Singultus.

ipsa. 7. meth. In singultu vero a repletionem cū
materia calida, aut frigida (nam quæ ab inani-
tione repletionem ex cibis postulat) vomitus
est sufficiens medela Gal. In dolore ventriculi
seu cardiaca affectione ab intemperie calida
cum materia acri biliosa, os ventriculi infestā-
te, facto decocto in aqua fontana, & tamarin-
dorum vnc. j. dissoluendo in ipso, aut mellis a-
erei vnc. iij. aut tantundem syrupi rosati solu-
tium, & rhabarbari infusi in vnc. ij. succi rosarū
drac. j. vel scrup. iij. spicæ gr. iij. fiat potus. Ma-

*Cardiaca
affectio ab
intemperie
calida.*

teria

teria vero crassa, ac lenta causans dolorem colicum, clysteri ex communi oleo facto, quod saepe simul cum fecibus pituitam vitream eicit, Paulo, & dolorẽ finiuir subito: aut ex eodem oleo, in quo prius decocta fuerit ruta, seu semen aliquod, quod flatum dissipet, Gal. 2. loc. aff. & 12. meth. Materia vero acris, & mordax huiusmodi dolorem causans, clysteri ex ptisanæ cremore, 12. meth. & medicamento amaro, quod ex aloë componitur, picra appellato. Gal. 1. loc. aff. & aliis plerisq; pro curatione doloris colici. Haftenus de his, veniamus ad vomitoria, & clysteria vt sciamus vsum ipsorum in purgandis materiis ab ipso ventriculo. De vomitoriis igitur sic dicamus. Materia existente in ventriculo, aut acris sit, aut acida, aut salsa, picam causante, vomitu ex aqua tepida erit eiicienda, & vbi difficilior erit vomitus, adiuuandus erit pauxillo aceti, aut syrupi acetosi, & vbi crassior erit, & viscosior, raphani decocto cum aceto mulso: aliaq; via in mulieribus grauidis non est tentandus humoris exitus praesertim medicamento purgante, Hippocrati, quod huiusmodi affectio primis potissimum mensibus contingere so-
leat. Existente vero materia biliosa in ventriculo intemperie calida, & sicca cum siti inducente, prius exhibito humectante alimento, veluti ptisanæ cremore, vomitu postea erit euacuanda, copiosa aqua tepida, addito aut pauco aceto, aut syrupo acetoso. Eisdem modis

Colicus dolor a materia lenta & crassa.

Colicus dolor ab acris & mordaci materia.

Vomitoria.

Sitis biliosa.

*Lienteria.**Ventriculi
inflatio.**Singultus.**Nausea.**Dysenteria.*

materia acris, & mordax, aut pituitosa excre-
 menta intemperiem inducentia aut calidam, B
 aut frigidam, ad quas sequuntur lienteria, vbi
 materia iste in ventriculo existit, huiusmo-
 di vomitoriis erunt eiicienda. Ad eundem
 modum in ventriculi inflatione eiendus erit
 vomitus iis modis supra adductis. In singultu
 quoque qui fit a repletionem a materia, aut cali-
 da, aut frigida (quod qui est ex inanitione, re-
 pletionem ex cibis sit curandus) vomitus est suf-
 ficiens medela Gal. Vbi autem vitii humores
 stomacho impacti nauseam causabunt, vomitu
 itidem erunt eiiciendi, digitis, aut pennis pro-
 ritato, vel liberaliori tepide potu, vel mulla ex
 Galeno. Quanquam eo casu, ut 7. meth. aquae
 mullae plus est sumendum, quam nutrimenti, vel
 deiectionis causa sumeretur; aut mulla, in qua
 incoctum sit absinthium, potui data; quod ut
 ibidem ait Galenus, tenues succos, quicumque
 in ipsius ore ventriculi continetur, commo-
 de deorsum pellat. In dysenteria vero, seu in-
 testinorum exulceratione vitii humores v-
 bi promte per vomitum poterunt euacuari, id
 potius erit tentandum: & hoc, quod vomitu
 videntes, nedum humorum euacuatio, sed etiam
 diuersio fiat, ex Gal. 4. meth. dicente, existen-
 te in superioribus intestinis vlcere per inferi-
 ora purgandum esse; si in inferioribus, super-
 num ventrem esse purgandum; verum est, quod
 vbi vomitu facile non poterunt eiici, per aluum
 erunt vacuandi; quod et si per partes exulceratas per-
 trans-

transeant, extra tamen educuntur per confe-
 rentia, ac communia loca: semper illud aduer-
 tentes vt mitioribus vtamur medicamentis. In *Calculus.*
 lapide etiam renum, seu calculo, qui fiat ex re-
 num, aut cavitatibus, aut substantia imbibita
 ab humore crasso, & lento, vomitus erit p-
 uocandus, quod sex de morb. vulg. si non ab *Priapismus.*
 affectu, ab accessione tamen liberet. In pria-
 pismo etiã, qui fiat ex repletione a nimio spi-
 ritu crasso viscido pudendorum: vbi vitiosi suc-
 ci in corpore redundabunt, vomitoriis medi-
 camentis potius, quam subducentibus aluum
 vtitur Galen. 14. meth. de comp. med. per loca,
 gratia auersionis in contrarium: quamquam
 vbi aut propter vomitus insuetudinem, aut
 quia vomere recuset æger, subducentibus al-
 uum erunt eiiciendi, sed lenioribus, ne vici-
 nas partes fluxione infestent. In æstuatione, *Æstuat.*
 lypothymia, & hydrope, quæ ex nimia re- *Lypothymia*
 pletionem, aut ex suppressis excrementis (quod *Hydrops.*
 quæ a nimia inanitione, nec purgationem,
 nec euacuationem expectet) per vomitum
 erit eiicienda materia, aut digitis, aut pennis,
 aut aqua calida cum pauculo aceto, aut syru-
 po acetoso simplici, quamquam vbi vomere
 non possint, aluum quoque ciete opus sit, aut
 medicamento per os, aut clysteri facto: ad-
 uertentes semper, qd huiusmodi affectus im-
 modicas semel vacuationes non ferat. Et hoc *Clystera.*
 de vomitoriis: Veniamus ad CLYSTERIA. Vti- *In inflatione*
 mur n. in ventriculi inflatione hoc clysteri. *ventriculi.*

*In ileo ex
multitudi-
ne sterco-
rum.*

Ex foliis ruta, flo. camom. pulegii, & calamîn-
thę an. m.ß. seminis anisi, fœniculi, dauci, &
cumini an. drac. iij. furfuris p.i. caricarum nu-
mero quatuor, fiat decoctum secundum artē:
de quo allumatur lib. vna, & adde vnc. iij. olei
anethini, camomellini, vel rutacei, mellis ro-
sacei vnc. ij. confectionis de dactilis drac. iij. &
pauco sale addito fiat clyster. In ileo vero ex
ilercorum multitudine obstructionem cau-
sante, emollientibus sterco, humectantibus,
& lenientibus clysteribus. Ex foliis malua-
rum, violarum, & mercurialis, althæę an. m. j.
flo. camom. fœnugræci m. ß. salis communis:
parum bulliant in iure aliquo, & accipe præ-
dictę decoctionis per collum transfusę quā-
titatem sufficientem, & adde olei communis, 74
amygdalarum dulcium, aut camomellini, aut
anethini vnc. iij. mellis rosati vnc. ij, misce &
fiat clyster. Hoc enim modo durities sterco-
ris emendatur humido, & pingui, & vbi nō e-
uacuabitur, addendū erit aliquod medicamē-
tū purgans. In dolore colico pendente a ma-
teria crassa, ac lenta, huiusmodi materia in
principio congruis clysteribus eiicietur ex
communi oleo factis, quo sæpe Paul. vitream
simul cum fecibus pituitam eiectam vidit, &
dolorem subito finitū: aut ex eodem oleo, in
quo prius decocta fuerit ruta, seu semen ali-
quod, q. flatū dissipet, Gal. 2, loc. aff. & 12. met.
Et vbi dolor huic nō cedit, hoc alio erit vten-
dū. Ex foliis maluarum, althæę, mercurialis,
& be-

*Clyster in
dolore colico
a materia
crassa ac lē-
ta.*

& betæ, ana. m. j. anethi. ruthæ flo. cam. fœno-
 græci seminis lini ana m. ß anisi, fœniculi, cimi-
 niana drac. ij. fiat decoctum in aqua fontana:
 cuius decocti accipe lib. .j. ß. mellis rosati vnc.
 ij. oleicamom. anethini, vel rutacei vnc. iiij. sa-
 lis communis drac. iiij. confectionis de dactylis
 drac. iiij. addendo adipem anserinum, aut gal-
 linaccum, aut butyrum. Vbi vero materia a-
 cris, & mordax erit in intestino colo, causans
 dolorem colicum, iniiciendus erit per sedem
 clyster; quod eiusmodi humorem educere &
 abstergere possit, cuiusmodi est ptisanæ cre-
 mor, 12. meth. Illud autem est aduertendum,
 quod in vsu huiusmodi clysteriorum pro ei-
 cienda materia acris, & mordaci causante do-
 lorem colicum, licet vti (vbi sine his proposi-
 tum obtineri non poterit) medicamentis tor-
 pore inferentibus 12. meth. quod in pecca-
 to talis materiæ, materia tenuis incrassatur, ca-
 lor refrigeratur, & torpor sensui inducitur,
 veluti philonium persicum, aut romanum. &
 vbi non sufficient hæc inferentia torporē me-
 dicamenta per sedem iniecta, eadē deuoran-
 da exhibemus ad drac. j. aut scrup. ij. a quibus
 tamen (etiam quod dolor vehementer vrge-
 at) cauendum est, existente materia pituitosa
 crassa, ac lenta: & hoc, q̄ licet indolentes red-
 dātur, affectus tamē fortior fiat: vnde etiam
 spatio longiori curatio prolongatur, tum q̄
 humor ipse tum crassior, tum ad motum ine-
 ptior reddatur, tū q̄ intestinorū tunice medi-

*In dolore co-
 lico a mate-
 ria acris &
 mordace*

*Stupefacci-
 entia in do-
 lore colico.*

In materia frigida dolo rem colicū causante vitanda sunt vehementer calfacientia. camentorū frigiditate densiores factæ, minus flatui trāsmittēdo habiles reddātur. Quinimo peccante materia frigida, a vehementer etiā calfacientibus sit cauendum, & iis præcipue quæ simul cum calfactione digerere nō valēt: & hoc, quod a caliditate, vehemēti liquen-
tur, & in flatum vertantur 12. meth. Vbi etiam

Diarrhæa ex materia biliosa.

Ex pituita.

*Iecoris ple-
gmone.*

*A calculo renum præ-
cautio.*

multitudo humorū defluet, aut ab vniuerso corpore, aut ab aliqua parte determinata ad ventriculū, & intestina, ratione cuius defluxus sequatur diarrhæa, vbi materia erit bilio-
sa, clysteri quoque euacuari poterit, ex hordei nō decorticati, ac torrefacti decocto, iure gal-
linarū, aut pullorū gallinaceorū, saccharo ru-
beo, ac oleo rosato. Pituita autē redūdātia, vice
olei rosacei camomellino, aut anethino, &
loco sacchari rubei rosaceo mellē. In iecoris
phlegmone in causā sui parte iā concocta, vel
inclinante, q; incipiente phlegmone per aluū
purgationē nociuā dicat Gal. 13. meth. hoc cly-
steri: Ex foliis maluarū, althææ, & betæ ana p. j.
mercurialis, & centaurei minoris an, p. ss. salis
cōmunis parum, fiat decoctum. Accipe prædi-
cti decocti lib. j. ss. olei cōmunis, amygdalarū
dulciū, vel camomellini vnc. iij. mellis rosacei
vnc. j. diacath. drac. vij. fiat clyster. In lapide re-
num seu calculo propter materiā crassā, ac
lentā in cavitatibus, aut substantia imbibi-
tam, vt ab accessione liberetur æger, clysteri
ex fursurū decocto, caricarū, fœnogræci, ari-
stolo-

Stolochia, cum vnc. iij. olei communis: vel ex
 maluarum, althææ, mercurialis, ac betæ foliis,
 caricis ac furfure, decoctum paretur pauco sa-
 le addito, cui adiiciatur olei communis, ane-
 thini, vel camom. vnc. iij. mellis ros. vnc. ij. β .
 pulpæ cassiæ no. extractæ vnc. j. Et vbi alius nō
 excernit hoc clysteri, addēda erit vnc. β . hie-
 ræ picræ simplicis, vel vnc. iij. confectionis de
 lactilis, & vnc. j. butyri recentis, aut adipis an-
 serini. In renum inflammatione clysterib. non *In inflāma-
 tam in multa copia, ne repleta intestina com- tione renum
 primant renes; veluti ex maluarum, betæ, & clyster.*
 violarum foliis, & oleo parato decocto. cuius
 ℥. lib. j. aut ℥. j. β . & adde olei violacei vn. iij.
 aut camom. vel anethini vnc. iij. mellis rosa-
 cei vnc. ij. salis communis parum, cassiæ extra-
 ctæ, aut pulpæ cassiæ fistulæ vnc. j. butyri recē-
 tis, & adipis anseris, seu gallinacei an. vnc. β .
 misce & fiat clyster. Materia etiā calida biliosa *In capitis
 dolorē in capite inferēte hoc clysteri: Exmal- dolore a ma
 uarū, violarum foliis, betæ, & borraginis an. teria calida
 m. j. facto decocto cū olei violacei ℥. iij. mellis & biliosa,
 ros. ℥. ij. cassiæ tractæ, vel pulpæ cassiæ fistulæ ℥. j. clyster.*
 salis parum: interdum addendo hieræ picræ *In catalepsē
 simplicis vnc. β . In catoche, seu catalepsi, quæ ab intēperie
 ab intemperie frigida sicca cerebri ortum frigida &
 trahit, clysteri ex furfurum decocto camo- sicca clyster*
 mellini, borraginis, betæ, mercurialis, ac salis,
 in quo adiiciendum erit olei communis, ca-
 mom. anethini, aut amygdalarum dulciū vnc.
 iij. mellis ros. vnc. ij. cassiæ tractæ vnc. j. diacath.

*In Melan-
cholia cly-
ster.*

*In Apople-
xia clyster.*

*Purgatio
materia cō-
tinentis ex
diuersis
partibus.*

vnc. β postea cum prædicto decocto coquan-
tur polipodii, senæ, epithymi an. drac. iij. &
adde prædictis diasenæ, aut confectionis ha-
mech. drac. iij. Vbi vero melācholicus succus
intemperiem cerebri mutauit, ita vt inducat
melancholiam, per interpositos dies vtēdum
erit hoc clystere, parato pri^o decocto ex foliis
maluæ, violarum, betæ, mercurialis, borragi-
nis, fumariæ, & lupulorum, furfure, ac pauco
sale adiectis, atque interdum addita senæ, po-
lypodii, vel epithymi, vnc. β in eo dissoluendo
olei violacei, vel communis, vel amygdalarū
dulcium vnc. iij. mellis ros. vnc. ij. pulpæ cassiæ
fistulæ vnc. j. diacath. drac. vj. vel eius loco dia-
senam, vel compositionem hamech. Humor
vero frigidus, & viscidus obstruēs principales
cerebri ventriculos, ratione cuius sequatur
apoplexia, euacuabitur clysteri, ex decocto
furfuris, mercurialis, minoris centaurei, rutæ,
hyssopi, pulegii, saluiæ, calaminthæ an. m. β
polipodii vnc. β seminis fœniculi, anisi an. dra.
ij. parato ex eis secundum artem decocto: ac-
cipe lib. i. β & in eo dissoluas hieræ picræ cō-
positæ vnc. β confectionis de dactilis drach.
iij. agarici drac. j. β mellis ros. vnc. ij. salis com-
munis, seu gemmæ parum, olei camq. anethi-
ni, seu rutacei vnc. iij. commixtis omnibus fiat
clyster. Postquam de vomitoriis, & clysteriis
hactenus fuit sermo, sequitur vt de medica-
mentis purgantibus materiam continentem
exsistentem in diuersis partibus corporis hu-
mani

mani loquamur, ac primum in Ventriculo, & intestinis. Bilis igitur existens in ventriculo calfacto, & exsiccato, ad quam intemperiem calidam, & siccam sequatur hoc symptoma, quod appellatur sitis, vbi difficilis erit vomitus, per inferna erit purganda leniētibus medicamentis, vt cassia fistula, saccharo violato, syrupo ex pluribus infusionibus violarum, vel rosarum, cum tamarindorum decocto. Eadē bilis acris, & mordax in intestinis, & ventriculo redundās, ad quam sequatur lienteria, purganda erit ex corticum miroba. citrinorū dra. iij. tamarin. drac. vii. paretur arte decoctum in aqua cichorei, & accipe prædicti decocti quantitatem sufficientem, & in eo dissolue aut māne vnc. j. β. aut syrupi rosati ex pl. infus. ros. rub. vnc. iij. rhabarbari in parte prædicti decocti macerati drac. j. fiat potus. In ileo ab inflammatione medicamento leniendo purgante, ceu sunt hæc, manna, cassia fistula, saccharum violaceum, seu syrupus ex pluribus infusionibus violarū. Humores vero vitiiati stomacho impacti nauseam causantes, vbi vomitu non poterunt eiici, idoneis pharmacis erunt deorsum pellendi. Idonea autem erunt, si modice purgabunt: sic, vt eorū vis super ventriculi & intestinorū loca nō ascendat, qualia sunt illa quæ ex aloe componuntur, quæ si non præsto sint, aloe ipsa, vt 7. meth. Vbi vero materia biliosa mordens intemperiem calidā induxerit causantem dolorem ventriculi, seu cardiacam

*Sitis ex in-
temperie
calida &
sicca.*

*In lienteria
purgatio.*

*Purgatio in
ileo ab in-
flammatio-
ne.*

In nausea.

*In Cardia-
ca purgatio
materia bi-
liosa.*

Z S

*In colico do-
lore a mate-
ria acris &
mordace
purgatio.*

In Cholera.

*In Diar-
rhæa.*

affectionem euacuanda erit, ex tamarindorū
vnc. j. & facto ex eis decocto in aqua fontana:
dissoluantur in ipso mellis aerei vnc. iij. vel
tantumdem syrupi ros. sol. rhabarbari infusi in
vnc. ij. succi rosarum drach. j. vel scrup. iij. spi-
cæ gr. iij. fiat potus. Acris vero materia & mor-
dax colicum dolorem faciens, vbi clysteri non
euacuabitur, medicamentū erit eiiciēda, quod
ex aloë componitur, picra appellatur, Gal. 1.
loc. aff. & 12. meth. velut permiscendo hieram
cum cassia fistula, aut manna, aut saccharo vio-
laceo, aut syrupo ex pluribus infus. violarum
vel rosarum. In cholera etiam, vbi scilicet
ventriculus totus, non solum secundum par-
tem superiorem, sed etiam inferiorē a nimio
defluxu cholerae capietur: vbi materiae procli-
uius per aluum tentabuntur a natura, quam
per vomitum, medicamento erunt eiiciendæ,
sed quod lenius sit, & in pauca quantitate: ne
in grauiora pericula ducatur ager ex im-
modica vacuatione. Bilis vero, vbi aut ab vniuerso
corpore, aut ab aliqua parte determinata pro-
pter eius multitudinem, defluet ad ventrem
vniuersum, id est, ad ventriculum & intesti-
na, ratione cuius defluxus sequitur diarrhæa
(nisi euacuatio modum excedet, quod tum
cohibēda sit aliis) tali medicamentū erit pur-
ganda: Ex tamarin. vnc. j. fiat decoctum in aqua
cichorii, & acetosæ: in cuius expressione dis-
solue rhabarbari drac. j. vel scrup. iij. exiguum
quid spicæ addendo, quod maceretur per ali-
quod

quod spatium, aut in vnc. l. β. succi rosarū, aut in parte prædicti decocti: & absque hoc, quod per colum fuerit transfusum, misceatur mellis aerei vnc. j. β. & exhibeatur: quanquam poterit etiam addi prædicto decocto corticum mirob. citrin. drac. j. vel ij. illud semper aduertendo, in quolibet alui profluuiio, vt purgans medicamentum quod exhibetur, sit moderatū, ne ex immodica vacuatione vires prosterantur. Eademq; ratione astringentia cū medicamentis purgantibus magis vel minus erūt admiscēda, prout magis vel minus alius profluuiio laborabit. Bilis vero, vbi dysenteriam, *In dysenteria.* seu intestinorum exulcerationē inducet, vbi facile per vomitum non poterit eiici, hoc medicamento erit eiicienda, ex tamar. vnc. j. corticū mirob. citrin. drac. ij. fiat decoctū in aqua oxalidis, aut plantaginis, in quo dissolue mellis aerei vnc. j. rhabarbari in prædicto decocto macerati, & nō transfusi colo drac. j. aut scrup. iij. syrupi de infus. ros. vnc. ij. dissolue, & præbe. Vbi vero opus erit maiore vi astringendi, & minore purgandi, hoc alio modo: ℞ corticū mirob. citrin. vnc. β decoquantur in oxalidis, & plantaginis aqua, & in ea mellis aerei vnc. j. rhabarbari parum torrefacti scrup. j. syrupi ex infusione rosarum vnc. j. & si opus fuerit torrefacito plus vtrumque tum mirob. tum rhabarbarū. *In inflammatione Ventriculi non conueniunt purgantia.*

B seu stomachi (quod longissime a tētata fluxione parte, q̄ redundat reuellere, nequaquā ad

*Purgatio
materia cō-
stinentis in
Hepate.
In obstru-
ctione hepa-
tis.*

*In inflam-
matione he-
patis incli-
nante phle-
gmate.*

*In intempe-
rie a vitio
vesicae fellis.*

cam trahere conueniat, ex Gal. 13. meth.) omnino a medicamento quod aluum deiciat erit abstinendum. IN HEPATE vbi erit vitiosus succus calidus hepar obstruens, ℥ rhabarbari optimi cum spica, aut squinanto vigorati. scrup. iij. maceretur per decē horas in aqua cichorii seu intibi, demum per colum transfundatur, dein ad iice pulpæ cassiæ no. extractæ vnc. j. β vel mellis roridi vnc. ij. diacath. drac. vij. misce & fiat potio cum aqua cichorii seu intibi. In iccoris inflammatione, phlegmone inclinante (quod in principio tanquam nocua prohibeaturalui purgatio, Gal. 13. meth.) eaque existente in iccoris cauo (quod existēte in gibba nedum iis, quæ in indice vrinas mouent, sed etiam valentioribus vti liceat Gal.) hoc medicamento erit vtendum, quamquam Gal. fliculæ aliquid in ptisana, ac nigri veratri corticem aliquando incoxit, ac præbuit, quod nostris temporibus mitius est: ℥ rhabarbari cū spica drac. j. maceretur per noctem in vnc. ij. mellis aerei adiectis, & vnc. β diacath. fiat potio cum aqua cichorii aut intibi. In intempérie quæ obtingat vitio vesicæ fellis, in qua purgatione præ alia euacuatione vtendū esse ait Gal. 5. loc. aff. hoc eodem medicamento supra nunc enarrato vteris, adiciendo elegmatis de succo rosarum drac. iij. quod huiusmodi affectio valentiori medicamēto opus habeat, Actio, aut catapotiis aggregatiuarum drac. j. cum altera drachma rhabarbari cū spica, quæ oximelle

melle excipiantur, & fiant pilulæ. IN LIENE, vi-
 tiosus succ⁹ calidus educendus est in lienis in-
 flammatione hoc medicamēto deiectorio su-
 perne exhibito, a situ & societate sumta indica-
 tione, 13. meth. Gal. Ex flo. fumarix, lupulorū,
 borraginis, violarum, & hordei an. drac. iij. se-
 næ, epithymi an. drac. ij. vix passæ decorticatæ
 vnc. ß fiat decoctum in aqua fontis, in quo per
 colum transuso dissolue mellis ros. vnc. ij. ß
 aut cassiæ fistulæ vnc. j. ß diacath. drach. vi. fiat
 potio. Vbi validiori purgatio indigeat, au-
 gebimus quantitatem senæ, & epithymi in de-
 cocto, & adiciemus polypodium, ac cnicum,
 & vice diacatholiconis, elegmatis indi, aut di-
 asenæ drach. iij. IN RENIBVS, materia acris, bi-
 liosa (quamquam etiam pituitosa falsa) calidā
 renum intemperiem efficiēs, ad quam sequa-
 tur diabetes, medicamento erit purganda, cō-
 mixto cum aliquo habente aliquam astrictio-
 nem, veluti syrupo ex pluribus, infus. ros. mel-
 le rorido, tamarindis, mirobalanis citrinis, &
 chebulis. In renum inflammatione cauendū
 erit a medicamentis valenter purgantibus, sed
 melle rorido, syrupo ex plu. infus. rosarum aut
 violarum erit vtendum, iisdemq; in renum ex-
 ulceratione. IN VTERO & PVDENDIS, In priapif-
 mo medicamentis purgantibus si vti opus erit,
 lenioribus tamen erit vtendum (nam vom-
 itoria potius quam subducentia aluum laudat
 Gal. 14. meth.) Biliosi succi, aut pituitosi salii
 vbi vasa referarint aut ruperint, aut eroserint,

*Purgatio
 materia ex-
 rinentis in
 inflamma-
 tione
 Lienis.*

*In intempe-
 rie calida
 Renum vt
 diabete.*

*In inflamo-
 matione re-
 num.*

*In exulce-
 ratione re-
 num.*

*In vteri af-
 fectibus &
 pudendorū.*

*In Priapismo.
Mensium
fluxus.*

ad quos morbos sequantur mensium fluxio, seu sanguinis profluvium, hoc medicamento erant eiciendi: ℞ tamarin. vnc. β. corticum mirab. citrin. drac. iij. in aqua oxalidis & plantaginis fiat decoctio, & in eo dissolue syrupi ex plu. infus. ros. rub. ʒ. iij. & rhabarbari sine spica ʒ. j. milce & fiat potio. Vbi vero erit pituita lassa fiet decoctum cum corticibus

*In fluore muliebri. mensium suppressio: vteri inflatio: vteri exulceratio.
Evacuatio materia continentis in Pulmone in Tussi.*

mirob. chebulorum drac. iij. & agarici trociscati scrup. iij. Eodem modo in fluore muliebri causato ab huiusmodi materiis: hoc eodē medicamento vtētes, vbi bilis causabit mensium suppressionem, vteri inflammationem,

& eiusdem exulcerationem. IN PVLNONE acris & tenuis materia distillans, obstruens vias spiritus, ad quam sequatur tussis, hoc medicamento erit purganda: ℞ hordei decorticati pug. i. flo. violarum & borraginis an. drac. iij. iubarum numero quatuor, vuarum passerum madatarum. vnc. β. glycyrrizæ drac. j. β. fiat decoctum in aqua fontana secundum artem: & in eo dissolue aut saccharum aut syrupum violatum, aut mannam, aut cassiam. In lactis defectu, vbi sanguis malitia bilis erit refertus, medicamento purgante vtendum erit, sed leni, quod bilem expurget, & non exsiccet, veluti manna, cassia fistula, syrupus ex pluribus infusionibus violarum aut rosarum. Iisdem in

76

In defectu lactis.

*In inflammatione mammarum.
Pneumonia.
Lateralis colica.*

mammarum inflammatione. In pneumonia etiā medicamentis lenientibus erit vtendum. Vbi vero biliosus humor lateris dolorē seu inflammationem

inflammationem causabit, hoc medicamento
 erit vtendum (quod a validis medicamentis
 cauendum sit propter febris intensiorem) ℞
 hordei mundi drac. iij. flo. borraginis, & viola-
 rum an. drac. ij. radices glycyrrizæ drac. j. β. vua-
 rum passerum mundatarum drac. iij. adianthi
 drac. j. β. iuiubarum numero quatuor, bulliāt
 secundum artem in aqua fontis: dein accipe
 prædicti decocti vnc. iij. aut iij. & in eo dissol-
 ue mannae vnc. ij. β. vel bolum cōficias ex cas-
 siæ fistulæ vnc. j. β. diaprunis lenitini vnc. β. In
 CEREBRO vbi erit materia biliosa intēperiē ca- *Dolor capi-*
 lidā in cerebro inducens, ad quā sequatur do- *sis ex intē-*
 lor: ℞ tamar. drac. vij. mirob. citrin. drac. ij. flo. *perie calida*
 borrag. viol. & hordei decorticati an. drac. ij. *cerebri.*
 fiat decoctū, in quo dissolues vel vnc. ij. man-
 nae electæ, vel vnc. β. diacath. & fiat potio. aut
 dissolue in prædicto decocto sacchari violacei,
 aut syrupi ex plu. inf. violarū vnc. ij. Vbi vero
 idem humor biliosus præassatus talem intem- *In mania*
 periem calidam induxerit, vt ad eam insequa- *purgatio.*
 tur mania, hoc medicamento erit purgāda: ℞
 flo. violarum, fumarizæ, lupulorū, borraginis,
 & hordei decorticati, nimpheæ, an. drac. ij. pas-
 silarum vinaceis detractis, & tamarin. an. vnc.
 j. ex quibus facto decocto extrahatur cum eo
 amygdalarum dulcium succus, in quo per de-
 cem horas maceretur drac. ij. mirob. citrin. &
 drac. j. indorū, & facta per colū trāsfusionē dis-
 solue, aut manne vn. ij. aut cassiæ fistulæ vn. j. β. *In vertigine*
 vbi fiet vertigo, facto decocto ex cort. mirob. *purgatio.*

*In hamer-
rhagia na-
rium.*

*In lippitudi-
ne.*

*In phreni-
side.*

*Sectionis
vena loci
determina-
ti in quocū-
que affectu.
In inflam-
matione vē-
triculi.*

*Vena sectio
in dysenter-
ia.*

citrin. drac. iij. in aquis cordialibus eodē mo-
do dissoluendo, aut mannæ vnc. ij. aut syrapi
ex plu. infus. ros. rub. vnc. iij. Eodem etiam v-
tentes in sanguinis e narib. eruptione, in lip-
pitudine. in phrenitidie vero eodem etiā pur-
gante medicamēto vtentes quo in mania. Nā
tamen si nullus græcus de purgatione mentio-
nem fecerit, hoc ideo non fecisse credendus
est, quod purgantia medicamenta quæ noue-
runt, erant natura calida, humores commo-
uentia, & hac ratione inflammationem & fe-
brim augentia: sed si hæc nouissent, quæ, cum
hoc q̄ purgant & reuellunt, non solū non au-
gent, quinimo febrim & inflammationē mi-
nuunt, hæc sane præcepissent: cū Gal. 4. meth.
interdum etiam in morbis magnis non solum
venæ sectione, sed purgatione vtendum esse
præcipiat ex Hippocrate, gratia reuellēdi hu-
morem, etiam quod nulla adsit humorū ple-
nitudo. Hactenus dictum sit de medicamētis
purgantibus materiā continentem, existen-
tem in diuersis partibus corporis humani. Se-
quitur vt percurramus locos determinatos se-
candi venam in quocumque affectu corporis
humani. Porro in stomachi seu ventriculi in-
flammatione, vena secanda erit interna, præ-
sertim vbi simul aderit totius corporis pleni-
tudo, magis & minus exhibendo pro virium
ratione, & sanguinis dominio ad alios humo-
res. In dysenteria autem (quanquam vulgus
medicorum quadam consuetudine ducti ve-
nam

B

nam non fecent) tamen præſente aut magna humorum copia, aut ſanguinis impetu vehementer vrgente, aut magna exiſtente inflammatione, aut dolore vehementi (quod Gal. I. aph. 23. in maximis doloribus nullum maius inuenerit remedium, quam vique ad animi deliquium venas ſecare aut purgare) quare omnibus in his caſibus, viribus, ætate, ac aliis conſentientibus, circa initia reuulſionis gratia ſecanda erit vena, & maxime in quibus conſueta ſanguinis excretio cohibetur, vt inquit Aetius, venam autem ſecat in dextro cubito humeralem, cum non ſimiliter ex incifione huius venæ vires labefactentur, ſed inſenſibiliter ſtriſtimque quodammodo ſanguis auferatur fiſſura tenui, quod non ob multitudinem vacuandam hoc fiat, ſed, vt materiã quaſi per riuos transferamus, paucusque ſanguis ſimul cum fiſſura tenui eſt auferendus: & hoc, quod multum auferre, & coaceruatim, ventrẽ conturbet, paucus vero e multo tempore miſſus inflammationem mitiget, & ſanguinis ad inteſtina confluxum reuellat, innatumq; calorem ſenſim refrigeret, & ſomnum magis, quam animi deliquium inducat, qui ſomnus eſt optimum dyſentericis remedium. Quin-
 immo non ſolum in his caſibus, ſed etiam vbi iecur erit male affectum, ita vt ab eo ſanguis bili admixtus deferatur ad inteſtina, interna in dextro cubito vena erit ſecanda, nedũ reuulſionis, ſed etiam ipſiusmet iecoris alterationis

*In dyſente-
 ria qua ve-
 na & quo-
 modo ſecan-
 da.*

*ſectio venæ
 in dyſente-
 ria a iecore
 male affe-
 cto.*

A a

*In tenasmo
ab inflama-
tione secan-
tur vana.*

*In obstructi-
one hepatis
recentis.*

*In obstructi-
one hepatis
inmeterata.*

*In inflama-
tione iecoris*

gratia: cum pleriq; medici qui in hoc casu so-
lam intestinorū exulcerationē neglecto icci-
note curare consueverūt in causa sint, vt egri
moriātur, ex Gal. 4. de artic. In tenasmo quoq;
si ab inflammatione fuerit ortus, a venæ secti-
one erit auspiciandum. In iecoris autē obstru-
ctione, præsertim vbi multæ fuerint iocinoris
obstructiones, & recentes, & ab humorib. ad
calidum vergentibus, ac eorum copia mole-
stantibus, & præsertim vbi obstructio adhuc
erit in fieri, secāda erit vena interna dextri cu-
biti, & hoc, quod propulsiūtur quod futurum
erat, compescendo humorum defluxum, & q;
factum est, per ea quæ obstructa liberant, Gal.
11. meth. Quanquam si obstructio nō solum
recentis sit, sed etiam inneterata, tum putrefa-
ctionem minetur, ac febrem accendat, auxi-
lium etiā sentiat ex venæ sectione inter-
næ dextri cubiti: aut obstructio sit in gibba,
aut in sima, quod hic non variet locus, p quem
evacuatio fieri debet: sicuti sit in purgatione,
per medicamentum. In iecoris autem inflam-
matione, quæ adhuc sit in generatione, virib.
& ætate tolerante, ad venæ sectionem erit ac-
cedendū, per quā sanguis qui fluit ad iecur tū
reuellatur, tum educatur internæ dextri cubi-
tiq; & e regione, seu e directo sit, & ampla via,
cum vena caua societatem habeat: & hac non
apparente media erit secanda: & vbi nec illa
se ostenderit, humeralis, ex Gal. 13. met. semel
detrahendo, si id ferre poterunt. Indicabitur
autem

autem facilis tolerantia ex modo redundan-
 tię, ætate, natura, anni tempore, regione, con-
 ſuetudine, virtute, vt ait Galenus. ſi vero ſemel
 ferre nõ poterūt, per vices, Aetio, erit partiē-
 dum. Tempus autem ſecandi venam erit pri-
 ma aut ſecunda die, & vrgentibus doloribus,
 & virtute præſente, etiam in ſeptima vena erit
 ſecanda, Gal. In lienis autem inflammatione,
 vena erit ſecanda ſiniſtri cubiti interna, Gal. 13.
 meth. eaq; non comparente, media: neq; hac
 cõparente, humeraria: & vbi nec iſta, quæ mi-
 nimo digito vicina eſt, Tralliano, non ſemel,
 ſed in duos dies id partiēdo, ne vitalis facultas
 deficiat. In renum inflammatione dubium eſt
 quæ vena ſecanda ſit, quod Aetius venam cu-
 biti ſecet. Galenus vero 13. meth. renibus, veſi-
 ca, pudendo, & vtero phlegmone laboranti-
 bus, eas quæ in cruribus ſitæ ſint venas ſecet,
 potiſſimum quæ circa poplitem ſunt; ſi mi-
 nus, eas, quæ iuxta malleolum, dũ modo ſem-
 per e directo poſitæ ſint: quamuis in eodem
 libro decernat ad partes maxime longinquas
 in dictis inflammationibus reuulſionem eſſe
 fiendam. Sed ſunt iſti hoc modo conciliandi,
 quod vbi reuellere opus erit, venam ex cubi-
 to: vbi euacuare, eā, quæ in malleolis, incide-
 mus, ex Galeno etiā libro de cur. ratione per
 venæ ſectiõẽ. ſupponit enim Galenus, quod
 vires adeo robuſtæ ſint, vt per vnicam venæ
 ſectiõẽ ferre valeant euacuationem ſimul
 cum auerſione. In veſicæ autẽ inflammatione

*Tempus ſe-
candi venā
in inflāma-
tiõe iecoris.
Vena ſectio
in inflāma-
tione lienis.*

*Cõtrouerſia
de ſectiõe
venæ in in-
flāmatione
renum.*

*Conciliatio
Galeni &
Aetii.*

*In inflam.
vteri. de se-
ctione vena
conciliatur
Galen. Ae-
tius & Pau-
lus.*

eodem modo, & easdem venas secat. In vteri
autem inflammatione 13. meth. eas quæ in cru-
ribus sitæ sunt, ac potissimū quæ circa popli-
tem sunt, sin minus, eas quæ circa malleolum,
perpetuo tamen sint e directo: Aetius vero, &
Paulus cubiti venam. Sed dicendum, quod in
inflammatione fiente: cum reuellendum erit,
perq; contrarias, & longinquas partes illud sit
agendum, cubiti vena interna erit secanda.
Vbi autem euacuare simul, ac deriuare vole-
mus, crurum venæ erunt secandæ. quod se-
cundo ad Glau. Galenus expressit, dum ait: In
locis muliebribus in contrarium trahes; si eas
quæ in cubito sunt secaueris venas, aut mamil-
lis cucurbitulas apposueris, vel manus con-
calfeceris, & fricaueris, atque ligaueris: deri-
uabis autem, si eas quæ poplitibus, aut talis ve-
nas diuiseris, & cucurbitulas coxis applicaue-
ris, & crura calefeceris, atque perfricueris.

*In principio
inflamma-
tionis vteri
reuulsio.*

Quare in principio inflammationis, vt san-
guis qui confluit ad affectam partem inhibea-
tur, secta in cubito vena reuullet, quod posuit
tertiodecimo metho. Pro eius autem cura-
tione, cum nihil ex parte inflammata detra-
hat, & menstruas purgationes comprimat,
venæ internæ erunt secandæ, & quæ in cubi-
to, erit omittenda. In pneumonia vero, Aetio,
iunctura cubiti erit secanda in principio; pri-
mum quidem modice extrahendo, & non
vsque ad animi defectum, & hoc, vt seruetur
ad repetendam detractionem, ex Aetio. Et
vbi

*Seçtio vena
cubiti in
pneumonia.*

vbi quid venæ sectionem prohibuerit, cucurbitula thoraci erit admouenda, ac lateribus affigenda, tantum sanguinis extrahendo, quantum vires ferre poterunt. In mammarum autem inflammatione vena erit secāda eiusdē lateris in talo, potissimum vbi mēses fuerint detenti, aut interna, aut media eiusdē cubiti, nō tantum semel, sed & bis, & ter, vbi fuerit opus. *In mamma- rum inflam- qua vena secanda sit.*

In lethargo vero statim ab initio, si nihil prohibeat, incidenda erit vena 13. meth. Galen. *In lethargo. De sectione vena in phrenitide cōtrouersia.*

media sane aut interna, quantitatem extrahendo pro ratione virium. In phrenitide vero statim ab initio, modo virtus valens sit, & alia consentiant, vena erit secanda 13. metho. quamuis Asclepiadi hoc non placeat. Quæ autem vena sit secanda, etsi auctores videantur diuersi, cum Paulus ex cubito, sed venam nō determinet, Aetius mediam cubiti determinet, Trallianus rectam in fronte venam. Sed dicendum omnes cōuenire, nam in principio vsq; ad quartum diem redundante multo sanguine vltra bilem, media: si non erit tanta sanguinis redundantia cum bile, humeralis, seu externa. Vbi autem phreniticus manum non exporriget, rectam frontis venam, collum fascia linea constringendo, vt vas attollatur: quanquam melius quandoque erit sanguinem partiri, ne vna vice extrahendo plurima fiat sanguinis agitatio; veluti secando primo mediam, secundo externam, tertio frontis venam, quarto cucurbitulas occipitio

In lippitudine ne ex plenitudine qua vena secanda. affigendo. In lippitudine vero, præsertim vbi ex plenitudine ortum ducet, secāda erit vena, Galen. 13. meth. cubiti exterior, humeralis appellata; ea sane quæ erit e directo oculi laborantis, cum ex lib. de cur. ratione per venæ sectionem, grauissimos dolores intra horæ vni⁹ spatium persepe compescuerit. Quantitatem iubet Gal. vsq; ad animi deliquium: & hoc, vbi fuerit vehemens inflammatio. Vbi autē non erit ita vehemens, viresq; non adeo robustæ, nec ætas florens, sanguis partiendus erit, interdum eadem die, interdum postridie repetēdo. & post venæ sectionem, cucurbitulæ etiam cum scarificatione occipitio erunt affigendæ. In suffusione vero, quæ nondum consistentiam sit adepta, circa initia, si nihil impediat, sanguis ex cubito, Aetio, & Paulo, mittendus erit, medix aut externæ, secundum quod magis expediet. In agilope incipiente inflammatione pro auersione eius quod influit, vena humeralis in cubito eiusdem lateris. In parotidib. eadem vena humeralis eiusdem lateris, Gal. in aphthis, seu igneis superficieis oris vlceribus, eadē humeralis, aut media: & vbi quid venæ sectionem impediet cucurbitulæ scapulis cum scarificatione affigendæ. In inflammatione gurgulionis, vena cubiti media, aut externa, & cucurbitulæ cū scarificatione ceruici affigendæ, & vbi nec his cedit affectio, venæ sub lingua erunt secāda Archigenis decreto.

In

In inflammatione glandularum iuxta linguā, *In consilla-*
 vena cubiti externa; media vero, vbi multitu- *rum inflam-*
 do sanguinis aderit. In angina vero secanda e- *in angina.*
 rit vena (si quid eam nō prohibeat) in cubito,
 humeralis sane vbi nōn aderit plethoria; me-
 dia vero vbi plethoria erit; sanguisque non v-
 niuersim erit trahendus, sed pluribus interpo-
 sitis vicibus, Alexandro: & hoc, quod particu-
 lares euacuationes causam potius ex affectis
 locis elidant: cumulata autem vniuersimque
 facta, animi defectionē excitet, & suffocatio-
 nis periculum superueniat, dum materia tota
 in affectam partem collectim prorumpit; aut
 per facile a faucibus, aut gutture ad pulmonē
 deferatur, & inuitabile periculum affert. Cō-
 fert autem ut ait Gal. 4. vict. acut. vacuatio, & *Vena sectio*
 venæ sectio duplici ratione, tum ob eam, quæ *in angina*
 a vacuatione est, reuulsionem, tum quod cor- *confert du-*
 pore vacuato, a parte affecta quod influit ex- *pliciratio-*
 pellimus, nihilq; (vbi etiam calido aliquo va- *ne.*
 porare volueris) a corpore parti affectæ calfa-
 ctæ demandatur. Notādum autē ne angustior
 fiat venæ sectio, Actio, ne sanguis velut per-
 coletur, & crassior eius pars intus remaneat,
 potissimū vbi crassior sanguis huius affectio-
 nis erit causa. Et vbi huiusce venæ incisio parū *Venarum*
 proficiet, venæ sub lingua erunt incidendæ; *sub lingua*
 neque multum erit differendum, sed eadē die *sectio in*
 id erit faciendū, Alexandro, aut saltem sequenti *angina.*
 die. Galenus vero 4. rationis victus acut. Ve-
 næ inquit, quæ sub lingua sunt, eā, quæ sub fau-

*De sectione
venarum in
symptoma-
tibus.*

*In actionb.
lasis.
In quib. sym-
ptomatibus
non fiat me-
tio sectionis
vena*

*In malo cor-
poris habitu
quando pur-
gatio &
quando ve-
na sectio co-
ueniat,*

*In priapismo
conuenit
sanguinis
missio*

cibus est, phlegmonem sine medicamentis
vacuant. & lib. de cur. ratione per venæ secti-
onem: Quocirca, inquit, quæ in gutture, & ar-
teria graui torquētur inflammatione, in prin-
cipio quidē aperta in cubito vena, post prin-
cipium autem in ipsa lingua, magnifice pro-
dest, incisis videlicet venis, quæ in ea sunt am-
babus. Haftenus de venarū sectione in mor-
bis, sequitur, vt agamus de sectione venarum
in symptomatibus; & primum in actionibus 78
lasis. Sciendum igitur, quod nec in cibi fasti-
dio, nec immoderata siti, nec canina appetē-
tia, nec citra, seu malatia, nec bulimo, nec leni-
tate intestinorum, seu cœliaca, & ventrali af-
fectione, nec singultu, nec ventriculi inflam-
matione, nec ventriculi cruditate, nec in sub-
uersione, aut nausea, aut vomitu vlla fit men-
tio de venæ sectione. In malo corporis habi-
tu, qui ex consuetæ excretionis cohibitione
contingat (quod qui ex vitiosorum humorū
copia contingit, purgationem postulet, quod
venæ sectio noxia sit) proritanda erit ea ipsa
excretio, vena in cubito incisa, Aetio, idque
partitis vicibus per triduum sanguis erit ex-
trahendus Aetio & Paulo. In priapismo, quod
hæc affectio iuuenibus magis contingat, ex
Galeno sanguinis missio, vtpote quæ eorum
ætati non repugnet, est maxime salutaris 14.
meth. Quare a principio statim propter do-
lores, & inflammationem vena erit secanda,
præsertim si multo semine abundabunt, & p-
ter

ter consuetudinem a venere abstinuerint, interna sane dicti cubiti, vt pote quæ celerrime & plurimum ex his, quæ principes sunt, partibus vena hæc corpus vacuet, 4. ratione vict. acut. Galeno: nec non eadem ab inferioribus partibus promptissime reuellat. In ignauia vero partium genitalium nulla fit mentio, nec, in non concipientibus: nec in hepaticis, seu laborantibus iccoris imbecillitate. In hydro-
 pis specie illa, quæ anasarca dicitur, sola cōuenit interdum sectio venæ cum incipit, 4. de
 ratione victus: & hoc cum ex retentione, vel hæmorrhoidis, vel muliebrium, vel ex quopiã quæ ita plethorica sit causa, inceperit. Quare circa initia venæ sectio conuenit, Galeno. Nā tametsi ex sanguine frigidior nascatur, & ratione frigiditatis non conueniat: quoniam tamen copię detractio naturam leuat, prope ad extinctionem accedente naturali calore, vt igni contingit, qui cum in periculo sit ne extinguatur ab immissis tum multis, tum humidis lignis, nisi quis multitudinem sustulerit: sic etiam in frigidior ob copiam sanguinis, vbi calor natiuus prope exstinguetur, venę sectio erit præsentissimū remediū, 4. de ratione victus, modo vires, & alia consentiant, internæ sane in cubito, quod velocissime, & plurimū ex partibus principibus vacuet corpus, 4. eiusdē: nec vnica vice neque vires deiiciantur, & vna cum morbo æger tollatur, sed iterando, & paulatim euacuando tutius. In tabe nō fit mē-

*In anasarca
 quando fiat
 vena sectio
 cōueniens.*

*In tabe quã-
do sunt ad-
hibenda
cauteria.*

*In Nyctalo-
pia qua ve-
na secanda.
In oculorum
obfuscatione.*

tio nisi de cauterio, quod tabidorum capiti non est adhibendum, nisi malum a fluxu acriũ humorum ex capite sit factum, aut fiat, ut pote quibus caput facile impleatur, ipsumque spiritus organis multas distillationes demittat. His enim cauterium capiti adhibitum, præsertim ea parte, qua sagittalis futura coronali committitur, aut occipitio inter primam, & secundam vertebra, quo loco tutius sit, non exiguum adiuumentum affert, Gal. 5. metho. quanquam ibi Galenus nec de iis, quæ igne sunt cauteriis, nec de determinata capitis parte sermonem faciat. In nyctalope vtendum erit venæ cubiti sectione, præsertim vbi bono habitu fuerit æger, humeralis sane, dein ex angulis oculorum. In obscuritate, seu oculorũ obfuscatione, præsertim in iis, quib. confertim offuscantur oculi, venæ cubiti erit incidenda, præsertim si plenitudine grauatus erit æger, humeralis, aut media; quod vt ait Aetius validissimum remediũ sit venæ sectio. dein interpositis aliquot diebus fascia collum circumdandum, & constringendum, & eleuatis angularibus venis, ab vtraque nasi parte secãdum erit, Paulo, & Aetio, postea confertim cucurbitula occipitio affigenda cum scarificatione, quod contingat plerunque, vt inquit Aetius, statim incumbente adhuc cucurbitula hominem respicere. In aurium autem sonitu, nec difficili seu graui auditu, nulla sit mentio, nec in læsione olfactus, & narium vitiis, præterquam

quam in ozanis, & polipo, vbi suspicio erit re-
 dundantiae corporis vniuersi. In dolore capitis
 ex siccitate non fit mentio: nec in dolore ca-
 pitis ex intemperie calida. In dolore autem
 capitis ex redundante flaua bile orto, etsi du-
 bium sit vtrum sectione venae sit vtendum an-
 te purgationem: id tamen hoc modo erit re-
 soluendum, si bilis sincera fuerit, aut alteri
 humoria sanguine diuerso, non esse secan-
 dam: sin autem cum sanguine fuerit associata,
 secanda erit vel media, vel humeralis, vel vtra-
 que pro ratione maioris, vel minoris redun-
 dantiae bilis cum sanguine. In dolore autem
 capitis ex intemperie frigida, non fit mentio,
 nec in ea quae sit ex redundante pituita: vbi
 vero ex plethora ortum trahet, non solum ca-
 pitis, sed totius corporis, media, & externa, vbi
 ex plethora, capitis tantum: externa etiam ta-
 tum. In dolore autem ex spiritu flatuoso, aut
 in dolore ex ebrietate non fit mentio. In do-
 lore autem capitis ex ictu, aut casu, secundo
 de comp. med. per loca, a venae sectione cura-
 tionis initium erit faciendum, quod hoc mo-
 do influxus reuellatur, incidendo mediam,
 aut humeralem venam. In dolore autem ca-
 pitis in febribus genito vena secanda erit post
 primam, aut secundam remissionem. in ce-
 phalea secatur, aut media, aut externa cu-
 biti vena: in hemicrania vero non fit men-
 tio. In aurium autem dolore, qui ex inflam-
 matione obortus sit, sanguinis missione vten-

*Polipus.
In capitis
dolore ex re-
dundante
flaua bile
cum sangui-
ne, vena se-
catur.*

*Capitis do-
lor ex ple-
thora mis-
sionem sang.
requirit.*

*In capitis
dolore a ca-
su aut ictu
aphlebot.
incipiendū
est.*

*Dolor capi-
tis in fe-
bribus.*

Cephalea.

*In aurium
dolore ex in-
flammati-
one qua vena
secanda.*

*In dentium
dolore a re-
dundantia
sanguinis
In pleuritide
vena cubiti
interna se-
cuta est.*

*Vena sectio
non est per-
petuo faciē-
da e directo
lateris labo-
rantis.*

dum ex cubito mediæ, seu humeralis, secun-
dum, quod plenitudo maior, vel minor, & vi-
res magis, vel minus valentes erunt. In dolo-
re dentium ex redundantia sanguinis orto, ve-
na humeralis erit incidenda, aut media, Actio
id est ea, quæ e directo laborantium dentium
fita est, & si opus fuerit, venæ etiã sub lingua,
aut cucurbitulæ scapulis affigendę. In dolore
laterali, seu pleuritide, Hippocrates, & Gale-
nus secundo de ratione victus in acut. & quar-
to eiusdem, & lib. de ratione curandi per venę
sectionem, vena cubiti interna eiusdem late-
ris est secāda, quod, vt ait Galenus, expedit, eã
quæ phlegmone obsidetur, partem, tum cele-
riter, tum quam ceteras partes magis in acu-
ris præsertim morbis vacuare: & sectio prædi-
ctæ venæ, sanguinem, inquit Galenus, ab affe-
cta parte, & magis, & velocius tum reuellere,
tum vacuare potest: & hoc ratione maioris
communitatis, atque propinquitatis cum af-
fecta parte, quam habet magis vena cubiti in-
terna e directo lateris laborantis: Quanquam
non perpetuo venæ sectio e directo lateris la-
borantis sit facienda, præsertim cum in vni-
uerso corpore aderit humorum redundantia,
& impetus irruentis fluxionis, sed ad partes
maxime longinquas est trahendum, aut ab
opposito latere, & situ existentes: seruata
tamen semper Hippocratis rectitudine: &
hoc, quod licet ex ea minus sequatur auxi-
lii laboranti particulæ, multo tamen securius
fiat,

fiat, cum non ad ipsam partem affectam per hanc venæ sectionem fluxio proritetur, veluti si ex eodem latere venæ sectio fieret: immo fluxio per eam inhibeat, cum fiat attractio ad partes maxime longinquas. Et post septimam diem dolore adhuc persistente, cucurbitula lateri erit affigenda, & cutis scarificanda, præsertim, vt ait Alexander, vbi parua copia erit vacuanda: quod per cucurbitulam cum extrahatur ex alto, quod in affecta parte continetur, & admirari liceat, quomodo dolor, licet vehementissimus, conquiescat, vt neque fomento, neque alio præsidio amplius indigeat. In dolore colico, in eo scilicet, qui ex inflammatione ortum trahat, protinus vbi ægri vires valentes fuerint, sanguis erit mittendus, Gal. 2. meth. venaque in cubito, præsertim interna, Paulo, est aperienda. Et vbi vrina etiam propter inflammationis magnitudinem retineatur, ex malleolo, inquit, sanguinẽ esse detrahendum. In ischiade seu coxendicum dolore a sanguinis multitudine orto, vena secanda erit. Quæ autem vena sit secanda, lib. de curatione per venæ sectionem Gal. ait, coxendicem iuuari secta vena poplitis, aut malleolorum. Quinimmo addit: memini, inquit, me ischiadas, siue coxendicum dolorem vno die, facta ex crure euacuatione, curasse. Quod etiam 10. de comp. med. per loca dixit. Eodem tamẽ in libro ait, tanquam, inquit, maximam vim ad affectionis curationem habeat totius

*In Colico
dolore
qua vena
sit secanda.*

*In suppressione
vrina.*

In Ischiade.

corporis euacuatio, ab ipsa exordiendum est, non solum a cruribus, sed etiam a cubito primum sanguinis detractioe facta. Quorum vtrumque verum est & obseruandum, recenti quidem existente dolore praesertim cum totius repletionem, vena cubiti erit secanda, utpote quae maxime reuellat: inueterato autem existente dolore, praesertim non existente in toto corpore sanguinis redundantia, vena quae in coxa reperitur, utpote quae vacuet sanguinem in venis coxendicum existentem deriuando: ut hac ratione recte potuerit dicere Galenus existius venae sectione vno se die curasse dolorem. In podagra autem & arthritide, seu morbo articulari, vena praeseruandi gratia pluries erit secanda, ea sane, Aetio, quae erit ex directo cruris fluxione infestati in brachio interna. & hac non comparente, media. & ubi manus dextra dolore infestabitur, vena in dextro crure erit secanda, quod venae sectio, ut ait Gal. lib. de cur. ratione per venae sectionem, in iis qui multo sanguine redundant, tale iuuamentum afferat, ut nedum cum inceperit podagra, seu morbus articularis, sed a gro nondum laborante, sed parato atque obnoxio huiusmodi doloribus, venae sectione liberarit, 6. aph. 47. In comate seu cataphora non fit mentio, sed cum modo cum lethargo in causis conueniat, modo cum phrenitide, modo cum vtrisque, remedia etiam postulat, quae lethargo & phrenitici conueniunt. In memoria

*In podagra
& arthritide.*

In cataphora.

moria abolita non fit mentio. In melanco- *In memoria*
 lia, ea scilicet, quæ ex toto gignatur, princi- *bolia.*
 pium curationis a venæ sectione erit exor-
 diendum, 3. loc. aff. viribus ægri, & aliis con-
 sentientibus. In melancholia autem qua so- *In melan-*
 lo affecto cerebro fiat, ibidem ait quo ad *cholia.*
 hanc dispositionem sanguinis detractio non
 indigere. Eodem modo, ut opinor, in hypo- *In melan-*
 chondriaca seu flatuosa melancholia erit a- *cholia hys*
 gendum, nisi multo sanguine redundet æger. *ochondria-*
 In furore seu insania, ea præsertim quæ excita- *ca.*
 tur ex feruenti sanguine, ante omnia sanguis *In insania.*
 erit mittendus ab externa cubiti vena, ubi aut
 ex flaua bile præaffata, aut ab exusto humo-
 re melancholico fiet, non fit mentio. In lupi- *In lucina*
 na insania accessionis tempore vena secatur, *insania.*
 & sanguis euacuatur vsque ad animi deli-
 quium. In catalepsi, ex Actio vena superna in *In catalepsi*
 cubito erit secanda citra dilationem, & pro
 viribus sanguis extrahendus: & hoc, ubi æger
 multo sanguine refertus erit, viresque, ac
 B ætas non prohibeant. In tussi non fit mentio. *Qua vena*
 In difficultate spirandi, seu orthopnoea, præ- *secanda sit*
 sertim sicca sine sputis, vel tussi citra puris col- *in ortho-*
 lectionem, Gal. lib. 4. rationis victa acut. præ-
 sertim ubi necessitas urgebit, ante omnia in-
 cidenda erit vena, media sane aut interna in cu-
 bito, nec multa sanguinis copia extrahenda, sed
 quantum vires patiet. In convulsione ex inanitione *In convul-*
 ne non fit mentio. In convulsione ex repletionem, *sione ex re-*
 pletione.

*In conuul-
sione ex in-
flammatio-
ne.
In palpita-
tione cordis.*

In incubo.

si repletio fuerit pituitosa, succorum citra sanguinis permixtionem, seu repletionem, purgante tollimus medicamento: sin autem repletio fuerit succorum pituitosorum non multum a sanguine distantium, mittendus erit sanguis ex media cubiti vena, non tamen vniuersim, sed pluribus vicibus: & hoc: quod taliter affectis non oporteat mittere tantum sanguinis, quantum exigit morbus, sed aliquid symptomati etiam sit relinquendum, Galen. i. art. cur. ad Glau. cuius causa saepe sudores eueniunt, vigiliae molestant, & acri vires debilitantur. In conuulsione autem ex inflammatione vena quoque erit secanda, liberaliterque sanguis erit extrahendus, modo pluribus vicibus illum euacuemus ob dictam causam. In palpitatione cordis stante circa initia, ubi aut virtus aut aetas, aut aliud quidquam non prohibeat, secanda erit vena, interna sane dextri cubiti, ubi associata erit plenitudo, non existente autem plenitudine, sinistri. Nam licet corpus per frigidum in hoc affectu sit distemperatum, ratione tamen partis affectae, quod princeps viscus sit, morbus cum sit magnus, confert sectio venae, quanquam conferat etiam gratia reuulsione, dum prohibetur humorum confluxus, praesertim cum ipsum cor imbecillum reperiatur, & ratione motus praeter naturam palpitantis excrementa etiam trahat. qua ratione Gal. non dixit eos curari a venae sectione, sed iuuari. In incubo, ubi sanguis redundabit, vena in cubito erit

to erit secunda vel media vel externa. In apo-
plexia statim sanguis detrahendus e dextra ma-
nu, ex humerali aut media vena, consentien-
tibus viribus, etate & aliis: & hoc quod affectus
magnitudo id requirat, tãquam princeps sco-
pus secundæ venæ Hip. & Gal. quanquam ve-
næ sectio in talibus agris maximo cum illorũ
periculo sit, Aetio: & hoc quod sanguinis de-
tractio vel occidat, vel liberet, & vbi non re-
dit & motus, & mens, nihil spei superfit. Co-
pia tamen sanguinis non semel, sed partite e-
rit extrahenda: & hoc, quod commouere tan-
tum oporteat, non autem exsoluere, & calorẽ
extinguere, vt ait Aetius. Quare repetenda erit
venæ sectio, q̃ aliud curationis genus vix vnq̃
sanitatem restituat, Celso. In resolutione nul-
lum aptius principium reperit Aetius, quam
ordiri a venæ sectione, modo moderate fiat,
ne agri refrigerentur. In vertigine, & tene-
bricosa vertigine cõcedentibus circumstan-
tiis secunda erit vena, Aetio & Paulo, hume-
ralis externa, vel media: non acruatim extra-
hendo, sed pluribus vicibus, quod qualibet
occasione agri concidant, & adhuc perseue-
rante affectione, neq; prædictis cedente, præ-
sertim si ex vaporibus calidiorib. per arterias
sursum elatis prædictæ affectiones fiant, arte-
riæ ipsæ iuxta tempora sitæ, supra aures erunt
incidendæ 3. loc affe. Quanquam vt ait Gale-
nus, non omnes huius auxilii beneficio curati
fuerint, tum quod per altiores arterias, quæ

*An in apo-
plexia sit ve-
na secunda.*

*In apoplexia
sanguis par-
tite extra-
hendus est.*

In paralyfi.

In vertigine

*Quando cõ-
ueniat in
vertigine se-
care arteri-
as supra au-
res.*

ad cerebrum ex ipsius basi per retiformem ascendunt, vaporosus calidusque spiritus interim elabitur ac cerebrum implet: tum etiā spiritus flatuosus potest ex insequenti cerebri intemperie oriri. Quare antequā secetur summe laborandum est, vt exquisitē sciatur vnde id proueniat: & hoc, quod vbi affectio prodibit altero duorum modorum iam dictorum, nullā vtilitatem acri suscipiant ex arteriarum sectione. In epilepsia, si nihil impedierit, vena erit secanda non cubiti, sed crurum prius, Gal. lib. de cur. ratione per venæ sectionē, parumq; sanguinis est extrahendum, idque fiendum accessione transacta. Sequitur vt percurramus locos secandi venam; vbi mutata sunt excrementa corporis. In distillatione sane, seu catharro descendente ad subiectas partes, præsertim si ex calidorum succorum redundantia fiat, vena externa cubiti humeralis dicta erit secanda. In eruptione sanguinis e naribus, s. meth. Gale. tum ad contraria auertendus erit sanguis, tum ad proxima deriuandus: ex sectione venæ sub eo cubito, qui profusioni e directo respondet; vbi scilicet æger adhuc non erit resolutus. Nam vbi sectio venæ impiedetur, vt cū erit cucurbitulis scapulis affixis cum scarificatione, quod hæc sit auersio sanguinis e naribus, Galeno: paulatimq; sanguis e vena erit trahendus: & vbi paululū detraxeris, mox vnā horā intermittes, rursusq; detrahes, post iterū atq; iterum pro laborantis viribus; quod hoc reuulsorio

*In epilepsia
quando vena
secanda
sit.*

*II.
Venarum
sectio in
mutatis ex-
crementis.
In catar-
rho.*

*In hæmor-
rhag. nariū.*

reuulsorio hoc modo administrato auxilio li.
 de cur. ratione per venæ sectionem validam se-
 sanguinis e naribus eruptionem sedasse pro-
 fiteatur Galenus. In profluvio sanguinis e re- *In profluvio*
 nibus, præsertim quibus per circuitus quosdā, *sanguinis e*
 aut propter venæ rupturam in renibus factam *renibus*
 sanguis excernetur, initio sanguinis impetus
 statim erit cohibendus venæ sectione in cu-
 bito, Aetio, partiēdo melius quam vnica vice,
 vt paulatim eius reuulsio & diuersio fiat, Ae-
 tio. In cruenta vero spuitione, si ex gingiuis *In cruenta*
 prodibit, impetus eius auerteretur admota oc- *spuitione.*
 cipitio cucurbitula, sic vt cutis quoq; incida- *cucurb. occi-*
 tur. In muliere, cui menstrua non feratur, cu- *picio admo-*
 curbitula incisis inguinibus adhibenda: & vbi *uenda est.*
 iis sanguis grauitur adhuc erumpet, loco cu-
 curbitulæ, humeralis incidenda aut media. In
 muliere cui menstrua nō ferantur, in talo ve- *In mēstruis*
 na erit secāda. Vbi a capite sanguis feretur, qui *suppressis*
 multus sit, euacuandus erit Aetio, aut ad pro- *que vena*
 pinquas partes deriuādo, quod fiet per nares, *secanda.*
 aut ad contiguas partes diuertēdo, quod fiet *In fluore*
 alicuius venæ sectione, ne per negligentiam *sanguinis.*
 cōsuetudo fiat sanguinis in hos locos delabē-
 di. Et perseuerante fluore cucurbitula quoq;
 subacta plurima flāma occipitio erit apponē-
 da. Si ob distillationem sequatur spuitio crue- *In spuitione*
 ra, quæ non multum acris sit, vena protinus in *cruenta non*
 principio erit secanda Aetio & Paulo, hume- *acri.*
 ralis aut media. Si sanguis vometur, vena in *In vomitio-*
 cubito humeralis, etiam si ex hepate in ventrē *nibus san-*
 guinis.

inferatur. Si a splene in ventrem, vena quæ inter paruum, & annularem digitum in manu sinistra. Si ex spiritus vasis disruptis, aut eorum oris patefactis, aut alia quauis causâ sanguis reiciatur, vena cubiti interna, Gal. s. met. paulatim detrahendo, quod non indigeant euacuatione, sed diuersione, nimirum ab ipsâ affectione vacuati, vt ait Aetius. & vbi cubiti vena non apparuerit, vena in talo, quæ (quod ad longinquiores partes fiat diuersio) Alexandro magis proficit. Sin autem sputum cruentum fuerit ex vasorum exesione ab acri distillatione, præsertim ad pulmonem & pectus, vbi æger validus fuerit, & multi sanguinis, statim a principio sanguinem mittit Gal. s. met. quamuis a venæ sectione Paulus & Alexâder caueant. Quod intelligendum, vbi admodum acris fuerit distillatio, quod iis, qui ex erosione sanguinē reddūt, corpus soleat esse & gracile & siccum. in cholera autē, & alui profluvio non fit mentio, nec in iis, qui vrinam cōtinere nequeunt. In diabete, vbi occeperit malum, nec ad perfectionem sit progressum, vena cubiti, Aetio & Paulo, quod inueterato malo totum corpus reddatur acrius. In ictero, seu morbo regio s. loc. aff. Gal. venæ sectionē dimisit, & purgationem commendauit, quāuis Aetius, & Paulus venam in cubito dextro secâr: quod forte est intelligendum, vbi simul cum bile sanguis redundabit. In ictero nigro ob lienis intemperiem, aut viarum ad illum obstru-

*In cruenta
spuitione ab
exesione va-
sorum.*

*In cholera
& profluvio
alui non fit
mentio.*

*Qua vena
secanda sit
In Diabete.*

In ictero.

*In ictero ni-
gro.*

obstructionem, interna cubiti sinistri erit secanda, quod perpetuo per venę sectionem ingentem conspexerit vtilitatem in lienis affectibus Gal. lib. de cur. ratione per venę sectionē. In lactis redundantia nihil præstātius, quā circa initia, vbi nihil impedierit, poplitis seu tali venam secare, copiosus sanguis erit extrahendus, & vbi continget aliā mamillarum esse magis oblāsam, e directo vena secanda erit. Et præter venę sectionem sunt prouocandi menses: qui vt ait Gal. 5. aph. 39. & 52. quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis multum præsertim, non colligitur. In lacte vero in casei speciem, seu grumos conuerso, non fit mentio. In immodica autem vteri purgatione, seu sanguinis profluvio, venę sectio in cubito facta interne reuellet, præsertim vbi fuerit sanguinis redundantia, & reliqua nō prohibeant: exiguumq; sanguinis erit auferendum, iterumq; opus vbi fuerit, erit iteranda. In profluvio seminis nihil. In muliebri fluore, præsertim si ruber fuerit, vbi nihil obstiterit, sanguis erit mittendus ex cubiti vena, quod hæc non solum materiam ad vterum confluentem diuertat, sed muliebris floris detentionem, ac constrictionem tutam efficiat. In vteri strangulatu, præsertim in quo facta fuerit menstruę purgationis detentio, secanda erit tali vena. In vteri prolapsu nihil. In vrinæ stillicidio, & in difficultate vrinæ nihil. In lapide vesicę nihil. In lapide vero renū, qui ve-

In lactis redundantia.

In lacte conuerso in grumos.

In menstruis immodicis.

In fluore muliebri.

In strangulatione vteri.

*De sectione
venæ in re-
num lapide.
conciliatur
Galeno &
Aetio.*

*In suppres-
sione mens-
struæ.*

hementissimos afferat dolores, vbi quid non prohibebit, vena erit secanda cubiti, Aetio, Galeno vero vena in poplitibus, aut iuxta malleolos, e directo renis patientis, quod semper, & perpetuo seruanda sit rectitudo. Quæ contrarietas hoc modo potest conciliari: quod vt ait Gal.lib. de cur. ratione per venæ sectionē, ambiguum est an renes partibus superioribus an inferioribus ascribi debeant: quoniam vt ait Gal.lib. de renum affectibus dig. ac curatio ne, existente virtute valida, vena in poplite, vel quæ ad malleolos erit secanda: vbi imbecillis, vena quæ in cubito. & hoc, quoniam si virtute existēte debili infra euacuaremus, retentrix facultas, quæ est imbecillis, cum non possit retinere, vniuersam materiam in præceps rapi ad imbecillē partē assiduo defluxu fineret. In mensiū suppressione omnibus cōsistentibus vena secanda erit, nō ea quidē quæ in cubito, vt ait Aetius: quod, vt ait Gal.lib. de cur. ratione per venæ sectionem, sectæ in cubito venæ mulierum purgationem retrahere & renellere soleāt, sed in malleolis aut poplitibus: & hoc, quod ex crurib. euacuationes tantum abest, vt retrahant, vti potius menses promoucant. Secanda autem erit vena nō multo tempore ante statum mensiū tempus, sed tribus aut quatuor diebus anteuertentes cōsuetos mulieris circuitus, victū his trib. aut quatuor diebus extenuantem etiam ordinantes, Galeno, sectionem paulatim iterando vel in eodem

eodem vel in vtroque crure. In mola, sangui- *In mola.*
 ne multo redundante (quod in abundantia a-
 liorum humorum purganda sint) prius interna
 cubiti vena, postea malleolorum vena erit se-
 canda. In difficultate partus, & in secunda de-
 relicta nihil, nec in lumbricis. Sequitur alterū
 genus euacuandi causam continentem, quæ
 per particularem sanguinis detractionē fieri
 solet. SANGVINIS DETRACTIO particularis, est *Causa con-*
 euacuatio vniuersalis, sanguinē paulatim tra- *tinētis, eua-*
 hens, illumq; potissimum, qui inhaeret in ea *cuatio per*
 parte, quæ læsa est, vt pars affecta a noxio hu- *detractionē*
 more subleuetur. Porro quod dicitur: Parti- *sanguinis*
 cularem sanguinis detractionem esse euacua- *particularē.*
 tionem vniuersalem sanguinis, notat cōmu-
 ne genus cuiusque generis phlebotomiæ, seu
 vniuersalis, seu particularis, ad differentiā pur-
 gationis, quæ solum vitiosos, nō autē promif-
 cue vniuersam humorū multitudinē detrahit.
 Et quod sequitur, huiusmodi phlebotomiæ
 genus paulatim sanguinē detrahē, facit dif-
 ferre huiusmodi particularem sanguinis de-
 tractionem a phlebotomia, & omnibus phle-
 botomiæ formis, quæ affatim vacuāt. Et quod
 sequitur: Sanguinem ab ea potissimum parte
 detrahē, quæ læsa est; notat vsum huiusce-
 modi vacuandi ad hoc institutum: vt sanguis,
 qui in aliqua parte inhaeret, qui nec secta vena,
 nec medicatione reuelli potuit, huiusmodi re-
 mediū genere euacuetur. Modi autē exercēdi

*Tres modi
phlebotomia
particularis
Hirudo.
Sacrificatio.
Cucurbitula.*

particulare hoc phlebotomandi genus, tres sunt præcipui, hirudò, cucurbitula, scarificatio. illa quidē morfu trifidū vulnus infligente sanguinē vacuat, scarificatio v. scissione cutis scalpello minutim facta. In hoc conveniunt omnes, quod partem solā, quā attingūt, evacuant, aut certe minimū ab aliis vicinis: nihil vero prorsus ex alto, aut ex distantiore loco proliciunt, nisi amplior aliqua vena subiecta vulneretur, sed tunc vires phlebotomiæ obtinebit. Sed hæcenus de modis quibus causa continens, & materia a loco remeabilis, a loco affecto fugari potest; nepe repulsione, derivatione, vacuatione: Sequitur, ut percurramus modos, quibus succurrere possumus materiæ in loco adeo infarctæ, ut omni remeandi habilitate sit orbata, quæ sane nullo enarratorum modorum, nec repulsione, nec derivatione, nec vacuatione tolli potuit. Quoniam vero materia remeandi habilitate priuatur, quia induratur: id autem, quod durum efficitur triplici ratione fit durum, vel propter siccitatem, vel propter congelationem, vel propter plenitudinem; sequitur, ut singulum emolliendi genus prosequamur, incipientes ab eo emolliendi genere, quod materiam emollit, quæ ex siccitate dura euasit, non multum excedente. **EMOLLITIO DURI** ex siccitate non multum excedente est alteratio facta a calido moderato, & humido, ut id, quod ratione siccitatis euasit durum,

*Materia in-
farcta & in-
durata: vac-
cuatio.*

*Emollitio
duri.
1. Ex siccitate non
multum ex-
cedente.*

euasit durum, molle fiat. Ideo autem dicitur: Emollitionem duri ex siccitate, ad differentiã duri per congelationem, & duri ex plenitudine. Et quod additur, ex siccitate non multum excedẽte, ad id spectat, vt separaretur ab iis, quæ dura quidem sunt ex siccitate, sed ex siccitate excedẽte, sicuti os, & lapis. Et quod sequitur:

Emollitionem huiusmodi duri fieri a calido moderato, & humido, eo spectat, vt notet *Emollitio
nis duri cau-
sa efficiens.*

causam efficientem huius generis emolliendi: & hoc, quod humiditas corrigat siccitatẽ, caliditas vero temperata adiuuet, vt humiditas penetraret ad profundum absque vi resol- uendi. Illud vero non est ignorandum, quod

si aliquid durum euaserit ex siccitate multum excedente, tunc non amplius emolliri posse calido moderato, & humido; sed humido *Emollitio
duri ex sicci-
tate multũ
excedente.*

B multo tenui admixto, partibus igneis, vel terreis attenuatis. Etenim, quæ adeo dura sunt per tantam exsiccationem, veluti ossa, & lapides, non possunt per epicrasin emolliri, veluti ea quæ dura sunt ex siccitate paucã. Ob id

patientibus calculos frustra exhiberentur ca- *Calculi e-
mollitio.*

lida, & humida, nisi humiditas esset admixta partibus tenuibus, seu acres sint, seu acidæ.

Humida quidem esse debent, vt madefaciant, & colliquent: sed hoc non sufficeret, nisi esset admixtum partibus; vel acres sint, vt succus chelidonii; vel acidæ, vt succus limonũ: vel acidæ simul & acres, veluti est acetum.

Quod si per infusionem in eo factam alicu-

2.
Duri pro-
pter pleni-
tudinem
emollio.

Inflamma-
torum loco-
rum duritiei
emollio.
Dolorum
ab humorib.
distenditib.
per modera-
e calida
edatio.

ius rei acerrimæ fieret acrius, veluti scyllæ ad-
mixtione, tanto facilius incideret, & in minu-
tas partes dissiparet. Atque hoc est illud, cur
medici pro frangendis lapidibus, & calculis
extollant maxime succum limonum, & cheli-
donii, & oxymel simplex, & scylliticum. At si
durum aliquid sit non ratione siccitatis, sed
propter plenitudinem, ab eodē, & ipsum ef-
ficiente, & alterate emollietur, a quo diximus
emolliiri id, quod euasit durum ex siccitate
moderata; nimirum a calido remissio vsque ad
primum gradum, aut saltem accedente ad tē-
peratum: associato cum humido aereo, calido
quidem: quod indigeamus aperiētibus, ut ma-
teria replens exire possit. Aperiō autem per
calidum fiat, remissum vero: Quoniam si ex-
cederet, non tantum aperiret, sed adhuc no-
uam materiam attraheret, & magis repleret:
associetur autem cum humido aereo, ut se-
cundum quod calidum aperit, humidum ae-
reum illud relaxet, quod tensum est. Atque
hoc est illud, cur medici ad emolliendum hu-
iusmodi dura ex plenitudine, sicuti apparet in
omnibus locis inflammatis; vtantur aqua te-
pida, decocto camomelli, althææ, maluæ, bu-
tyro recenti, & oleo dulci, quale est sabinum.
Illud etiam non est ignorandum ab huiusmo-
di emolliente moderate calido a medicis do-
lores sedari, cum ab eo humores in loco con-
tenti partes distrahentes, & solutionem con-
tinui molientes, per halitum discutiatur ape-
riendo.

riendo meatus. Quæ quidem apertio, seu rarefactio a calore moderato fieri solet; tamen si quandoq; etiam altero efficiente vtantur, sensum stupefaciente, & mortificante, vt amplius propria iniuria non percipiatur, quod faciunt excessiue frigidis. Sed de his suo loco vberius agetur, vbi pertractabimus de arte sedandi dolorē. Sin autem huiusmodi alterās calidum sit & siccum, medium scilicet inter intensum, & remissum, associatum aliqua vi aut astringente, aut emplastica, emollietur illud quod erit durum per congelationem a frigido. Notanter autem dictum fuit, id quod habet emollire durum per congelationem, a calido fieri debere, & sicco, medio inter intensum, & remissum, veluti sunt ea quæ calfaciunt in secundo gradu: & hoc, quod sicuti calida in primo imbecillia sunt, & impotentia ad soluendā materiam congelatam: ita calida in tertio magis potentia sunt, cum non tantum possint soluere, sed etiā solutum resolvere, & subtilioribus partib. materiæ resolutis, reliquum postea materiæ gypsum, & inmedicabile relinquere. Quæ ratione etiam additum fuit: calidum hoc & siccum medium inter intensum, & remissum, associatum esse debere aliqua vi astringente, aut emplastica: & hoc, vt soliti vapores introrsum arceantur, & earum distillationem prohibeant. Atq; hoc est illud quod ait Galenus: Nullū vehemēter excalfaciēs, siccansq; medicamentū aptū esse ad scirrhosos affectus curādos: & hoc

*in Dolorib.
sedandi
per facientia.*

*3.
Dum per
congelationem
a frigido emol-
lito.*

*Secundo
calida in
primo.
secundo,
tertio.*

*Scirrhus non
conueniunt
vehemen-
ter calfaci-
entia &
siccantia.*

quod etsi quæ vehementer dissoluendo va- 82
 cuant, trahunt, ac digerunt, etsi paucis primis
 diebus egregie processisse curatio videatur, id
 tamen, quod de affectu restat, insanabile fit: &
 hoc quod partibus tenuibus digestis, reliquū
 veluti lapidosa concretio relinquatur. 2. art.
 curat. ad Glauc. & 14. meth. Atque hoc illud
 est, cur practici scirrhum a pituitosa materia
 per congelationem indurata emolliant ma-
 xime ammoniaco, bdellio, ladano pingui, &
 œsypo: etiam humida ad emolliendū optima,
 nec vllō vehementer excalfaciente, siccante-
 ve medicamento vtantur, sed iis tantum, quæ
 cū emollitione discutere possunt, veluti sunt
 medullæ omnes, præsertim ceruina, & vituli-
 na, adipēs omnes, præsertim anserina, & galli-
 nacea, butyrum, althææ radix, oleum quod a-
 stringens non sit, sed plane tenuium partium,
 quale est sabinum, in eo incoquentes interdū
 fœnumgræcum, aut althææ comā: aceto quin-
 etiam vtentes, præsertim præparata iā emol-
 lientibus materia: & hoc, quod aceti vis, mo-
 do modice, & tempore debito admisceatur,
 maxime sit salutaris, dissecādo crassos humo-
 res, ac resoluendo, præsertim in liene, & car-
 nosi musculi partibus scirrho affectis, quod
 partes huiusmodi raræ sint, nec timor sit vt
 nerui eius lædantur, dummodo nec sæpe, nec
 inter initia, nec longo tempore medicamen-
 tis ex aceto compositis, præsertim in ligamen-
 tis, & tendonibus vtaris. Atque hoc est illud
 cur

*Scirrhum
 a pituita
 per congela-
 tionem in-
 duratum
 emollientia.*

*Medulla in
 scirrho.*

*Aceti vis in
 scirrho.*

cur in lienis scirrho post emollientia medica- *Scirrhi lie-*
 menta liquatum ammoniacum aceto ad luti *nis curatio.*
 crassitudinem maximum vsum præstet, altero
 postmodum die redeundo ad emollientia, ve-
 luti radice althææ in adipe anserino, aut galli-
 naceo liquata, & cataplasmatibus more imposi-
 ta, quemadmodum discurrit Gale. 14. meth. &
 2. ad Glauconem. Præter hæc emollitur tumor *Tumoris*
 durus lienis, & digeritur vnguento ex medul- *duri in liene*
 la cruris cerui, aut vituli, adipe anseris, gallinæ, *curatio ex-*
 oleo amygdalarum dulcium, & emplastro de *perta.*
 meliloto, & ceratis Mesuæ æsypatis, vt am-
 moniaco in aceto communi, vel scyllitico,
 Galen. 14. meth. addito oleo amygdalarum dul-
 cium, vel capparum: quod remedium est effi-
 cacissimum, vt vnguento ex succo, vel substā-
 tia tota radice brionis, aut ciclamini cum oleis
 prædictis, & cera pauca facto, quod efficacis-
 simum est post alia dicta, ac certissimum, vt for-
 ex decocto florum genistæ, radicum capparis,
 foliorum tamarisci, scolopendrii, asplenii ex
 spōgia, vel vesica imposito, vt butyro liquato,
 & subacto diu, cum hoc decocto, & deinde
 spleni illito. Ad eundem modum, vbi materia *Scirrhi he-*
 in hepate obduruit, emolliunt emplastro me- *patis emol-*
 liloti Mesuæ, vel malua, althææ, farina lini, fœ- *lurio.*
 nigræci, butyro, cerato æsypato Philagii apud
 Mesuem: adhuc æsypus ipse cum oleo amyg-
 dalarum dulcium, vel butyro mire scirrhos e-
 mollit. Qui si sint exquisiti, & absoluti, sunt in-
 sanabiles in hepate, & cæteris partibus, vt 2.

art. cur ad Glau. Quanquam indicatione a parte affecta delumta, quæ semper ex Galeno 14. metho. in omnibus tum morbis, tum symptomatibus memoriæ est habēda, ea quæ habent vim astringendi sunt admiscenda, ita tamen vt semper quæ digerendi, dissoluendi, ac molliendi vim habent, astringētia superēt. Sed de his in morbis partium corporis humani, præsertim iccoris affectibus vberius agitur. Ad eundem modum in tophorum curatione, qui in podagris nasci solent, progredientes medicamentis emolliētē naturā sortitis, in lienis scirrho, & aliis enarratis: & hoc præcipue præ aliis ex omnium græcorum cōsensu, videlicet vetustissimo, acerrimoq; caseo B cum suillæ carnis præpinguis, ac veteris decocto cōtrito, & superimposito. Sed hæc de primo modo, & arte tractandi materiam a loco irremediabilem. Sequitur maturatio, seu suppuratio, qua mediāte pus effici solet, & reduci materia abscellus ad formam conuenientem. MATURATIO est alteratio facta a calore naturali temperato conseruante, vel etiam augente substantiam caloris innati, vt materia ad optimam formam reducatur. Ideo autem dicitur: maturationem fieri a calore naturali, ad differentiam putrefactionis, quæ fit a calore præter naturam, & non naturali; temperato vero, quod intemperatus, & dissimilis calori naturali maturationem non faciat. Et quod sequitur, maturationē fieri a calore naturali

*Tophorum
in podagris
curatio.*

*Maturatio
seu suppara-
tio.*

*Maturatio
nis & emol-
litionis dif-
ferentia.*

turali temperato, conseruante, vel etiam augente substantiam caloris innati, eo pertinet: vt seiungatur ab emolitione, in qua augemus qualitatem caloris: maturatio autem substantiam caloris respicit, vt illam cōseruet, vel augeat. Causa enim efficiens in pure mouendo *Phrenitidis* temperatissima esse debet, & calori naturali *Et absoluti* similima. Atque hoc est illud cur medici pro *aryspalatis* *suppuratio.* maturacione manum patientis loco suppurationis applicandam iubeant, aquam modice calidam, oleum dulce, adipem suillam, farinā tritici iubentes huiusmodi emplastica, vt meatus obstruentia nō sinant calorem naturalem diffilare. Atque hoc est illud, cur practici in illa cerebri inflammatione, quæ phrenitis appellatur, vbi iam facta est inflammatio, & absolutū erysipelas, nec amplius in generatione est, adinoueant capiti tēperate calida, veluti colūbum, capum, elurum, catulum, vel simile animalculum viuum per spinam sectum, & exenteratum, vt a vita calet, vel arietis pulmonem, aut hepar. Similiter ab animali calente, & aliis in melancholia fieri solitis, veluti balneo capitis ex malua, althæa, viola, capitibus, & intestinis veruecum. Ad eundem modum si inflammatio in pectore fuerit, quæ pleuritis dicitur, *In Pleuritide.* suppuretur oleo amygdalarum dulciū, camomellino, & cataplasmatibus ex farina aut muccagine seminis lini, fœnogræci, maluæ, althææ, & radicū, flo. camomelli, melilori, cū butyro recti, & adipe gallinaceo coctionē pmouet; &

*In Ventri-
culi phleg-
mone.*

*In inflam-
matione he-
patis.*

*Vlcus in
gibba parte
secoris.
Vlcus in si-
ma.*

rupto abscessu, quod tussi fieri potest, aqua saccharata, vel hordei decocto vlcus tergent: si febris est remissior, etiam hydromelli, vel aqua ex melle distillata, & decocto cicerum rubrorum. denique vlcus glutinant bolo armeno, terra lemmia ad scrup. j. & ceteris in phthi- si fieri solitis. Ad eundem modum in ventriculi phlegmone post digerentia (in statu non ta- men sola, quod resoluentibus perpetuo, & semper, astringentia, & parte roborantia sunt admiscenda, in ventriculo, & hepate ob actio- nis eius necessitatem, ut discurret Gal. 7. & 11. metho.) si resolui non poterit, quod tamen est longe optatius, lib. de inaequali intemperie, co- quentibus suppurationem moliuntur, & vlcus, ubi abscessus erupit, terget, siccant, carne im- plent, & cicatrice tegunt. Ad eundem modum in hepatis inflammatione, si resoluentibus phlegmon non potest sanari, sed suppuretur (quod dolores, & febres tunc intensiores de- clarant) ut ex aph. 47. 2. Coctionem hanc iuuat cataplasmate ex decocto ficuum siccarum, vuarum passarum, althææ, maluæ, seminis lini, & fœnogræci, cum butyro, oleo amygdalarum dulcium, adipe gallinæ, anseris; abscessum dein rumpentes motu violento, veluti saltu, vo- mitu, tussi, sternutamento: ruptum statim de- tergent; si vlcus est in gibba, vetricis, decocto cicerum rubrorum, vel hordei cum mulla, vel aqua saccharata; si vero est in sima, cassia, mā- na, sero lactis caprini, & aliis aluum deicien- 8;
tibus,

13 tibus, tandem vlcus glutinant bolo armeno, *Suppuratio*
 sigillo lemnio. Ad eundem modum, & iisdem *in inflam-*
 & fomentis & cataplasmatibus pus producenti- *matione li-*
 bus adiuuantes, procedentes in lienis inflā- *enis.*
 matione, quibus diximus esse procedendum
 in hepatis inflammatione, vbi scilicet in sup-
 purationem tender lienis inflammatio, quod
 tamen raro contingit. Ad eundem modum in *In inflam.*
 renum inflammatione, si ad suppurationem *renum.*
 deuenire voluerit: quod cognoscetur si ex i-
 doneis medicamentis neque dolor, neque fe-
 bris, nec grauitas conquiescat, suppurationem
 ac puris eruptionem mouet, & adiuuant spō-
 gis aqua & oleo assiduo imbutis; fofus gratia
 admotis, cataplasmatibus ex farina hordeacea,
 fursuribus, ficubus, althæa, & similibus, supe-
 rius in suppurando hepatis phlegmone dictis:
 descensu etiam in soliu ex emollientibus her-
 bis, malua, althæa, camomello, lini semine, fœ-
 nograco: perfecta suppuratione, quod cog-
 noscetur si febris & dolores minores fuerint,
 si ruptura moratur, in potu exhibent vrinam
 ducentia, veluti fœniculi, pulegii, & origani, &
 similium decoctum. rumpunt enim suppura-
 tionem, & pus per vrinam expurgant, vel aliu
 subducunt clysteribus acerbis, post puris emi-
 ctionem, lac cum melle præbentes, & alia quæ
 in renum vlcere facienda esse dicemus. Sequi-
 tur DIGESTIO, quæ maturationi similis, & *Digestio.*
 eadem fere esse videtur, cum ab eodẽ ferme
 efficiente fieri soleat, & ad eundem fere finẽ,

C c

*Digestionis
& maturatio-
nis dif-
ferentia.*

*In cerebri
intemperie
cum mate-
ria sangui-
nea qua re-
liquias dis-
soluant.*

*Dissipantia
reliquias in
intemperie
cerebri pi-
tuitosa.*

in hoc solum differre videntur, quod ubi materia continens in loco existens in farcta, non erit adeo multa, ut resolui non possit, utimur digestionem; ubi autem per resolutionem dissolui non potest, & in vapores resolui, maturatione utimur, reducentes materiam illam ad talem statum, ut vacuari possit. Atque hoc est illud, cur practici post euacuationem causae antecedentis & continentis, soleant adhibere digerentia reliquias materiae in locis affectis contentas. Ob id in intemperie cerebri cum materia calida & humida seu sanguinea, & a materia etiam biliosa pendente (quanquam materia biliosa, quod ob leuitatem, raritatem, tenuitatem facile exhalet, huiusmodi reliquias digerentibus vix opus habeat) reliquias huiusmodi materierum in capite relictarum clementer digerentibus dissoluere nitantur, utentes foru capitis ex seminibus altheae, lini, fœnogræci, flo. camomelli, meliloti in aqua sufficienti coctis, vel ex oleo camomelli, vel gallo, columbo, hepate, pulmone magni animalis natura præcalido adhuc mortuo. Ad eundem modum in intemperie frigida & humida cerebri a pituita pendente, reliquias dissipare solent tum sumtis, tum admotis: suntis quidem diamusci dulcis vel amari Mesuae drachmis duabus, vel theriacis aut mithridati veteris drachma una semel in hebdomada, horis septem ante cibum, vel aceto cõdita, vel confectioe ex acoro tota sua substantia in id efficaci, horis duabus ante cibum

eibū, per se, aut cū aqua betonica, maiorana, saluia, vel alterius capitalis facultate similis: ad motis vero vnctionibus, irrigationibus, fotib. cataplasmatibus, emplasticis, sacculis, odoramentis, & reliquis topicis remediis ex oleo anethino, camomelli, liliorum, costino, balanino, ex decocto capitaliū p̄dictorū in lixiuio, euphorbio, castoreo. Hęc capiti cū aliis capiti applicare nō formidātes, q̄ in aurē etiā tuto a Galeno immittantur, ex pomo odorifero, maiorana, stœchade, caryophyllis, cinnamomo &c. cū cera cōstāte. nullū tamē horū capiti admouētes, nisi ventriculo vacuo, quod a pleno vis magna vaporū calore suo in caput trahatur, quibus met non solum a capite pituita purgatur, sed etiam intemperies frigida & humida ab huiusmodi materia causata emendari solet. Ad eundē modum post corporis totius euacuationem, atq; etiam ipsius capitis, digerere solent reliquias materię relictas in obstructione cerebri a pituitosa materia, a qua secuta sit apoplexia, tū sumtis, tū admotis: sumtis quidē, veluti cōfectionis anacardina scrup. j. quæ calore vehementi febrim etiam excitare solet, acoro vero condito, cōfectione ex acoro vero per se in ore retentis, vel etiā deuoratis cum aliquis capitalibus: admotis vero capiti raso oleis liliorū, ex spica, ex euphorbio, ex costo, quod etiā capiti familiare est; emplastro Mesuæ ex sinapi phlegmonē & vesicas excitante, & valēter ad cutim trahente; suffitu quoq; castorei,

*Dissipantia
reliquias
pituita ob-
struentis ce-
rebrum in
apoplexia.*

In paralyfi.

*In neruorum
affectibus
resoluentis
unguent.
efficax.*

*In Paralyfi
valentiora
caute adhi-
benda sunt.*

*In Paralyfi
therma effi-
caces.*

& odoramentorum similiter valentium, cataplasmatibus, fortibus ex valenter calidis siccis. Ad eundem modum in paralyfi digerere solent materia, applicando digerentia parti primario affecta, non autem iis, quæ animali facultate ad sensum & motum necessaria priuantur, ob superiorem partium affectum, vt Gal. quendam ex casu e curru digitos habentē resolutos sanauit, emplastro non digitis, sed spinali medulla admoto, quia ea parte offensa, nervus qui ad illos digitos ferebatur, ex dolore phlegmonem, & ab ea obstructionem, quæ spiritum ad digitos ferri prohiberet, contraxerat. Aduertendum autem vt mitia digerentia prius explorentur, veluti oleum camomelli, oleum vulpinum. Mesuæ ad neruorum affectus efficax: postea valentiora, veluti oleum de spica, costinum, de cerebriathina Mesuæ, philosophorum eiusdem, aqua vitæ, & vnguentū ex puluere lumbricorum terræ olla in clibanoficcatorum, ex galangæ, pipetis an. vnc. iij. cum libris tribus mellis despumati, mire efficax in affectibus neruorum resoluentis. Amplius succum ireos, castoreum, emplastrum Mesuæ ex sinapi: aduertentes ne huiusmodi valentia parti diutius adhæreant, ne vrant, aut phlegmonem accerant: balneis quoq; aquarum medicamentosarum, præsertim sulphurearum, nitrosarum, & horum luto parti primario affectæ admoto: cerebrum semper in huiusmodi affectibus corroborantes drachma

vna

vna theriaces veteris, aut mithridati, diamo-
 fchi dulcis, aut amari, aut acori veri conditi,
 aut confectionis de acoro, aut drachmas duas
 olei ex acoro in dies adhibendo, aut stachadē,
 qua valde cerebrum calfacit, & siccat: pulue-
 ris etiam hieræ aureus vnus prodest, pipe-
 ris aurei duo. amplius chamæpythis in para-
 lyfi efficacissima, & sumta & admota. Ad eū-
 dem modum in conuulsione. reliquias mate-
 riæ cōtinentis neruis affixæ, quæ proxime spas-
 mum causat, digerere solent: veluti vnctioni-
 bus cum oleo liliorū, & nisi febris adest, vul-
 pino, costino actu calidiore, aut potius in his
 oleis, vel decocto catuli ex oleo, vel vino, vel
 aqua saluæ partium conuulsarum balneo: vn-
 guento quoq; de bdellio in spasmo efficacis-
 simo: pellibus luporum, vulpium, mellidum
 (taxones vocant) felium, veruecū & similium
 animalium: ac hepatis, pulmonibus a viuis a-
 nimalibus vt vita calent, conuulsæ parti, quan-
 diu calebunt, admotis, & catulo viuo, in dor-
 so secto, circumposito: vel partem in bouem,
 aut veruecem, aut aliud maius animal recens
 casum immisam continere, quandiu animal
 calebit: cucurbitula etiam parti conuulsæ ap-
 plicata, leui quidē si paruus est, spasmus, cum
 scarificatione vero si magnus: alioqui materia
 attracta & non vacuata conuulsionem gēmi-
 naret. Amplius perfundēdo frigida aqua par-
 tem conuulsam, modo vlcus nō adsit, & ætas
 media sit, & iuuenis bene carnosus, calore in-

*In conuul-
 sione reli-
 quias diffi-
 pantia.*

*In spasmo
 reliquarum
 dissolutio.*

84

*An tutum
sit in con-
uulsione ex-
citare fe-
brim eph-
meram.
Balnea in
convulsione.*

tro a frigore compulso, reuocatione sanatur. Febris vero ephemeræ excitatio, & si Auic. salubris sit, his temporibus tamen tuto nō tentaretur, quod corpora horum temporum pleniore victu magis excrementosa, ad putridas potius quam diarias sint opportuna. Amplius balneis quoque, post etiā totius corporis purgationē, præsertim naturalibus, veluti sulphureis, falsis, aluminosis, & quæ etiam a nobis fiunt ex sulphure, sale, alumine in aqua coctis, atque ex decocto herbarum cerebralium maiorana, saluiæ, betonicæ, camomelli, rosis marini: sumtis etiam materia resoluetur, & roborabitur: veluti acoro & huiusmodi imbecillioribus quotidie ad drachmas duas: fortioribus vero, veluti mithridato in hebdomada semel ad drachmam vnā, & si quotidie scrup. j. aut semidrachma opopanaxem quoq; & castoreū dat Auic. post cibum, vt ab eo vis ipsorū obtundatur, non autē ante, ne cito ad hepar permeans ipsum læderet: quamuis & sumtum & admotum castoreum neminem vnquam læserit, Galeno. Ad eundē modum in epilepsia reliquam in cerebro materiam resolvere solent, & cerebrum frigidum & humidum calfaciendo & siccando roborare tum sumtis, tū admotis: sumtis quidem acoro vero condito, & aliis supradictis, medicamēto ex scylla, quod ad præcauendum epilepsiā præstantissimū est: theriaca, aut mithridato semel in septimana sumto: iis etiam quæ tota sua substantia morbo repugnant

*Reliquiarū
materia re-
solutio in
epilepsia.*

repugnāt, veluti ruta, pœonia præsertim mas,
 & modis omnibus admota, & odorata: craniū
 quoque maris in mare, fœminæ in fœmina v-
 stum, donec sit albissimum & pulueratum,
 potu quotidiano epilepsiam sanare testis est
 Gal. II. simpl. de ossibus. Ad hunc modum, In *In phreni-*
 cerebri inflammatione illa, quæ phrenitis di- *ride.*
 citur, materiam digerere solent adhuc in me-
 ningibus crassiore & impactiore iisdem
 quibus digeri diximus materiam in capite a
 materia sanguinea & biliosa, & ad motis etiam
 capiti temperate calidis: veluti columbo, ca-
 po, eluro, catulo, vel simili animalculo viuo
 per spinam secto, & exenterato, vt a vita calet:
 vel arietis pulmone, aut hepar similiter ab ani-
 mali calente. In intemperie autem pectoris *In tussi.*
 aut pulmonum cum materia, a qua proueniat
 tussis, materiam reliquam digerere solēt tro-
 ciscis, & suffitibus Rasis a Matthæo Gradi ex-
 pertis. In obstructione autē pulmonis, aut pe- *In Asthma-*
 ctoris a materia pituitosa crassa, a qua proue- *se.*
 nit difficultas anhelit⁹, veluti asthma, materiæ
 reliquias siccantibus & dissipantibus resolu-
 re solent, veluti suffitu cum thure, sulphure
 purgato, & etiam arsenico, quod mirum in his
 Gentilis prædicat, etsi sit deleterium, & ob id
 vix vtendū, nisi rite castigetur: suntis etiā the-
 riaca, mithridato, diamosco dulci & amaro,
 & similib. In inflammatione autē illa pectoris, *In pleuritide.*
 quæ pleuritis dicitur, reliquias materiæ dige-
 rere solēt ad motionem linimētorū, vnguentorū,

*In pleuriti-
de initio an
fistula conue-
niat.*

*Reliqui autē
materie di-
gestione ut
plura. Hepa-
tis.*

*Obstructio-
ne hepatis
vice digerē-
tium tergen-
tia adhiben-
da
In morbis
lenti diffi-
cultate re-
liq.*

cataplasmatum, emplastrorum, fotu per spon-
giam ex decocto camomelli, meliloti, fursuris
vel per vesicam eodem decocto plenam, aut
frixo cum paucis vino milio & fursure: initio
tamen ab huiusmodi fotu cauentes, ut ait Hip-
pocrates, & Galenus 2. rat. vict. acut. quia ma-
teria largiore tracta, eam augerent, nisi mate-
ria esset flatulenta: quia tamen flatibus resolu-
tis dolorem sedaret, oleis idoneis amygdala-
rum dulcium, camomellino, cataplasmate ex
farina aut mucagine seminis lini fœnigraci,
maluæ, althææ, & radicum, flo. camom. meli-
lori. In hepatis autem inflammatione reliquias
materiæ digerere solent iis sane, cum quibus **B**
perpetuo stupida mixta sint, veluti ablinthio
pontico, rosæ, mastiche, schænanto, spica nar-
di (quod pars hæc opus habeat toti corpori
commune, & ad vitam necessarium) cum ca-
momello, meliloto, anetho, althæa, siue de-
cocto ad fouendum hypochondrium dextrū,
siue ex iis tritis sacculo, siue linimento, vel vn-
guento ex oleo lili, camom. anethini, absin-
thii. In obstructione autem hepatis, vice dige-
rentium tergentibus erit procedendum. In
morbis lienis cum iisdem digerentibus reli-
quias materiæ quibus diximus esse utendum
in reliquis materiæ post hepatis inflamma-
tionem cum iisdem observationibus. In ob-
structione autem, & renum inflammatione,
ubi inflammatio cœpit declinare, discutere
solent materiæ reliquum sessione agroti in
fœno-

fœnogræci, altheæ, seminis lini, maluæ, inter-
 dum etiam artemisiæ, marrubii, & saluæ de-
 cocto usque ad lumbos, illinitione pubi & lum-
 bis hordeaceæ farina: cum fœnogræco, & se-
 mine lini in mulsa elixata, aut caricarum deco-
 cto: pessis quinetiam ex butyro, medulla cer-
 uina, adipe anserino, gallinæ, & similibus pa-
 ratis. In visione imbecilli ab humore largiore,
 reliquias materiæ resoluerere solent, & roborare
 suntis quidem veluti nuce muscata (qua
 vna in dies mane sumta, visionem recuperat
 Mesues) mirobalanis chebulis conditis duob.
 bis aut ter in hebdomada sumtis ad roboran-
 dum pliris arcotico, acoro vero condito, dia-
 coro ad drachmas duas mane & vesperi hora
 somni, mithridato, diamoscho dulci & amaro:
 admotis vero oculo veluti emplastro Mesuæ,
 succo & aqua fœniculi in vase aereo per resi-
 dentiam purgato, qui cum saccharo, & melle,
 & foliis auri æstate insoletur, ut felle gallinæ,
 perdicis, piscium, animalium autem rapacium
 & aliorum natura calidorum, ut leonis, canis
 felacrius est: suis, aut veruecis, agni est clemē-
 tius, piscium vero fel est clementissimum. Ad
 eundem modum in suffusione materiæ reli-
 quias dissoluere & dissipare solent partim sum-
 tis hora somni, ut cum cibi vapore vis eorum
 in cerebrum & oculos rapiatur: ut drachmis
 duabus confectionis Huma in Mesuæ lauda-
 tis: admotis vero (sed corpore prius exquisire
 purgato, aliter vi ea, qua digerunt, novos etiā

*In renum
obstructione
& inflam-
matione.*

*In imbecilli
visione ab
humore
largiore.*

*Fel acre,
clemens &
clementis.*

*Qua in suf-
fusione dis-
sipent ma-
teriæ reli-
quias.*

*Clementioribus
7a.*

vapores & humores ad oculum traherent) & primum clementioribus, vt oculus sensu tactus exacto præditus, valentioribus etiam affuescat, veluti fœniculi, rutæ aqua, vel succus per residētiam purgatus, aqua ex melle distillata, vel puluere sacchari cādi multis probato, vel vrina pueri nondū polluti cum paucō fœniculi distillata, vt seruari diutius possit, nec oleat, & balsamo ob eius penuriam vsu raro, & puluere ossis sepia: & vbi his malum nō cedit,

Valentioribus.

valentioribus postea vtentes, veluti fellibus animalium: sed primū clementioribus, qualia sunt piscium, suum, agnorum, gallorum, perdicis: deinde acrioribus, vt auium prædaciārū, accipitris, aquilæ, falconis, & tauri, bouis, & a-

*Transitus
ad alia in-
strumenta
medica.*

pri. Sed hæcenus de modis, quib. materia existit in vnaquaq; particula ita infarcta, vt neq; repulsione, nec deriuatione, nec purgatione, nec phlebotomia vacuari possit, sed emolli-
tione solum, & maturatione, quæ post maturationē aut erūpere solet aut artis vi & incisione, & ipsarum partium diductione euacuatur. Quoniam vero materia aliquando ita pertinaciter, & in profundo existit, vt nullo enarratorum instrumentorū genere euacuari possit: ars alia instrumenta adinuenit, quibus materia in profundo pertinaciter adhærens a cētro ad circumferentiā violēter attrahi potest. Quoniā vero & violēter & violētius trahi poterat, ideo duo genera instrumentorū adin-
uenta fuerunt: quorum primum, q; vi, sed non
adeo.

85

adeo multa, dropacem : alterum vero quod maiori violentia trahit, sinapismum appellarunt. Apud modernos, quod pice plerunque fiant, picationis nomine designantur. Quorū sane singulum quid sit non incommode assequemur, si prius percurramus quid sit attractio : quæ vtriusq; naturam tanquā genus eorum habet explanare. ATTRACTIO est mutatio de vno loco ad alium versus partem trahentem, facta a calido, & sicco valido tenuis substantiæ, in substantia terrestri fundato, vt calor naturalis, aut materia euocetur ad extra. Ideo autem dicitur, esse mutationem de vno loco ad alium, q̃ motus localis sit cōmune genus auersionis, repulsionis, deriuationis, & attractionis. Quod sequitur: Attractionē esse mutationem de vno loco ad alium versus partem trahentem, facit differre attractionē a repulsionē : quæ a se versus alias partes expellit. Et quod sequitur: Attractionē fieri medicamento calido, & sicco, valido, & terrestri subiecto fundato: notat causam efficientem, quæ quidem calida esse debet, quod calidi sit attrahere, sicca vero, vt attractum retineri possit, valida vero, quod calidum, & siccum quanto est validius tanto magis trahat. Ob id calida in secundo moderate; magis quæ in tertio; omniū maxime quæ in quarto trahunt. Et quod ait diffinitio, huiusmodi calidum, & siccum fundari debere in subiecto terrestri, notat quod cum attractio sit motus, motus autem in tem-

IIII.

Attractio.

*Attractio-
nis & re-
pulsionis
differentia.
Attractio-
nis causa,
efficientis.*

*Attractio-
nis causa fi-
nalis duplex
est.*

1.

2.

*De natura
dropacis &
sinapismi.
Dropacis
actio.*

*Sinapismi
actio.*

pore fiat, si in tenui substantia essent fundata cito exolefcerent. Atque hoc est illud cur in diffinitione additum fuit, huiusmodi caliditatem validam in subiecto terrestri fundari debere, vt pertinaciter in hoc subiecto inhaerēs, sui pertinacia etiam materię pertinaci in profundo existenti opponi possit. Quod postmodum sequitur: Ideo attractionem fieri, vt calor naturalis, aut materia euocetur ad extra: notat causam finalem ipsius attractionis, quæ quidem duplex est: altera, in qua quærimus euocare calorem ad extra ad aliquod membrū, vel propter aliquam aggritudinem, vel frigiditatem extrinsecam, ita debilitatum, vt ad atrophiam, & siderationem maxime vergat. Quæ ratione vt nutrirī possit, violenter calorem attrahere solent a centro ad circumferentiam, & ad membrum illud calore priuatum: altera vero, in qua, non quidem vt calor, nec vt membrū nutriatur, attractione vtimur, sed vt materia viscida in profundo impacta velociter a centro ad circumferentiam attrahatur. Ex cuius notione facile erit cognoscere naturā dropacis, & sinapismi. Nam actio quæ dropace fit, erit attractio aut caloris, aut materiæ in profundo pertinaciter hærentis, facta a calido, & sicco vique ad tertium gradū in terrestri substantia fundato, vt calor naturalis, aut materia euocetur ad extra. Itidem & actio, quæ sinapismo fieri solet, erit attractio materiæ in profundo pertinaciter existētis, facta a calido, & sicco

siccō valido vsque ad quartum gradum in terrestri substantia fundato, ad hoc instituta, vt materia euocetur ad extra. Quæ quidem definitiones cum ex declaratione superioris definitionis manifestæ esse possint, nec inter se differant, nisi quod attractio, cum sit vniuersale genus harum duarum specierum attractionis, explicita etiam fuit causa efficiente generica, & confusa, & illimitata: actiones vero, quæ dropace, & sinapismo fiunt, cum sint species determinatæ, & limitatæ, determinato etiam, ac limitato efficiente declarate fuerunt:

B dropax quidem efficiente calido tertij gradus; *Dropacis & sinapismi causa efficiens.*
 sinapismus vero, cuius attractio violentior est actione dropacis, efficiente calido quarti gradus. Atque hoc est illud, cur pro conficiendo dropace, qui praxim exercent vtantur galbano, pice, sagapeno, vel pluribus istorum, secundum varietatem corporum, quibus applicentur, mollium, & durorum magis, & minus: vt hac ratione in corpore molli pice vti soleant, galbanum vero tanquam violentius, & calidius omittant, in hunc modum: Picis vn. j. olei *Dropacismi compositio.*
 nardini vnc. j. nam necesse est oleum quoque calidissimum esse, vt aperiat, & ad attractionem disponat, simul bulliant duabus, aut tribus ebullitionibus: Et iis ab igne amotis (quod pulueres coctionem non admittant) addentes pulueris gingiberis, pyretri, nasturtii, vel seminis nasturtii, an. vn. j. Et hæc omnia incorporata simul super corium extendantur, & secundum

*Dropacis
morum usus
in calfaciē-
do membro
vt possit nu-
triri.*

*Dropacis
morū usus
in spāsmo.*

*Dropacis &
sinapismi
differentia.*

varium finem vario modo illo vtētes. Etenim
vbi membrum calfacere opus erit, ita vt nu-
triri possit membrum illud, corpus in balneo
aquæ dulcis erit ponendum, vt attenuata cuti,
& membro, statim dropax appositus ad actū
trahatur, tantumque temporis dropax in mē-
bro relinquatur, quoad rubuerit locus, neque
a rubedine diutius permittatur, ne calor at-
tractus resoluator, & membrum adhuc frigi-
dus euadat. Quinimmo remoto dropace, vt
calor naturalis in loco retineatur aliquo oleo
emplastico erit inungendus, veluti camomel-
lino, in quo tragacantha, & gummi dissoluan-
tur, vt calor attractus clausione pororum re-
tineatur. Quod si scopus erit attrahere mate-
riam impactam in membro in profundo, ve-
luti in spāsmo materiam impactam in neruo
attrahere solent, absolendus erit locus, & fri-
cāndus aliqua re calida, dein dropax erit appli-
candus, & cum rubebit locus, amouēdus erit,
oleoque erit inungendus, qui vim possideat
remouendi materiam illam, & causam spāsmi
continentem ad superficiem vi dropacis at-
tractam; veluti oleo de costo: iterumque dro-
pax erit apponendus vsque ad rubedinē dun-
taxat; quod vltra rubedinem in loco moram
trahens, escharas, & vesicas inducere soleat,
qui postmodum est scopus, & finis ipsius sina-
pismi: ratione cuius a dropace videtur differ-
re; quanquam etiam in hoc differant, quod in
sinapismo semper materiae quærat attractio,
& magis

& magis violenter: in dropace autem nō solū
 materia, sed etiam caloris attractio fiat, & in
 attrahenda materia sinapismus valentius at-
 trahat; vt aliud non videatur esse dropax quā
 præparatio ad sinapismum. Quare cū vtriulq;
 finis idem sit, differens secūdum magis, & mi-
 nus, quod dropacis finis sit rubificatio, sina-
 pismi autē eschara, & vesica: sequitur quod et-
 iam ex eadem met materia in genere conficie-
 tur sinapismus, ex qua etiam dropax, differen-
 te solum secundum magis, & minus. Ob id ca-
 lidis in quarto gradu vtuntur in sinapismis cō-
 ficiēdis, veluti sinapi, & euphorbio recenti (nā
 inueteratum huiusmodi facultate priuatur) q̄
 rātæ adustionis est, vt eius quoq; vapor videat-
 ur adurere. Cantharides etiam ad hoc faciūt,
 buprestes, flammula Iouis, batrachion, stercus
 columbinum putrefactum, pilulæ caprarum
 spiratæ. Modus conficiendi apud modernos
 duabus potissimum materiis confici solet: Fi-
 cis aridis, & pinguibus in aqua positis, & con-
 tusis quoad fiat pasta, commiscentes puluerē
 alicuius istorum iam enarratorum, vel partes
 duas caricarum cū vna parte æquali puluerū,
 86 vel partes duas caricarum cū parte vna pulue-
 rum, in hunc modum: Caricarum drac. ij. pul-
 ueris sinapis, vel cantharidum drac. j. cum
 fermento; quod, vt ait Gal. cap. de fermento,
 validissimum est ad attrahendum. Non igno-
 randum tamen est diuersum esse modum cō-
 ficiendi dropacem, & sinapismum. Nā dropax

*Sinapismi
 & dropacis
 materia
 differt tan-
 tum secun-
 dum magis
 & minus.*

*Sinapismi
 confectio.*

*Dropacem
 & sinapis-
 mum confi-
 ciendi di-
 uersos mo-
 dos.*

*Sinapismus
in ischiade.*

*Iberidis
herbarius*

adeo extenditur, ut totum membrum ample-
ctatur, sinapismus vero tanquam efficacior,
quantitatem viuis aurei non excedit. Atque
hoc est illud, cui practici in ischiade, qua re-
pellentia non admittit, purgato corpore, va-
lenter foras ex profunda cotyle trahentibus
utantur, veluti cataplasmate ex stercore colu-
bino, & elytheribus acribus. Et vbi his morbus
non cedit, sed adhuc infestabit, ad sinapismū
accedunt: veluti sinapi cum caricis, vel etiam
per se illito conferēte, Paulo, vel hunc in mo-
dum: Ex seminis sinapis in aceto fortissimo
macerati vnc. ij. caricarum vnc. iiij. stercoris
columbini in vino albo decocti vnc. iiij. mellis
anacardini vnc. q. misce, & fiat sinapismus. Vel
ex cantharidum alis abiectis drac. ij. staphidis
agrie drac. iiij. cū fermento, & aceto fiat me-
dicamentum: quanquam præter hæc Paulus,
& Artius iberidis herbe vsum extollant, tan-
quam in totum ischiadicis sanitati restituē-
tem; videlicet ex eius radice diligenter tusa, &
suilla axungia veteri modica excepta, adeo ut
emplastri speciem representet, & linteolo de-
fiori illita locis maxime dolentibus impona-
tur, ac incumbat; mulieribus quidem non in-
fra duas horas, viris autem per quatuor hora-
rum spatium, si id perferre poterunt, quod tu-
mores excitet cum ardore, & rubore, veluti
etiam sinapismus. postea ager in balneum in-
ducendus, eaque omnia peragenda, quæ ab a-
liis auctoribus animaduertuntur. Quod reme-
dium

dium, & vtendi modum ex Damocratis etiam auctoritate ponit Gal. 10. de comp. med. per loca, præter ea, quæ ex Archigene recenset. Sequitur cauterizatio, quæ quidem est actio medica actioni dropacum, & sinapisinorum maxime similis, & conformis, differens solum secundum magis, & minus, cum sint quidam gradus adustionis. Cuius sane vsus in arte medica maximus est, & fuit etiam antiquitus, tamen si temporibus istis sit obsoletus, & qui in ischiade etiã, si igne sub genu externa in parte inustio fiat, diurnis coxendicum doloribus valde conferre soleat. Porro CAUTERIZATIO est combustio imperfecta igne recte, & conuenienter facta, vt membrum excitetur, corroboretur, & euacuetur. Ideo autem dicitur cauterizationem esse combustionem, quod cõbustio sit formale genus huiusce actionis, quo differt ab aliis ingeniis medicis. Et quod sequitur: Cauterizationem esse combustionem imperfectam: notat cauterizationis genus nõ esse quamcunque combustionem, sed eã dũtaxat, quæ imperfecta est: cuius finis, & terminus est rem combustibilem vsq; ad carbonis naturam immutare: qua ratione imperfecta combustio appellata fuit, quod vltimum finẽ nõ assequatur; nimirũ incinerationẽ: & hoc, q̃ carbo adhuc ratione humidi ab igne inflammatur, & in cinerẽ transmutetur, qui amplius inflammari non potest. Atque hoc est illud quod ait Galenus 5. Therap. cap. 4. Cauterium

Cauterisationis, dropacis & sinapisinorum differentia.

Cauterizatio in Ischiade.

Cauterizatio.

Cauterizationis terminus.

*Canterii
causa effi-
ciens du-
plex.*

*Medicamē-
tum cau-
sticum.*

*Canterium
aliud est
actuale ali-
ud poten-
tiale.*

*Canterisa-
tio tutior
est quæ fit
igne actua-
li.*

ideo applicari, vt res vertatur in escharā adu-
stam, quæ habet rationem carbonis. Quod
postmodū sequitur: Combustionē imperfe-
ctam ab igne fieri: notat causam efficientem,
qua mediāte cauterizatio a medicis fieri solet,
tamen si apud artis medicæ professores duplex
reperiatur genus efficientis combustionem;
alterum ignis, alterum vero medicamentum, **B**
in potentia secum vim ignis habēs, vnde me-
dicamentum causticum appellari solet, quod
ideo in potētia ignis vim habere dicitur, quod
opus sit, si ignis operationes habet exercere,
ad actum a calore naturali deducatur, & fiat ex
potentia actu ignis: qua ratione nostris alterū
cauterium actuale, alterum vero potentiale
appellari solet. Illud tamē non est ignorandū,
vt traditur, s. de simpl. med. capit. 4. quod etsi
combustio, & cauterizatio duplici efficiente
fieri possit, igne, & medicamento, quod cau-
sticum appellatur, præstantius tamen esse, &
tutius cauterizare igne actuali; quam medica-
mento potenciali: cuius rei ratio hæc est, quod
ignis cum sit forma simplicissima, nihil ultra
combustionē in membro relinquit, sed actio-
nem suam perficit, propter summam quam
habet agendi vim: medicamentum autem nō
perficit actionem suam propter agendi vim,
quam habet, sed ratione, qua a tota substan-
tia membro contrariatur, & illi est inimicum.
cumque sit compositum quoddam, non se-
cum comburit, sed & alia multa nocumenta
in

in membro inducit, corrumpendo calorem membri naturalem: vnde fieri solent estio-
mena, gangrenæ, & huiusmodi alia nocumē-
ta ab Abubachere enumerata: ex quo sequi-
tur cauterizationem medicamento caustico
factam, inuentam potius fuisse gratia adulan-
di viros effeminatos, ignem formidantes, cum
occulte faciat, & longiori tempore id, quod
ignis vis, & tuto, & cito efficere potest. Atque
hoc est illud, cur in definitione facta sit men-
tio ipsius ignis, & non alterius efficientis ab i-
gne. Et quod sequitur: Recte, & conuenienter
facta: notat artem exercēdi huiusmodi instru-
menti genus. Recte autem & conuenienter
exercebitur, si prius consideratū fuerit, an sit
cauterizandum; nimirum quod hoc remedii
genus sit violentissimum, argumēto illud esse
potest, quod incisio si soluit continuum, sub-
stantiam tamen ipsam dimittit: at combustio,
præterquā quod soluit continuū, substantiā
etiam absumit, & humidum vniuersum: ita vt
cauterizatio sit solutiua continui, corruptiua
substantiæ, complexionis, & compositionis,
in quibus consistit totum hominis esse. Quæ
ratione cum sit extremum remedium, confi-
derandum erit, an cauterium sit adhibēdum,
necne: quod extremis morbis extrema ex-
quisita remedia sint adhibenda. Tunc autem
scietur adhibendum esse, si morbus ita perti-
nax erit, vt propter multitudinem materiæ
periculū sit ne locus putrescat: siq; recte per-

*Ars recte &
conuenienter
cauterizandi.*

*Cauterium
est extremū
remedium.*

*Quando
cauterium
adhiben-
dum sit.*

*Cauterii
quantitas
& tempus.
Item modus
comburendi.*

*Cauterisa-
tio in cra-
nio & hy-
drope.
Materia
combustio-
nis.*

pensum fuerit, rubificantibus non posse tra-
hi quantum oportet, vesicatoriis non posse
penetrari ad profundum, incisione non posse
euacuari totum: tunc enim ilico, ut prohibea-
tur putrefactio, aliquo vehementi exsiccante,
& comburente erit utendum, praesertim ubi
non dabit inducias, sed periculum immineat,
ne os ipsum putrescat: quantitas vero combu-
stionis ex quantitate morbi erit elicienda. Te-
pus comburendi commodum erit tunc, post
scilicet praemissam exquisitissimam totius cor-
poris vacuationem, s. 6. & 7. Aph. Gal. quod do-
lor fiat maximus. Modus comburendi elicitur
ex modo ipsius morbi. Nam si intentio erit ex-
siccare locum, in quo contineatur materia,
quae non multum distet a cute, vstionem fa-
ciemus instrumento confecto ex rotulis pla-
nis, quemadmodum est arbor iurisconsulto-
rum: si in superficie solum, & parum, instru-
mento utemur facto in forma sphaerica, quod
huiusmodi figura in puncto solum contingat:
sin autem scopus erit penetrare ad profundum,
instrumento habente formam gladii, veluti
fit in craneo, in quo non oportet multis in lo- 87
cis comburere, & hoc, quod periculum sit pro-
pter membranam. Et veluti etiam in hydrope,
in qua materiam scopus est euacuare. Quam ob
rationem ubi non multum erit aduertendum,
eligemus materiam ex aere, si multum, ex ferro,
quod aestenuius sit, ferrum autem crassius: &
in materia crassa ignis potentior sit, quam in
rariori,


rariori, vt propter has diuerſas rationes forſan
 Ariſtoteles æs, Abubacher autem magis fer-
 rum laudari: Auicenna autem aurum, quod
 eſſet magis ſimile naturæ humanæ. Vbi per- *In Scrophu-*
 pendendum etiam diligenter erit, pleraque *larum adu-*
 partes eſſe quæ habent neruos & chordas, vt *ſtione*
 multi ſcrophulas adurentes viſſerint arterias *cautela.*
 iugulares, & mortem intulerint. Amplius cõ-
 ſiderandæ erunt reliquæ circumſtantiæ, æſtas,
 tempora calida & ſicca, & huiusmodi alia. Et
 quod ſequitur in diſſinitione, cauteriorum a- *Cauterifa-*
 ctionem eſſe combuſtionem imperfectã, fa- *tionis fines.*
 ctam ad hoc, vt membrum exſiccetur, corro-
 boretur, & euacuetur, notat finem huiusce
 instrumenti. Notandum tamẽ eſt, multiplicẽ
 hunc finem quandoque vniuerſum a medicis
 intendi, quandoque vero pro parte: vniuerſus
 quidẽ, velut cum applicatur iſchiæ, id eſt ver- *In applica-*
 tebræ coxæ in deſcẽſu mucositate a capite ad *tione iſchia.*
 vertebram, vbi pituita redundat, coxa relaxa-
 tur, & os facile excidit: tunc enim ratione ho-
 rum trium ſimul applicamus cauterium, vt ait
 Gal. 6. Aph. 60. quandoque vero fit principa-
 liter vt euacuetur, quemadmodum in hydro- *In hydrope*
 pe: quandoque vero vt corroboretur & exſic-
 cetur, veluti in ſuppuratis in hepate, vt ait Gal. *In ſuppuratis in he-*
 7. Apho. 38. Ex quo ſequitur fontanellas iſtorũ *pate.*
 modernorum non eſſe cauteria antiquorum: *Fontanel-*
 & hoc, quod fontanellæ in omnibus deuiant *le non ſunt*
 a cauſa finali cauteriorum: nimirũ quod cau- *cauteria*
 terium ſemper loco affecto applicetur, & ad *antiquorũ.*

*Cauterio-
rum vsus in
hamor-
rhagia.*

*In foetore
narium.
In fistulis
ani.
In vtero.*

hunc finem, vt exsiccet: fontanellæ vero locū humectant, cauterium intendit locū affectū reddere sanum, fontanellæ sanum efficiunt ægrum: vt his rationibus concludendum sit fontanellas non esse cauteria antiquorum. Notandum autem est præter dicta, Galenum vti etiā cauterio ad prohibendum nimium sanguinis fluxum, velut in vulneratis. Vbi enim cætera non sistunt hæmorrhagiam, inurit locum illū vnde exit, vt facta crusta, & eschara supprimatur sanguis. Vbi autem cauterio opus erit vti in partibus internis, veluti in habentibus maximum narium foetorem, quo in casu inuri solent carunculæ illæ mamillares: vel in ano vbi adsit fistula, vel in vtero, tunc cannula erit cōficienda, & luto ex aceto & terra lemnia erit munienda, inspersa vt ait Auic. aquis frigidis. Sed hæc de arte remouendi vitia eorum, quæ in humano corpore continentur, & de modis variis, quibus materia in loco affecto contēta, quæ non repulsione, nec deriuatione, nec vacuatione, aut per medicamentum, aut phlebotomiam eiici potuit, nec mollitione, nec maturatione, nec loci incisione, nec digestionē, violenter, aut rubificantibus, aut comburentibus euacuatur.

JO. PAVL.



BIO. PAULI PERNUMIA
PATAVINI.

De Curatione morborum.

LIBER SEXTVS.

SECVNDVM nunc genus restat corū
quæ præter naturam nobis inesse
proposita sunt: morborum nempe,
qui vt ortu, ita & curatione causis
succedunt. Etenim etsi morborum partium
corporis humani quidam adeo recentes sint,
vt ex causarum curatione & remotione peni-
tus tollantur (& hoc quoties partes corporis
humani contentorum vitia nulla adhuc firma
stabilique constitutione contraxerunt) Quo-
niam tamen plerumque adeo firmiter causæ
partibus vitia inusserunt, vt etiam quod causæ
tollantur genitus tamē affectus in partib. cor-
poris humani adhuc persistat. Sequitur igitur
vt percurramus, qua arte post causarū omniū
remotionem sint auferendi: si prius memorię
repetamus quot vitiorū genera partes corpo-
ris humani contrahere possint. Quod qui-
dem non incommode assequemur ex cog-
nitione naturalium constitutionum partium

*Morborum
genera vn-
de dignos-
cenda.*

*Partes hu-
mani corpo-
ris sunt du-
plices.*

*Morborum
genera es-
sentia ge-
nera.*

*Ex quatuor
morborum
summis ge-
nerib. quas
quor summa
remediorū
genera pro-
ueniunt.*

corporis humani. Porro cum partes humani corporis duplices sint, aliaē similes, organicę aliaē: ac similiarium recta constitutio sit concinna ex quatuor primis qualitatibus conflata temperatura: organicarum vero formatio recta: sequitur etiam quod duo erunt prima, ac summa morborum & vitiorum genera, quorum alterum, quod partis similis eucrasiam peruerteret, morbus similis: alterū, quod organi rationem infringeret, organicus appellabitur. Et quoniam vtrique parti commune est, ut simul sint, & continentur: sequitur quod huius vnionis dissolutio, morbus vtrique cōmunis esse dicetur. Ea vero ratione, qua genera hæc morborum simul inter se commuicari possunt, sequitur quartum vitii genus, quod morbus compositus, eo quod ex miscella dictorum morborum originem trahat, appellari potest: vnde etiam ortum trahent quatuor summa remediorū genera: alteratio, apertio, vnio: & quartum, quod omnium simul vim depellendi habeat. quorum singulum qua arte administrandum sit, nō incommode assequemur, si prius percurramus quid sit vnūquodq; illorum: incipientes ab alteratione. Quoniam vero eadem vitia, quę penes qualitates inducuntur in contentis partibus etiam corporis humani similaribus inuruntur: sequitur quod etiam ab eodem remedii genere, nempe alteratione, erunt tollenda. Cumque iam alterationis singulam speciem tam penes primas, quam

B

quam secundas qualitates declarauerimus, & singularum naturam manifestam fecerimus in causarum tractatione, sequitur igitur ut percurramus materias & medicamenta, quibus uti solent practici pro alteratione, atque immutatione intemperierum partium corporis humani, si prius illud prenotatum fuerit, quod etiam in arte curandi notatum fuit, pro recto & conuenienti usu medicamentorum, quibus morbi partes corporis humani occupantes sunt depellendi: Partium primo, seu locorum affectorum semper esse considerationem, & memoriam habendam, nempe considerando eorum substantiam, quod aliter curetur membrum carneum, ubi adsint & venæ, & arteriæ; aliter membrum ex sanguine, sicuti etiam nervus: Modum substantiæ, utrum molle, durum: quod alia remedia poscat durum, alia molle: Temperaturam, an frigida, an calida: Plasma seu compositionem, an habeat cavitates interius: Colligantiam, an habeat colligantiam cum membro principali: Situm, an sit in profundo, an vero in superficie: Sensibilitatem, an parum vel valde sensibile sit: Operationes, an seruiat uniuerso corpori. Et hoc, quod ex horum consideratione medicamenta varia applicanda sint. Atque hoc est illud, cur intemperies ventriculi calida frigidis his depelli soleat. Neque enim semper in ventriculo imbecillo utendum calidis siccis astringentibus: quem errorem practico-
*Alteratio
intemperie-
rum partium
corporis hu-
mani.
Indicatio-
nes pro recto
usu medica-
mentorum.*

*Ventriculi
intemperies
calida cura-
tio.*

*In affectib.
ventriculi
vitanda
sunt immo-
derate re-
frigerantia.*

*In appeten-
tia & in-
temperies
ventriculi
calida.*

*Intemperies
ventriculi
calida cum
lenteria.*

quidem veluti syrupo cidoniorum, rosato, ex succo oxalidis, de ribes, cum duplo aquæ rosarū, plantaginis, oxalidis, diarrhone abb. aut communi, & trium sandalorum, conferva rosarum, saccharo rosato, carne cidoniorū, sumtis horis tribus ante pastus: quæ omnia, præter oxalidem, astringendo quoque laxam a calore partem roborant: ad motis vero oleo rosato, cidoniorū, mirteo per se vel cum rosis, balau- stis, malicoriis, sandalis, spodio, corallio, forma linimenti vel alia: cauentes semper, vt ait Gal. 7. meth. ne ventriculum, partem natura frigidam, immodice refrigeremus, & sic vim eius coctricem prosternamus. Ad eundē modum intemperies calida ventriculi complica- ta cum appetitu abolito, velut in cibi fastidio, seu in appetentia, reflectentibus caliditate & corroborantibus erit alteranda oleo rosato, citoniorum, vel hoc vnguento: si dictis oleis addatur succi lactuæ, cichorii, portulacæ vel solani vnc. j. sandalorum & corallorū rubeo- rum scrup. j. cum paucis aceto, ac exigua cera fiat vnguentum: vel citonium accipias, & in posca decoquito, cōtundito, ac stomacho im- pone. Vbi vero intēperies calida erit associata cum lenteria, ad extra alterabitur illinitione ex oleo citoniorum, mirtino, rosaceo, vel ci- toniū in vino astringente decoctum, ac con- tusum: cui adiiciatur hypocistidis, & boli ar- meni drac. j. coralliorum & sandalorū rubeo- rum an. drac. ij. chiæ mastices drac. ss illinatur venter.

venter. item sacculus ex purpureis rosis siccis,
 sandalis, corallis, balaustio, hypocistide, corti-
 cū citri, cinnamomi, chiæ mastices pauca quā-
 titate, & in succo citoniorum & aqua rosacea
 præmacerentur, & pluribus vicibus modice
 calidis ventri applicentur: vel hoc vnguento
 seu cerato ab extra vētriculo, & intestinis au-
 xilianti: olei citoniorum, rosacei, an drac. j. olei
 de absinthio vnciam mediam, sandalorum, &
 corallorū rubeorum an. drac. ij. hypocistidis,
 balaustiorum, & acaciæ an. drac. j. chiæ masti-
 ces drac. β cum pauca cera, & vino astringenti
 fiat vnguentum seu ceratum. At intemperies
 ventriculi sicca, humectantibus erit tollenda,
 veluti tollitur febris hectica: lacte scilicet, bal-
 neo, ex decocto malua, violæ nigræ, lactucæ,
 capitibus & intestinis veruecum, vino imbe-
 cillo, fuluo, diluto, & humectantibus herbis.
 Intemperies vero ventriculi frigida & humi-
 da, ad quam imbecillitas consequi solet, calfa-
 cientibus & exsiccantibus, & laxitatē perpe-
 tuo prospicientibus depelletur: veluti syrupis
 stomachicis calidis, quorum præstantissimi
 sunt syrupus absinthii Ro. etiam hepar robo-
 rās, syrupus seu miua cidoniorum aromatica,
 syrupus menthæ, cum duplo aquæ menthæ, &
 absinthii præcipue, ell. rosato Galeni, galanga
 puluerata cum vino albo sumta, vel in pilulas
 cum syrupo mēthæ, vel simili formata per ho-
 ram ante cibum, & diagalanga secreto qui-
 busdam remedio, præsertim ad flatum ipsius

*Intemperies
 sicca vētri-
 culi.
 Febris he-
 ctica.*

*Intemperies
 ventriculi
 frigida &
 humida.*

*Syrupi sto-
 machici
 calidi.*

Diagalāga.

*In ventri-
culi intem-
perie frig. &
hum. em-
plastra.
forma.*

*In intempe-
rie ventri-
culi humida
& frigida
cum nausea
& vomitu.*

resoluendos, gingiberis conditi radice vna mane sumta, vel theriaca, aut mithridati drac. j. semel in septimana, granis piperis 6. 7. 8. integris, ne puluerata ad hepar rapiantur (quod fere calidum est, quibus ventriculus est frigidior) hora ante cibum dimidia deuoratis. Tunicam vero interiore ventriculi gallinarum, ventre mergi, & struthionis camelli ab aliis laudata, a Galeno vituperata: ad motum vero ventriculi oleis calidis, de spica, mentha, absinthio, mastice, & vnguentis, ceratis, emplastris ex iisdem oleis, cera, & aromatibus stomachicis, ut nucem muscata, xyloaloe, caryophyllis, galanga, mastice, mentha, absinthio: fotu ante pastum spongia imbuta vino aromatico, cui incocta sint mentha, absinthii, schizanthii an. manip. j. cinnamomi, ciperi, calami aromatici, an. drac. ij. masticeis, nucis muscatae an. drac. j. Post hunc fotum, poris iam adaperitis, illiniri poterit oleis praedictis. Amplius bombax bene carptus eodem vino aromatico merfus & siccatus, deinde pulueribus praedictorum aromatum fartus in epithema ventriculi, forma scuti confutur, tectum, ligatum imponatur; vel ex iisdem sacculi: pueri quoque carnosius non facile sudantis venter admotus, Gal. lib. 5. simp. teste cap. 5. calore suo concoctionem potenter adiuuat, & catulus pinguis, & palma manus quae fit carnosius. Vbi vero eadem intemperies ventriculi humida sit cum frigiditate, ventriculum relaxans, ad quam sequatur nausea & vomitio, alteranda erit

da erit intemperies, & roborandus ventricu-
 lus: intus pharmacis ex trium piperum gene-
 ribus drac. j. ex vino tenui potatum, vel diacin-
 namomum, aut diarrhodon, aut aromaticum
 rosaceum: extra, hoc vnguento ex chia masti- *Vnguentū.*
 ces, aloes an. vnc. j. diluantur & dissoluantur in
 oleo de absinthio, ac nardino, & cum purpu-
 rea lana ventriculo imponantur: aut hoc mo-
 do: ℥ olei masticiini, de absinthio, nardini an.
 vnc. j. mentha sicca, cinnamomi, maceris, ga-
 langæ an drac. j. chia mastices drac. iiij. misce,
 & cum pauca cera fiat vnguentū: vel hoc sac- *Sacculus.*
 culo: ℥ vtriusque methæ, & absinthii p. j. cin-
 namomi, chia mastices, ligni aloes an. drac. ij.
 corticum citri, maceris, calami odorati an dra-
 s. caryophyllorum scrup. j. rosarum rubearum
 siccarum manip. s. omnia contūdantur, simulq;
 misceantur, & formetur sacculi in figura scu-
 tiformi, & stomacho imponantur: qui insuper
 89 poterunt macerari in vino græco, in quo ab-
 sinthii parum fuerit decoctum, & sæpius ite-
 rati applicentur calidi. vbi magis emplastris *In frigido &
laxo ven-
triculo em-
plastris.*
 uti volueris, chiam masticem assume, quæ in
 oleo nardino, ac de absinthio diluatur, & ma-
 ceretur quantum satis sit, ac dimidia quan-
 titatem eius ipsius aloes adice, adeo ut in em-
 plastri formam redigantur, & in corio scuti
 formam obtinente extende, & utere: & si ma-
 ius cinnamomi, maceris, caryophyllorum, ac
 calami odorati exiguum puluerem, addere
 poteris: ex torrido item pane vino græco ma-

*In intempe-
rie ventri-
culi & in-
testinorum
frigida cum
hæmateria.*

Vnguentum.

Sacculus.

*Tepida dis-
soluunt fir-
mitudinem
ventriculi.*

cerato, & vtraque mentha, ac absinthio con-
tusis, ac cinnamomi, aloes, & chia mastices
pulvere optimum medicamentum ad frigidū,
ac laxatum stomachum efficies. Intemperies
vero frigida ventriculi, & intestinorum etiam
cum hæmateria insequente, si cū pituitosis suc-
cis erit associata, vomitu prius auersa, & eua-
cuata, & materia præparata syrupo de absin-
thio, de mentha; dein vacuata pulvere hieræ
simplicis Gal. post euacuationem alteranda
erit ante cibum per tres horas vnc. ℥. syrupi
de absinthio, aut ex mentha cū paucō pulvere
cinnamomi, galangæ, exceptis oleo mastici-
no, de absinthio: aut hoc vnguento: ℥. olei
masticini, & myrtini an. vnc. j. de absinthio vn.
℥. cinnamomi, galangæ, maceris an. drac. ℥. spi-
cæ feru. ij. chia mastices drac. j. cū cera, & vino
odorato fiat vnguentum: aut hoc sacculo: ℥.
vtriusq; menthæ, & absinthii an. p. j. chia ma-
stices, cinnamomi, ligni aloes, & corticum ci-
tri an. drac. ij. caryophyllorum, maceris, galā-
gæ, calami odorati an. drac. j. rosarum rubearū
ficcarū m. j. ℥. figurentur sacculi scutiformes,
qui paucō vino odorato sæpi⁹ inspersi, & pau-
co cidoniorū succo macerati calidi applicen-
tur: intelligo autē vt sint abūde calidi: & hoc, q̃
tale esse conuenit cum primū imponitur taliū
vnūquodq; quippe q̃ tepida omnia ventriculi
firmitudinem dissoluunt. S. meth. med. Am-
plius poterit apponi Gal. ceratum stomachicū
dictum. Eadem frigida intemperies vētriculi,
ad

ad quam sequi solet cibi fastidiū, seu inappe- *Intemperies*
tentia; si frigiditas erit associata cum humori- *ventriculi*
bus viscosis frigidis, prius præparatis iis, quæ *frigida cum*
ex oxymellite aut muria componuntur, veluti *fastidio cibi.*
cappares ex oxymellite parati, & oliuæ, quæ ex
muria, aut oxymellite condiuntur, & picra i-
psa dissecante, ac detergente lentos, & crassos
humores, 6. de tuen. san. ad duas drac. post fri-
gidorum euacuationem hoc modo erit alte-
randa dicta intemperies ventriculi frigida; cū *Ventriculo*
diatrion pipereon, quod qui frigidum ventrē *frigido qua*
possident, si eo quotidie vtantur, nihil incom- *conueniant.*
modi sentiant, 6. de tuend. san. quanquam iis,
qui ad frigus propensiores sunt, diaspoliticon
magis conueniat, & etiam theriaca: & quibus
venter nimis erit refrigeratus, medicamēta ex
pipere, & gingibere cōfecta erunt exhiben-
da, in hunc modū, vt 6. de tuend. san. facit Gal.
Accipiendo succi malorum cotoneorū, quæ *Ventriculo*
dulciora, maioraque sunt, ac minus acerba, *nimis refri.*
sextarios fomanos duos, mellis optimi tantū- *gerato qua*
dem, aceti sextarium vnum & medium: & cū *adhibenda*
super prunas modice coxeris, & spumam de- *sint.*
traxeris, immittes vnc. iij. gingiberis, piperis
albi vnc. j. deinde rursus in humili igne deco-
ques, donec mollis crassitudo existat: qua
crassitudine stomachica medicamēta præpa-
rari solent: idq; maxime est dandum ieiunis in
mediocri quātitate: quanquā nec si a cibo sū-
matur, quidquam lædat, & prius pranso ante
cœnam duabus horis, aut tribus commo-

*In ventri-
culo nimie
refrigerato
incuratio.*

Sacculi.

Emplastrū.

*Flatum
discussio.*

de dari possit. Verū est, quod huiusmodi me-
dicamentum est satis acre, sed pro varietate
temperamenti ipsius ventris frigidi, tuto po-
terimus medietatem piperis, ac gingiberis as- **B**
sumere. Extrinsecus etiam iis, quæ stomachū,
& fouere, & corroborare possunt; veluti oleo
masticino, nardino, de absinthio: vel hac inū-
ctione: ℞ menthæ sicce, ligni aloes an. scrup. j.
mastices drac. iij. aloes drac. ij. succi absinthii
drac. iij. olei nardini, & masticini an. vnc. s. ce-
ræ quod satis sit, fiat vnguentum: vel sacculos
adhibendo in hunc modum: ℞ absinthii, mē-
thæ an. p. vn. corticum citri, ligni aloes, cin-
namomi, mastices an. drac. ij. maceris, galangæ
ana drac. j. rosarū succarū p. ij. omnib. rite con-
tusis figurentur sacculi ad formā scuti, qui vel
per se, vel in vino græco macerati, prius appli-
centur, & pluries iterentur. Emplastrū quoq;
cōfici poterit ex palmulis, mastice, aloë, vino,
hordei farina, ac croco; adiectis oleo nardino,
ac absinthii succo, nec non addendo ceræ, &
terebinthinæ parum. Sed hæc de curatione
intemperierum ventriculi. Illud autem non
est prætermittendum, ab intemperie frigida
in ventriculo flatus plerunque gigni, & in to-
to ventre: qui sane huiusmodi medicamentis
erunt dissoluendi; primum clementioribus,
vt temperate calidis, veluti camomello, meli-
loto; deī valentioribus, vt baccis lauri, alliis,
Gal. 7. & 12. meth. aniso, cumino, galanga, cum
vino aromatite, aut cretico dulci, seu maluari-
co, vel

co, vel diacumino, diagalanga, dianiso; & valentiore his, confectione ex baccis lauri cum vino bono sumta: cucurbitula quoq; ventriculo, vel etiã vmbilico admota miraculi modo affectus flatulentos repente mitigat, aut tollit, Gal. 14. meth. Sequitur hepatis intemperies: & primum iecoris calida intemperies: veluti post febres biliosas relictã, quã sane persanabitur aqua hordei; vuis passis calidis, quales sunt quã clibano coqui solent, hepatis tota substantia familiaribus, vt quã etiã hepaticam dysenteriam persanent. intibus vero & hepar lupi, & limacum caro hepatis intemperiei tum calidã, tum frigidã tota substantia salubria sunt; modo ablatus sit limacũ lentor multis lotionibus, & frictionibus in lixiuio calido, vel aqua calida saliaut arenis mixta: aqua etiam ex limacibus distillata mane ad vnc. vj. sumta hepar imbecillum mire roborat. Amplius tolletur intemperies hepatis calida, ad quam hepatica affectio sequatur, huiusmodi morsulis factis: Ex tria sandalorum drac. j. diarrhodonis abb. scrupu. j. seminis cichorii scru. ß. vuarum passarum drac. iij. seminum melonum drac. iij. sacchari dissoluti in aqua cichorii, & rosarum quantũ sufficit, formentur morsuli, quorum quilibet sit ponderis vnc. j. exhibeanturque cum pauca aqua, in qua folia, & radices cichorii, vel hortulanã endiuia fuerint decoctã. Extrinsecus epithemate frigido hoc modo facto: Ex succi cicho-

Iecoris intemperies calida.

Vua passa sanant dysenteriam hepaticam.

In hepatica affectione calida morsula.

Epithema frigidum.

E c

*Vnguentum**Cataplasma.**Iecoris in-
temperies
cal. & sicca.**Atrophia
ex intem-
perie iecoris
calida &
sicca.**Elephantia-
sis.**Lepros.
Scabies.*

rii, hortulanæ endiuia, lactucæ, seu solani an.
 drac. iij. aquæ rosarum rubearum, & cichorii,
 seu endiuia an. lib. j. sandalorum, corallorum
 rubeorum an. drac. iij. aceti albi vnc. ij. misce,
 & fiant epithemata, hyeme actu calida, æstate
 vero subfrigida: vel hoc vnguento: Ex olei ro-
 facei, de absinthio, myrtini, & de papauere, seu
 nimphaæ ana vnc. j. sandalorum omniū, & co-
 rallorum rubeorū an. dra. ij. succi cichorii, &
 lactucæ an. vn. ss. aceti parum, ceræ quantum
 sufficit, fiat vnguētum: vel hoc cataplasmate;
 Ex foliis plantaginis, & cichorii, ac malo coto-
 neo in aqua, & oleo rosaceo decoctis, ac con-
 tuis, adiecta hordeacea farina, & exiguo cro-
 co cū pauco aceto. Intemperies vero hepatis
 calida, & sicca post humorum præparationem
 infrigidantibus, & humectantibus, veluti sy-
 rupo violaceo, & cichoraceis, & victus ratio-
 ne temperata, & ad humidum vergente, præ- 90
 fertim carne, & iure pullorum, velut etiam in
 atrophia fieri solet, proueniēte ex intemperie
 hepatis calida, & sicca, & lacte asinino, huma-
 no, & hordei etiā decocto erit tollenda. iisdē-
 met tolletur hæc intemperies calida, & sicca
 hepatis, a qua proueniat elephāiasis, scabies,
 & lepra. in elephantiasi tamen addenda erunt
 ea medicamenta, quæ fiunt ex viperis, qualia
 sunt theriaca, pastilli seu trocisci theriacales,
 & sal theriacale. Nā tametsi hæc omnia calida
 sint, & sicca, ea tamen ratione conueniunt, vt
 ait Galenus 10. de simpl. med. cap. de carne,
 quod

quod sui caliditate, & subtilitate faciant euaporare materias congestas, quæ sunt in ambitu corporis, & in ipsis visceribus. Parantur autem viperæ multis modis, & comburuntur præcipue: & hoc, ut ait Galen. lib. de Theriaca ad Pisonem, ut medicamenta facta tenuiora facilius in altum corpus penetrare possint: verum est, quod huiusmodi medicamenta calidiora in intemperie hepatis calida, & sicca sunt commiscenda medicamentis ipsa contemperantibus, veluti saccharo rosato, violato, borraginato. Amplius adiuuabitur huiusmodi intemperies ducentibus urinam, quæ tamen non sint calida, veluti est asplenum, seu cetrach, quod sui tenuitate, non autem caliditate urinam prouocat, & veneris capillus. Extra vero tolletur inunctione ex oleo rosato, amygdalino, & similibus, & balneis aquæ dulcis, in quibus sint decocta ea quæ humectant: cuiusmodi sunt decocta ex pedibus castratorum iuuenum, & huiusmodi, & balneis moderate calidis ex decocto betonicæ, camomillæ, & similibus. Pro tollendis autem crustis, & aliis affectionibus cutis, balneis erit vrendum abstergentibus, in quibus decocta sint semina fœnugræci, radices lapathi, lingua vaccina appellata, & flores fumi terre, & huiusmodi: & balnea, in quibus decocta sint sulphur, alumen, camomilla. Amplius viperis integris decoctis in oleo amygdalarum amararum.

*Viperarum
preparatio.*

*Iecoris in
temperies
calida &
sicca tem-
peratur diu-
reticis.*

*Item bal-
neis.*

*Pro crustis
& aliis cui-
tus affection-
ibus bal-
nea.*

*Pila.**Iecoris in-
temperies
frigida.**Hydropis
curatio.**Hepar ro-
borantia.**Dysenteria
hepatica.*

quo decocto inungendum erit corpus vniuer-
sum: vel hunc in modum: Ex saponis albi mul-
toties loti cum aqua rosacea libra media, pul-
ueris ireos, storacis, calaminthæ, singulorum
vnc. j. pulueris betonicae drac. iij. misce cum o-
leo rosato, & fiat pila, cum qua fricetur corpus
vniuersum in balneo exsistens. Sequitur he-
patis intemperies frigida, quæ sane contrariis
calfacientibus erit tollenda: his tamen semper
obseruatis, primum vt addantur clementer a-
periētia: & hoc, quod fere simul adsit obstru-
ctio a congestis in eo, per imbecillam sangui-
ficationem, excrementis: addendo etiam mo-
dice adstringentia, quæ partis principis robur
tueri possint, aut restituere. Amplius tenuium
partium esse debent tergentia, lenientia, vt di-
cta excrementa vacuentur. Quas vires habent
terebinthina, cinnamomum, vix passæ, pista-
chia, schænantum, spica nardi, absinthii pon-
ticum; vt etiam eius ipsius vnus vsu hydrops
sanetur. cuius species omnes hydropis drach-
mis duabus diacurcumæ mane cum aliquo li-
quore, vt aqua absinthii sumtis, sanari scribit
Auicenna. E dialaccæ etiam cochlear vnum
hepar roborat, rhabarbaro etiam tolluntur
hepatis vitia, & aliorum medicamentorum
freno bis in hebdomada sumto ad drachmam
vnam, dysenteriam hepaticam persanante, &
trochiscis de eupatorio cum syrupo absinthii,
eupatorii. Ad extra vero tollitur frigida hepa-
tis intemperies, ad quam hepatica affectio se-
qui

qui solet, huiusmodi linimēto: Ex oleo camomellino, nardino, anethino, sampsicino, lentiscino, seu de absinthio: vel hoc vnguento: Ex succi eupatorii, marrubii, & fumarie an. drac. iij. assari, spicæ nardi, & celticæ an. scrup. j. cinnamomi, iunci odorati, & ligni aloes ana scrup. β, olei rosati, camom. & de absinthio ana vn. j. ceræ quantum sufficit, aceti parum; misce, & fiat vnguētum: vel hoc cerato: Ex fœnugræci, farina hordeacea, seminis lini, ac lupinorum ana drac. iij. flo. camomil. eupatorii, absinthii, meliloti, iunci, odorati ana scrupu. j. myrrhæ, mastices, corticū thuris ana drac. β, olei anethini, nardini, rosacei, ac de absinthio ana vnc. j. ceræ quantum sufficit, fiat ceratum, & vtere: Vel hoc epithemate: ℥ succi eupatorii, marrubii, fumarie, cichorii ana lib. β dein accipe radicis capparorū, filicis, & cichorii ana drac. iij. absinthii, flo. camomil. fol. plantaginis ana pug. β chamædrios, chamæpitheos drac. iij. seminis dauci, anisi, & fœniculi ana drac. j. spicæ, stæchadis drach. j. β. fiat decoctum secundum artem in aquæ pluuiæ sufficienti quantitate, de quo accipe libras duas, miscetoq; cum prædictis succis, ac aceti vnc. ij. adicito, & vtere.

Sequuntur lienis intemperies, quæ sane eandem, vt inquit Paulus, cum iocinore curationem postulant, cibis iisdem, potibus simplicissimis, pharmacis, ac fomentorum irrigationibus, oleis, & vnguentis. Sequitur intemperies calida renum, quæ plerunque calculi est effe-

*Pro affectio-
ne hepatica
linimentū.*

*In affectio-
ne hepatica
vnguentū.*

Ceratum.

Epithema.

*Lienis intē-
peries.*

*Renum in-
temperies ca-
lida ex qua
calculus.*

*In Diabete
topica.*

Vnguentum

ctiua causa, quæ sane refrigerantibus erit tem-
peranda, quæ tamen astringentia non sint, ne
vis astrictis materiam retineant: ac si externe
lumbi erunt aperiendi, pelles, plumas, calori-
fica cætera lumbos tangere prohibentes, ad-
mouentes renibus inter duas telas ceratū Gal.
refri. vel sandal. vel ex cera alba, & oleo viola-
to, vel nimphæato, vel cucurbitino, singula
quarta parte horæ ablato, & dum refrigeat ite-
rum admoto: quanquam in aere frigido tepi-
dum sit applicandū. Calida vero intemperies
renum, aut sine materia, aut cum materia cali-
da renibus imbibita, ad quam diabetes sequi
solet, quæ sane ex aqua tollitur hordeo tosto
cōfecta, aut succo malorum punicorum cum
frigida permixto, vel decocto mirtillorū, po-
morum, seu pirorum astringentium: Extrinse-
cus huiusmodi topicis lumbis, seu renibus,
pectini, & hypochondrio præsertim dextro il-
linitione oleo rosato, omphacino, præcipue
cidoniorū, & mirtino: adhuc oleo de papaue-
re, seu de nimphæa cum paucis aceto, ac cera:
vel hoc vnguento. Ex sandalorum omnium dra.
ij. succi plantaginis, & cichorii an. vn. j. olei ro-
facei, & mirtini an. vnc. j. ꝑ. ceræ & aceti parū;
fiat vnguētum. Renibus autem & pectini hoc
vnguento: Ex succi lactucæ, & portulacæ, ac
foliorum pampinorū vitis, seu solani, seu um-
bilici veneris an. vnc. j. farinæ hordei vnc. j. ꝑ.
gummi draganti infusi in aqua rosacea dra. iij.
cremoris seminum citoniorum drac. iij. olei
rosati,

rosati, mirtini, & de nymphaea an. vn. j. hypoci-
 stidis, balauſtiorum, corallorum rubeorum, &
 rhu obſoniorum an. ſcrup. ij. aceti, & cera pa-
 rum, fiat vnguentum. proceſſu temporis adii-
 ci poterit papaueris ſuccus, ſeu hyoſciam, cre-
 mor etiã ſeminum papaueris, & eiufdem oleũ
 & vbi volueris cataplaſmatib. vti, hoc modo: *Cataplaſ-*
 Ex foliorum hyoſciam, papaueris, ſolani, & *ma.*
 roſarum an. m. j. portulacæ, vmbilici veneris
 an. m. ſ. cremoris ſeminum papaueris, & coto-
 neorum an. drac. iij. farina hordei pug. j. ſ. ſan-
 dalorum, & corallorum rubeorum, ac balau-
 ſtiorum an. drac. j. olei roſati, mirtini, & cido-
 niorum an. vnc. j. contundantur, miſceantur,
 & cum ſucco ſolani, ſeu foliorum vitis, pauco
 aceto addito fiat cataplaſma. Sequitur veſica, *Veſica intē-*
 quæ ſane internperie frigida laborare ſolet, a *peries frigi-*
 qua veſica redditur imbecillis, ad quam iſchu- *da.*
 ria, ſeu vrinæ ſuppreſſio procedere ſolet. & nō
 ſolum iſchuria, ſed etiam vrinæ incontinentia *In Iſchuria*
 ab huiusmodi intēperie frigida afficiente mu- *& vrina*
 ſculum veſicæ a natura factũ ad aſtringendum, *in continen-*
 quæ proſecto tollitur aſſiduis inſeſſibus ſeu *tia ſotus.*
 ſotib. in ſænu græci, ſeminis lini, althææ, rutæ,
 ſampſuci, ac artemiſiæ decocto cũ oleo, & loci
 inunctione ex oleo rutaceo calido ſæpe per
 diem & noctẽ, & maxime poſt inſeſſus: & hoc
 vnguento: Ex olei nardini, coſtini, & rutacei *Vnguentũ.*
 an. vnc. j. olei de ſcorpionibus & irini an. vnc. ſ.
 maſticis, florum ſtæchadis an. drac. ij. caſtorei
 drac. j. ſagapeni & bdellii an. drac. ſ. diſſoluatur

*Vasorum
spermaticeo
rum intem-
peries cali-
da & hu-
mida.
In Gonor-
rhæa.
Cataplas-
ma.*

Inseffiones.

Vnguenta.

Lamina.

gummi in vino albo, & addita cera fiat vnguentum. In hunc etiam vsum confert vnguentum, quod dicitur dialthæa. Sequitur vterius, sed primū expediāmus vasa spermaticea: quæ quidem vbi intemperie calida & humida simul erunt affecta, ad quam sequi solet gonorrhæa seu seminis profluuium, his erit depellenda: circa lumbos & pubem medicamento ex rosaceo, maxime omphacino parato, aut paucō vino cū linteis lineis, aut in melino oleo paucō, vino addito madefactis, aut spongiis posca imbutis, aut cataplasmate ex palmulis, malis, acacia, hypocistide, ænanthæ, rhoe & similibus: necnon inseffionibus ex lentisco, rubo, mirto in vino austero, aut etiam aqua ipsa decoctis: & per interualla vnguentis ex iis succis compositis astringentibus, aut succo semperniui, aut lactucæ, & nimphææ, & rosaceo, & cera. Vel hoc vnguento: Ex olei rosati omphacini, citoniorum, de nenuphare, & mirtini an. vnc. j. cremoris seminis lini, & seminum citoniorum extranei cum aqua rosacea an. drac. β. foliorum rutæ, agnicasti, & menthæ siccorum an. drac. β. succi polygoni, portulacæ, semperniui an. vnc. j. β. pulueris corallorum & sandalorum rubeorum, sanguinis draconis, & boli armeni an. drac. j. ceræ quantum sufficit, aceti parum, misce & fiat vnguentum: etiā lamina plumbea lumbis supposita multum refrigerare consuevit in somno. & vbi plumbi durtiē non tolerabunt, ex prædictis herbis refrigerantibus

bus quædam arefacta substernantur, quibus addes viticis folia, rutæ, ac calamenthæ, & rosæ: profunt enim hæc citra renum læsionem. Præterea huiusmodi pastillis: Ex seminis rutæ, *Pastilli.* agni casti, & vrticæ an. scrup. β. seminis lactucæ, portulacæ, plantaginis, & papaueris albi an. scrup. j. seminum coriandrorū præparatorum, & canapis torrefactorum an. gr. iij. diacalaminthæ drac. ij. cornu cerui vsti, seminis rosarum, sandalorum, & corallorum rubeorum an. gr. vij. seminum melonum drac. iij. sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum sufficit: formantur pastilli, quorū vnum cū pauco vino rubeo astringenti, aut pauca aqua, in qua ferrum sæpius fuerit exstinctum, assumāt

*Vteri intē-
peries cali-
da.*

*In mensium
suppressione
balnea.*

pro qualibet vice. At vterus vbi intemperie calida laborabit, ad quam mensium suppressio fiat, post purgationē humoris biliosi, post frictiones & vincula partium infernarum, & cucurbitulas pubi, & inguinibus affigendas, balneo aquæ dulcis erit vtendum, & in sessione, ex malua & althæa, & violis, hordeo, & camomelli floribus decoctum parando: & inunctione pubis, & inguinum huiusmodi vnguento, ex olei amygdalarum dulciū & amararum, & olei de cucurbita an. vnc. j. adipis anseris, & butyri recentis an. drac. iij. ladanī drac. ij. fiat vnguentum: & pessis ex contusis maluarum & althææ radicibus, hordeo decocto, saccharo rubeo, adipe anseris vel gallinæ, omnibus contusis & simul permixtis, & serico

Inunctiones.

E e s

*Pastilli.**Ex uteri
intemperie
frigida mē-
sium sup-
pressio.
Balnea.**Sacculi.**Suffitus.**Vnguentum.*

lintheo veteri inuolutis: prius tamen quam im-
mittantur, in oleo amygdalarum dulcium, vel
de cucurbita intingantur & hoc tempore cre-
mor seminum melonum, vel cucumeris cum
aqua hordei cum corticibus paretur, aut aqua
capillorum veneris, vel in aqua radice glycy-
rhizæ fuerit decocta, & exhibeatur. Insuper pa-
stillis ex prædictis paratis, & reliquis seminib.
cōmuniibus, qui a balneo, seu infessu cum præ-
dicta aqua hordei, aut capillorū veneris præ-
beantur. Et vbi hæc non suffecerint, confugi-
endum erit ad ea, quæ Mesues vocat medica-
menta. Vbi vero uterus intemperie frigida la-
borabit, ad quam itidem mensium suppressio
sequi solet, balneis mineralibus ad rē facienti-
bus erit vtendum: vel vbi naturale haberi non
poterit, infessione in aqua, in qua artemisia,
camomilla, pulegiū, calamintha, sauina, ma-
iorana, & ruta fuerint decocta: Ex quibus sac-
celli etiam parari poterunt, qui calfacti in la-
tere irrorato ex paucis vino albo applicentur,
sæpius iterentur, & foveantur partes circa vte-
rum. Insuper suffitu ex aromatibus muliebria
ducente, Hip. 25. 5. Aph. quod vasorū ora ob-
serata aperiat, humorū crassitudinem extenu-
et, & obstructions incidendo liberet, vt ait
Gal. in commento, & inunctione in imo ven-
tre, pube, & inguinibus ex hoc vnguento: Ex
olei liliacei, & irini an. vnc. j. amygdalarū ama-
rarum, & de capparibus an. vnc. β. succi rutæ
aut sauinæ, & artemisæ an. drac. iij. ladani dra.
vij.

vij. ceræ quantum sufficit, fiat vnguentū: *Pess. mitiores.* Pess. etiam vbi opus fuerit primo mitioribus, deinde valentioribus. mitioribus quidem ex anserino seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & paucis croci: interim adiciendo mercurialis herbe contusæ parum, aut tantundem artemisiæ, aut fauinæ, aut pulegii, & vbi valentioribus erit *Pess. valentiores.* vtendum, myrrha, bdellio, galbano, aristolochia, rubia tinctorum, abrotano: adiectis iisdem prius cõtusis, ac linteo serico, aut lineo tenui, ad formam digiti humani inuolutis, oleoque irino aut liliaceo prius infusis, mulieris pudendo immixtis, adeo vt os vteri attingant, cruribus tamẽ alligatis, vt vbi opus sit promptius valcant auferri. *Pastilli.* Pastilli quoque ex seminis feniculi, dauci, & seseli an. scrup. j. cinnamomi, cassiæ, cuiuslibet, scrup. ss. seminum melonum & cucumeris drac. ss. sacchari dissoluti in aqua melissophylli, aut capillorum veneris quantum sufficit, formentur pastilli, & vtere temporibus dictis cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris. Mirifice quoque conducunt pastilli ex myrrha, si drachmam vnã exhibeas cum aqua mulsa, aut aqua capillorum veneris. *Pectoris & pulmonum intemperies calida.* Sequitur pectus & pulmones: quæ quidem vbi intemperie calida a materia relicta laborabunt, depelleretur iis elegmatibus, quibus diximus materiam pulmonibus conceptam exspui facilem reddi, & foris thoracem inungendo oleo violato, frigida vero intemperie iisdem *Intemper. frigida.* elegmatibus, quibus diximus materiam exspui

*Tussis ex
frigida in-
temperie or-
ganorū re-
spirationis.*

*Capitis in
dolor ex in-
temp. ca-
lida.*

*Inunctio-
nes.*

facilem reddi : & foris inunctione cum oleo amygdalarum dulcium per se, aut cum butyro recenti, & croco pauco, vel etiā oleo & mucagine seminis lini, fœnogræci, maluæ, althææ: frigida vero intemperies organorum respirationis, præsertim musculorū thoracis, ad quā tussis, sed non ita vehemens sequi solet, depelletur, pectus inungendo calidis vnguentis: vt camomellino, anethino, amygdalarum dulcium, butyro, ac anseris, seu gallinæ pinguedine. vel hoc vnguento, Ex butyri recentis, pinguedinis anseris an. drac. ij. olei irini, & amygdalarum dulcium an. vnc. ij. farinæ fœnogræci, seminis lini, & althææ an. dra. s. radice althææ, helenii & glycyrrhizæ an drac. j. cum cera fiat vnguentum. Per calfaciētia enim instrumentorum respirandi frigiditatem emendamus. Quæ autem ex defluxu humoris contingit, sequenti libro curationi symptomatum dicato, 92 vbi de tussi agetur, manifesta fiet. Sequitur caput, cuius quidem intemperies calida, ad quā dolor sequi solet, depelletur somno, Apollonii auctoritate. 2. de comp. med. per loca. aquæ potu, aut vino aquoso Gal. vbi aqua exhiberi non poterit, & sumtione vnc. j. s. syrupi de infusione rosarum, aut ex nimpheæ, vel violacei, cū duabus vel tribus vnciis aquæ borraginis, vel cichorii. Extra vero caput erit inungēdum iuxta sinciput propter laxitatē coarticulationis iuxta coronalem commissuram, quod illic ob ossium tum tenuitatem, tum raritatem, facilius

cilius vis medicamentorū intro recipi possit. Quo in loco rosaceo caput erit illiniendum, aut irrigandum, proximum a rosaceo erit camomillinum: mēlura aut em rosacei & camomillini ab ardoris magnitudine, & paruitate, & habitu corporis, ætate, & aliis circūstantiis erit circumscribenda vt pueris, eunuchis, & qui molli carnē præditi sunt camomillino, in aliis rosaceo. A papaueris tamen & mandragoræ succo erit abstinendum, quod nō citra dānum refrigerēt, Gal. quare hoc modo erit refrigerandum caput: ℞ olei rosacei vnc. ij. aque rosarum vnc. j. aceti vnc. β. aut prædictis, succi semperuiui, portulacæ, seu lactucæ vnc. j. immiscendo: aut tantūdem aliorum medicamentorum in frigidantium: vel cremorem addendo seminis cidoniorū, maluarum, aut althææ, seu psilii drach. iij. vel iiij. & loco rosacei, violaceo, de cucurbita, & ex nimpheæ oleo vtēdo, & cum cera ac paucō aceto ad vnguēti formā sincipiti applicando. Poterit etiā alterari sac-

Succus papaueris & mandragoræ cum damno refrigerant.

Vnguētū.

Sacculi.

Embrocha.

cellis ex rosis, violis, hordeo, lentibus, ac nimpheæ, foliis prius contusis: vel vbi malueris alterare embrocha, hoc modo: ℞ foli. maluarum, violarum, & rosarū an. pug. β. florum nimpheæ drac. iij. pampinorum, seu capreolorum vitium, portulacæ seu semperuiui an. m. j. camomelli, meliloti, & fœnogræci an. dra. ij. coquantur secundum artem, & fiat embrocha, addendo aceti parum, præsertim si dolor intra cranium erit: qua ratione prædictis o-

Mania.

*In mania
pharmacū
Aetii.*

*Catarthus
ex intemp.
calida ce-
rebri.*

*In insania
irrigationes*

minibus medicamentis erit immiscendum. O-
dore etiam alterari poterit, ex aqua rosacea &
mirtilloꝝ cum exigua aceti portione. Ad eū-
dem modum si ad intemperiem calidam ce-
rebri sequatur mania, irrigatione erit alteran-
da, ex rosarum, violarum, lolani, foliorum la-
ctuce an. pug. β. corticū papaveris albi drac. ij.
florum camomillæ drac. iiij. florum stœchadis
drac. j. Et cum prius bullierint in debita aquæ
quantitate, additoque pauco aceto iuxta co-
ronalem commissuram, loco prius abraſo ca-
put irrigato. Confidit autē Aetius valde phar-
maco ex papaveris capitibus cum ptisanæ suc-
co, aut aqua exhibito pondere vnius cochlea-
ris. Interdum non vna vice, sed intermissa die
vna, rursus exhibendo. Aſſerit enim hoc me-
dicamentum ab affectione liberare post venæ
sectionem. Suffimēto etiā alterari poterit, ve-
luti fit in calida intemperie cerebri, ad quam
sequatur distillatio, velut ex manna, seu corti-
cis thuris, labdani, mastices, an. scrup. β. sanda-
lorum rubeorum & luteorum, & corallorum
rubeorum an. drac. j. rosarum rubearū siccarū
incompletarum drac. iiij. fiat pulvis, qui vbi v-
sus exigat carbonibus ignitis inspergatur. Ca-
lida vero intemperies aut sola, aut cum mate-
ria, seu succo calido, ad quam sequatur mania
seu furor, aut insania, irrigatione capitis roſa-
ceo cum pauco aceto, aut poligoni succo, vel
oleo anethino imbuta petia lanca aut linea
sincipiti impolita, & frequenter remota, aut
huius-

huiusmodi irrigatione: Ex rosarum, violarum,
solani foliorum lactuca an. pug. β. corticum
papaueris albi drac. ij. florum camomillæ dra.
iij. florum stæchadis drac. j. bulliant in debita
B aquæ quantitate, & addito pauco aceto iuxta
coronalem commissuram fiat irrigatio capite
abrado quæ non sit frigida, sed tepida. Calida *Catarrhus*
vero capitis intemperies, ad quam sequatur *acris & bil-*
catarrhus seu distillatio, si erit cum materia a- *iosus ex in-*
cri & biliosa, prius præparata & vacuata, caput *temperie*
erit alterandum: quod ut ait Gal. 6. de tuen. val. *capitis ca-*
in quouis defluxu ex capite ad subiectas par- *lida.*
tes, capiti prospiciendum sit, ipsumq; sanandū,
veluti mali fontem, ac firmandum, modo li-
ceat, quod origo, & principium catarrhi e ca-
pite nascatur. Alteranda igitur erit intemperies
calida capitis balneis aquæ dulcis, quo & cali- *Balnea.*
dos vapores, qui in capite sunt euocemus, &
totum capitis temperamentū melius redda-
mus, 6. de tuen. val. Gal. caputq; rosaceo perū-
gendum erit, præsertim tēpore æstatis, potissi-
mum omphacino. Et suffitus hoc modo fien- *Suffitus*
dus: Ex mānz seu corticis thuris, laudani, ma-
stices, singulorum scrup. β. sandalorū rubeorū
& luteorum, & corallorum rubeorū an. drac.
j. rosarum rubearum siccarum incompleta-
rū dra. iij. fiat puluis, & ubi vsus exigat carbo-
nibus ignitis inspergatur. Vbi vero caput in- *In catar-*
temperie frigida erit affectum, ratione cuius *rbo frigida.*
itidem sequatur catarrhus, si cum materia e-
rit associata, præparata prius & alterata, &

Sacculi.

euacuata materia clysteribus, purgatione, caput ad oppositum erit alterandum, saccellis capiti ipsi admouendis, ex hyssopi, samplici, florum camomillæ, melilotian. drach. j. s. flo. stœchadis, spicæ, singulorum scrup. j. mastices, ligni aloes, maceris cuiusque drac. s. rosarum aridarum drac. iij. terantur singula; & in sericū, seu tenuē linteū lineā immittatur, sacculusq; formetur, & coronali suturæ imponatur. Quo

*Sinapismus.**Cauterium.**Suffitus.*

etiam loco sinapismus, aut igneum cauterium (vbi diuturnior fuerit affectio) vtiliter adhiberi poterit: Et huiusmodi suffimento: ℥ maceris, ligni aloes, spicæ, mastices, corticum, seu mannae thuris an. scrup. s. hyssopi, & samplici sicca an. scrup. j. ladani drac. j. florum stœchadis, & caryophyllorū, singulorum drac. s. rosarum rubearum siccarum drac. ij. vel iij. paretur puluis, & modo dicto in intemperie calida v-

In intem-
perie frigida
cerebri ma-
teria pitui-
tosa vacua-
sio.

tere. Frigida vero cerebri intemperies, si cum materia erit associata pituitosa, euacuanda erit materia apoplegmatisimis seu pastillis, Tral-
liano, ℥ vnae passæ drac. iij. hyssopi & samplici an. drac. ij. cum pauco melle & cera formetur pastilli, quorum vnus notabili quodā spa-

Pastillis.

tio commanducetur: aut ex piperis & sinapis an. drac. j. hyssopi, staphidis agriæ, origani, & pirethri scrup. j. vnae passæ drac. iij. cum melle & cera iidem formentur. Errhinis etiam euacuabitur a capite pituita: Ex hyssopi, samplici, & betonica decocti lib. iij. succi foliorum betæ, aut radicū eius vnc. iij. vel lib. s. vel si fortioribus

Errhinis.

tioribus indigeas, tantundem succi brassicæ, *Sternutatoriis.*
aut ciclamini adicias. Sternutatoriis etiā pro-
ritari poterit, vt puluere albi ellebori, casto-
rii, piperis, aut nigellæ naribus indito, vel ex iis
composito. Euacuata materia, alterabitur in- *Intemperiei*
temperies frigida cerebri tum odoramentis *frigida cere-*
calidis ex samplici corticum, & foliorū citri, *bri altera-*
hyssopi, & rutæ an. scrup. ij. castorii, florum stœ- *tio.*
chadis singulorum scrup. j. stiracis calamitæ,
labdani, ligni aloes an. drac. ss. mastices, corticū
thuris, spicæ, & caryophyllorum, maceris an.
scrup. ss. sandalorum rubeorum, & corallorū *Orbiculis.*
rubeorum an. drac. j. cum succo betonicæ, seu
sampilci, & cremore tragacanthi fiat orbicu-
lus odoriferus, moschi, ac ambre gr. iij. vel iiij.
addendo. Et affusione ad sinciput olei rutacei *Affusione*
93 aut anethini, camomellini: frontem quoque, *oleorum ad*
nares, & aurium meatus illiniendo, quod ho- *sinciput.*
rum oleorum vsu solo 2. de comp. med. per lo-
ca, interdum liberetur cerebrum ab affectio-
ne, præsertim vbi intemperies recens sit, & ab
aere impressa. Sacculis etiā ex rutæ foliis, hyf- *Sacculis.*
sopi, & serpilli an. p. j. samplici, betonicæ ana
drac. iiij. florum stœchadis, spicæ, ana drac. j. ro-
sarum rubearum m. ss. Similiter & vnguento *Vnguentis.*
ex olei rutacei, camomellini, & nardini an. vn.
j. hyssopi, spicæ, florum stœchadis an. drac. ss.
mastices, thuris an. drac. j. cere parum. & vbi
opus erit, castorii addendo scrup. j. Embrochis *Embrochis*
etiā calidis, ex decocto florum camomelli,
fœnigræci, seminis lini, fertulæ campanæ an.

Fomentis.

*Ad capitis
dolorem an-
tiquum ex
frigidityte.
Ad hemi-
craniam ex
frigidityte.*

*In memoria
de perdita
ex intemp.
frigida a pi-
tuita irri-
gatione.*

m. Bspicae, florum stœcadis an. drac. j. foliorum
ruta, hyssopi, & samplucian. drac. ij. Horum
etiam vaporibus per nares susceptis. Amplius
lauri foliis teneris cum irino vnguento tritis
capiti adhibitis; & fomentis per spongas cali-
das imbutis, & expressis, maxime si in aqua
lauri folia tenera fuerint incocta, aut samplu-
ci, vel ciperi. Præter hæc aliis quoque uti po-
terimus cephalæum enim post repellentia, &
distergentia: Ex verbenacæ oleo incocta si caput
irrigetur, omnem capitis dolorem antiquum
ex frigidityte, aut ex crassis humoribus ortum
medetur, Gal. 2. de comp. med. per loca. Et he-
micranæ ex frigidas causas 2. de comp. med.
per loca in fine Gal. si dimidiam frontis partē
vnā cum temporis musculo ex euphorbio,
oleo, & cerâ parato vnguento illinias, cōmo-
dissimum ailerit esse medicamentū, quod fiet
ex euphorbii vnc. j. olei lib. j. ceræ quadrante.
Quod si validius videbitur medicamentum,
poterit euphorbii vn. s. assumi, præsertim si eu-
phorbium validū sit, corpusq; molle, ac ex-
acto sensu. Iuuat etiam si in aurem instilletur
hoc modo: Euphorbii scrup. j. olei dulcis vnc.
ij. quibus commixtis gutta vna, vel duæ in aurē
instillentur. cauendum autē erit ab hoc phar-
maco in iis, quibus a calidis vaporibus aut hu-
moribus hemicranæa gignetur. Ad eundem
modum, & iisdem depellerur intemperies fri-
gida cerebri, quæ ut plurimum a pituita (quā-
quam etiam a melancholia) oriri soleat, ad quā
sequatur

sequatur memoria deperdita irrigationibus,
 quas græci embrochas appellant, ex alto cadē-
 tibus torrentis ritu, capiti prius abraſo intem-
 peries tolletur, præſertim iuxta coronalē cō-
 miſſuram. Qua parte cum laxior ſit, atque os
 tenuius & rarius, promptē non tantum quali-
 tates, ſed & ſubſtantia medicamentorū, præ-
 ſertim ſi tenues fuerint, intro tranſmittuntur
 Galeno teſte, ac in ſeiſpſo experto 13. meth. & 2.
 de comp. med. per loca, in hunc modum pa-
 ratis: Ex hyſſopi, ſerpilli, thymi ana pu. ſ. beto-
 nica, ſampliſci, ſlorum camomilla ana pug. j.
 ſlorum ſtæchadis drac. iij. fiat decoctum: cui
 addatur caſtorei drac. j. aceti vnc. j. Necnō vn-
 ctionibus ex oleo nardino, nucis muſcata, de
 caſtoreo, coſtino, vel de piperibus in eodē lo-
 co factis, quanquam etiam in poſteriori parte
 capitis, videlicet in occipitio, ac iuxta primā,
 & ſecundam vertebram: & huiuſmodi præte-
 retea ſaccullo: Ex hyſſopi, ſampliſci, ſlorū ſtæ-
 chadis an. dra. j. caſtorei, nucis muſcata, ſpica,
 macis ana ſcrup. j. corticum thuris, maſtices, &
 ligni aloes an. drac. j. ſ. roſarum rubearū ſic-
 carum æquali pondere omnibus, contundā-
 tur, & formentur ſacculli. Vbi vero ex melan-
 cholico ſuſco pendeſcit, ab irrigationib. exſic-
 cātia erunt demenda, & addēda humectantia:
 & vñctionibus addendū erit oleum camomel-
 linum, anethinum, & amygdalarū dulciū. Sed
 de alteratione intemperiei frigida, & ſicca
 cerebri diſſuſius agetur, ſi prius percurramus

Vñctiones.

Sacculus.

In memoria
deperdita a
melancho-
lia.

*Ex intem-
perie cere-
bri frigida
& humida
paralysis.*

*In paralysis
tabella.*

Vnguenta.

intemperiem frigidam, & humidam cerebri, ad quam sequatur paralysis, seu corporis resolutio, aut alicuius membri particularis, vbi membrum aliquod particulare huiusmodi intemperie laborabit; quæ quidem intemperies frigida, & humida cerebri si erit cum materia vitiosa, & impacta, post vniuersi corporis, & capitis purgationem, apophlegmatismis, sternutatoriis, ac nasalibus medicamentis, quæ caput purgia dicuntur, vtpote iis, quæ a capite pituitam dicunt, cerebrum erit alterandum, quod cerebri in hoc affectu semper sit habenda ratio, aut sit primario, aut non primario affectum. Alterandum igitur erit ex diambra, antidoti plirisarcoticon, & diamoschi dulcis, singulorum scrup. j. pulueris hirundinis præparati drac. ss. seminum coriandrorum præparatorum drac. j. sacchari rosacei drac. m. j. sacchari rosacei drac. m. iij. cum saccharo dissoluto in aqua rosacea fiant tabellæ, ex quib. æger sæpius parum in ore teneat: vel assumat castoreum, aut opopanaceum, aut sagapenum pondere vnius drachmæ cū aqua mulsæ. Ad extra vero capiti (vbi caput fuerit primario affectum, aut spinali medullæ, aut parti illi, quæ primario erit affecta) vnguentis ex oleo nardino, costino, de nuce muscata, vulpino, de hiperico, castoreo, aut e terrenis vermibus parato: & demum laurino, seu de euphorbio: aut vbi componere malueris, hoc vnguento: Ex olei vulpini, nardini, de nuce muscata, omniū vnc. i. j. succi

succi hyperici, saluæ an. drac. ij. castorii, saga-
 peni ana drac. j. ß. florum stæchadis drac. ß. cū
 pauca cera, & exiguo vino albo odorifero fiat
 vnguentum: aut hoc sacculo: Ex hyssopi, sam- *Sacculum.*
 pluci, hyperici, saluic, rutæ, foliorum lauri an.
 drac. ij, spicæ, masticis, castorii, florum stæcha-
 dis an. scrup. ij. caryophyllorum, maceris, nu-
 cis muscatæ an. scrup. ß. rosarum rubearū sic-
 carum m. ß. omnia contundantur, & paretur
 sacculus: aut huiusmodi fomēto: Ex saluia, ro- *Fomentum.*
 remarino, hyperico, herba paralyti hodie vo-
 cata, hyssopo, sampso, betonica, pulegio, &
 calamintha, omnibus in vino albo decoctis,
 additisque castorii drac. ij. florum stæcadis, ac
 spicæ, an. drac. j. ß. quibus sæpius reiteratis cum
 spongiis, seu linteis, aliquod ex prædictis vn-
 guentis, seu sacculis super imponendum erit.
 Et vbi his malum non cedit, sinapismis, aut *Sinapismi.*
 per ignem cauteriis pars illa, Aetio, erit inurē- *Cauteria.*
 da. Similique ratione erit procedendum vbi
 particularis aliquis neruus fuerit affectus, eius
 origine prius inuenta; quemadmodum Pau-
 saniam sophistam ex amissione duorum mi-
 nimorum digitorum male a medicis curato-
 rum, Galenus sauat, circa dorsi initiū ea me-
 dicamenta apponens, quæ illi digitis applica-
 rant. At frigida, & sicca cerebri intemperies, a *In melan-*
 melancholico succo facta, ad quam melācho- *cholia ex*
 lia sequi solet, sumtis quidem tolletur, diabu- *intemperie*
 glossato, diaborraginato, electuario de gem- *frigida &*
 mis Mesuæ, electuario lætificatæ Rasis: admo- *sicca cere-*
 bri.

- Epithema.* tis vero, veluti epithemate cordiali ex florum borraginis, & buglossiana drachmis duabus, caryophyllorum drac. j. simul mixtis, balneo totius, & capitis, ex malua, althæa, viola, & intestinis veruecum, & præsertim dulcis aquæ
- Balneum.* balneis, qua non solum totum corpus contemperat, sed etiam aliquid melancholici succi discutit: quanquam eorum caput tepida potius quam calida aqua sit superinfundendum; vel ubi malueris caput torrentis ritu irrigare, hac
- Irrigatio.* irrigatione erit vtendum: Ex foliorum maluarum, violarum, althææ, borraginis, lupulorū, ana pug. j. florum camomillæ manip. ß florum stæchadis drac. iij. fiat decoctum secundum artem, & vtere, capite prius abrafo; & post irrigationem vnctione capitis ex oleo amygdalarum dulcium, violaceo, camomellino, seu anethino odoroamento etiam: Ex aqua rosaceæ, & florum citrangularum vnc. iij. florum nimpheæ, violarum, melissophylli, maluarum althææ an. drac. ij. decoque in prædictis aquis, & adde parū aceti, & per nares vapores suscipito.
- Vnctiones.*
- Suffus.* In hypochondriaca autem, & flatuosa melancholia, exterius fomento hypochondriis facto ex oleo, in quo decocta fuerint, ruta, anethum, absinthium, pulegium, serpillū, agni semen, bacca lauri, aut folia eiusdē tenera; quod hæc dolores mitigent, & flatus discutiant. Et in stomachi inflationibus hoc sacculo: Ex foliorum, & baccarum lauri, rutæ, absinthii, serpilli, pulegii an. drac. ij. vel iij. florum camomillæ
- fœnugræci,

fœnigræci, anethi an. drac. iij. cumini, anisi, feminis fœniculi an drac. j. rosarum rubearum m. j. contundatur, & fiant sacculi, qui irrorati pauco aceto, vel vino calido approximantur, sæpius eos mutando supra ventriculū: Et hoc cataplasmate: In oleo decoquendo anilum, cuminum, apium, absinthium, & artemisiæ folia, addendo ciperum, & cōsmarinum lenissime trita, quod admoveatur, & permittatur, & ante, & post cibū diutius permanere: Sicca vero cerebri intemperies, ad quam dolor capitis, sequi etiam solet, irrigationibus iuxta coronalem commissuram ex oleo amygdalino dulci, vel violaceo, & camomellino simul mixtis, interim miscendo prædictis oleis aliquā pinguedinē, vel anseris, aut gallinæ aut vitulorū, aut butyri recēs: humidis quoq; errhinis ex prædictis oleis, & pinguedinibus, & gallinarū iusculis, & saccharo albo. Sed hæc de arte curandi primum morborum genus, quod partes similes afficere solet. Sequitur ut percurramus artem curandi secundū genus morborum, quod circa partium compositionem versatur; præsertim speciem illam morbi in compositione, quæ circa ductus organorum versatur obstructio appellatur. (nam reliqua vitia circa compositionem partium, chirurgiam potius ut in pluribus postulant.) Quoniam vero occlusionis, seu obstructionis oppositum remedium est ipsa apertio, sequitur igitur ut prius explicemus quid sit apertio. APERTIO est dilatatio

Cataplasma.

In capitis dolore ex intemperie sicca irrigationes.

Errhina.

2.
Morborum organicorū curatio.

Apertio,

*Apertio
est rarefa-
ctionis dif-
ferentia.*

meatuū in profundo facta a calore potius in-
tenso, quam remisso, vsque ad secundum gra-
dum, vel primam tertii gradus mansionem, in
substantia crassa fundato, vt id quod clausum
est aperiat. Ideo autem dicitur: Apertionem
esse dilatationem meatuum in profundo, ad
differentiam rarefactionis: cum rarefacere sit
superficiem cutis magis solutam reddere, vt
vapores per ipsius meatus commode diffilari
possint. Apertio autem est dilatatio meatuum
attenuans in profundo obstruētes humores,
tum attenuando, tum abstergendo, tum excu-
tiendo. Atq, hoc est illud, cur additum fuerit:
Apertionem fieri non quidem a modico ca-
lore, vt facere solent rarefacientia, sed ab intē-
so. Etenim cū apertio habeat ad profundum
penetrare, & crassos humores præparare, &
excutere, valido calore indiguit. Quoniam: ve-
ro calor etsi validus esset, & in substantia tenui,
cito resolveretur, ob id additū fuit: Apertio-
nem fieri a valido calore in substantia crassa
fundato: & hoc, vt diutius conseruari possit,
quoad actum proprium expleat, modo calidi-
tas tanta non fit, & tanta crassitudo, vt potius
apta sint putrefacere, quam aperire: sed tanta
fit crassitudo, quanta valeat ad sustinendum
diutius calorem, & illum penetrationi magis
habilem reddere. Quanquam si aliqualis astri-
ctio etiam adesset, non tantum non impediret
caloris transitum, quinimmo ipsum propellē-
do maxime adiuuaret: cuiusmodi sunt amara B
omnia

Amara.

omnia, quæ in crassa substantia fundata sunt, magis & minus intensa post modum accipientes pro varietate tum corporum, tum ægritudinis, vt sæpe ad vteri inflatus, & menses tetētos scyllam & huiusmodi adhibeamus. Sequitur vt ostēdamus quomodo ij, qui praxim exercent in obstructionibus membrorū, in hac ideam quasi continue respicientes procedere soleāt: si tamē prius illud prænotatum fuerit, huiusmodi morbi genus, dum depellitur causa continens, plerunque tolli, vt pauca supersint a nobis dicenda, quod in curatione causæ continentis ingenia omnia sint a nobis satis superque discussa. Atque hoc est illud, cur in iecoris obstructione, facta prius materiæ euacuatione tum venæ sectione, internæ dextri cubiti venę, qua mediante propulsatur quod facturum est ex affluxu confluentium humorum, ii. meth. & præsertim existente obstructione ab humoribus calidis: & post purgationem corporis vniuersi per medicamentū ducens ad intestinā, vbi obstructio in finis corporis erit; per vrinas vero vbi in gibbis, lib. de constit. art. medicæ: quod ad detergendas obstructions accedere nō possimus, nisi prius vitiosi succi maiori parte emissa: alioqui periculum esset, si obstructionibus liberandis studeremus, priusquam vacuatio fieret, ne ipsas magis impingeremus, ex Gal. 8. meth. & ii. eiusdem. postea accedendum erit ad liberandas obstructions attenuantibus, &

*In inflatio-
ne vteri &
mensibus
retentis.*

*De obstru-
ctionibus.*

*Hepatis ob-
structio.*

oppilationem dissoluentibus medicamentis; iis sane, vbi a crassioribus, & glutinosioribus humoribus obstructio orta fuerit, & praesertim in gibba: quod tunc validioribus opus sit, veluti eupatorio ex oxymellite, stœchade tum cocta, tum trita, aniso, fœniculi, ac dauci semine, & iure galli veteris, ac ciceris decocto, Alexandro, Actio, & aliis laudato; & syrupo ex absinthio, ex hyssopo, marrubio, de bizantiis, radicū duarum aut quinque, de eupatorio, oxymellite tum simplici, tum composito, cum aquis fœniculi, calluthæ, eupatorii, asparagi, addentes etiam mel rosatum, vbi abstergere, & oxymel, vbi & abstergere, & incidere voluit: post coctionē vinum exhibentes albū, tenuē, cappares, radices petroselini, cichorii, apii, fœniculi. Vbi vero ad calidum vergent crassi humores obstruentes, veluti a bile crassa, aperientibus quibusdā vtentes, & attenuantibus, sed frigidis, qualia sunt intubus hortensis, & agrestis, cichorium, & omne seridis, sonchi, hieracii, cōdrillæ genus, aut syrupo ex succo cichorii, aut endiuia, oxysaccharo, seu aceto simplici, syrupo cichorii a Nicolao scripto, cum rhabbaro, aqua foliorū, & radicū plantaginis, decocto quinq; seminū communīū frigidorū: topicis etiam vtentes, quorum mentio habita fuit in eius intemperie. Lienis autem obstructio similib. genere medicamētis erit tollenda, quod iisdē vtrumq; viscus leuari soleat. quare vbi erit lienis obstructio, aut viarum ad lienem

*Hepatis a
bile crassa
obstructio.*

*Lienis ob-
structio.*

lienem pertinentium, a qua icteritia nigra la-
 pius procedere solet, eadem victus ratione ca-
 tenuante, atq; iisdē medicamentis, validiorib.
 tamē erit tollēda, quod lien sine molestia me-
 dicamenta toleret validiora, 2. ad Glau. quæ ex
 astringentibus aliquid habeant, quod actionē
 vniuerso corpori ad humorum bonitatem, &
 ipsum conferat, 9. de comp. med. per loca, in-
 ter quæ sunt acerum, & acerū mullum, quod
 incidere, & attenuare crassos humores citra
 calfactionem possit, 9. de compo. medic. per
 loca, præsertim vbi idē viscus ne dum obstru-
 ctione, sed etiam induratione laborabit, 9. de
 comp. med. per loca. & decocto corticum ra-
 95 dicum capparorum, aut scolopendrii; quod
 quale medicamentum sit iocinori absinthiū,
 tale sit lieni capparis cortex, & quale rursus io-
 cinori eupatorium, tale sit lieni scolopendriū
 13. meth. quod similia genere medicamenta v-
 traque viscera postulent, sed tanto valentiora
 lien, quanto crassiori vitur alimento, ex Gale-
 no ibidem. Renum vero obstructione ab hu-
 more crasso, & lento facta, in renum aut cani-
 tatibus, aut substantia imbibito, a qua calculus
 seu renū lapis fieri solet, post totius corporis
 expurgationem, iis medicamentis erit vten-
 dum, quæ laxare meatus, ac renum corpora
 mollire valeant, ad hunc enim modum quo-
 quo modo videtur apertio fieri. Quare fomē-
 tis erit vtendum ex decocto foliorū maluarū,
 foliorum ac radicū althææ, florum camo-

icteritia nigra.

*Lienis indu-
ratio.*

*locus & lien
eadem gene-
re medica-
menta po-
stulant.*

*Arenum
obstructione
calculus.*

Fomenta.

Infectiones.

momelli, fœnugræci, seminis lini in hydreleo, & cum spongiis sæpe supra affectam partem, seu renem adhibenda erunt. Ex iisdem fieri poterunt infectiones, & inter omnia Alexandro probatissimum est balneum aquæ dulcis: & hoc, quod nō solum mitiget, sed etiam curare possit. Infestante vehemētius dolore, renum regio, ac lumborum inungenda erit hoc

Vnguentū.

vnguento: Ex olei camomellini, vel anethini, & amygdalarum dulcium an. vn. j. β. adipis anseris, vel gallinacei, & butyri recentis an. drac. iij. ceræ quod satis sit, fiat vnguentum: interim adiiciendo oleum ex scorpionibus paratum, aut ex eodem cum butyro recenti, & oleo amygdalarum dulciū, ac cera, fiat vnguentum:

Cataplasma,

postea hoc cataplasmate: Ex farina tritici, seminis lini, & fœnugræci an. m. j. olei anethini, vel camomillini, & amygdalarum dulcium an. vnc. j. β. mellis vn. ij. resinæ terebinthinæ vnc. j. radicis althææ contusæ drac. iij. misceantur arte, & fiat cataplasma, prius farinis in prædicta decoctione decoctis. Neque erit absurdū eadem vnguenta pectini & vesicæ adhibere, & ne quam primum frigescant, calfactorio aliquo extra cōtegere, quod per saccellos fiet ex milio, furfure, ac flo. camo. paratos, ac in latere paucō vino insperso calfactos. Conducunt etiam non parum cucurbitulæ absque incisione adhibitæ, quæ sæpe lapidē adeo celeriter trāferunt, vt subitam eius mali leuationem comparare possint, lapide nimirum in locum ampliore

*Sacculi.**Cucurbitula.*

plio^rem translato, supra a renibus initium fa-
 ciente; quanquam adhibendæ non sunt infe-
 stantibus doloribus, sed ipsis aliquantulum
 lenitis. Vesicæ vero obstructio occludens os
 vesicæ, ad quam ischuria sequi solet, iisdem li-
 beranda erit. Vteri vero in obstructione, ad
 quam mensium suppressio sequi solet, pro a-
 pertione vasorum in vterum desinentiū, mer-
 curialis herba tusa, linteo inuoluta pessi modo
 est immittenda, quod ora hæc mire aperiat,
 vel melanthii farina, quæ idem potest: & mi-
 thridatios antidoti ad drachmam vnam, cum
 mastice scrup. j. Mastix enim non solum repel-
 lit, sed etiā valentius attrahit, quod apophleg-
 matismo probat. Et vbi hæc non sufficiunt,
 opopanace, galbano, sagapeno, ammoniaco,
 euphorbio paucis pectini admoto, aut pello
 immissis, mox prouocantur menses, & fit aper-
 tio, quorum acrium vsu multo, si ardor quidā
 mordax succedat, aqua rosarū, albumine oui,
 oleo violato & rosato, lacte, & similib. ex pan-
 no impositis collo vteri. Et præter hæc cicla-
 minis etiam radix super ipsam transuanti mu-
 lieri menses prouocare putatur. Sed præter hæc
 omnia illud est notandum, venæ sectionem,
 etiam si obstructio non a sanguine solo sit, sed
 etiam sola, omnem magnam obstructionem
 tollendi vim habere, & aperiendi: nimirum
 dum sanguinis missio materias exagitat, loco-
 que moueri cogit. Etiam vteri obstructio, va-
 sorum scilicet ad vterum pertinentiū, ad quā

*Ischuria ex
obstructione
vesicæ.*

*Mensium
suppressio ex
obstructione
uteri.*

Mastix.

*Venæ sectio
ad omnes
magnas ob-
structiones
est utilis.*

In mola in-
sessus.

Fotus.

Vnguentum

Cataplas-
ma.

Pess.

sequatur retentio multorum mensium si-
mul cum semine morboſo, a quibus mola ſe-
qui ſolet, medicamentis erit tollenda, ſiue in-
tus, ſiue extra adhibitis, quæ laudandi, mollic-
di, & mitigandi vim habeant: veluti inſeſſus &
decocta maluarum, althææ, camomelli, ſemi-
nis lini, ſcœnugræci, ſertulæ campanæ, & ane-
thi, faciendo decoctum in aqua, proceſſu
temporis addendo pulegium, thymum, hyſ-
ſopum, ſaluiam, artemiſiam, & ex eorundem
decocto exiguo vino albo addito, fotus faci-
do cum ſpongiis, poſt quos imus venter, pe-
cten, & inguina hoc vnguento inungantur. Ex
olei irini, liliorum alborum, anethini, camo-
mellini an. drac. j. butyri recentis, adipis anſe-
ris an. drac. iij. ladanij vnc. ſ. ceræ & vini odo-
rari parum, fiat vnguentum: interim addi po-
terit cremor ſeminis lini, althææ, & ſcœnugræ-
ci, ammoniacique aut bdellij in vino diſſoluti
parum: & cataplaſmata ex radicum & foliorū
althææ, & maluarum an. m. j. farinæ ſcœnugræ-
ci, ſeminis lini, & hordei an. m. j. ſ. olei vtriuſq;
amygdalæ, & liliorum alborum an. vnc. j. mi-
ſce & cum aqua muſſa, & paucio vino odorato
fiat cataplaſma: peſſis etiam ex cæſipo, butyro,
adipe anſerino, medulla, aut cerebro cerui,
melle, caricis pinguibus, & viuis paſſis cum o-
leo irino, & amaracino, quibus interim rutæ,
ſaluiæ, artemiſiæ, aut maioranæ folia contuſa
miſcebit. Obſtructio vero, vbi contigerit or-
ganorum ſeu viarum ſpiritus, per quas aer in-
ſpiratur,

spiratur, ad quam sequi solet vehemens tussis, *Ex viarum*
quandoque vero spirandi difficultas, post fa- *spiritus ob-*
ctam purgationem tum vniuersalem, tum par- *structione*
ticularem ipsius pectoris, elegmatis, & aliis *tussis & spi-*
cap. de tussi & spirandi difficultate enarratis, *ranti diffi-*
quæ habeant vim incidendi, attenuandi, ab- *cultas.*
stergendi crassitiem, & visciditatem humoris
obstruentis, & humectandi, vt facile sursum
feratur humores absterfi, huiusmodi cataplas-
mate thoraci erit consulendum: Ex ficibus & *Cataplas-*
hordeacea farina, magis vero ex loliacea ha- *ma.*
bente resinam, mel, & ceram admixtam: in-
farciri etiam illi poterit iris & manna, aut ex
hordei farina cum resina, cera, iride, & man-
na, ac aqua mulsa. Post hæc his vnguentis cal- *Vnguentum*
facientib. thorax erit inungendus, irino, ane-
thino, rutaceo: & hoc ex iis confectio: Ex semi-
nis lini, fœnugraci, & althææ an. drac. ij. radice
iridis drac. j. β. olei irini, camomellini, & ruta-
cei an. vnc. j. butyri recentis & adipis anseris,
seu gallinæ, vtriusque drac. iij. ceræ quod satis
sit, fiat vnguentum. Prius tamen quam inun-
gatur thorax, aspero linteo fricandus erit, quo
vis medicamentorum promptius ad profun-
da valeat penetrare. Cerebri vero obstructio *In epilepsia*
si fiet, videlicet ventriculorū cerebri, aut me- *ab obstru-*
dii, aut postremi, a crasso pituitæ succo (quan- *ctione cere-*
quam etiam a melancholico) ad quam sequi *bri a pitui-*
solet epilepsia, post acres clysteres, glâdes, ex- *ta.*
tremarū partiū fortes ligaturas, vomitū ex sto-
macho humores trahentem, & sensum irri-

*Sternuta-
menta.**Errhina.**Pastilli.**In conuul-
sione canina
pastilli.**In epilepsia.
inunctio.**Pulvis.*

tantibus naribus admotis, & tandem ab acces-
sione post corporis vniuersi purgationem, ca-
piti prospiciendum erit sternutamentis: quod
fiet ellebori, castorii, seu piperis puluere nari-
bus iniecto; aut liquidis erthinis ex aqua hor-
dei, in qua samplucus, aut amaracus, serpillū,
calamintha, seu ruta fuerint decocta, adiecto,
betæ succo, iridis, aut ciclaminis & mansilibus
pastillis, qui per os pituitam educant, ex hyssop-
o, pulegio, pipere, castorio, chia mastice, pi-
rethro; vua passa, & cera confectis, vel simili-
bus, hunc in modum: ℥ pirethri, staphidis a-
griæ, piperis an. drac. j. castorii scrup. j. mastices
drach. j. s. vuæ passæ drac. ij. ceræ albæ parum,
misce & fiant māsiles pastilli cum oxymellite;
aut rosaceo melle: vel in hunc modum mansi-
les pastillos facientes ad conuulsionem etiam
caninam fieri solitos: Ex radicis pirethri gingi-
beris, castorii, singulorum scrup. ij. piperis, sta-
phydis agriæ an. scrup. j. mastices drac. ij. semi-
nis sinapis drac. s. hyssopi, origani an. scrup. iiij,
vuæ passæ drac. ij, excipiantur omnia trita, &
adhibita cera, ac pauco rosaceo melle, fiāt pa-
stilli mansiles, qui sane sunt apophlegmatif-
mata valentiora: Et inunctione principii spinę
ex oleo costino, nardino, hyperici, de castoreo
aut de nuce muscata. Et puluere capiri insper-
gendo: Ex hyssopi, sampluci siccæ gr. iiij. corti-
cum thuris, mastices an. gr. iiij. spicæ, florū stæ-
chadis, macis an. gr. ij. caryophyllorum, nucis
muscatæ an. gr. j. rosarum rubearum siccarum
drac.

drac. iij. terantur omnia, & fiat puluis, qui capi-
 titi circa coronalem commissuram insperga-
 tur. Temporum quoque inunctione, & iuxta
 narium foramen ex antidoto mithridatico, suc-
 co rutæ, ac pauco aceto, rutaque sæpius odo-
 randa, ac sub cervical sternenda. Et suffumiga-
 tione ex ladani drac. j. corticū thuris, masticis
 an. scr. j. rosarum rubearum drac. iij. fiat pul-
 uis, qui super prunas adhibitus leuiter suffu-
 miget agrum, ac domum in qua degit æger:
 Et cucurbitulæ cum scarificatione scapulis af-
 figenda, seu in occipitio: Et cataplasma ex pa-
 ne cocto cum aqua mulsæ cū amygdalis ama-
 ris contrito, aut serpillio, aut calamintha, aut
 mentha, seu ruta: postea rasum caput liniendū
 erit peucedani succo in aceto diluto, vel spon-
 dilio seu serpillio in aceto cocto, aut iride: & si-
 napismus capiti adhibendus, & ferro canden-
 ti occipitium & infra, quo loco summa verte-
 bra cum capite comittitur, adurendū, ex Cor-
 nelio Celso, duobus in locis, vt per eos perni-
 ciosus humor euadat: aut si duobus in locis in-
 unctionem æger nō perferat: saltē in vno ferro
 candenti oportebit adurere, quo summa ver-
 tebra cum capite committitur. Ad eundem
 modum procedentes vbi ad obstructionem
 sequatur apoplexia. itidem si obstructio fiat ex
 flatuoso spiritu, ad quam vertigo, & tenebri-
 cosa vertigo sequi solet, prius euacuato aut
 purgato corpore vniuerso, mox a purgatione
 humor ille qui peccabit, a quo spiritus flatuo-

Suffumi-
gatio.Cucurbitu-
la.Cataplas-
ma.Sinapismus.
Canteri-
satio.In Apople-
xia.In vertigi-
ne tenebri-
cosa.

Gg

*Cucurbitu-
la.*

*Apophleg-
matismi.*

*Gargarif-
mi.*

Suffitus.

*Sternuta-
menta.*

III.

*Solutio vni-
onis curatio*

*Vnio quid
sit.*

*Vnionis &
contigua-
tis differen-
tia.*

sus eleuatur, euacuandus erit cucurbitulis cū
scarificatione ad occipitiū affixis; & apophleg-
matismis pituitam a capite per os detrahenti-
bus iam enarratis: & nasariis, naribus infun-
dendo aquam hordei cum corticibus, cum
anagallidis succo, aut radicis betæ, vel ciclami-
nis: gargarismi quoque conferent ex origani
& pulegii decocto cum aceto mulso: odorem
insuper suscipiēdo per nares, ex amaraci, fani-
pluci, & hyssopi, & florum stœchadis deco-
cto, castoreo pauco addito, & moscho, ac ace-
to pauco. Ex pulegio item tuso, vel origano,
aut sinapi cum aceto commixto sternutamē-
ta procuranda erunt. Sed hæc de secūdo mor-
bi genere. Sequitur tertiū morbi genus, quod
vnitatis solutio dicitur. cuius quidem contra-
rium remedium quoniam solet esse vnio: se-
quitur igitur, vt prius percurramus, quid sit v-
nio. VNIO est coniunctio eorum, quæ dislo-
luta sunt, ad terminum vnum communē, re-
cte & conuenienter facta, vt ea quæ ab inui-
cem fuerunt separata, pristinae suæ vnitati re-
stituuntur. Ideo autem dicitur vnionem esse
coniunctionem, quod cōiunctio sit commu-
ne quoddam genus eorum omnium quæ, ab-
inui cem separata sunt & dispersa: a qua in vnū
communem locum reducuntur. Quoniam
vero coniuncta etiam esse dicuntur ea, quorū
extrema, seu termini, & limites simul sunt, &
mutuo se tangunt, ob id vt vnio seiungeretur
ab hoc vnionis modo, additum fuit, vnionem
esse

esse cōiunctionem eorum, quæ dissoluta sunt, ad terminum vnum communē: & hoc, quod necessarium sit ad hoc vt fiat vnio, non solum corporum dissolutorum extrema, & exitus simul coniungi, sed etiam simul coalescere & vniri, vt moles vna & cōtinua reddatur, e quorum contactu, coagmentatuque natura vna exeat, atque confundatur. Quoniam vero atigua continua euadere non possunt, nisi sint de natura coibili, nimirum quod tangat lapidem lignum, fieri tamen ligno continuatus quantauis ferruminatione nunquam poterit, quod alia de causa non prouenit, nisi ratione similitudinis partium, quæ inter se habent coalescere. Atque hoc est illud cur practici sorditiam intercidentem prius tollant, ab eaq; cauent, vtpote quæ vnionem impedit ad vnum communem terminum fiendam. Et quod sequitur: vnionem esse cōiunctionem eorum, quæ dissoluta sunt, ad terminum vnum communem, recte & conuenienter facta, vt ea quæ ab inuicem separata sunt, pristinae suæ vnitati restituantur, notat finem ipsius vnionis, atque artem recte & conuenienter assequendi finē illum: recte autem & conuenienter fiet, si aliqua vnionem antecedentia, & aliqua in fienda ipsa vnione, semper fuerint animaduersa. Id autem, quod in antecedentibus vnionem primo est animaduertendum, illud est, vt prius perpēdatur, nunquid causa, quæ solutionē cōtinui effecit, desierit, vel adhuc maneat. Nā ubi

Quæ requirantur ad vnionem.

Sordities vnionem impedit.

Ars curandi solutionē vnitatis, quando causa desit.

*Quādo cau-
sa efficiens
adhuc pra-
sens est.*

*Motus vni-
tatem im-
pedit.*

*Pulmonum
ulcera dif-
ficilissime sa-
nantur.*

desierit, primum sistendus erit sanguis, post
vero vt ait Gal. 5. meth. dissolutum vas aut ru-
ptione, aut resecratione, vniendum, illud con-
glutinando, vel obstruendo. Permanente ve-
ro adhuc efficiente causa, vtpote abundantia,
ea primo erit vacuanda: quod ea manente, so-
lutio vasis adhuc plus rumpatur, & magis con-
tinue resecetur: postea sanguis suppressendus,
dein solutio vnienda. Secundo, vt motus o-
mnis quam maxime fieri potest auferatur: vt-
pote qui vnitatem & coniunctionem extre-
marū impediat. qua ratione vlcera in pulmo-
ne curationem nequaquam admittūt, aut sal-
tem difficile admodum sanantur, 4. loc. aff. &
5. meth. vbi difficillima sanatu ait esse pulmo-
nis vlcera, vt quæ nec citra tussim expurgari
possint, & si tussim excites, laceres ac dissol-
uas, vt quasi per mutuas operas malum iis in
orbē redeat: & præterea quod præter id, quod
tussiendo lacerantur, respirando extra mouē-
tur: vt hac ratione 5. meth. concludat, vbi per-
ruptum in pulmone vas est (nisi protinus an-
tequam phlegmon excitetur, glutinatum sit)
id postea insanabile reddi: aut si aliquando cu-
rantur, relinquitur tamen in ipso res quædam
callosa, quæ tractu temporis leui quacumque
occasione expelli solet, 4. loc. aff. Quanquam
præter hæc difficillima sint sanatu pulmonum
ulcera, vtpote quod ea, quæ idonea vlceribus
medicamenta sunt, contingere vlcus, sicuti in
ventriculo, non possint, quæ per mediū inter-
uallum

97 tallum fere vim suam amittant. Quæ autem *Observanda*
 in ipsa vnione aduertenda sunt, huiusmodi *in vnione.*
 sunt: primum vt partium dissolutarum substā-
 tia conseruetur. conseruabitur autem iis, quæ
 modice exsiccant: secundo, vt caueamus, ne-
 quid labris vlceris intercidat, aut pilus, aut o-
 leum, aut aliquid aliud, quod naturam illam
 simul coibilē impediatur: tertio, quoniā omne
 contium attiguum etiam est, & partes quæ
 debent cōtinuari necesse est, vt prius inuicem
 se tangant, iubendum vt partes inuicem distā-
 tes manu blande applicentur, & vt applicitæ
 simul conseruentur, quod facere solent vin-
 culo, sutura, aut fibulis. Quod si vlcus non sit
 simplex, sed cauum, tunc non solum aggluti-
 nantibus, sed etiam gignentibus carnem erit
 opus. Quoniam vero in generatione carnis
 duplex gignitur excrementum, alterum tenue,
 a quo vlcus humidum redditur, & sanies ap-
 pellatur; alterū vero crassius, quod vlcus sor-
 didum reddit, & sordes dicitur, 3. meth. cap. 3.
 ideo pro vlcerum curatione indigemus siccā-
 tibus, & expurgantibus. Quod si sanguis vitio-
 sus ad partem vlcere affectam fluat, ita vt car-
 nis temperiem gignendæ nouæ carnis opificē
 corrumpat, sanguis ad contrarias partes erit
 reuellendus. Illud autem nō est ignorandum,
 quod si continui solutio in ossē contingeret, fra-
 ctura appellatur, etsi indicetur esse fiendam
 vnionem: si tamen in prouectioribus (quod in
 puerulis vnio fieri possit) os erit solutum, cum

1
2.

3.

Vlcus cauū.

4.
*In carnis
generatione
duplex ex-
crementū.*

5.

*Fractura
curatio.*

vnio sit impossibilis, vice vnionis alligatione partes solutas esse coniungendas, quod fit callo supernato, partes fractas circum alligante. Huiusmodi autem coniunctio ligaturis fiet, ex ligaturis a parte agra ad sanā allicietur succus faciens pro calli generatione. Qui succus cum debeat esse glutinosus, ut callus, qui habet esse veluti glutinum quoddam, partes simul coniungere possit: cumq; succus ex sanguine fiat, sanguis autem ex cibo, ob id corpus in calli generatione nutriendum erit alimento optimi succi, & renaci. Sed de fracturis plura forte quam locus iste postulet, de quibus vberius Gal. 6. meth. cap. 5. Nunc sequitur ut percurramus quomodo ij, qui praxim exercent, iis fere medicamentis innixi solutionem continui in quocunque membro curare soleant; veluti in dysenteria, quæ est vnitas soluta intestinorum, astringentibus vtuntur, & exsiccantibus, & quod fluxio alio sit transferranda, nec per affectū locum sit ducenda, vrinā mouētib; amplius, vbi opus erit, habentibus vim obtundendi humorum acrimoniā. Et quoniā, ut diximus, alterius naturæ materia intercideri non debet, si simul cōiungi volumus ea, quæ dissoluta sunt, ob id abstergentibus etiā vti solent, quæ interdum curandæ dysenterię sufficiunt. Sanari enim solent vlcera ex lotione bilis, vel mucci mordacis ab intestinis, q̄ fieri solet per iniectiones ex aquæ hordei libra vna, vitellis duobus, & sacchari rubri

*In dysente-
ria cura-
tione.
Astringen-
tia.*

*x siccantia
Diuretica.
Abstergen-
tia.*

rubri vn. vna. Sin autem vlcus est profundum *In dysente-*
 pus multum reiiciens, tergetur clysteri ex de- *ria quando*
 cocto furfuris frumenti, vel ligni guaiaci, vel *ulcus est*
 cicerum rubrorum, vel ex hydromellite, vel *profundum.*
 fero lactis caprini, vel lotio; vel si valētius vis,
 ex lixiuio, vel ex vino rubro subdulci tergēte,
 & roborāte, addēdo mellis rosati vnc. ij. Quo-
 niam vero adeo materia fluit, vt morfu cōtin- *Emplasti-*
 uo exulceret intestinorum superficiem, od id *ca.*
 emplasticis etiā vti solent, quasi rectorio quo-
 dam & crusta armantibus intestina; velut acci-
 piendo cum albumine ouorum, gummi ara-
 bici, adipis caprini, an. semunciam, olei rosari
 vncias duas, ne adeps cito concre scat, boli ar-
 meni, tragacanthi an. vnc. j. cum vnciis decem
 aquæ hordei, si lauandum, & tergendum, vel
 tantūdem iuris pinguis carniū, vbi vim em-
 plastīcam maiorem volunt, addito etiā buty-
 ro recēti insulso, & plantaginis succo. Ne au- *Detergētia.*
 tem acres materiæ lentore istorū retineantur,
 & intestinīs affigantur, post iniectiones em-
 plasticas, lauatorio vti solent, sicq; vicissim, vbi
 diligenter facta fuerit deterfio, natura carne
 implere, glutinare, & cicatrice tegere per se
 poterit, vel erit adiuuanda, vt illud promptius
 fiat, tunc cum materia mordax constiterit, &
 fluere cessauerit, solusq; sanguis fluere perse- *Sarcotica.*
 uerabit, sarcoticis, & glutinantibus, & cicatri-
 cē ducētibus iniectionibus, q̄ fiet ex libra vna
 decocti rosarū, balaustiorū, malicorū, oxia-
 canthæ, vuarū, gallarum, seminis coriādri, ad-

*Vlcera
intestini
tenuum,
crassorum
ac mediorū
ab aliis atq;
aliis magis
curantur.*

*Vlceris in
intestinis
gracilibus
curatio.*

dendo boli armeni, sanguinis draconis, terræ
lemniam, thuris an. dra. j. vel trocisc. e terra lem-
nia drac. ij. cum vitellis ouorum duorum. Vel
hoc modo, clysteribus siccantibus, & abster-
gentibus, veluti decocto lentium, rosarum,
balaustiorum, addendo bolum armenicum,
terram lemniam; non omissis tamen interea
tergentibus: illud semper aduertentes, quod
vbi vlcera erūt in tenuibus intestinis, ab epo-
tis medicamentis magis adiuuantur, s. meth.
& 6. loc. aff. & hoc, quod per sedem iniecta in-
tegris viribus non possint peruenire. Quæ ve-
ro in crassis existent, iis quæ per sedem iniici-
untur, quod magis propinqua sint. Vbi vero
in iis, quæ medio situ posita sunt, ambo requi-
runt, & quæ superne, & quæ inferne. Quapro-
pter vt manifestior fiat curandi ratio, exempla
proponemus. Igitur si in superioribus, & gra-
cilibus intestinis vlcus erit, syrupo vtendū erit
e mirto, & ribes, aut succo oxalidis, seu ex in-
fusione rosarum, aut incompletarum, & inte-
rim quoque aridarū parato, aut ex succo plan-
taginis, cum quibus adici poterit scrup. j. hu-
ius pulueris, qui recipit seminum rosarum,
oxalidis, plantaginis, portulacæ, an scrup. j. co-
rallorum rubeorum, cornu cerui vsti, an drac.
j. amili, dragacanthi an. drac. ss. poterit etiam
exhiberi puluis iste cum vetusto saccharo ro-
faceo, & vbi hæc non sufficient scrup. j. ex pa-
stillis de spodio, succino, seu terra lemnia cum
aliquo prædictorum syruporum: & stercus ca-
num

num sola ossa vorantium cum lacte calibeato *Stercus ca-*
 dysentericis maxime confert, Galen. 10. simpl. *num sola*
 semperque cauendum erit, quod omnium in- *ossa voran-*
 ternarum partium est indicatio, vt seu cibi, seu *tium.*
 medicamenta eligantur naturæ familiaria, fu-
 giantur contraria, 4. meth. Vnde a medicamē-
 tis, quæ ex opio, mandragora, nigro papauere
 fiunt, cauendū, nisi maxima necessitas vrgeat.
 In exulceratione autem crassorum intestino- *Stupefaci-*
 rum iis magis, quæ per sedem infunduntur: *entia in dy-*
 quanquam etiam si in eadem vtaris, quibus in *senteria fu-*
 tenuibus intestinis vtendum esse diximus, ni- *gienda.*
 hil nocebis: eandem tamen facultatem habe-
 re debent, astringendi scilicet, obtundendi, & *In intestino-*
 resiccandi, & vbi vlcera fuerint sordida, habē- *rum crasso-*
 tibus vim abstergēdi: initio sane hunc in mo- *rum exul-*
 dū: Ex aqua hordei torrefacti cū corticibus, *ceratione.*
 & iuris gall. seu pullorum salis expertis an. lib. *Abstergen-*
 β. vitellis ouorum numero duobus, olei rosa- *tia.*
 cei vnc. j. β. Et vbi pituitosi dysenterici fuerint, *Dysenteria*
 sacchari rubei, aut mellis rosacei vn. ij. fiat cly- *pituitosa.*
 ster. Vbi autem sanguinis copia profluet, poli- *Dysent. san-*
 goni, aut arnoglossæ succi vnc. ij. vel. iij. adice, *guinea.*
 aut asinini stercoreis præsertim in montibus
 nutriti, & astringētibus herbis, præsertim vbi
 stercus succo plantaginis fuerit madefactum,
 & expressum, deinde infusum. Vbi autem do-
 lor vehementer vrgebit, caprillum seuum, vt
 quod inter alia sit dysentericis utilissimum, q̃
 facilius concreseat, & intestinis iniungatur,
 plurimoque tempore inhareat, nec habeat

*Qua vlcere
curationem
impedians.*

*Astringen-
tia validio-
ra.*

*Stupefaci-
entia.*

*Vlcera de
pascentia
intestina.*

acrimoniam vt hircinum, Gal. i. 4. & ii. simp.
aut id vbi haberi non poterit, hircinus, vel an-
serinus, seu gallinaceus adeps prædicto clyste-
ri adiiciatur pondere vnc. j. aut ij. similiter au-
geatur oleum rosaceum omphacinum. Vitanda
tamen hæc erunt, veluti & ouorum vitelli,
quoad fieri poterit, vbi dolor non vrgebit, &
vlcere curationem impedian; aut saltem sit
exigua eorum quantitas. quo tempore etiam
cremoris orizæ, dragaganthi, aut gummi, aut
amili vnc. j. aut vnc. ss. permiscere poteris. Vbi
autem maiori egebis astrictione, & resicca-
tione, in dicta hordei aqua foliorum plantagi-
nis, poligoni, ac portulacæ pug. ss. decoques,
rosarum rubearum drac. iij. balauftiorum, hy-
pocistidis ana dra. ij. cui per colum transfuso
seui caprilli vnc. ss. olei rosacei vnc. j. sacchari
rubei vnc. ij. aut sacchari rosacei tantū-
dem, succi plantaginis, aut portulacæ vnc. j. ss.
miscero, & fiat clyster. Et vbi magis astringere
volueris, luti armeni, & sanguinis draconis a-
na. drac. j. adicies, vel tantundem pastillorum
de spodio, seu terra lemnia, aut succino. Sin
autem dolor magnopere vrgebit, stupefaciē-
tibus medicamentis vti poteris, & ea permis-
cere, quod tutius per sedē quā per os exhibeā-
tur, veluti philonii perfici drac. ss. aut scrup. ij.
aut catapotiorū de cinoglossa, seu eius, quod
Requies Nicolao appellatur. Vbi autē vlcera
intestina depascentur, inducentibus crustam
erit vtendum, de quibus Gal. 9. de comp. med.
per

per loca, quamuis, vbi depascantur præsertim tenuia intestina, paruum spem Aetius habeat. Admouenda etiam erunt ad extra ea, quæ eadem habeant intentiones, quâquam cataplasmata, fomenta, vnguenta, seu cerata haud magno opere probemus, potissimum vbi frigida, atq; astringentia fuerint: & hoc, quod quo magis cutim densaueris, eo magis fluxiones augebis, i. art. cur. ad Glau. Vbi autem vehementi urgente dolore, eis cogeris vti, sint nec facultate, nec actu admodum frigida, & addatur aliquid aceti, vt medicamentorum facultas altius ad intestina penetrare valeat; aut vini albi & tenuis modicum. Illud autem præter hæc omnia est aduertendum, lac quoq; præsertim in fluxionibus biliosis, vt leniantur, & descendant, præsertim bubulum, aut caprillum Alexandro, & Aetio valentissimum esse remediū, tepidum sane, recens mulctū, ac potatum, aut ad ignem decoctum, & assidue agitatū, donec ad tertias sit redactum, vel per silices fluuiales ignitos, & candentes ferri laminas in ipso extinctas coctū, spumam dū lac coquitur pingui, aut cochleari abiiciendo: quanquam etiam si cum biliosa fluxione associata sit febris, quæ urgeat, lac, cui quarta pars aquæ sit admixta simul coctum, ad dimidiā totius consumptionem nō verentur exhibere Aetius, & Alexander. Quod sane intelligendū erit post euacuationē, & vbi perseverabunt fluxiones biliosæ, ita vt habitū veluti colliquēt, ac vires cōsumāt.

Lactis præstantia in flux. biliosis.

Lac in febre cum fluxione biliosa quando exhibendum.

*Renum so-
luta vnitas.*

*Mictionis
cruenta cu-
ratio.*

*Cataplas-
mata.*

*In mictione
cruenta em-
plastrum.
Aetii.*

Sequitur soluta vnitas ipsorum renum (nam hepar, & lien perraro id pati solent) ad quam mictio cruenta sequi solet, seu sanguinis profluuium e renibus: quæ quidem seu per rupturam, seu per erosionem facta sit, remouenda est post diætam, quæ paucum sanguinis gignat & venæ sectionem in cubito in principio, syrupo mirtino, & de infusione rosarum siccarum, addendo drac. j. lapidis hæmatitis, aut boli armeni præparati, pauco aceto addito. Et vbi hæc non suffecerint, drac. j. ex pastillis de spodio, seu terræ lemnæ. Extrinsecus autem imponentes ea, quæ ad sanguinis reiectionem periputum ascribentur, quæque vna cum eo quod astringunt, & resiccant, & robur addere possint, hunc in modum: Ex foliorum mirti, rubi, & quercus an. m. ß malicorii, & balaustiorum an. drac. iij. farinæ hordei pug. j. olei rosati vnc. ij. cum posca fiat cataplasma. aut hoc modo: Ex palmularum in vino astringenti, aut posca decoctarum vn. iij. foliorum plâtaginis m. j. gummi, tragacanthæ, & succi semperuiui vn. j. aluminis, acaciæ, hypocistidis an. drac. ij. olei mirtini, & rosacei an. vnc. j. ß. farinæ hordei p. ß. fiat cataplasma. Loci vero circa renes spongiis posca imbutis, irrigandi erunt, aut linteis cum rosaceo, & aceto, posthæc vnguentis, emplastris, & reliquis medicamentis, cap. de cruenta spuitione descriptis. Et hoc emplastro ex Aetio o-
pimo: Ex ceræ vnc. j. ß. vitellorum ouorum numero ij. palmarum numero x. croci drac. j. aceti,

B

aceti, & rosacei quantum sufficit, misce, & fiat
emplastrum. Renum itidem in exulceratione *In renum
exulcera-
tione.*
post euacuationem humorum vitiosorū vo-
mitu præsertim factam, post acrium humorū *Abstergen-
tia.*
obtusionem, abstergentibus ad vlcera purgā-
da vti solent, veluti potu aquæ mulsæ, aut de-
cocto fœnugræci cum melle, aut maluæ, aut
melonum semine cū hydromellite, lacte præ-
terea cum melle recens mulcto, & calido po-
tu exhibito, quod vlcera mire purgare potest.
Amplius serum caprinum, decoctum hordei, *Vlceris pur-
gati signa.*
vuarum passarum, & glycyrrhizæ: ab his, vbi
purgata fuerint vlcera (quod cōiicitur ex pu-
re excreto non fœculento, sed subalbo, leni,
æquali, & pauco) ad resiccantia, astringentia,
& glutinantia medicamēta est transeundum,
veluti bolo armenia, gummi, tragacantha, a-
milo, terra lemnia, & huiusmodi aliis, in hunc
modum: Terræ lemnia, boli armeni, vtriusq;
drac. j. β. tragacanthi, spodii vsti ana drac. j. ami-
li, nucum pinearum tostarum an. drac. β. semi-
num lini, melonum an. drach. ij. seminis apii
scrup. ij. conterantur singula, & in puluerem
reducta dentur quotidie drachmæ duæ cū la-
cte recens mulcto. Extrinsecus etiam admo-
uentes ea, quæ habent vim exsiccandi, ac ro- *Topica.*
borandi, emplastra, cerata, vnguenta ex oleis
rosaceo, mirtino, farina hordei, thure, masti-
ce, rosis purpureis, & similibus composita. Vt
autem res clarius elucescat, formulis illustra-
bitur. Vbi igitur vlcus non fuerit ex succis vi-

*Vlcera ex
vitiosis suc-
cis acribus
& non acri-
bus.*

*Lac asininū
& equinū
in vlcerib.
& pure op-
timum.*

*Vlceris mū-
dasi signa.*

tiosis acribus, aqua mulsa exhibenda erit in potu; vbi autem fuerit ex acribus humoribus, prius erunt purgandi, postea iis vtendum, quæ vlcera purgant, inter quæ magnopere conducit lac asininum potissimū, aut equinum, præsertim cum melle, quod calidū sit, recēs multum, animali in ægri domum adducto: quod non solum vlcerum renum, sed aliorum etiā internorum vlcerum est optimum pharmacum, & graui puri maxime amicum: & aquæ mulsæ aquosæ potio, & cremor ptisanæ cum modico melle, aut melonum semen cum eadem aqua mulsa, & graminis decocto: aut decoctum parantes ex hordeo cum corticibus torrefacto, adianto, ac glycyrrhiza. Cuius vnc. iij. cum vnc. j. s. seminis melonū præbeas. Et enim iis medicamentis vrinam ducentia sunt semper adiungēda a situ, & figura partis laborantis indicatione sumta in renum, & vesiçæ vitiis Gal. 4. meth. Pastilli quoque ex melonū, seu cucumeris semine, ac maluarum, & halicacabi, cum abrafa radice glycyrrhizæ, ac tragacantho, ac vua passa, & saccharo conficias, quorum vnum, vel duos vice qualibet cū prædicto decocto, seu aquosâ aqua mulsa dabis. Vbi postea vlcera fuerint mūda, quod erit tūc, vbi neque tectorium vlcerei obductum cū vrinis excretum apparebit, neque pus excretum erit fœculentum, sed subalbum, lene, & aquale, & paucum, tunc ad exsiccantia, astringentia, & cogentia, & vrinam ducentia tū alimen-
ta,

ta, tunc medicamenta erit transeundum. Quo
 in casu exhibet Paul. bolum armenū, aut feru-
 larum combustarū cinerem quantum tribus
 digitis comprahendi potest, ex passo. cuiusli-
 bet autem eorum exhiberi poterit drachma
 vna cum aqua mulsā, aut lacte: extrinsecus ve-
 ro utēdum erit iis, quæ renes exsiccare, ac ro-
 borare possunt, veluti vnguentis, ceratis, cata-
 plasmatibus, seu emplastris, ex oleo mirtino, ci-
 toniorum, rosaceo, & masticino, poligoni,
 seu plantaginis succo, mastice, thuris cortice,
 bolo armena, sandalis, hordacea seu fabacea
 99 farina, ouorum albumine, cera & aceto, &
 huiusmodi confectis, de quibus in vesicæ vl-
 cere mentionem faciemus. Sequitur vesicæ *In exulce-*
 exulceratio, in cuius curatione (præter ratio- *ratione ve-*
 nem viuendi, quæ eadem debet esse cum *sica.*
 renum exulceratione) maximum remedium
 erit lactis potus, quod asperitates leniat, vlce-
 rationes eluat, & malum extergat, medica-
 mentis semper urinæ acredinem obtunden-
 tes, & prohibentes ne gignatur acris, sordi-
 ticum vlcus eluentes medicamentis expur-
 gandi & abstergendi facultatem obtinenti-
 bus, veluti mulsā dilutissima, vel lacte cum
 paululo mellis, acrimoniam & mordacita-
 tem depellentes, lacte recens mulcto cum
 optimo amilo infuso, aut pompholige pluri-
 bus aquis elota & exsiccata, atq; subinde cum
 lacte diluta. Si vlcus pascēdo serpat, per cathe- *Vesica vl-*
 terē in vesicā sunt iniiciēda quæ depastionem *cus:*

*Lac asini
num & ca
prillum lau
datum in
exulcera
tione vesi
ca.*

*In vesica
ulceribus
sordidis.*

*In exulcera
tione de pa
stionem si
stentia.*

sistere possunt, veluti acacia, hypocistis, terra
lemnia, bolus armenia, & huiusmodi. Post
modum expurgatum vlcus simul vnire qua
runt iis, quae cicatricem inducunt, quod effi
cientur per infessus astringentes, tum per
eiusdem facultatis emplastra, fomenta, & irri
gationes. Illud autem aduertendum pro ex
ulcerationis vesicae curatione, cum superius
laudauimus potu lactis asini, praecipue, aut
caprilli, esse laudatum, cum quo mellis rosacei
paululum adici poterit. In vesicam quoque
nulla dilutissima erit infundenda, vel ipsum
met lac cum paulo mellis, aut cum cucumeris
semine, seu candido oui liquore, cum pompho
lige, vel similitum medicaminum aliquo, vel
decocto ex hordeo non decorticato, plantagi
nis folijs, ac radice glycyrrhizae, admiscendo
parum mellis, aut mellis rosati: & ubi acrimo
nia consequetur, optimum amilum erit adden
dum, aut seminis althaeae, maluarum, cucume
ris, vel seminis acetici cremor: interim etiam semi
nis papaueris. Et ubi eadem vlcera sordida fu
erint, magis quae repurgandi vim habet phar
maca erunt infundenda, augendaque mellis
erit, aut mellis rosati quantitas. Mordacitatis
etiam tempore instante in intestina quoque
per sedem pitanae succus erit infundendus, &
seminis lini succus, & cucumeris semine decor
ticatum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad sin
gula instillato. Et ubi exulceratio pascendo ser
pet, subastringentibus medicamentis extra ad
hibitis

hibitis erit vtendum , atque iis quidem actu
 calidis , vt ob calorem partes circumdolitan-
 tes leniendo iuuentur : ob ipsorum autem fa-
 cultatem vicinos locos exulcerationem depa-
 scere prohibeant, veluti vua passa, palmae, gal-
 lae, malicorium, alumē, acacia, hypocistis. Re-
 purgatis autem vlceribus , tentandum erit vt
 cicatrix perducatur, idque per infessus astringen-
 tes , & eiusdem facultatis epithemata : in
 quem vsum emplastrum ex ouis, hordeo vsto,
 & cadmia tripla eorum parte , cū cerato mir-
 reo , aut rosaceo contemperata commode su-
 perponetur. Nec minus confert , si medica-
 mentum ex amilo sarcocolla , & cerussa, pau-
 xillo oleo rosaceo & cera additis, & cum lacte
 dissolutum iniiciatur in vesicam : generosius-
 que euadet si plumbum vstum , ac thuris cor-
 ticem adicias. Sequitur vnitatis dissolutio in
 vtero. Vlcus igitur vteri & ipsum prius si cum
 inflammatione aderit, venae sectione facta , me-
 dicandum erit , si corpus vitiosis humoribus
 erit redundans, repressione defluxus humo-
 rum vtendum, veluti succo portulacae , plan-
 taginis, &c. sorditiem vlcis expurgando pri-
 sae cremore cum melle, mulla , cū decocto
 radice iridis, aristolochiae, absinthii, aut agri-
 moniae: in vlcere sane cōspicuo iis illiniēdo, in
 profundo vero per mentrechitas infundēdo,
 vlceribus probe expurgatis , cicatricem indu-
 centibus, veluti est decoctio rosarum , malo-
 rum cotoneorum, rubi, mirti, rinois , acaciae,

*Cicatricem
 inducentia
 in vlcere
 vesicae.*

*Vteri vlcus
 cum inflam-
 matione.*

*Sordium
 purgatio.*

Hh

*Mensium
fluxus ab
erosione ve-
narum v-
teri.*

*Sarcotica
in eroso va-
se paruo &
ampliore.*

*Vteri vlcus
superficiariū
& profun-
dum.*

hypocistidis ex vino astringente, & aliis supe-
rius enarratis, vt autem res ipsa clarior fiat, ad-
uertendum erit quod si solutio continui talis
erit, veluti est erosio venarum vteri, a qua flu-
xio mensium prodire solet, prius purgato cor-
pore a vitiosis humoribus, aut biliosis, aut pi-
tuitosis salsis, ne augeant erosionem, per re-
nutritionem erosorum erit curāda. Quod fiet
per cibos boni succi, & medicamenta sarcoti-
ca dicta, hoc est, carnem gignētia, 7. de comp.
med. per loca. Quare non solum plantaginis
succus ciathi mensura iniiciendus erit, sed ali-
ud etiam, paruo quidem existente vase, vnde
profluit sanguis, addendum erit vt aloē, man-
na, thuris cortex, pinus, terra lemnia, lapis hæ-
matites: magno vero & ampliori existente,
balaustio, acacia, hypocistide, gallis, malico-
rio, & similibus res agenda erit, & tandē quæ
mediocriter, & sine morfu detergant, atq; ex-
siccant, cōmoda sunt, vt quæ carnem gignant,
3. meth. & 2. de comp. med. per genera. In vteri
autē exulceratione perpendendū erit an pura
sit, an impura: & si impura an sit associata cū a-
lio morbo, veluti cū inflāmatione, aut cū sor-
de. Purum igitur vlcus aut erit superficiariū, id
est, conspicuum, aut profundum. Vtrumque
leniter astringentibus atque exsiccātibus me-
dicamentis erit tollendum, sed conspicuum
illinitione, profundum vero infusione per in-
strumentum, rosacei, aut tetrapharmaci cum
butyro recenti, ac rosaceo: elotione locorum
cum

cum decocto rosarum aut lentiū, aut ptisanæ, *Vteri vlcus*
 seu plantaginis succo. Si associatum erit cum *cum inflama-*
 inflammatione, tollenda erit prius inflamma- *matione.*
 tio. Sin autem vlcus erit sordidum, detergen- *In vlcere*
 tibus medicamentis erit vtendum, veluti ptisanæ *sordido de-*
 cremore cum melle vel mulla, in qua fœ- *tergentia.*
 nugrēcū sit decoctū, aut malua, aut furfures:
 & vbi valentior abstergentia requiret, mar-
 rubio, vel melli adiuncta erui farina, vel iris,
 quæ etiam extrinsecus ex mulla macerata illi-
 niuntur. Vbi vero vlcus depascetur, valentio- *Vlcus de-*
 ribus astringentibus erit vtendū, veluti bacca- *pascens.*
 rum mirti, palmularum, lentium, & malicorii
 decocti infusione, & fomentis, & infessionib.
 ex aqua mulla, in qua absinthium, marrubiū,
 erium, aut lentes sint decoctæ: & loci eluātur
 ptisanæ succo addito melle, & rosaceo. Vbi au- *Vlcus effe-*
 tem vlcus non solum depascens, sed efferatū *ratum.*
 quodammodo erit, eluendū erit equino, aut
 asinino lacte recens mulcto, & in vtriusq; pe-
 nuria, quodcunq; haberi poterit, erit accipiē-
 dum recens coctum, duabus lactis heminis,
 mellis heminam dimidiam addendo, & drac.
 iiij. iridis inspergēdo, & tale infusum calidum
 sæpe infundēdo. & vbi, quod fuit infusum, erit
 excretū, loci protinus malua decocto eluan-
 tur, dein pessus subdatur ex farina erui, & iri-
 dis an. dra. ij. cum melle subactis, aut etiā farinā
 lentium cū melle subdes. Cohibita depascētia
 ac efferitate, his postea vtendū erit, quæ ad vl-
 cera repurgata diximus esse adhibenda, tandē-

*Vnguentum
cicatricem
inducens.*

*Soluta uni-
tas in pe-
ctore.*

*In spūto san-
guinis a ve-
na aperta
electuariū*

*A vena
rassa.*

que ad ea, quæ ad cicatricem perducunt, erit accedendum: primum mitioribus, dein efficacioribus etiam de foris adhibitis: abdomini videlicet & coxis, quod emplastrorum, & cataplasmatum facultas per latentes meatus traducatur, ut ait Paulus. Quare hoc vnguento erit utendum: Ex tutiæ ablutæ partibus duabus, litargyrii, cerussæ, & sarcocollæ ana parte vna, cum oleo rosaceo, & cera fiat vnguentum. Poterit etiam addi croci parum, quandoq; vero plumbum vsum, & pro rosaceo melinū, aut mirteum admiscendum. Sequitur pectus, cuius quidem pectoris venæ ubi fuerint apertæ, aut fractæ, & disruptæ, aut corrosæ, ad quas dissolutiones sputū sanguinis sequi solet, ubi vena erit aperta, huiusmodi electuario erit curanda (cauentes semper ab iis quæ exasperet, ne tussim excitent) velut ex sacchari rosacei antiqui vnc. ij. corallorum rubeorum, hypocistidis an. dra. j. cum syrupo rosato fiat electuarium, saccharo quidem rosaceo vtentes tanquam materia ad scopum & ipsa faciente. Infrigidando. n. & leniter astringendo foraminū apertionem reliqua medicamenta emendat. Sin autem vena fuerit fracta, tunc erit utendū non solum astringentibus partes solutas ut simul tangantur, sed etiam iis, quæ habeant vim inuiscandi & conglutinandi: veluti prædictis ad apertam venam enarratis, addentes radicis consolida maioris coctæ sub cineribus, & dimissæ per cribrum vnc. j. ad agglutinandum, & inuisc-

inuiscandum partes solutas. Vbi autem vena *Avena cor-*
 erit corrofa, præter astringentia partes in vnũ *rosa.*
 diuulsas, præter agglutinantia partes addentes
 etiam ea, quæ habent vim aggenerandi carniẽ, *Sarcotica.*
 veluti superius enarrato electuario addentes
 ireos, thuris an. drac. j. iubentes vt huiusmodi
 electuarium in ore teneant, vt paulatim per
 foramina tracheæ arteriæ pertranscat vel ad
 pulmones, vel ad pectus. Extrinsecus eodem
 modo thoracem ex vino astringente, oleisque
 rosaceo, cotoneorum, aut mirtino inungen- *Vnguentum*
 tes, vel vnguentum efficientes, adiectione in
 prædictis oleis boli armeni, terræ lemnia, co- *Cataplas-*
 rallorum rubeorum: vel cataplasma adhiben- *ma.*
 tes ex palmulis, acacia, cortice mali granati, &
 lentium farina: vel ceratum, illud semper ad- *Ceratum.*
 uertentes, ne huiusmodi astringentia admo-
 ueantur, nisi facta alio prius auersione, & hoc,
 ne sanguinem intro compellerent. Amplius *In ruptura*
 in huiusmodi solutione venarum pectoris il- *venarum*
 lud aduertentes, vt mox facta vasorum ruptu- *dua obser-*
 ra simul concreseat, priusquam inflammatio *uationes.*
 illamprehendat: & hoc, quod vbi inflamma-
 tio præuenit, parum amplius sit sperandum de
 vulneris conglutinatione, quippe quod inflā-
 matio in multos dies extendatur, ac post solu-
 tam inflammationem cluere oporteat tū pus,
 tum seorsum sanguinẽ ipsius visceris. Sed de
 his vberius agemus in curatione symptomatũ
 excrementorum immuratorum, videlicet in
 sanguinis reiectione, seu sputo cruenta. At vl-

*Pulmonis
vltus.
Tabes ex
ulcere pul-
monis diffi-
cilime sana-
tur.*

*Lac est op-
timum me-
dicamentū
& alimen-
tum.*

*Lactis emē-
datio.*

cus pulmonis, ad quod tabes sequi solet, et si Galeno difficillimū sit sanatu, præsertim post excitatam phlegmonem, ex 5. meth. tribus rationibus, tum quod pulmones respirādo semper moueantur, tum quod citra tussim expurgari non possint, tum ratione viæ, quæ cum longinquior sit, medicamēta vim suam amittere cogantur: vbi tamen tentabitur curatio, iis potissimum erit vtendum: lacte primum, eoque muliebri, quod præ cæteris magis laudatur tanquam naturæ nostræ magis simile, ex vberibus more infantium sumto, ex 7. metho. aut saltem mulcto calente: aut si nō muliebri, saltem asinino: & post hoc bubulo aut caprillo. Lac enim inter omnia optimū esse cense-
tur, quod non solum rationem medicamenti optimi, sed etiam optimi nutrimenti secū gerat. Optimum enim est medicamentum, 3. alimētorum, ratione qua detergit, & vlcera repurgat serola sua substantia, calcosa vero consolidat, optimum etiam est alimentum, 5. & 7. meth. eo quod omniū quæ mandimus sit optimi succi, ac multi alimenti, 3. de alimentis, promteque cōcoquitur, ac distribuitur, quibus alimēti rationibus omnibus indigemus, etiam quod ad vltus pulmonis sequi soleat tabes, & vniuersi corporis arefactio, quod etiam laudatum fuerat ante per secula multa ab Hippocrate 5. aph. 64. Quare lacte erit vtendum vnc. iij. vel. iiij. pro vice. & vbi timebimus ne in ventriculo cogatur, mellis tepidi parum, aut sacchari,

sacchari, aut mellis rosacei miscebimus, præsertim in lacte caprillo periculoso sine melle sumto, lib. de cib. boni & mali succi. Vno in casu solū cauendū erit a lactis vsu, vbi scilicet valida febris agitabuntur, ex Hip. s. aph. 64. Tūc enim ptisana, aut eius cremore erit vtendum. multa etiam vtitur Aetius, quæ, quia dubia est, omitti potest. Medicari vero pulmonis vlceribus oportet eo apparatu, vt facile sursum efferrantur humores, adhibendo curam ne alii cōgregentur, in quem vsus est aqua multa per se, & cum amilo, aut iride, & radice dulci in ea decoctis, vel hyssopo, seu marrubio, & syrupo de glycyrrhiza, aut hyssopo, aut marrubio, quibus syrupis mellis rosacei parū admiscebimus: illud aduertentes, huiusmodi medicamenta humida, facta pro vlcere curatione ægro supino cubanti esse exhibenda, eaq; ore contineri debere, paulatimq; permittendū vt in asperā arteriā, & per eā ad pulmonē illabatur, & pectus. Vbi autē febris obstiterit, neque vti possumus huiusmodi medicamentis, aqua hordei erit vtendū, vel hoc elegmate hoc modo formato: Ex elegmatis e pulmone vulpis, & e pino ana drac. j. syrupi mirtini, de hyssopo, mellis rosacei, syrupi e glycyrrhiza an. vnc. j. s. boli armeni, terræ lemnæ, & lapidis hæmatitis an. scr. j. radicis simphyti dr. ij. diatragacathidra. ij. misce & fiat elegma, q̄ paulatim delingatur. Nec minus confert saccharū rosaceum læpius exhibitū per se, aut cū ptisanæ cremore.

*Lact in febre
valida sibi
giendum.*

*Pulmonum
ulceris cu-
ratio.*

*Observan-
dum.*

*In vlcere
pulmonis
cum febre
elegma.*

*Vlceris ex-
siccatio cum
the & ea vel
mihrid.*

*Cataplas-
ma.*

Cerata.

Epithema.

*Solutio con-
tinui partiū
capitis.
Vlceris na-
rium diffici-
lis est cura-
tio.*

Et pro vlceris exsiccatione, valida nō existen-
te febre, proderit per interualla exhibere mi-
thridatum aut theriacam, 4. loc. aff. His enim
vrentes medicamētis, saltim illud acquirimus,
quod vlcus non vltra progreditur, nec maius
fit, sed siccatum, ac ceu callo duratum longio-
ri vita facit vt agri vti possint. Extrinsecus vero
in principio, vbi conquieuerit malum, cata-
plasmate vtendum erit ex althææ foliis tritis,
semine lini, & tenuissimo polline, quæ cum
decoctione scænuigræci & althææ, vel maluæ,
oleo ac melle admisceantur, processu tempo-
ris ad cerata pertranseunt ex butyro, oleo
laurino, ac cera apparata. Tempore autem re-
purgationis epithemate ex terebinthina, oleo
irino, aut laurino, butyro, aut medulla cerui-
na, adipe taurino, iridisque farina, & æsipo æ-
qualibus omnibus partibus simul commixtis,
& tempore quo cicatrix obducetur thoracem
inungendo oleo mirtino, aut rosaceo, adiectis
alumine, acacia, malicorio, hypocistide, galla,
& rhoe obsoniorum, semper tussi prospicien-
tes: vbi grauius affliget thymo trito, & hyssopo
cum succo radicis dulcis ac melle cocto ex-
ceptis, quæ sub lingua contineantur. Sequitur
cōtinui dissolutio in capite, seu earum partiū,
quæ circa caput reperiuntur: veluti est vlcus
narium, & vlcus oculorum. Narium quidem
vlcera sunt curatu difficilia, putredinosa, gra-
uiterque olentia, quæ ozena græcis dicuntur. I-
gitur post repressionem defluxus vitiatorum
humorum

humorum acrium ad nares fluentium (quæ
capitis siccatione, & corroboratione fiet Gal.
3. de comp. med. per loca tonso capiti, assidue
que perfricato, medicamentis sincipiti im-
positis vim habentibus siccandi & firmandi, oleo
scilicet mirtino, rosarum, puluere corallorū,
sandalorum, rosarum rubearum siccarum, de
quibus in intemperie capitis) ad nasi curatio-
nem erit accedendum : quod fiet & medica-
101 mentis habentibus vim exsiccandi, repellēdi,
& discutiendi, veluti melle cum exiguo resinę
terebinthinę, specillo lana inuoluto, aut spiri-
tu succus erit per nares attrahendus. In puro
autem vlcere, licio ex vino diluto, aut mēthę,
seu marrubii succo cum melle, inuoluendo
lana specillum, illudque in medicamento in-
tingendo. Galenus vero Archigenis auctori-
tate, calaminthę succum naribus infundit; aut
ipsammet aridam calamintham per fistulam
insufflandam. Existente autem veteri vlcere
hoc medicamento ex Oribasio erit vtendum:
Ex spumę argenti, & cerussę drac. 6. myrrhę,
aloes, singulorū drachmis ij. gallarū drachma
vna; vino, & mirteo oleo dilutis vtere non so-
lum ad nariū vlcera, sed & ad sedis vlcera, & ri-
mas. At vlcus oculorum, eadem secūdum ge-
nus curatione erit restituendū, vt ait Galenus
4. de comp. med. per loca, quanquam ob par-
tis naturam quam tenuissima medicamenta
sint adhibenda. Quare facta auersione, & pur-
gatione, considerandum erit vtrum vlcus sit

*In narium
vlcere puro.*

*In veteri
medicamē-
tum Ori-
basii.*

*Ad sedis
vlcera.*

*Oculorum
vltus cum
inflammatione.*

*Vlcus im-
purum &
sordidum.*

*Collirium
ex thure.*

*Cicatricem
inducentia.*

purum, an impurum: & si impurum, aut cum
sorde, aut cum inflammatione associatum. I-
gitur si cum inflammatione erit associatum,
medicamentis erit vtendum, quæ inflamma-
tionem concoquere, & lenire possint, non
neglecta vlcus curatione. Vtrique autem sa-
tisfaciet collirium albū muliebri lacte disso-
lutum, quod instilletur cum oui albumine,
aut cataplasmate, ex Actio; ex ouo simul cum
eius vitello, cum rosaceo, & vino leuiter tepe-
facto, & lana excepto leuiter imponendo. Vl-
cus autē impurū ratione sorditiei nulla me-
diocriter diluta, & fœnugræci decocto erit
tollenda: multa vero existente sorde, ad fœ-
nugræci succum parum mellis erit addendū:
semper aduertentes vt fœnugræcum exactissi-
me purgetur, sæpe abluendo pura aqua dulci.
Vlcere facto puro, a fœnugræci succo erit ab-
stinendum, & collirio ex thure, quod vim ob-
tinet glutinandi, ac incarnandi, erit vtendum,
quod accipit ammoniaci, sarcocollæ ana. drac.
ß. thuris drac. decem, croci drach. ij. omnia le-
uigata, ac fœnugræci succo excepta, in colliria
digerantur. Vlceribus incarnatis, & ad plani-
tiem quasi reductis, transeundum ad ea colli-
ria, quæ cicatricem ducunt, veluti pompholi-
gis clotæ drach. iij. plumbi vsti drach. ij. croci
drac. vna, squammæ æris drac. ij. gummi drac.
iij. omnia leuigata, & aqua pluuiali excepta di-
gerantur in colliria. Sequitur quartum morbi
genus, quod inflammatio, seu morbus com-
positus

positus (eo quod ex miscella aliorum morborum ortum trahat) appellatur. Quæ quidem inflammatio vbi in stomacho erit, recte, & conuenienter depelletur, si non solum morbi, sed etiam loci affecti habebitur ratio: & hoc, quod ratione loci affecti, cum in numero sit earum partium, quarum munus toti corpori ex usu est, hac ratione non solum in principio inflammationis, sed & in fine, seu declinatione astringentibus erit opus, Gal. 13. meth. Quare in principio ex 13. metho. astringentibus aut solis, aut laxantia superantibus erit vtendum; veluti oleo omphacino, rosaceo, citoniorum, vel etiam de absinthio, præsertim vbi valida non fuerit inflammatio, aut feruor ingens: vel ex rosis, & absinthii parte vna florum, camomillæ, radicum, ac foliorum althææ parte media, in aqua pluuiali factò decocto, & pauco aceto, & vino albo aquoso addito, factis epithematibus: aut ex olei rosacci, omphacini, mastiacini, & de absinthio ana vnc. j. camomellini, & amygdalarum dulcium ana vnc. j. puluere sandalorum, corallorum rubeorum, & rosarum rubearum ana drach. ij. ceræ quantum sufficit, modicoque vino albo. aut aceto addito factò vnguento: aut vbi affectus maiora astringentia postulabit, ænanthe, hypocistide, balauftio, rhu obloniorum, floribus rosarum, ac reliquis ventriculorum refrigerando, tum roborando idoneis. In augmento autem, aut summo vigore

IIII.
Morborum
generis
curatio.
In inflam-
matione
ventriculi.

Astringen-
tia.

Epithema-
ta.

Vnguentum

*In inflam-
mationis
ventriculi
augmento.*

*Declinatio-
ne.*

*In iecoris
inflammatione ad
mittuntur
purgantia.*

*Scirrhusa
inflammatione
ventriculi.*

inflammationis, prædictis astringentibus laxantia miscenda, vel augenda: veluti camomellum, althæam, semen lini, melilotum, fœnum-græcum, adipem anserinum, gallinaceū, oleū camomellinum, anethinum, liliaceum, amygdalinum. Ex quorum commixtione varia pro varietate expostulantis vsus, varia tum epithe-mata, tum cataplasmata, tum etiam vnguenta fieri poterunt. In declinatione autem inflammationis purgatio præberi poterit; cum etiam in iocinoris inflammatione, vbi cauum eius afficitur, purgantia medicamenta, modo valentiora non sint, exhibenda esse concedat Galenus: Quinimmo etiam medicamēta valentiora, cum ptisana permixta approbat; veluti filiculam, & corticem nigri veratri, ex 13. met. (nam in principio, vbi phlegmon ventriculū, aut intestina occupare incipit, a medicamento per aluum deiciente est cauendum, quod longissime a tentata fluxione parte, quod redundat reuellere, nequaquam autem ad eam conueniat trahere, ex Gal. 13. meth.) Illud autem est sciendum, quod vbi moderata inflammatio fuerit, etiam Galeni ceratum sufficiens erit, cuius descriptio habetur 8. meth. Et vbi stomachus magis corroborari postulabit, aloë augere conueniet, admiscereque cum eo aut succum absinthii, aut cœnanten, aut succū capreolorum vitis. Tandem vbi aliquid scirrhusi ab inflammatione relictum fuerit, ita vt emollientia requirat, corroborantia etiam, ac astringentia,

astringentia, Tralliano, erunt commiscenda. *In inflam-*
 Sequitur inflammatio iecoris, in qua, remota *matione ie-*
 prius causa, quæ phlegmonem excitabit, aut *coris vena*
 sit calor ipsi⁹ iecoris, aut eius dolor, ex 13. met. *sectio.*
 & facta euacuatione simul & reuulsione fluē-
 tis, & augentis inflammationem sanguinis ex
 interna dextri cubiti, quod e directo sit, & am-
 pla via cum vena, quæ caua dicitur, societatem
 habeat, etiam hac non apparente, media: &
 vbi neque hæc apparuerit, humerali ex Gal.
 13. meth. ad alterantia erit accedendum topi- *Alterantia*
 ca; quæ non adhibebimus priusquam corpus *topica.*
 vniuersum ab excrementis fuerit liberū, quod
 est commune omnium inflammationum: in
 quorum adhibitione hæc duo perpetuo erūt
 obseruanda: primum ne frigida adhibeantur, *Obseruatio.*
 etiam si inter initia simus, alias plus noxæ quā
 vtilitatis essent: secundo, vt semper astringen-
 tia secum habeant admixta. & si amplius inflā-
 matio non esset in principio, nec repulsione
 eius, quod influit, indigeremus; & hoc, quod
 cum sit principium nutritis facultatis, eius ro-
 bur sit seruandum, 13. metho. Quare illinietur
 extrinsecus in hepatis regione, oleo rosaceo,
 aut melino, aut absinthite, & procedere tem-
 pore oleo rosaceo, seu cidoniorum, cum ma-
 sticino, camomellino cum pauco aceto, aut
 vino albo, sumta a situ visceris indicatione: vel *Epithema-*
 huiusmodi epithematibus: Ex rosarū rubea- *ta.*
 rum, soliorum plātaginis, & cichorii, seu hor-
 tulanæ endiuæ ana pug. j. florum camomelli,

*In inflam-
matione
gibbae partis
iecoris.*

*In caua
partis in-
flammati-
one.*

*Inflamma-
tionis sup-
puratio.*

*Scirrhus ex
inflam-
matione iecoris*

meliloti, absinthii, & anethi ana pug. β. bul-
liant in aqua pluuiali, demum adde succi ci-
chorii, & endiuiae ana lib. j. aceti vnc. ij. misce,
& fiant epithemata. Ex quibus etiam cerata,
& emplastra fieri poterunt. Dein illud per-
petuo obseruantes, vt in tantum relaxantia,
seu digerentia vires praesidiorum astringen-
tium vincant, quantum inflammatio ab eius
principio recedet. Tempore autē procedēte, ¹⁰
vbi inflammatio coquetur, quae in gibba visceris
consistat, modice vrinas mouentibus erit vtē-
dū, aslaro, nardo celtica, petroselino, meo, ex
Galeno: insuper & oxymellite, & syrupo de bi-
zantiis, de trib. radicibus, ac de eupatorio. Vbi
vero in cauo existet, & tempus processerit,
per ventrem erunt vacuandi 13. meth. clysteri.
& vbi per clysterē curari non poterit, purgan-
te medicamento cibis admixto, ex Gal. 13. met.
Vbi autem inflammatio ad suppurationē ver-
tatur, adiuuanda erit natura, vt quam celerri-
me puris generatio fiat, & facta suppuratione,
abscessus ruptura erit adiuuanda: & post eius
rupturam, per eandem viam pus erit ducen-
dum, per quam videbimus a natura transnit-
ti, aut per ledem, aut os, aut vrinam: Quod si
in scirrhi naturā vertetur, hoc modo erit tol-
lendus. In potu quidem seu intra ea erunt ex-
hibenda, quae diximus exhiberi debere ad li-
berandas iecoris obstructions: atque ea o-
minia, quae in renibus contentos lapides com-
minuere possunt, admiscendo illis ea, quae vri-
nam

nam ducere possunt, 2. ad Glau. Illud semper
aduertentes, quod vbi multo sanguine corpus
abundarit, secetur interna dexteri cubiti, aut
si melancholico, aut pituitoso, prius purgetur,
postmodum his topicis erit vtendū, quæ pos-
sint abstergere humorem, qui in viscere con-
tinetur, aperire, quæque habeant admixtam
vim eorum, quæ habent facultatem inciden-
di, 2. ad Glau. & 14. merh. Veluti in hunc modū:
Ex absinthii pug. β. foliorum, & radicū althææ
an. manip. j. bulliant in oleo communi, quo
super hepar per spōgias sæpe admoueatur fo-
mentum. dein recipe olei de absinthio, & ma-
stici ana vnc. j. nardini, & citoniorum ana vnc.
β. spicæ nardi indicæ, vel celticæ an. drac. β. cro-
ci scrup. β. adipis anseris, seu gallinæ, & medul-
læ ceruinæ, seu vitulinæ ana vnc. j. ceræ quan-
tum sufficit, aceti parum, fiat vnguentū, quod
mane, & vespere applicetur, præcedentibus
semper fomentis. Procedente vero tempore,
addere poteris prædicto vnguento vnc. β. vel
vnc. j. ammoniaci, aut bdellii humentioris ex-
sistentis, siue stiracis similiter humentioris,
prius aceto dissoluti, & simauis in cataplasma-
tis formam redigas, excipiendo folia simul, &
radices maluarum, ac althææ, ana m. j. & cum
modice prius fuerint decocta, confundantur,
& adde adipis anseris, seu gallinæ vnc. ij. len-
ti cremoris scænuigræci, seminis lini, & althææ
an. dra. iij. olei mastichini, lētiscini, & de absin-
thio ana vnc. j. ammoniaci, seu bdellii in aceto

*Topica ab-
stergensia.*

Vnguentum

*Cataplas-
ma.*

*tecur non
fert admo-
dum fortia.*

*Lienis in-
flammatiō.*

*In modera-
ta lienis in-
flammatiō-
ne forus.*

*In fluxus
impetu vn-
guentum.*

dissoluti vnc. iij. misce, & fiat cataplasma cum oxymellite, quod item precedente semper fomento adhibeatur: interim addendo nardi spicam, indicam, aut celticam ana dra. j. & croci scrup. ss. semper aduertendo ne admodum fortibus vtamur medicamentis, cum ea viscus hoc non perferat, ex Galeno, quæque semper aliquid astringentis habeant. Sequitur inflammatiō lienis, quæ quidem post venæ sectionē sinistri cubiti, ex Galen. 13. meth. omnibus visceribus inflammatis præsentissimo remedio, & post purgationem per aluum factam, quod euacuationi per renes factæ nulla via pateat ad hoc viscus, præsertim si deiectorium medicamentum superne exhibeatur, a situ, & societate sumta indicatione, Galen. 13. metho. quamuis venter etiam elui debeat, ex Actio: topicis postmodum erit vtendum, quæ & ipsa ratione visceris, astringentis quidquā habeāt: in principio quidem repellentibus, 13. metho. astringentia medicamēta magis, & minus robusta facientes, pro impetu fluxus maiori, & **B** minori. Vnde moderata existente lienis inflāmatione, ex vino veteri, ac austero, tenuiumque partium oleo dulci permixto, forus erit fiendus lana succida excepto, vel linteis lineis. & vbi maior erit caliditas, oleo rosaceo, aut omphacino, vel ex olei anethini, aut camomellini vn. j. & rosacei, seu citoniorum, & mirtini an. vn. j. ss. paucō vino, ac cera vnguentum paretur: & vbi forti impetu fluxus feretur, acutum

etum pro vino accipiat, & sinistrum hypo- *Cataplas-*
 cundrium fomentis iis foueatur: post fomen- *ma.*
 ta hoc vtendum erit cataplasmate; Ex farinae
 fœnugræci, seminis lini, & hordeaceæ ana vn.
 j. ß. caricarum aceto acerrimo maceratarum,
 vnc. j. adipis anseris, & butyri recentis ana dra.
 iiij. olei anethini, camomellini, & rosacei ana
 vnc. j. omnibus tuis, & simul commistis cum
 pauco oximellite fiat cataplasma. Vbi ve- *Lienis scir-*
 ro ad scirrhum transierit, post venæ sectio- *rhus ex in-*
 nem ubi opus fuerit, internæ scilicet in fini- *flammatio-*
 stro cubito, & post purgationem cum ante- *ne.*
 cedente sua præparatione potui exhibenda
 erit post cibum aqua a ferratio fabro, in qua
 cādens ferrum extinctum sit; quod hæc præ-
 cipue lienem coherceat. Quod animaduer-
 sum fuit in iis animalibus, quæ apud hos fa-
 bros educata, exiguos lienes habēt, vt ait Cel-
 sus: febricitantibus quidem sola, non febrici-
 tantibus vero cum vino, Archigenis auctori-
 tate, 9. de comp. med. per loca, datur autem a-
 qua per se cyathis tribus, feбри vero carētibus
 cum vini, vel aceti cyatho vno: aut vulpis he- *Vulpis epur.*
 par siccum cum aceto mulso similiter biben-
 dum exhibitū commendat Gal. 9. de comp.
 med. per loca, ex Archigene, postea localibus *Localia.*
 erit vtendum eadem methodo factis, qua in
 iocinoris scirrhu fieri debere diximus, emol-
 lientibus scilicet, discutientibus, & aliquam a-
 stringendi vim habentibus, in hoc variatibus,
 quod tutior erit vsus aceti in lienis scirrhu et-

*Fotus.**Vnguentum*

*In renum
inflammatione vehemen-
ter refrigerantia
sunt fugien-
da.*

iam a principio, cum naturaliter sit rarus, neq[ue]
timor sit vt nervus eius vi lædatur, sicut in tē-
donibus, ac nervosis muscoli partibus, 14. me-
tho. Quare capparis cortex ex aceto cōtrit[us],
illitusque optimus erit: & fotus hoc modo pa-
rati: Ex centauri minoris, & scolopendrii ana-
m. j. corticum radicum capparorum vnc. β. ra-
dicum & foliorum althææ ana manip. β. bul-
liant in aceti, & olei partibus æqualibus, & cū
spongiis fiāt fotus. quibus sæpius admotis, in-
frascripto vteris vnguento: Ex olei amygdala-
rum amararum, liliacei, irini, & de capparibus
ana. vñ. j. succi scolopendrii, & centauri mino-
ris ana drac. iij. corticum radicum capparo-
rum & miricæ ana drac. ij. adipis anserini, seu
gallinacei drac. iij. medullæ cervinæ, seu vitu-
linæ drac. ij. β. ammoniaci in aceto dissoluti
vnc. β. aceti, & ceræ quantum satis sit, fiat vn-
guentum: & ammoniacum cum aceto ad luti
crassitudinem redactum non pauci imponen-
tes quidem lieni eius scirrhum curarūt, illud-
que solum cicurando sæpe satis fuit, Gal. 14.
meth. medēdi. Sequitur inflammatio renum,
quæ quidem post venæ sectionem (licet du-
bium sit quæ vena sit secanda, & post purga-
tionem) extrinsecus inter initia feruēte adhuc
inflammatione, per refrigerantia erit remo-
uenda, quanquam quæ impendio refrigerant
sint vitanda, ne renes inflammati indurentur,
potissimum cum scirrhis suapte natura sint
subiecti, tum propter eorum substantiæ qua-
litatem

litate[m], tum propter excrementorum natu-
 ram, quæ per ipsos dilabuntur, 13. meth. Veluti
 per oleum rosaceu[m], omphacinum, seu melinu[m],
 pauco aceto addito, & succo poligoni, aut por-
 tulacæ: aut hoc cerato. Ex oleo rosaceo, *Ceratum.*
 o; vel melino, luteis ouorum, poligoni succo,
 aceto pauco, & cera, fiat ceratum, & supra
 renes accommodetur. In augmento aliquid *In augmen-*
 miscendum erit digerendi, ac discutiendi vim *to inflam-*
 habens, veluti camomellini, & eius oleum, *mattonis*
 fœnugræcum, semen lini, althæa, & recen- *renum.*
 tes etiam adipēs, vt anserinum, gallinaceum.
 In declinatione autem admiscenda erunt ea, *In declina-*
 quæ adhuc magis discutiant, veluti est cha- *tione fotua-*
 mæpitis, abrotanum: & fotibus per spongiās
 erit vtendum, ex decocto camomelli, semi-
 ne lini, anethi, ac althææ foliis & radicibus,
 pauculo calamo aromatico, & flore iunci o-
 dorati addito, ac pauco etiam aceto. postea
 cataplasmatibus erit vtendum, quæ ex farina *Cataplas-*
 fœnugræci, & seminis lini fiant, hordeacea, *mata.*
 & fabacea, radicibus & foliis althææ in iure
 camomelli decoctis, addito oleo camomelli-
 no, seu anethino cum aqua mulsa, seu sapa,
 vbi crassior videbitur esse materia derelicta.
 Concocta inflammatione, & quieto dolo- *Diuretica.*
 re, per vrinam ducentia erit purgandum, pe-
 troselino, & huiusmodi, ex aqua illud coquen-
 do, & cum vino & melle bibendo. in cibis
 fœniculum exhibendo, apium, daucum, & pa-
 stinacas probe percoctas. Vbi inflammatio

Suppurātia. ad puris permutationem vertetur, adiuuanda erit suppuratio tum puris eruptio: adiuuabitur autem spongiis foveis gratia admotis, assidue imbutis aqua & oleo, aut decocto foliorum & radicum althææ, camomelli, scænu-græci, & seminis lini, quæ calidæ admoueantur. Eundem usum præbebunt cataplasmata ex farina hordeacea, cum ficuū & althææ ex aqua mulsâ decocto. Genito pure ipsius eruptio erit procuranda: quod fiet urinam ducentibus in potu exhibitis, veluti cucumeris semen decortiatum ex aqua mulsâ, palmulis in ipsâ incoctis. post abscessus rupturâ, quibus pro puris purgatione sit utendum in renum exulceratione iam diximus. Sequitur inflammatio vesicæ, quæ quidem post venæ sectionem venæ illius in arte phlebotomandi narratam, auferenda est, iubendo insidere ægrum in decocto seminis lini, scænu-græci, in hydræleo, pauco addito aniso, aut dauci semine, in quo æger mingat: aut vesicæ locus irrigandus ex oleo camomellino, anethino, seminis lini, aut eo, in quo althæa fuerit incocta: & fomentis per aquam & oleum in vesicis semiplenis admotis, aut spongiis. Et vbi hæc nō suffecerint, cucurbitula circa pectinem aut pubem vna cū scarificatione affigenda, & vbi medicamentis his malum non ceder, papaueris calix simul cum oleo incoquendus erit, & adeps anserinus & gallinaceus in ipso oleo eliquatus simul infundendus: & vehementioribus existētibus doloribus,

*Puris edu-
tio.*

*In vesica
inflamma-
tione.*

Ioribus, Ruffi auctoritate opiat^{is} medicamē- *Opiata.*
tis erit vtendum, ex opio, modica myrrha, &
croco composito medicamento, lanæque illi-
to, & in podicem indito. Vbi autem ad suppu-
rationem deueniet, iuuanda iis erit, de
quibus in aliarum partium inflammationi-
bus ad suppurationem vergentibus dictū fuit.

Et post maturationem, vbi disrumpetur ab-
scessus, eidem quoque erit opitulandum pro
eius disruptione: & post disruptionem vlcus
erit curandum iis, quibus diximus exulcera-

tionem curari debere. Sequitur vteri inflam- *In inflam-*
matio, quæ quidē post venæ sectionē (quam- *matione*
uis quæ vena sit secanda maxime dubium sit) *vteri cauē-*
& post etiam purgationem semper cauendo a *dum est a*
mensium prouocatione delenda erit, imo vē- *pruocatio-*
tri, pubi, & lumbis fots, irrigationes, seu e- *ne mensiū.*
pithemata adhibendo ex vino & oleo, aut vi- *Epithema-*
ta.

Bno & oleo rosato seu aceto, & rosaceo cū lin-
teis lineis tepidis, similiter palmulas, aut mala
cotonea in vino aut in posca coquendo, ad-
miscendo oleum rosatum, aut citoniorum, &
cataplasmata admouendo ex farina hordei, se- *Cataplas-*
minum lini, & fœnugræci, vitellis ouorum as- *mata.*
fatis cum rosaceo, & decocto capitum papa-
ueris, & meliloti, ac exiguo vino, seu aceto cō-
posita, aut etiam ex palmulis vino diluto de- *Vteri infl-*
coctis cum farina hordei, & oleo rosaceo, seu *matio acce-*
cidoniorum. Et vbi erysipelatis naturam par- *dens ad na-*
ticipabit (quod ex igneo calore percipietur) *turam ery-*
poligorum, portulacam, plantaginem ac vitis *sipelatis:*

*Pess.**In inflam-
matione de-
clinante.**Suppuratio-
nem adiu-
uantia.*

pampinos cataplasmati apponere oportebit. Et vbi cataplasmatum onus locus non tolerabit, aqua rosacea admixta erit assumenda, & aliquis prædictarum herbarum succus, pessis etiam ex prædictarum herbarum foliis contusis, aut succis, rosaceo, melino, & exiguo croco, & anseris pinguedine mire sedabuntur dolores inflammationis, & vbi dolor multus excrucietur, lacrymæ papaueris exigua cum lacte muliebri, & succo fœnugræci exhibe. per totum etiam morbi decursum insessum etiam ex decocto fœnugræci, seminum lini, maluarum, artemisiæ, & olei præcipue post principium adhibe. Declinante inflammatione, ad laxantia & discutientia erit accedendum: veluti in fœnugræci, althææ, seminum lini, interdum etiâ pulegii, marrubii, saluiæ, & artemisiæ decocto ægrum insidere præcipiendo, & ad imum ventrem ac pubem, farinam hordeaceam cum fœnugræco, & lini semine in aqua multa coctam imponendo, aut caricarum decoctum adhibendo. pessis etiâ utendum erit ex æsipo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, & oleo anethino, camomellino, seu irino & cera compositis. Et vbi inflammatio discuti non poterit, sed ad suppurationem verget, adiuuanda erit suppurationi, imo vetrici & lumbis cataplasmata imponendo ex lini semine, fœnugræco, farina hordei, caricis decoctis, althææ radice: & sinus per spongiam fouendi, & vaporibus per arundinem operculo ollæ perforato insertâ intra pudendum

dum receptis, in fessione in decocto eorū, quę habent vim attrahendi, veluti est pulegiū, saluiam, artemisiā, dictamnū : & pēssis ex rebinthina, myrrha, & sipo, & butyro compositis : & aliquando cataplasmate ex columbino stercore cum oleo & melle. Rupto autem abscessū accedendū erit ad medicametā in solutione continui, seu exulceratione vteri superioris posita. Sequitur lateris inflammatio, quę *In lateris inflammatione.* quidē post venę sectionē eiusdē lateris, & post purgationem etiam, Tralliano, vbi corpus nitrosi succis redundans erit, aut si ob viriū imbecillitatē purgatio fieri non possit, post acres clysteres, Paulo, quanquam etiam existente virtute valida purgatio nūquam validioribus medicamentis sit faciendā, nisi aut cassia, aut syrupo ex pluribus infusionibus violarum, deum iis medicamentis erit vtendum, quę ad facilem excreationem, ac thoracis expurgationem conducunt: diuersis tamen pro diuersitate peccantis humoris inflammationem facientis, in sanguine sane aut bile peccante, syrupo violaceo, vel ex adianto, in pituita vero & crassioribus humoribus syrupo e glycyrrhiza, seu hyssopo, aut etiam e marrubio, cum aquis borraginis, aut hordei aut adianti, vel aqua, in qua glycyrrhizę radix fuerit decocta: & etiam elegmatibus, cap. de tussi & catharro enarratis. Fetus postea erunt fiendi, qui sane Hippocrati a principio fieri solent, vt dolorē lateris calidis fotib. dissoluat. Qui sane etsi plures Hip

Humorum expurgatio.

Fetus humidi debent siccos precedere.

crati numerentur, & sicci, & humidi, ab humidis tamen semper auspicandum esse opinor: quod humida tametsi nihil aduersus affectum aliquando faciant, non tamen insigne afferre possint detrimentum, veluti ii, qui ex aceto vel orobo, aut sale fiunt, qui nisi humorem forte fortuna sibi contrarium nacti sint, maximum agris incommodum afferre possunt. Quare fomento calido erit vtendum & humido, quod fiet ex aqua calida in vtre vel vesica, aut alio vasculo posita, aut spongiam magnam & mollem ex aqua calida expressam applicando: aut loco prædicti forus, hoc aliud parâdo. In aqua radicem & folia althææ, flores camomelli, fœnugræcum, sertulam campanam, & semen lini decoquendo, & aliquo dictorum modorum forus applicando: & post forus vnguenta eiusdem rationis admoueri poterunt, ex olei amygdalarum dulcium vnc. j. butyri recentis vnc. ß. vel loco olei amygdalarum dulcium, camomellino, aut anethino. Post septimum diem si eodem modo dolor persistet, cucurbitula lateri erit affigenda, & cutis scarificanda, dummodo, vt ait Alexander, parua copia sit vacuanda. Et ubi inflammatio membranæ discuti non poterit, ita quod ad suppurationem vertatur (cognoscitur autem ex eo vt ait Hippocrates 2. progn. quod quicumque dolor in his affliget sedibus, thorace scilicet, & pulmone, non desinens neque screationis purgatione, neque ventris subductione, neque venę sectione, ac medicamēto,

ac

Vnguenta.

*Inflam-
mationis mem-
branæ tho-
racis suppu-
ratio.*

ac victus ratione, in suppurationem verti ob-
 seruatur) tunc iis erit vtendū, nunc in inflam-
 matione pulmonis, quæ ad suppurationē ver-
 tatur, enarrandis. Sequitur inflammatio pul- *Pulmonis*
 monis, quæ pulmonia, seu peripneumonia ap- *inflamma-*
 pellatur, quæ iisdem sane quasi, quibus pleuri- *tio.*
 tis, curanda erit: veluti sorbitione ptisana, aut *Peripneu-*
 etiam ptisana ipsa cum melle: & vbi a frigidio- *monia &*
 ribus succis inflammatio pendeat, in ptisana *pleuritis*
 decoquendum erit parum hyssopi, aut origani; *dis*
 & aqua hordei pro potu erit exhibenda, in qua *curatio.*
 glycyrrhizæ radix fuerit decocta, vel ficuū de-
 coctum cum paucis hyssopo. & post venæ se-
 ctionem in cubito internam vtriusq; brachii,
 aut si quid venæ sectionem prohibebit, cucur-
 bitulas thoraci admotas, & lateribus affixas,
 quibus cum tantū sanguinis extrahatur, quan-
 tum vires ferant: & post purgationem, ab ex-
 tra huiusmodi topicis erit vtendum, aduersus *Topica.*
 dolores calidis fomentis valentibus digerendo
 ac discutiendo, de quibus in lateris inflamma-
 tione dictum fuit: thoracisq; partes erunt il-
 liniendæ oleo amygdalarum dulcium, & ama-
 rarum, aut anethino seu camomellino, irino
 aut rutaceo, vel cerato ex butyri recentis, & *Ceratum,*
 adipis anseris an. drac. j. olei rutacei, ac vtriusq;
 amygdalæ an. vnc. β. pulueris iridis & hyssopi
 siccæ an. scrup. ij. æsi pi liquidæ drac. iij. ceræ quā-
 tum sufficit, fiat ceratum: vel hoc cataplasma- *Cataplas-*
 te: Ex radicibus & foliorum althææ, & malua- *ma.*
 rum an. m. β. contendantur, & adde cremoris

*In empye-
mate.*

*Puris con-
coctio per
fomenta.*

*Cataplas-
mata.*

feminis lini, althææ, & fœnugræci an. drac. ij.
iridis & hyssopi, quæ tenuissime trita sint, an.
drac. j. butyri & ælipi liquidæ an. drac. j. β. oleⁱ
camomellini & rutacei an. vn. j. cū aqua mulæ
aut resina terebinthina conficiatur cataplas-
ma, quo tum pectus, tum latera contegantur.
optimum etiam erit eidē cataplasmati inper-
gere feminis lini, ac fœnugræci tenuissimum
pollinem. Vbi autem in suppurationē termi-
nabit, quæ suppuratio empyema appellatur,
ptisanæ cremore cocto aut in iure galli, aut vi-
no dulci tenuis subtilitæ, 7. de comp. med. per
loca. Et cū suppuratio fieri incipiet, puris con-
fectio, seu concoctio erit adiuvanda. quod qui-
dē fiet, s. simp. modice humectantibus, & ex-
calfacientibus, talibus tandem, quæ neq; ex-
cedant, neque deficient a temperatura corpo-
ris, sed similima sint, quæq; emplasticam vim
habeant, ibidem: quare fomentis per spon-
gias ex aqua temperate calida, cui additū sit oleū,
quod hydrelæon vocant, quod inter omnia,
quæ puris generationi conferunt, aptissima sit
perfusio aquæ temperate calidæ, s. simp. & ad-
eps aut suillus, aut vitulinus, aut gallinaceus
seu anserum, cū maluæ seu althææ radice per-
mixtus: vel cataplasmate, præsertim tardante
suppuratione, ex caricis decoctis, hordeacea
farina, althææ radice, columbino stercore, &
modica resina terebinthina: & cerato ex buty-
ro, ruta, iride, baccis lauri, radice maluæ, al-
thææ, farina hordeacea aut triticea, oleo com-
muni,

mini amygdalarum dulcium, aut camomelli,
 & cera simul. Genito pure rumpēdus erit ab-
 scessus: quod fiet mullæ sorbitione, aut ptisanæ
 cremore cum melle, & decocto hyssopi aut
 thymi cum melle: extra vero cataplasmate ex
 stercore caprino. Rupto abscessu adiuuanda
 erit puris excretio per eum locum, per quem
 repere ostendet: si per aluum, magis emolliē-
 tibus: si per renes, urinā ducentibus: si per tus-
 sim, ptisana optimo melle permixta, & radicis
 dulcis succo commāducato, & melle rosaceo,
 syrupo e glycyrrhiza, de hyssopo, & e marru-
 bio. Postea ubi diuturnior affectus erit, febris
 remissior, & vires imbecillæ, lacte erit vten-
 dum, veluti diximus fieri debere in pulmonis
 exulceratione, ad quam tabes sequi solet. Se-
 quitur inflammatio cerebri, & partium quæ
 circa caput continētur, veluti sunt phrenitis,
 lethargus, oculorum, quæ lippitudo dicitur,
 glandularum iuxta linguam, gurgulionis, &
 angina. Phrenitis sane post venæ sectionem
 initio factam, & post corporis vniuersi purga-
 tionem, oxirhodino caput inades fieri postula-
 bit, rosaceo cum modico aceto, ex Galen. 13.
 meth. in principio sane. sed post corporis vni-
 uersi euacuationem benedictis medicamen-
 tis fiendam, repellendus humor erit a capite,
 atque alterandus, ne immodica caliditate li-
 beralius humor attrahatur, & caput replea-
 tur: atq; eodem tempore odoriferū erit faciē-
 dum, ex aquæ rosarum & mirtillorū an. vn. iij.

*Puris edu-
ctio:*

*Inflamma-
tio partium
circa caput.*

*Phrenitidis
curatio.*

sandalorum rubeorum, citrinorum, & coral-
 lorum rubeorum an. drac. j. aceti rosacei vnc. j.
 & s. miscantur simul: interim etiam vtentes
 syrupis, veluti rosaceo, violaceo, ex nimphæa,
 ex cichorio seu endiuia, ac de papauere: odor
 naribus obiiiciendus, ac nares ipsæ intus, vel
 frons similibus medicamentis illiniendæ, etiã
 cum in summo incremẽto phrenitici fuerint,
 Gal. 13. meth. quod vt ait sopire & stupefacere
 principem facultatem opus sit, cerebrum sci-
 licet, quod supra modum incaluit, refrigeran-
 do: ex quibus etiam facies assidue proluatur,
 Aetio. Et quam diu huiusmodi affectus morã
 contraxerit, discutientibus erit vtendum, ve-
 luti si serpillum, thymum, melilotũ, & althæa
 oleo incoquantur rosaceo, vel camomellino,
 quo caput irrigetur iuxta capitis commissurã
 coronalem, atque vapor per nares suscipien-
 dus: aduertendo semper ne calidis huiusmodi
 medicamentis, velut etiam catellis, aut gallis
 vtamur alio tempore quam in declinatione:
 quod in principio aut augmento inflamma-
 tionem, & febrem maxime irritare possent.
 Quoniã vero phreniticis vigilie fere semper
 solent esse associatæ, quapropter somnus ma-
 xime erit procurandus: quapropter pro oxyrho-
 dino caput recte irrigabitur oleo de nimphæa
 violaceo, seu ex papauere, pauco aceto addi-
 to, aut ex decocto foliorum lactuæ, violarũ,
 tum etiam for im, hyoscyamo, rosis, solano,
 capitis papaueris albi, & nigri, & mandragoræ ros
 pomis,

*Somni con-
 ciliatio:*

pomis, semper aliquid aceti addendo, caput irrigando huiusmodi decocto, atq; etiam olfaciendo: naribus, ac fronti, & temporibus populeonvnguentum cum modico aceti applicando, tandemq; iis omnibus vtendo, de quibus sermo fiendus erit pro curatione vigiliarum. Lethargus vero si fiet, post venæ sectionem, & purgationem, oxyrhodino in principio a capite humor erit repellendus, 13. meth. procedete tempore in oxyrhodino etiam incoquentes quæ simul extenuare possint, veluti castoreum, pulegium, thymum: & naribus etiam applicetur huiusmodi decoctum, quod calfacere, ac desiccare, & attenuare humoris crassitudinem, ac lentorē possit: sternutamentis etiam vtentes ex castoreo, pipere, seu elleboro. palatus etiam erit vngendus, Galeno, valentibus & acribus medicamentis, veluti mithridato, theriaca, aut sinapi cum melle: his enim cedit affectus & discutietur. caput insuper radendum erit, & ex alto torrētis ritu huiusmodi medicamentum erit sincipitis loco fundendum: veluti serpillum, hyssopū, ac thymum cū pauco castoreo in aceto & oleo coquentes, vel caput fouentes aqua, in qua laurus & ruta fuerint decocta, vel castoreum assumendo vna hora ante accessionem cū oxymellite: veluti drac. j. cum oxymellitis vn. j. cuius solius assumptione fatetur Trallianus multos se curasse: & balneo, coctione morbi apparente, & excrementorum copia amplius non

*Lethargi
curatio.*

Ophthalmia eustrophia.

existente. Oculorum vero inflammatio, quæ lippitudo, seu ophthalmia dicitur ubi accidet, post venæ sectionem exteriorem cubiti e directo oculi laborantis, ex cuius sectione intra spatium vnius horæ grauissimi dolores compesci solent, Gal. lib. de curatione per venæ sectionem, & post purgationem eius humoris, qui peccās erit, & post auersionem ad partes infernas, aut vinculis, aut frictione, aut alui deiectione fiendam, Gale. 13. metho. fomenta postmodum ex aqua dulci modice calida laboranti particulæ erunt applicanda 13. metho.

Repellentia in initio.

Quapropter in principio pharmacis etiā repulsois uti possumus, sed quæ non sint nacta vehementem astrictionem, aliter amplio rem dolorem infligerent exasperando, vnde lenitiorum liquorū admixtione moderata fieri solent, veluti albo oui liquore, fœnugræci decocto, e lacte iuenculæ in cotem, in qua collirium teritur, ex vberibus expresso. Solent enim veteres albo oui liquore uti, tum quod minime mordeat, tum quod glutinosus sit, vnde lenire asperitates acris humoris potest, & ratione glutinositatis in loco permanere, & si modice incaleat, cum absq; rosione sit, dolorem maxime lenire, 13. metho. Ab his vero anodynis, quæ sensum auferendo dolorem sedant, summo opere cauendum; cum nec vehementes fluxiones reprimant, sed potius excerni prohibeant. & ubi humores acres cōtingit esse, corneam erodant, aut si multi sint,

Oui liquor albus.

Anodyna magnopere fugienda sunt.

dolor

dolor maximus excitetur , & simul necessarium sit vim visoriam offendi. Quod si eis urgente maxima necessitate fueris vñs , postmodum sanitatis tempore oculi erunt calfaciendi, velut & reliquæ partes omnes, quibus huiusmodi stupefacientia applicita forēt, Galenus 12. metho. Frons illinienda erit ex plantaginis, solani, seu semperuiui succo, oui candido, rosacco oleo, vel aqua, bolo armena, & pauco aceto. Et vbi cataplasmate erit vtendum, hoc modo erit fiendum: Ex papauerum capitibus in aqua coctis , ac fœnugraci, vel hordei, vel lini seminis farina aqua immixta, ex Galeno 12. metho. Vbi autem concocta fuerit phlegmon , & corpus vacuum , lauationibus in balneo erit vtendum 13. metho. Et vbi nec in toto corpore amplius adsit humorum copia , nec a capite ad oculos feratur fluxio, & sanguis crassior oculorum venas intendat, ac tumidas reddat , præter balneum temperatum, quod meatus excalfacere, & laxare valeat , vinum meracius erit exhibendum , quod non solum excalfacere, & meatus aperire, sed etiam sanguinem diffundere, ac vacuare potest , & sui motus vehementia obstructions aperire, 31. 6. lib. Apho. Cuius curationem vniuersam breuissimo quodam oraculo Hippocrates 6. Aphoris. 31. exprelsit, dum ait : Dolores oculorum meri portio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentū epotū soluit. Sequi-

*Tonsillarū
inflammatio.*

*Mel gargarismis non
conuenit in
principio.*

Topica.

*Suppurationem ad-
iuuantia.*

tur inflammatio glandularum iuxta linguam, quæ quidem post venę sectionem humeri externam, & etiam purgationem medicamento leniente factam, circa initia gargarismis erit tollenda astringentibus, & repellentibus, veluti rosarum decocto, & palmarum, mixarum, aut lenticularū, aut fursuris: cauentes in principio a melle in gargarismis, ne per acrimoniā malum irritetur, vt ait Actius: aduertendo vt repulsoria actu tepida fiant, quod inflammata non tolerant frigus, sicut neque plurimū calorem, Actio: deinde gargarissent ægri ptisanæ succum, in quo decoctæ sint vuarū passæ: remittente autē inflammatione in gargarismos mel admiscere conueniet, aut sapam tepidam, vel decoctum radicis dulcis, aut ficuū, & hyssopi decoctum. Extrinsecus vero leniter fouēdū erit spongiis expressis, ac madidis in aqua, in qua flores camomelli, althææ, & maluarū folia, fœnugræcum, seu fertula campana fuerint decocta: & cataplasma imponendum erit ex farina hordei, seminis lini, aut fœnugræci. Et vbi ex vsu acriorum collutionum, seu gargarismorum exasperabitur inflammatio, leuioribus gargarismis, Actio, vtendum erit, qualis est iuccus ptisanæ tepidus, aut lac etiam tepidum. Vbi autem in pus inflammatio vertetur, quod tunc erit, vbi vehemētius exacerbabit, coadiuuanda erit suppuratio calidioribus gargarismis, veluti aqua mulsa calida, & caricarū decocto, ac hyssopi cum radice dulci:

ad

ad extra vero cataplasmate ex hordeacea farina, & fœnugræco, cum decocto caricarum & althææ, ac melle: aut intra vapore aquæ calidæ. confecto pure (quod est vbi dolores minuuntur) acrioribus collutionibus erit vtendum, vt rumpatur abscessus: veluti pulegio, thymo, hyssopo in sapa, aut aqua mullâ decoctis, & gargarizatis. Vbi pure substâte noluerit rumpi abscessus, incidendus erit, deinde vtendum erit mulso calido per se, aut etiam lenticulæ, vel rosarum decocto admixto, donec penitus ad cicatricem ducatur. Sequitur inflammatio *Gurgulionis* inflammatio, quæ quidem post venæ sectionē, diuersionem, & purgationem, topicis habentibus vim repellendi fluxionem erit demēda, veluti collutionibus ex palmulis decoctis, vel rosarum decocto, pampinorum, rubi, & maiorum austerorum, ac pirorum, & sorborum. & vbi maior fuerit influxus, mirti, & baccarū decocto, & ex acerbis malis cotoneis, aut mespilorum, aut cornorum. Horum itaq; decocta in aqua erunt gargarizanda Gal. 6. de cōp. med. per loca. Et vbi processerit inflammatio aliquid ex discussoriis erit admiscēdum. & vbi etiam dolor affuerit, aliquid etiam ex mitigatoriis: ex discussoriis quidem, veluti floribus camomelli, fœnugræci, fertulæ campanæ, anethi, althææ, mellis: & vbi mitigatoriis etiā erit vtendum, medicamento gargarizandum erit, ex contusa radice dulci, melle, & dulci aqua, pari mensura simul coctis. procedente tem-

Kk

pore discussoria erunt augenda, veluti addendo hyssopum, aut glycyrrhizæ radicem. Vbi autem inflammatio ad suppurationē verget, concoquētibz erit vtendum; veluti decocto cy caricis per se solum, aut sapa, aut aqua mulsa permixto. Supputata inflāmatione, & erupto pure, ad extergentia, & exsiccantia erit transeundum, veluti aqua hordei cum melle

*Gurgulionis
laxitas.*

rosaceo mixta, aut aqua mulsa. Vbi vero gurgulio laxior euaserit (quanquam etiam citra inflammationem laxetur saepe) ita vt linguæ radici, ac faucibus propensus incumbat, aridis medicamentis vtendum erit, ex gallē omphacitidis, aluminis scissi, ac salis ammoniaci partibus, æqualibus, quibus contritis, ac simul mixtis expleto cochleari vna cōtangatur, Gal. 6. de comp. med. per loca. Et vbi his medicamentis affectus non cedit, ita vt vigilias, tussim, & etiam strangulatum afferat, ad eius excisionem accedendum erit, iisdem obseruatis

*Angina cu-
ratio.*

quæ Galenus narrat 14. metho. med. Sequitur angina; quæ quidem post venæ sectionem illico lactam humeralis e directo, & post vniuersi corporis purgationem, tum medicamento vacuante, tum clysteribus erit oppugnanda, quod vt ait Galenus 4. de ratione vict. acut. conferat duabus ex causis corpus totum ex-

*Vacuatio
dupliciter
confert an-
gina.*

crementis vacuare, tum quod ex vacuatione sequitur reuulsio, tum quod corpore vacuato a loco affecto, si volumus repellere, corpus repulsiōni facillime consentit; aut si calido aliquo

quo partem affectam vaporare velis, nullus timor adsit, vt a corpore ipso ad partē humor transmittatur. Inflammationem vero curabimus in principio quidem leniter astringentibus, veluti rosarum, lentium, mixarum, palmarumque decocto, aut flore rosarum ex hydromellite. His igitur per initia erit gargarizandum, aut fiat gargarismus ex eo medicamento simplici, quod ex moris est, cum rhus decocto, vel eo, quod ex nucibus: quod medicamentum fatetur Galenus ex succo nucum viridium se preparasse, cum ex Alexandria in patriam rediret, propter quendam hortulanum, quod gargarizare iussit, ipsumque praecoxit cum melle, quod succus tenuior esset.

Medicamentum ex nucibus.

Quod medicamentum testatur cetera stomatica superare 6. de comp. med. per loca, veluti illud quod ex moris constat, & id quod ex succo rubi mororum preparatur: & tertium quod ex musto: & quartum quod ex puniceo succo: & quintum quod per astringentia mala componitur. Possunt etiam componi gargarismata ex iam dictis in hunc modum: Ex vnc. ij. medicamenti ex moris, & tantundem medicamenti ex succo nucum, cum aquae hordei libra vna, aqua rosarum vnciis quatuor, aceti albi vncia vna misce, & gargariza: vel in hunc modum: Aquae hordei lib. ij. in qua rhus drach. quatuor decoquantur, aqua mirtinae lib. β medicamenti ex moris rubi, aut ex moris vncias tres medicamenti ex

Medicamentum stomaticum optimum.

Gargarismata.

Rotula.

nucibus, aut ex malis punicis vnc. quatuor, acetii albi vnc. ij. Poterit etiam parari medicamentum in rotulis, quod assidue in ore teneatur, ac sensim deglutiatur: Ex diacodii drac. ij. pulueris hirundinis præparatæ scrup. i. seminum coriandrorum preparatorum drac. j. sacchari dissoluti in aqua rosarum quantum sufficit. Quo etiam tempore syrupo rosaceo, violaceo, iuiubino uti possumus. Morbo vero in-

Discutiētia.

crescente, atq; etiā consistente, medicamentis erit utendum possidentibus vim discutiendi, veluti caricarum, aut furfurum, seu glycyrrhizę in aqua mulsa decocto, aut hyssopo, thymo, pulegio: vel hunc in modum: Ex hordei m. ss. vuarum passerarum vnc. j. palmularum, & caricarum, ac mixarū, ana numero v. glycyrrhizę drac. iij. hyssopi drac. iij. coquantur secundum artem in lib. ij. aquæ fontanæ donec medieta absumatur. cui decocto percolato adde mellis


*Trahentia
ad extra.*

rosacei vnc. ij. medicamenti ex moris vnc. j. acetii albi parū, misce, & fiat gargarismus. Quo tempore etiam medicamenti ad extra trahentibus erit utendum, veluti spongiis in calido oleo demissis, aut vntione ex oleo camomelino, liliaceo, anethino: & cataplasmate ex hordeacea farina, semine lini, palmulis ex aqua coctis, croco, & mica panis simul incoctis, adiuciendo etiam ficus siccas. Vbi in abscessum angina verget, iuuanda erit natura iis iam supra enarratis: & facto pure iis, quæ ruptionem proritant, ruptoque abscessu, iis utendum erit quæ

*Angina in
abscessum
vergens.*

quæ vim detergendi habent, iam supra enarratis. Sed hæc de curatione morborū, in quibus illud erit aduertendum, morbos genere diuersos maxime in curatione, & remediis cōuenire; veluti curationem obstructionis cum intemperie frigida, & inflammationem cum calida, & vnitatem solutam cum vasorū apertione.

*Morborum
diuersorum
eadem re-
media.*



IO. PAULI PERNUMIA

PATAVINI.

De Curatione Symptomatum.

LIBER SEPTIMVS.



ORBIS cognatione tanta symptomata cohærent, tamque immutabili continuatione iunguntur, vt symptomatum curatio ex curatione morborum capi debeat: quemadmodum pariter necesse fuit morborum curationem ex curatione causarum haberi. Etenim cum sanarum, atque integrarum actionum vitæ stabilis & constans causa sit & recta & sana corporis constitutio: qua vitata aut abolita, simul actio vitatur & perit: sequitur etiam quod ex curatione, & depulsione vitiorum corporis, vitia etiam ipsarum actionum tollā-

*Causa actionum in-
tegrarum
est sana cor-
poris consti-
tutio.*

*Symptoma-
ta quando-
que curatio-
nem ad se
trahunt.*

*Ordo dicen-
dorum.*

*I.
Curatio vi-
tiorū actio-
nis attra-
ctiue.*

*Inappetē-
tia curatio
In cibi fa-
stidio.*

Vomitus.

tur, neque alia sit symptomatum quam ipso-
rum morborum, & causarum curandi ratio.
Quoniam tamen, etsi symptomata fere sem-
per tollantur ex causarum remotione, quan-
doquidem ita vehementia sunt, vt cæteris pe-
nitus neglectis, ob eorum malitiam necesse
sit illis attendere: cuiusmodi solet esse dolor,
syncope, & nimia excrementorum fluxio, &
suppressio, aut si non sunt vehementia, aut ita
maligna, vt trahant ad se curam, proprii tamē,
& peculiaris aliquid postulant pro eorum cu-
ratione. Quapropter sequitur vt agamus de
curatione huiusmodi symptomatum, tum co-
rum, quorum natura ita maligna est, vt non
sinat causas tolli, tum etiam eorum, quorum
vehementia, & maligna natura talis esse solet,
vt nisi quamprimum illis occurramus, virtu-
tem statim prosternere possint. Primum autē
artem curandi vitia actionum percurrēmus,
deinde excrementorum. Atque in curandis
actionum vitiis naturæ primum, deinde ani-
mæ, postremo curationem viciatarū functio-
num vitalium attingemus. Primum attractiue
virtutis vitium in ipso ventriculo, appetitus
imminutus & abolitus, quod cibi fastidium
dicitur, esse solet. Quæ quidem actio læsa, seu **B**
appetētiæ amissio, si ex aliqua intemperie vē-
triculi prodibit aut calida, aut frigida, aut cum
materia biliosa, quæ sui redundantia cibi fasti-
dium proritet, aut frigida viscida, vacuatione
materiæ, vomitu, aut deiectione: vomitu sane
bilis,

bilis, præfertim vbi æger vomitui facilis erit, ex copiosa aqua tepida aut sola, aut paucō aceto, aut syrupo aceroso associata: deiectione vero (& ante deiectionē humoris calidi præparatione aut syrupo violato, aut ex infusione rosarū) siēda vn.iiij. syrapi ex plurib. infusionibus rosarū rubearū, cū decocto tamarindorū; deinde alteratione intemperiei calidæ ventriculi, & corroboratione: veluti citonio saccharo condito, vel eorundem citoniorum succo, cum aceto & melle permixto, modo quo docet Gal. 6. de valet. tuend. frigida vero & tenax materia extenuanda, incidenda, & abstergenda iis, quæ ex oxymellite aut muria componuntur, veluti capparibus ex oxymellite paratis, & oliuis, quæ ex muria, aut oxymellite coniunguntur, aut melle rosaceo, aut oxymellite, aut pice ipsa, vbi illa non sufficient, quæ acrimonia & calore eorum, quæ in se habet, crassos ac lentos succos dissecat ac detergit, 6. de val. tuen. quanquam non assidue illa sit vtendum, sed singulis septem, aut decem diebus, pondere drac. ij. Et post frigidorū euacuationem iis erit vtendum, quæ frigidā ventriculi intemperie alterare possunt, de quibus in curatione morborum. Nam causis euacuatis, & alteratis intemperiebus, actio ex morbi immutatione & curatione, per viam sequelæ pristinae suæ dignitati restituitur: quanquam symptomatis etiā aliqua habebitur ratio, si omni ingenio quæremus cibū excitare, quod fiet cibus pluribus &

Deiectione.

Frigida & tenax materia in appetitu abolito.

*Symptoma-
ta deprava-
ta attra-
ctionis.*

*Sitis a cau-
sa calida.*

*Sitis a cau-
sa calida
& humida
a causa cal.
& sicca.*

*Sitis cum
febre.*

variis, ac optimo apparatu, & praesertim si talia fuerint, ut facile deuorari possint: & hoc, quod multa com manducatio iniucunditatem quãdam afferat, & appetitum auertat: veluti iunt oua sorbilia, volucres macrae & montanae, & huiusmodi alia. Sequuntur symptomata attractionis deprauata, veluti est sitis immoderata, canina appetentia, pica, bulimus. Sitis sane, si morbus fuerit nimia caliditas, aut ob edulia calida, aut ob vinum meracius contracta, frigida potu depelletur, 6. morbo. vulg. Sin autẽ caliditas & humiditas sitim causabit, optimũ eius remedium erit acetum i. simpl. med. seu limonii succus cum aqua frigida. Sin autem causa fuerit caliditas & siccitas, aceto curatur, Gal. ibidẽ: ut quod strenue refrigeret, & quous expedite permeet: & aqua, quã supra quã quod refrigerat, omnium est humidissima, quod nihil sit aqua humidius, Galeno, quã simul erunt miscenda secundum egri iucunditatem. Ad extra etiam frigida erunt apponenda. Vbi vero sitis erit cum febre associata, veluti contingit in febricitantibus, cum in principiis, ac exacerbationum augmentis potus prohibeatur, excogitata fuerunt ingenia, quibus sitis mitigetur: quod fiet per irrigationem capitis ex oleo frigidissimo, vel rosaceo, Aetio & Paulo, & cucumeris vel peponis semine in ore retento, & gargarismis, & oris collutionibus, aut vino albo aquoso multa aqua permixto. In declinatione vero exacerbationum, & eorum

108 & eorum remissione, potum aquæ frigida dare conueniet, seu paulo aceto adiecto, vt diximus, ex Galeno, vel vnc. ij. syrupi acetosi simplicis, cum frigida permixti: & vt tutius remedium existat, nō aquæ frigida, sed aquæ hordei fiat permixtio. Sequitur canina appetētia, cuius sane Gal. secūdo lib. 21. aph. vini potum, non cibi multitudinem, remedium esse affirmat: & addit multos se sanasse, qui indefinenter fameſcebant, vinum ipsis abundanter exhibens, ex eorum genere, quæ multum calfaciunt, colorem habens flauum vel rubeū absque aſtrictione. Qua ratione Aetius quoque multum, ac acruatim ait esse bibendum, calidum sane, aut saltem tepidum. Vbi vero præter intemperiem frigidam aderit quoque humor pituitosus, & acidus in ipso ventris ore impactus, ac veluti aqua in spongiam imbibitus, eos ex hyera purgabimus, quæ non tantū calfacere, sed dissecare & repurgare, & ex profundo extrahere imbibitum humorem, & inferne per aluū euacuare potest, in hūc modū: Hyeræ dr. ij. ex vino cū aqua calida diluto, hoc modo sane curabitur canina appetentia ab intemperie frigida aut sine materia aut cū materia. Vbi autē symptoma hoc pēdebit ex immodica corporis dissolutione, vini vice aqua erit exhibenda, & cutis erit condensanda oleo aliquo astringenti, vt rosaceo, omphacino, mirteo: & illinienda erit huiusmodi illinitio: Ex succi plantaginis & semperuiui an. vnc. β san-

*Caninam
appetentiam
curat vini
potus.*

*Appetentia
canina ex
intemp. frigida cum
humore pituitoso &
acido.*

Ex immodica dissolutione corporis.

*Pica cum
materia.*

*Bulimicu-
ratio.*

*Bulimus in
febris.*

dalorum rubeorū, sanguinis draconis, & boli
armeni ana drac. iij. olei mirtini, citoniorum,
rosacei, omphacini an. vnc. j. farinae hordei dr.
iij. albuminis ouorum vnc. β aceti addendo
parum, cere quantum sufficit, fiat vnguentū.
Pica vero, si fuerit cum materia, secundū con-
ditiones materiae erit preparanda, postea eua-
cuanda pica Galeni. Atque euacuato humo-
re vitioso, alterandus erit ventriculus ad con-
trariam qualitatem, veluti mali punici dulcis
succo mentha sicca insperso, & secundum in-
temperiem eligendo & intra & extra medica-
menta in morbis partium corporis iam enar-
rata. Sequitur bulimus, de quo Gal. 8. de cōp.
med. per loca, ait, eos qui ingenti fame animo
linquuntur, seu bulimo, reuocandos esse odo-
ramentis aceti, aut pulegii, aut malis, aut pyris,
aut similibus, quod ut ait Gal. per huiusmodi
odores tales ut plurimum reuocentur, ipsos-
que ab exsolutione & animi deliquio reuoca-
tos, pane in vino diluto, aut aliquo, quod ipsos
aceruatim reficere possit, veluti sunt ova for-
bilia, nutrit. Quinimo ubi in febribus huius-
modi symptoma continget, si in principio, aut
vigore eueniat, ubi per prædicta odoramenta
nihil factum fuerit, audendum erit, non ob-
stante febris tempore hoc vetante, ipsis auxi-
liari cibatione vna atque altera, in vino made-
facta panis buccella, ut refocillatus æger ad re-
missionis tempus peruenire possit: cū & ipse
Gal. in principio, augmento, ac summo vigo-
re ex-

re exacerbationum febrilium, potissimum calidis & siccis corporibus, & quib. stomachus fuerit imbecillus, cibum offerat, præsertim panem vino dilutum, non vni duntaxat aut alteri, sed pluribus, 10. meth. Sin autem symptoma pendebit a materia aliqua in ore ventriculi existente, prius erit præparanda, deinde purganda. Sequuntur symptomata retentionis debilis & abolitæ: cuiusmodi sunt cæliaca affectio, & lienteria, quæ quidem lienteria vbi ex calida intemperie ortum habet cum materia, vomitu sane erit curanda, dummodo difficulter non vomat, sed pronus sit æger ad vomendum, & quod humores in ventre collecti percipiantur. Nam vbi in intestinis continentur, non possunt per vomitum euacuari, ex Gal. 4. aph. 22. Amplius vrinam cientibus, quæ deriuationem moliuntur, fluxionemque sæpe transferunt, veluti est apium, fœniculum, anisum: postmodum astringentibus potibus, veluti plantaginis semine trito, sicco, & potato: & syrupo de ribes, aut qui ex incōpletis & aridis rosis conficitur: vel corricis quercinæ glâdis decocto: vel drac. j. trochiscorū de spodio, vel e terra lemnia. Vbi vero lienteria erit ex intemperie calida duntaxat citra acres humores iisdem alterantibus, & astringentibus erit vtdum intus & extra, modo omittantur & vrināducentia, & vomitus. Sequitur singultus, qui symptoma est quoquo modo retentionis deprauatæ: Qui quidem si erit ex inanitione,

*Cibatio in
vigore exa-
cerbat. fe-
brilium.*

*Symptoma-
ta debilis &
abolitæ re-
tentionis.*

*Lienteria ex
intemperie
calida cum
materia cu-
ratio.*

*Lienteria
ex intemp.
calida citra
humores
acres.*

*Singultus
ex inanitione.*

Ex intemperie frigida cum materia.

Ex intemperie calida cum humoribus mordacibus

curandus erit per cibaria, quæ defectum expleant, & prospiciendum erit aut ad immodicum sanguinis fluorem, aut alui profluvium, & aliud quodcunque symptomatis erit causa. Sin autem erit ex intemperie aut frigida aut calida, aut cum materia, aut sine materia: si erit ex intemperie frigida cum materia, huiusmodi singultum ex plenitudine ortū curabit sternutatio, Hippo. & Gal. 6. aph. 13. quod violento opus sit motu, ut veluti conclusæ ipsum efficiētes humiditates diffilentur, atque euacuentur. Addit Paulus, spiritus retentionem potens esse remedium: Et vomitus, 8. de comp. medic. per loca, qui etiam iuuari poterit ex potu aquæ tepidæ cum oxymellite scyllitico: postea intemperies frigida calfacientibus tum cibis, tum medicamentis erit tollenda, veluti ruta cum vino. Ad extra inunctione ex oleo, in quo ruta, cuminum, absinthiū sint decocta, & sacculis ex utraq; mentha. Sin autem fuerit singultus ob caliditatem, & mordacem humorum acrimoniam, vomitus itidem est sufficiens medela, Gal. Post vomitum obtundenda erit acrimonia stimulans syrupo violaceo, aut de infusione rosarum, aut lacte recens mulcto, Actio. Et ubi mordacitas his non obtundetur, discutiendus erit iis, quæ sensus stupefactionem inducunt: in quem usum exhibet Galenus drac. j. medicamento philonii romani, aut perfici: quanquam præter hæc ponat Galenus pharmacum quoddam mixtā quandam

quandam facultatem habens alterandi, discutiendi, attenuandi, & resiccandi, & sensum obtundendi 8. de comp. med. per loca, Asclepiadis auctoritate. quod etiam examinat per expositionē cuiuslibet simplicis medicamenti in ipsum ingredientis. Sequuntur symptomata concoctionis, & primum concoctionis imminutæ, cuiusmodi est flatus, seu ventriculi inflatio, & tarda concoctio etiam, quæ brady-pepsia dicitur. De flatu sane Galenus 14. meth. ait indicationem curationis omnium inflationum communem esse, vt quod præter naturam est euacuetur: propriam vero esse, vt tenuissimis & potestate calidis medicamentis illud fiat. Quare somnus solito longior conciliandus, vtpote qui mirifice concoctionem iuuat, 12. metho. vomitus præcipiendus, & post vomitum, oleo foue, quod tenuium sit partiū, quodq; rutam habeat incoctam, aut aliquod calidorum seminum, cuiusmodi sunt cumini, apij, & petroselini, Gal. 14. meth. Si perseueret, irrigationibus erit vtendum: si magis adhuc, fomentis calidis & siccis. amplius cucurbitula cum multa flamma admota vmbilicum vndique complectente, toto symptomate liberat, Gal. 14. meth. ita vt videatur, inquit Galenus, præsidium hoc in huiusmodi affectibus flatuosis incantamenti cuiusdam simile quid efficere, siue in intestinis, seu in quauis corporis parte dolor fuerit. Ilico enim cucurbitula admota a dolore liberat. Amplius glande, clyste-

*Concoctio-
nis immi-
nuta & sym-
ptomata.*

Flatu.

ri, potione. Vbi autem flatus erit ex pituitosis humoribus in halitum dissolutis, euacuandi prius erunt, antequam prædicta applicentur.

Bradypepsia

Euacuabitur autem aut vomitu, aut clysteri, sed acri: quoniam ex acrium iniectione leuari solent; Galeno. postea cucurbitula applicanda, & fomenta, & cataplasmata, 12. metho. Eadem fere faciet ad tardam coctionem. Sequi-

109

Cruditus ex ciborum multitudine aut qualitate vitiosa.

tur cōcoctionis abolitę symptoma, quod crudititas appellatur: quę quidem si ex ciborū multitudine, aut eorum vitiosa qualitate pēdebit, vomitu materia erit eicienda, modo ager facile vomat (quod cogere eum, qui vomere nō possit, absurdum sit, Gal. 1. loc. aff.) potu aquę tepidę cum paucō aceto. At, aut quia vomere, non possit, aut quia materia ad vētris inferiora descenderit, vt citius descendat, eam adiuuat Gal. glande, aut leui clysteri, 8. meth. Vbi autem quod diminute est cōcoctum, seu crudum in superiori ventriculi parte consister, modico diatrionpipereon est adiuuandum, modo quo docet Gal. 4. de tuen. val. Ab extra laudat Gal. 5. simpl. med. & 7. meth. corpus humanum, aut paruos catellos. Obseruandū tamē erit ne puellus humecta sit cute, quod qui sudore profunditur refrigeret potius, quam quod calfaciat, ait Gal. Aliis etiam medicamentis moderate calidis concoctio iuuabitur extra adhibitis, quorum sylua ponitur a Gal. 8. meth. Notandum tamen est, quibus ob calidā intemperiem, vel ob bilem vētriculi crudititas accidet,

Cibi corruptio.

accidet, quæ potius concoctio deprauata, seu cibi corruptio appellari potest, cōcoctu difficilia esse exhibenda: & hoc quod non ita facile alterentur, ac corrumpantur, ex Galeni decreto i. de fac. alim. Sequuntur symptomata expulsionis: & primum expulsionis abolitæ; veluti est passio illa quæ ileos appellatur: quanquam hinc etiam desumi poterunt remedia expulsionis diminutæ, quæ tarda alui deiectio dicitur. Igitur sciendum quod medicamenta, quæ per os præbentur, magis cōpetunt in hac passione, quæ ileos appellatur, quā in coli dolore, sumpta a positu, indicatione, a quacunq; causa ortum trahat ileos. Igitur si pendebit ex siccorum stercorum multitudine, tolletur iuribus pinguibus, clysteri leniente, quod obstructioni, quæ fit a stercore duro, remedio sit duritie humidus, & pinguis clyster, Gal. lib. art. medi. & cum acribus euacuatio. quorum vtrunque, emollitionem scilicet, & euacuationē ius galli habet, a Mesue descriptū. Ad extra irrigationibus, fomentis, cataplasmatibus habētibus vim emolliendi, descensu in oleum calidum, aut in aqua, & oleo refertum vtendum, in qua aqua malua, & althæa prius fuerint incocta. acetum etiam in aqua & oleo decoctum, ac bibitum, deinde frustra panis ex aqua feruenti præbeatur, ex Oribasio: & camomelli decoctū, quod vt siquid aliud, visceribus gratum est, condensata corpora rarefaciens, indurata emolliens, ac tensa relaxans, doloresque sedans, ac

*Symptomata
expulsionis
abolitæ.*

*Ileos.
Tarda alui
deiectio.*

*Ileos ex ster-
corum sic-
corum mul-
titudine.*

*Decoctum
camomelli.*

*Voluulus
a venenoso
pharmaco.
Expulsionis
deprauata
symptoma-
ta.*

*Nausea &
vomitio.*

mitigans, 3. de simp. med. & lini semen, quam-
uis minus camomello sit visceribus gratum,
vt ait Galenus. Iisdem decoctis relaxantibus
fouendus erit podex cum spongiis, vt mulcu-
lus relaxetur, & ne ab ipso incipiat cōstrictio-
nis motus. Eodem modo si a venenoso phar-
maco voluulus contingat, vomitum prouo-
cabitur aqua tepida, oleo, & iuribus pingui-
bus. Sequuntur vitia expulsionis deprauatæ,
veluti est singultus, nausea, & vomitio. sed de
singultu iam actum fuit in retentione deprau-
ata, cuius symptoma quoquo modo videtur
esse. Nauseæ igitur, ac vomitionis causa erit,
aut humiditas lola absque materia, aut cum
vitiatis humoribus, sui humiditate totum vē-
trē exsolutum, ac laxum reddens, & tunc vti-
lissimus ei erit astringentium eduliorum, po-
tuum, ac pharmacorum vñs, octauo de cōp.
med. per loca, quemadmodum, vbi fuerint re-
dundantes circa stomachum & ventrem hu-
mores, in maximum proueniunt detrimen-
tum ægri ex vñu astringētium. Vbi igitur pen-
debūt a tenuibus, ac serosis humoribus (nam
bilis in ventriculo oriri non potest, nisi ad i- B
psūm transmittatur) confestim vomitu erunt
eiiciendi. quod fiet mulsā secundum Galenū,
sed aquæ mulsæ sumēdum plus erit, quam vel
nutrimenti, vel etiam deiectionis causa sume-
retur, 7. meth. aut mulsā, in qua incoctum sit
absinthium, ibidem Gale. quæ tenues succos
deorsum pellere potest. aut si vitiosi succi in
ven-

ventriculi tunicis imbibiti deorsum pelli non poterunt, pharmacis pellendi erunt vim purgandi eos obtinētibus, modo eorum vis ventriculi, & intestinorum loca non ascendat. In quem vsum præstantissima sunt medicamenta, quæ ex aloe componuntur, aut aloe ipsa, si composita ad manum non sint 7. meth. quod nihil vtilius sit ad humiditatem viciatam perigantem tunicas ventriculi picra ex aloe, 8. de comp. med. per loca. Quare drachma vna aloes elotæ exhibebitur, quod lota, licet minus purget, magis tamen roboret. odoratis etiam naribus ad motis sistetur, quod odoratorum opposita graucolentia nauscam excitent. Vbi autem affectio diutius permanebit, & cibi nō retinebuntur, cucurbitula ad os ventris erit affigenda cum plurima flamma, donec locus rubefiat, atque ipsa adhuc affixa præbeatur cibibus, ex Aetio. Sequuntur symptomata nutritionis; & primum nutritionis diminutæ, veluti est hepatica affectio, & hydrops. Ad hepaticam affectionem Galenus 8. de comp. med. per loca, nihil adeo inquit epaticis opitulari, vt vnam passam, ob hoc, quod cum familiaris nobis sit, in tantum astringens est, quantum opus habet viscus affectum, habet autē & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna; estque ipsa haud facile putredini obnoxia, & præter hæc secundum totam substantiam visceri ipsi est familiaris & propria. Amplius, si hepatica affectio fiat ex

*Purgantia
ventriculi
& intesti-
norum loca
non ascen-
dentia.*

*Nutritionis
diminuta
symptoma-
ta.*

*In hepatica
affectione
vna passam
est præstan-
tissimum
remedium.*

*Hepatica
affectio ex
intemp. ca-
lida.*

calida intemperie, Asclepiades medicamen-
tum hoc Antonii musæ exhibebat, 8. de cōp.
med. per loca. Succu cichorii cyathum vnum
cū aquæ calidæ cyathis tribus, mellis attici co-
chleario addito; est namque cichorii, & seridis
etiā facultas subfrigida, & subamara, & mo-
derate astringens, & propter has qualitates o-
ptima pharmaca in temperiebus hepatis cali-
dis, commissuras venarum osculorum in sima
visceris parte ad eas quæ in gibba sunt, exter-
gunt, & robur visceri addunt per astrictoriam
facultatem. Vtilis autem est non solum succus
ipsorum tum recēs, tum exsiccatus, sed & ipsa
olera exsiccata, tusaq; ac trita potui inspersa, &
eorum decoctum in potu acceptum, similiter

*In hepatica
affectione
Galenus
vult ut Phi-
lonis anti-
doto.*

& radices ipsorum. Audet præterea Galenus
Philonis antidotū, semel tamen exhibere, ait-
que omnem aliquādo se calidam intemperie
mirabiliter sanasse, 8. de comp. med. per loca.
Notanter autem dixi semel, quod ut ait Galen.
nullum hepaticum pharmacum vehementer
refrigerare debet. morśulis etiam, epirhema-
tibus, vnguentis, cataplasmatibus alterari po-
terit. At vbi ex frigida intemperie symptoma
pendebit, potū vini, præsertim tenuis, & odo-
riferi extollit Gal. de cōp. med. per loca, quod
conuenientissimū sit, quia nutrit, concoquit,
roborat, & putrefactioni resistit, & antidotū
Ciphoiden ex Andromachi auctoritate ma-
gnopere extollit: cuius descriptionem ponit,
& omnia quæ eius compositionem ingredi-
untur

*Hepatica
affectio ex
intemp. fri-
gida.*

untur accurate examinat. Poterit conducere etiam compositum Galeni medicamentū ex malorum cotoneorum succo, 6. de tnen.val. Notandum autem illud est, vbi intemperies frigida humori pituitoso in viscere existenti
 110 erit associata, materiam esse euacuandam medicamento, quod non solum habeat facultatē educendi pituitam, sed etiam viscus ipsum roborandi, cuiusmodi est agaricus, Paulo, & Aui. quidquid alii dicant. Ad extra illinitionibus erit vtendū, vnguentis, ceratis, epithematibus calidis in superiori libro enarratis. Vnū aliud *Iecur lupinū cuilibet hepatis imbecillitati auxiliatur.* prater hæc ponit Galenus, quod indifferēter cuilibet hepatis imbecillitati a quacunq; causa orta auxiliatur 8. de comp. medic. per loca. Lupini iecoris triti dra.j. cum vino aliquo dulci, non febrientibus: febrientibus vero ex aqua calida, aut cichorii succo, Galeno. Verum est, quod 11. simpl. med. fac. ait: Iecur lupinum sæpenumero in medicamen indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur, nec tamē quod mentione dignum sit præstare comperi, comparans ad illud, quod sine ipso componitur, forte, quoniam per se solum exhiberi debet, veluti 8. & 6. de comp. med. per loca. Hydrops *In anasarca balnea.* vero, & primum anasarca, seu aqua intercutē, indiget vrinā cientibus, ad extra fluuiatilibus, & marinis arenis, quod exsiccent tumorem ab aqua intercutem carnem, agroto in eis calfactis decumbente, 9. simp. medic. aut aqua marina, aut aluminosa, aut sulphurea

- Cochlea.* lauandus æger, & 10. simpl. Cochleæ inquit, quæ vstionem expertæ nō sunt, tritæ vna cum testis imponantur, & toti ventri aqua intercutem laborantium, & in arthriticis articulorū tumoribus aggre quidem diuelluntur; cæterū impense deficcant, & sane inharere sinere oportet quoad sponte decidant. Cataplasmatibus etiam erit vtendum, & vbi iis nō cesserit, chirurgia erit vtendum. Ascites & ipsa iisdemet, in qua tamen cauendum erit ab vniuersa aquæ euacuatione, tanquam periculosa, Gal.
- In Arthriticis tumoribus cochlea.* & Hipp. 6. aph. 27. Tympanites vero saccellis flatus dissoluentibus, cucurbitulis toti ventri applicitis, & cataplasmatibus. Illud autem erit aduertendum, quod si cum aqua intercutem febris erit complicata, admodum calidis auxiliis vtendum non erit, sed eius quod magis vrgebit cura erit habenda, altero non neglecto, vel omnibus pari studio auxiliandum, ex Gal.
- Ascites.* 1. aph. 16. Sequitur nutritionis abolitæ symptoma, quod atrophia, & tabes appellatur, Gal. li. de marasmo, lib. de cibis boni, & mali succi, & 5. & 7. metho. quod sum sit ab Hippocrate 5.
- Tympanites.* aph. 64. lacte nihil præstantius esse affirmant, eo quod optimi sit succi, multique alimenti, 3. fac. alim. promteque concoquitur, ac distribuitur. Amplius quod vlceri etiā in pulmone maxime auxilietur, cū detergat, vlcerare purget serosa eius substantia & caseosa cōsolidet. Genus autem lactis muliebri cæteris anteponendum. Modus autem illud assumendi optimus
- Aqua intercutem cum febris.*
- Nutritionis abolita symptoma.*
- In tabe nihil lacte præstantius.*

mus est ex vberibus more infantium, aut vbi hoc non placebit ægro, calens ex mamillis extractum est bibendum, 7. meth. proximum a muliebri est asininum, ab iis bubulum, ac caprillum. Quantitas vnc. iij. aut iiij. & post eius assumptionem alium cibum non sumant, nec bibant, ne corrumpatur. *Lac quando cauendum.* Cauendus tamen erit lactis vsus, vbi valida febre tabidi laborabunt, cum iis duntaxat exhiberi debeat, qui nō valde febricitant, 5. aph. 54. Hipp. Quando autem non solum curadum est, vt a pulmone sursum efferantur humores; sed etiam est adhibenda cura ne alii congregentur, excogitata proinde a medicis sunt, vbi expurgandum ex pectore, aut pulmone pus erit, fortissima, vt ait Gal. 5. metho. quæque maxime dissēcent pharmaca. *Mel.* In quē vsū conducit aqua mulsæ per se, quod mel, non solum quia detergendi vim habeat, vlceri non noceat, verum digestionis aliorum medicamentorum in corpus sit instrumentū, ac celeris transitus vehiculum. quam ob rem *Aqua mulsæ in tabe.* omnibus medicamentis, quæ thoracis, ac pulmonis vlceribus sunt destinata, ipsum admisceri præcipit Gal. 4. meth. Aqua igitur mulsæ conferet vel per se, vel cum amilo, & iride, & *Vlceris pulmonum exsiccatio.* dulci radice in ea decoctis, vel hyssopo, seu marrubio, & elegmatibus, & morsulis. Pro vlceris autem exsiccatione tabidis per interualla mithridato, theriaca pro forti pulmonis exsiccatione vsus est Gal. 4. loc. aff. quibus tabidi hoc acquirunt, quod vlcus non ultra pro-

*Tussis in ta-
be.*

*In tabe quā-
do sit insti-
tuendum
cauterium.
Nutritionis
deprauata
symptoma.
Cachexia.*

*Generatio-
nis sympto-
mata.
Venereæ rei
impotentia.*

greditur, sed siccatum, ac cœu callo obductum longiori vita eos frui sinit. Vbi tussis molesta alliget, thymus tritus, & hyssopus cum succo radicis dulcis, ac melle cocto excepta, formataque sub lingua tenenda dentur: illud aduer- tentes, quod omne medicamentum agro su- pino est exhibendum, & ore continendum, paulatimque permittendum in asperam arte- riam defluere, ex Gal. 4. & 5. metho. Ad extra cataplasmatibus, & ceratis vtendum. Cauteriū autem in capite non erit faciendum, nisi malū affluxu acrium humorum procedat. Sequitur symptoma nutritionis deprauatæ, quæ ca- chexia dicitur, in qua curanda, perpetuo ex quacunq; causâ ortum duxerit, hepati succur- rendum erit, & erit roborandum, cum sit san- guinis officina, cauentes semper ne cruditas sequatur, quæ in venas & habitū corporis vti- lioris vice alimēti rapta, partibus corporis ap- ponatur. Qua ratione cibus erit vtendum sim- plicibus, & qui facile coqui possint, ac opti- mum sanguinem gignere, vitando crassa, & viscosa, & quæ difficile coquuntur. Sequuntur symptomata generationis: & primum ignauia partium genitalium, seu impotentia rei vene- reæ, quæ sane cibus calfacientibus, & optimū succu gignentibus erit restituenda; veluti car- nibus gallinarum, caponum, perdicū, phasia- norum, auicularum montanarum, iuuenum columborum, testiculis gallorum, & præter succi bonitatem, cibaria flatui debent esse as- sociata,

fociata, veluti cicere, faba, nucib. pineis, amygdalis dulcibus, & vt ait Gal. s. simp. iis sit vtendū, quæcunq; semē aut pcreare aut prouocare possunt, quæ sane bene nutrire debēt, & esse flatuosa; veluti lini semē, & eruca, Gal. s. sim. & testes vulpis sicci triti, cochleari mēsurā potati, membri enim tentiginē faciunt: & huiusmodi morfulis erit vtendum: Ex feminis erucæ, vrticæ, anisi, ac fœniculi, & pastinacæ an. dr. β. nucis pineæ, amygdalarū dulcium an. drac. ij. piperis, cinnamomi an. vnc. β. ramenti genitalis. ceruini, ac satyrii an. vnc. j. diambra, seu diamuschi, vel diasatirii drach. j. β. sacchari dissoluti in aqua melissophili, & rosarum quantum satis sit, fiant morfuli ponderis vnc. j. & cum odorato vino fuluo, seu subrubro præbeantur ante cœnam, vel etiā mane ante prædium. Sequitur sterilitas, quæ sane cum pluribus ex causis fieri possit, quandoq; ex nimia apertione, quandoque ex nimia oris vteri angustia, aliquādo ex intemperie humida, siccā, calida, frigida: ex causarū remotione symptoma etiam remoueri solet. Si in compositione error sit, veluti ex nimia oris angustia, tollitur fomentis, infussionibus, perfusionibus, ac pessis odoratis, & mollientibus, veluti ex decocto maluarum, feminis lini, althææ, fœnugræci in oleo & hoc decocto vtendu erit non solū pro infussionibus, sed etiā pro iniectionibus; pessis etiam hoc modo factis: Ex radicum, & foliorū maluarum & althææ contusarum an. drac. ij.

Testes vulpis.
Morfuli.

Sterilitas.

In sterilitate ab uteri oris angustia.

Pess.

farinae seminis lini, & fœnugraci ana vnc. j. adipis anseris drac. iij. croci parum, & moſchi parum, miſceantur, & in ſerico linteo vbi fuerint inuoluta peſſi fiant, qui in oleo irino, aut liliaceo intincti ſubdantur: procedente tempore addendo artemiſiam, amaracum, pulegium. Sin autem cauſa fuerit nimia oris vteri apertio, & hiatus, fomentis, & aliis medicamentis ſiccioribus erit vtendum, quæ habeant vim aſtringendi, veluti eſt gallarum decoctum, citini, lêtifcus, rubi radix, mirtus, & huiusmodi. Vbi intemperies cauſa fuerit, eaque ſicca, balneis tolletur, inunctionibus, cataplaſmatis, ac inſeſſionibus humectandi vim habentibus. Vbi intemperies humida fuerit, reſiccantibus, ac aſtringentibus erit tollenda poſt vniuerſi corporis euacuationem, quod ante eius purgationem cohibita materia ad principales partes decurrere ſoleat, huiusmodi decocto: Ex lêtifco, mirto, roſis, rubi teneris virgultis, rhu coriario, mali punici floribus, & gallis, & pilulis cupreſſi, ex quibus inſeſſus, irrigationes, fortus, cataplaſmata, iniectiones, & peſſi erunt formandi: Et potionibus huiusmodi: mirri baccas, aut malicorium punici dulcis cum vino terito, & exhibeto, aut auellanas nuces vſtas cum vino tritas propinato. Vbi cauſa fuerit intemperies calida, potui exhibenda erunt ea, quæ habent vim inſtigidandi, ſeu ſyrupi, ſeu decocta fuerint, & aquarum dulcium balnea, & applicatio medicamentorum inſtigidantium lum bis,

III

In ſterilitate ab vterioris nimia apertione.

Ab intemperie ſicca.

Ab intemperie humida.

Ab intemperie calida.

lumbis, pubi, & imo ventri, veluti solani, aut
vmbilici veneris succus, semperuiui, aut lactu-
cæ rosaceo admixto, aut foliorum atriplicis,
portulacæ, seu lactucæ excipe pugillos duos,
olei rosacei, violacei, & citrinorum an. vn. j. fa-
rinæ hordei pug. j. cum succo solani aut vmbi-
lici veneris, & pauca aqua rosacea fiat cataplas-
ma, & prædictis locis applicetur. amplius in
pudendum subdendo solani, aut vmbilici ve-
neris succum rosaceo admixtum, qui inuolu-
tus linteo lineo ad digiti formā excipiat. Vbi
vero causa fuerit intemperies frigida, potui *Ab intemp.*
post purgationem erunt exhibenda hæc, ca- *frigida.*
storeum, cuminum, anisum, pulegium, piper,
& huiusmodi, absorbenda cum vino odorato
albo, aut aqua mulsa: & potus mercurialis cum
castoreo, aut absinthio trib. aut quatuor die-
bus, consueto mensium tempore. Vtero vero
suffitus erit fiendus, & per arundinem ollæ
operculo perforato insertam erit excipien-
dus, muliere pannis circumtecta, ex calidis o-
doratis fiendus, cassia, cinnamomo, costo, amo-
mo, thure, myrrha, stirace. Vapor etiam fieri
poterit ex aqua calida, in qua prius fuerint de-
cocta artemisia, salvia, ruta, cuminū, pulegiū,
idemque decoctum per pudendum iniici po-
terit, pelli etiam erunt subdendi ex myrrha,
ruta, galbano, castoreo, chia mastice, excipero
parati. Hactenus de symptomatibus animæ *Sensitiua a-*
vegetatiuæ. sequuntur symptomata animæ sen- *nima sym-*
sitiuæ. Et primum visionis debilis, cuiusmodi *ptomata.*

*Nyctalopia
curatio.*

offusio.

*Suffusio in-
cipiens.*

*Auditio
gravis.
Surditas.*

est nyctalope. Pro cuius curatione laudat Gal.
4. de comp. med. per loca, iecoris hircini saniē
colligere, quæ dum assatur effluit, hacq; ocu-
los oblinire, iecurque ipsum, maxime hircinū
assatum cum sale: sin minus caprillum come-
dendum exhibere. Solent etiam oculi illiniri
melle despumato: quo iniecto, vt cōtineatur,
oculi sunt claudendi. Ad hebetudinem vero,
& obscuritatem, seu offuscationem, illinian-
tur oculi eodem modo melle, sed ante illini-
tionem per spongiam in aqua calida marina
tinctam, fomentum adhibendum erit, aliquā-
do etiam tota facies in marinam tepidam im-
mittenda. incipientem autem offuscationem,
aut suffusionem 4. de comp. med. per loca, in
fine, persanat omni felle cum marrubii succo,
ac melle attico. Ad auditionem autem grauē,
& surditatem, capite præsertim graui ac reple-
to prius exsiccato ac corroborato, 3. de comp.
med. per loca, in ipsam aurem immittit phar-
maca, quæ crassos ac viscidos humores fin-
dant, secēt, attenuentque. Ex quorum nume-
ro est absinthium cum aqua decoctum, ac per
arundinem pro fomento adhibitum: ita vt al-
tera arundinis pars cavitati auris adaptetur, al-
tera vero foramini operculi ollæ inferatur,
quo vapor, qui exhalat, in auditorium mea-
tum illabatur, Apollonii auctoritate. Fomen-
tis quoque vtendū, quæ per spongas fiunt, ex
aliquo decocto, & castoreum cū baccis lauri,
& aceto permixtū instillandū. Sustinet enim vt
ait

ait Gal. 6. meth. med. in fine, auditorius meatus validissima medicamenta, quamuis non solum usque ad cerebri duram membranam pertingat, sed etiam neruum contingat, qui in ipsum a cerebro descendit. Sonitus autem aurium, si in febribus fiant, non sunt interturbandi, quod ut plurimum statim sedentur, ex Galeno. Si igitur causa erit spiritus flatuosus, crassus, lentusque humor, desiccantibus, attenuatoriis, & discussoriis pharmacis erit utendum, veluti oleo amygdalarum amararum, ex Archigente 3. de comp. med. per loca, castoreum facit, & spica nardi, a quibus portionibus cum aceto & rosaceo, si instilletur. & ex Apollonio, porri succus cum lacte muliebri, aut rosaceo infundendus. Quod si fiat sonitus ob sensus subtilitatem audiendi, praedictis pharmacis ex stupefacientibus quidpiam admiscet Gal. veluti mandragorae, aut papaueris succum, aut rosaceum cum paucis aceto, ac paucissimo opio. Laesionem vero olfactus, & narium vitia Gal. lib. de instrumento odoratus curauit, cuiusdam adolescenti, qui a diuturna tum grauedine, tum distillatione, odorandi sensum laesum habebat, aquam in ore continendam exhibendo: qui ubi per triduum hoc auxilio usus fuisset, magnopere ab eo adiutus fuit. Sequitur stupor, & paralytis imperfecta. Qui stupor cum sit tactio diminuta, & veluti paralytis quaedam imperfecta, differatque solum secundum magis & minus, id est de causis symptomatum, quae propter ea-

Auditorius meatus fert medicamenta validissima.

Aurium sonitus in febribus.

Sonitus aurium a spiritu crasso & flatuoso.

A subtilitate sensus audiendi.

Olfactus laesus.

Stupor seu paralytis imperfecta.

*Capitis do-
lor ex siccitate,*

*Ab intemp.
calida.*

*Ab intemp.
calida cum
materia biliosa flaua.*

dem etiam remedia, quæ paralyſi, ſtupori etiã auxiliabuntur, differentia ſolum ſecundum magis & minus. Et quoniam paralyſis imperfecta, quæ tactum ſolum deperdit, eandem curationem requirit, quam paralyſis perfecta, quapropter adhuc locum confugiendũ erit, & erit vtendũ remediis paralyſis perfectæ. Sequitur dolor, & primum dolor capitis. Qui ſane ſi pendebit ex ſiccitate, tolletur irrigationibus iuxta coronalem commiſſuram ex oleo amygdalino dulci, aut violaceo, & camomellino ſimul commixtis, & errhinis ex gallinarũ iuſculis, & ſaccharo albo, & potu aquoſo. Vbi vero ortum trahet ab intemperie calida, ſomni habenda erit maxima ratio, Apollonii auctoritate, 2. de comp. med. per loca aquæ potatione, aut vbi aquam bibere nõ poterit, aquoſo vino, Galeno: roſaceo etiã caput erit ungẽdũ iuxta ſinciput propter laxitatẽ coarticulationis, iuxta coronalẽ commiſſurã. Etenim ob oſſiũ tenuitatẽ, & raritatẽ facile qualitas medicamentorum penetrare poteſt. proximum a roſaceo eſt camomellinum, eligendo menſuram roſacei & camomellini, pro ardoris magnitudine, & habitu corporis. vtendum erit localibus in intemperie calida cerebri, ſuperius enarratis. Vbi enim intemperies pendebit ab intemperie calida cum materia bilioſa flaua, iſdem localibus erit vtendum, ſed adhuc frigidioribus & humidioribus. Vbi vero dolor capitis ortum trahet ab intemperie frigida cũ materia

materia pituitosa, prius purgata materia & e-
 uacuato capite, apophlegmatissimis vtendum
 erit calidis, errhinis, sternutatoriis, odoratis
 orbiculis in morbis capitis dictis. Intemperies
 postea frigida, potissimum si erit orta ex frigi-
 ditate ambientis, si recens erit, Galeno 2. de
 comp. med. per loca, auctore facile depelletur
 vt interdum sufficiat rutaccum oleum calidū
 sincipiti affusum, & frons erit illinienda, & au-
 rium ac narium meatus: imo quidam pedum
 vestigia, ac sedem illinunt, vt ibidem testatur
 Galenus. Et sacculis erit vtendum, vnguentis,
 & embrochis pro depellenda intemperie fri-
 gida capitis iam enarratis. Vbi vero dolor non
 ex bile, aut pituita, sed ex sanguine, seu pletho-
 ra ortum trahet, curata prius plethora, locali-
 bus postmodum erit vtendum, iis primum,
 quæ a capite vim habent repellendi, dein iis,
 quæ dissoluunt & euacuant, postremo corro-
 borantibus. Repellit autem, Galenus ibi oleo
 omphacino, dein addit aliquid ex discussoriis,
 vt camomellinum & anethinum, aut in oleo
 serpillum, aut hyssopum fac decoquas. Et vbi
 opus erit, irrigationibus erit vtendum, quæ
 vim habeant discutiendi. Si dolor erit ex flatu,
 & simul cum flatu calor in capite prædomine-
 tur, rosaceum erit adhibendum, quod videli-
 cet repulsiuum, concoctorium, mitigatoriū,
 ad hæc discussorium etiam sit, Gal. 2. de comp.
 med. per loca. Vbi autem flatu erit cum fri-
 gore, loco rosacci vtendum erit camomellino

*Ab intem.
 frigida cum
 materia pi-
 tuitosa.
 Capitis do-
 lor ex in-
 temp. frigi-
 da ab am-
 biente cau-
 sata.*

*In capitis
 dolore a
 plethora.*

*A flatu cum
 calore.*

*A flatu cum
 frigore.*

*Cephalaa.**Hemicra-
nia.**Ars sedandi
dolores.*

cum aceto, quod attenuatoriam, & discusso-
riam habet facultatē. Et vbi augetur affectio,
Archigenis auctoritate, facienda erit irrigatio
ex ruta viridi cum aceto & oleo trita, & saccu-
lis, & odoramentis ad intemperiem frigidam
capitis facientibus: & pro flatu discutiendo,
diacumini, aut dianisi drach. j. mane erit assu-
menda. Cephalaa iisdem repellentibus discu-
tientibus repelletur, ex verbenaca oleo inco-
cta, si enim cum ea caput irrigetur, omnē ca-
pitis dolorē antiquum ex frigiditate, aut cras-
sis humoribus ortum medetur, Gal. 2. de cōp.
med. per loca. Hemicranæ vero Gal. in fine
2. de comp. medic. per loca, ob frigidas causas,
dimidiam frontis partem vna cum temporis
musculo, ex euphorbio, oleo, & cera parato
vnguento illinit, commodissimū enim asserit
esse medicamentum. Euphorbii sumens vnc.
j. olei lib. j. ceræ quadrantem. quod si validius
videbitur medicamentum, poterit euphorbii
vnc. s. assumi, præsertim si euphorbium vali-
dum sit, corpusque molle, ac exactiori sensu.
Iuuat etiam si in aurem instilletur hoc modo,
euphorbii scrupu. j. olei dulcis vnc. ij. quibus
commixtis, gutta vna, vel duæ in aurem instil-
lentur. Cauendum autem ab hoc pharmaco
in iis, quibus a calidis vaporibus, aut humori-
bus hæmicrania gignetur. Quoniam vero do-
lor est vnum ex iis symptomatibus, quæ tra-
here solent ad se curationem vniuersam, qua-
propter sequitur vt diligenter agamus de arte
sedandi

sedandi dolorem. Igitur sciendum sedationem doloris esse alterationem factam vel a calido moderato, vel excedente frigido, ut vis tactiua a nocuo liberetur. Ideo autē dicitur: sedationem doloris esse alterationem, ad differentiā auersionis, & euacuationis. Et quod additur: fieri vel a calido moderato, vel ab excedente frigido, notat causam efficientem sedandi dolorem duplicem esse: altera est, qua mediante humores in loco impacti partes distrahentes, & solutionem continui molientes, per halitum discutiuntur aperiendo meatus. Apertio autem, seu rarefactio a calore moderato fieri debet, ut tensio tollatur. Tensio autem tollitur causam auferendo. Causa auferitur euacuando materiam, & discutiendo. discussio autē fit efficiendo cutim raram. Rarum autem aliquid fit a calido, non tamen assante, quod tenuis substantiæ sit: & hoc, quod calor assans constipationem potius quam raritatem efficiat. tenuis etiam substantiæ esse debet huiusmodi causa effectiua, ut facile penetret, & crassitudine non constipet: veluti sunt lilium, camomellū, semen lini, fœnugræcum, samplicum, pulegium, calamentum, origanum. Notandum autem quod ubi timebimus attractionē, calidis utemur in primo gradu tantum, in secundo vero & in tertio, ubi sine timore attractionis validam discussionem operamus. Vbi autē huiusmodi efficiente dolor sedari non potest, tunc transimus ad alterū genus efficientis, utē-

Quid sedatio doloris.

Dolores sedandi duplex causa efficit.

*1.
Apertione tollitur tensio.*

2.

Capitis dolor criticus.

Capitis dolor biliosus.

Narcotica in affectibus calidis sunt iustiora.

tes frigiditate intensa, qua mediante sensum stupefacimus, ut membrum propriam iniuriā non percipiat, quod fieri solet excessiue frigidis. Atque hoc est illud, cur practici in dolore capitis, qui criticus non sit (quod dolor capitis criticus 3. progn. & crismus, præsertim crisi per vomitum, aut hemorrhagiam imminente, remediis non egeat, nisi iis forte, quæ vomitū, aut sanguinis fluorem e naribus celerent, & promoucant) quique dolor non sit ex capitis cōsensu cum toto corpore in febribus, quod febris existens symptoma his persanatis cesset, nec remedia postulet. vbi tamen dolor ob vehementiā remedia postulat, uti solent frontalibus ex oxyrhodino, populeo vnguento, & frigida quedam ore contineri iubent, non autem sincipiti repellentia applicant, ut in cautionibus repellentium diximus. Et vbi dolorē capitis, biliosum esse cognoscunt, atque doloris vehementia vinci non potest, ad narcotica accedere solent, id est, stupefacientia sensum tactus, & ob id modo quodam dolorem sedantia. Notanter autem dictum fuit, in dolore capitis a bile, quod in affectibus calidis tutiora narcotica sint: Galeno tamen semper formidata, ut apñ. 31. lib. 6. & 12. meth. vnde in capitis dolore ab intemperie calida pendente, etsi refrigerandum sit, a papaueris tamen & mandragoræ succo abstinendum esse iubet, quod non citra damnum refrigerent. Quare caute saltem erunt applicanda, nec ita valentia, nec diu

diu hærere sunt permittenda, præsertim parti capiti principi, & natura frigida, quia multos ita sopiuerunt, etiam partibus aliis indita, vt postea nunquam sint experrecti. Qua ratione narcoticorum optimam compositionem facere volentes, vt ait Gal. 9. de comp. med. per loca, ad tria præcipue respexerunt: primum vt sensus tactus obtundatur: secundo vt nihil noxæ ex illa stupefactione in particula relinquantur: postremo, quod est maximum, vt dispositioni auxilietur. Quæ tria Philo in sua antidoto seruauit. Nam hyosciamus, & omnium valentissime opium facultatis sensoria stuporẽ, & somnum torpidum frigiditate summa molitur. Vt autem horum vehementia obtundatur, nec adeo noceant, sed imminẽs ab eis noxa potius inhibeatur, vtque citius distribuantur obstupefacientia (nam per se admodum tarde permeant) & penetrent interiorum affectarum partium substantiam, calfacientia adiecit, costum, pyrethrum, euphorbium, piper, quæ etiam noxios, & dolorificos humores coquere, crassos tenuare, lentos incidere, & tergere, & flatulentos item spiritus tẽuare, & vtrosque per halitum digerere, & vacuare possunt. Ob hæc Philonium, & quæ humida sunt, doloribus implacabilibus salubria esse solent. Sequitur vt discurremus artem placandi dolores, qui per alias corporis sedes inueniuntur. Ad eundem modum in conuulsione seu spasmo, qui dolorem adeo intolerabilem in-

*Galeno tamen semper
fermidata.
Narcoticorum optima
compositio
in tribus
consistit.*

*Philonis
antidotus.*

*Dolorem se-
datio in
spasmo.*

M m

uehere solet, vt luctuosum sit clamantes audi-
 re miseris modis sese intorquentes, balneo v-
 tendum erit ex oleo communi temperate ca-
 lido tum per se, tum ei incoquendo semen lini¹¹³
 fœnugræci, folia maluæ, violæ, vel lumbricos,
 & hos iam coctos probe tritos parti imponen-
 do, cataplasmatibus modo. In diuitibus balneum
 ex oleo vulpino, cui vetusto vulpes aliquot æ-
 tate florentes viuę fuerint incoctæ: aduer-
 tendo quod in huiusmodi balneis mora longior
 vires resoluit. Vnde mox dolore sedato, in le-
 cto reclinadus est æger, & cum repetit dolor,
 balneo est reddendus. Anodinum quoq; de-
 coctum capitis lanati; & intestinorum verue-
 cis, & aliorum omasorum. In puncto neruo, vbi ad-
 est dolor vehementissimus, sedare cum solent
 terebinthina oleo rosato mixta, quæ ceterarum
 partium nervosarum dolorem a casu, vel cau-
 sa alia mire compensat: vel fotu partis ex oleo,
 cui terræ lumbrici fuerint incocti, ac ex iisdem
 tritis cataplasma est efficacissimum. panis quoq;
 calidus calido lacte infusus, & cataplasmatibus
 modo impositus valde est anodinus. Vbi au-
 tem dolor nullis huiusce generis remediis vin-
 citur, stupefacientibus tactum vti solent, vt pa-
 nem adhibentes cum decocto papaueris albi,
 & si opus est, cum opio ipso. Atq; vbi nec his
 remediis couulsionis dolor compesci potest,
 neruum transversum secare prestat, quam ho-
 minem certæ morti succumbere. Ad eundem
 modum in oculi dolore ab inflammatione,
 oculo

*In puncto
 neruo.*

oculo ipsi aquam rosarum albo oui permixtā *In dolore a-*
 immittunt, vel lac ex mamma emulgent, col- *culi ab in-*
 lirim quoque vel siccum, vel liquidū in cote *flammatio-*
 medica ex aqua rosarum, vel simili pertritū ex *ne.*
 corallio rubro, gummi arabico, tragacantho,
 pompholige, cerussa lotis, ne oculum morfu
 suo lædant. Vbi dolor non vincitur, opii vel
 opiati aliquid ad sensum tactus oculi stupefa-
 ciendum addunt: vt quod repellendi simul &
 stupefaciendi facultate polleat, vt aquam ro-
 sarum, cui incoctum sit semen papaueris albi,
 etiam addito oui albo, immissa oculo per se,
 vel ex mica panis eo decocto imbuta. Vbi ab
 his dolor non lenitur, trochiscis albis Rasis *Trochisci*
 ex aqua rosarum solutis vtuntur: & hoc, si do- *albi Rasis.*
 lor est vehementissimus nullis cedens reme-
 diis, aliter illis non est vtendum; quod cum
 valenter stupefaciant, spiritus crassos reddant,
 & facultatem visoriam infirmant. Ob id nar-
 coticorum vsus semper Galeno fuit suspectus,
 aphorif. 31. lib. 6. & alibi passim, præcipue
 in oculo, & partibus capiti vicinis frigidis na-
 tura, & etiam morbo. Vt autem ars sedandi *Methodus*
 dolorem in oculo ab inflammatione inflictū *curandi do-*
 manifestior fiat, aduertendum erit, vt post fa- *lores oculo-*
 ctam venæ sectionem humeralis, vsque ad *rum ab in-*
 animi deliquium, vbi vehemens fuerit dolor, *flammatione.*
 & inflammatio, lib. de cur. ratione per venæ
 sectionem, & post factam reuulsionem partiū
 infernarum frictione, & ligatura, & alui deie-
 ctione, Galen. 13. meth. mox fomenta oculo ex

*Repulsoria
debent mo-
deratam a-
strictionem
habere.*

*Repulsoriis
Galenus
admixcet la-
nientia.*

*Anodyna
magnopere
fugienda.*

aqua dulci modice calida adhibeantur, Gal. 13. meth. Et ad mouenda sunt pharmaca repulso-
ria, præsertim circa initia, sed quæ non vehe-
mentem sortita sint astrictionem, quod tuni-
cas exasperando ampliore dolore infligat,
sed mediocris astrictionis prædita esse debet,
quarto de comp. med. per loca: & præter hæc,
quod ppria substantia mediocriter sint astrin-
gentia, moderatiora adhuc sunt fienda lenitiui
liquoris admixtione, tum vt vehementiæ do-
loris habeatur ratio, aut magnitudinis inflam-
mationis, aut acredinis influentium humorũ.
Qua ratione lenitiuorum liquorũ repulsoriis
admixcendorum mentionẽ fecit Galenus 13.
meth. veluti albi oui liquoris, fœnugræci de-
cocti, & ipsius lactis, quod iuuenulæ, simulq;
boni succi fœminæ existat, vberibus ipsius in-
cotem, in qua collirium teritur, expressis, quo
calidum adhuc oculis infundatur. Sed certe
ab eis anodynis, quæ sensum auferendo dolo-
rem sedant, summopere cauet Galenus, tum
quod ipsa nec vehemẽtes fluxiones reprimat,
sed potius excerni prohibeant, atque ob id, si
humores fluentes acres esse cõtingat, corneã
erodi faciant: si vero multi, magis irritari, ac
vehementer extendi, ac si rumperetur, vt ne-
cessẽ sit dolores impatibiles excitari, 6. aph. 31.
(nisi medicamentum summopere sit stupefa-
ciens.) Sed tunc postmodum vbi vehementer
stupefaciens sit, tametsi oculus inflammatio-
nem, & dolorem non sentiat, sequitur tamen
necessario

necessario potestatis visoriae offensio : adeo quod cessante inflammatione , vel debiliter, vel nihil omnino vident, simulque quandam praeduram dispositionē inducunt in oculi tunicis difficulter sanabilem; vt non ab re huiusmodi medicamenta vehementer stupefacientia Galeno semper fuerint suspecta. Quibus tamen si quis aliqua urgente necessitate fuerit vltus, oculos postmodum sanitatis tempore calfacere habet, 12. meth. quo in loco cataplasma etiam confici iubet ex papauerum capitibus in aqua decoctis, ac fœnugraci, vel hordei, vel lini seminis farina aqua immixta. Quo etiam in vehementi aurium dolore vti possumus. Illud autem non est ignorandum, in applicatione medicamentorum dolorē oculi sedatium, maxime inter cæteros præstare oui liquorem, cum minime mordens sit, & glutinosus, atq; hac ratione potens lenire asperitates omnes, quascunque acris fluxio excitare potest. amplius, quod cum crassus, ac lentus sit humor ille, constantius quam tenuis, & aquosus in loco permaneat: & cum absq; rosione sit, si modice incaleat, dolorem maxime lenit, 13. met. vt hac ratione tenuis oui humor rosarum albarum stillatio liquore, aut aqua permixtus, commodissimum sit medicamentum: Vbi vehementer dolor urgeat bis, ter, & quater tenuibus lineis linteis in eo madefactis. Ad hæc corpore iam vacuo, & concoctiã phlegmone, solo balneo dulcis aquæ, & temperato do-

*Anodynis
adhibitis
quomodo
oculis pro-
spiciendum*

*In Aurium
dolore cata-
plasma.*

*Oui liquor
maxime se-
dat oculorū
dolores.*

*Balneum
aqua dulcis
curat oculo-
rum dolores
concocta
phlegmone.*

*In oculorum
dolore ex hu-
moribus
crassis &
frigidis lo-
calia.*

*Fœnugra-
cum.*

lor sedatur, Gal. 13. meth. & hoc dum balneum maxima ex parte humoris fluxionem, qui ad oculos fertur, sistat, maximam eius partem inter lauandum per corpus vniuersum excernendo, reliquum vero diluendo, & temperando; vt hoc solius balnei vsu, vbi in toto corpore adest humorū acrimonia, qualitate potius quam quantitate peccantium, quendam liberauerit dolore affectum ex acrium humorum influxu Gal. 6. apho. 31. Vbi autem dolor oculorum ex crassorum, frigidorumq; humorum redundantia pēdebit, vacuato prius corpore vniuerso, & auerso humorum impetu deorsum, & capite etiam purgato, ex 13. met. mox localibus erit vtendum, non tamen iis, quæ repercutiant, ac reprimāt, quinimmo iis potius quæ euocant, atque digerunt, 13. meth. Quod fiet, fouendo oculos ex fœnugraci decocto, eo prius curioso lauato, ne quid illi vel pulueris, vel sabuli adharens clā lateat, quod vt ait Gale. medicamentum hoc sit omnium, quæ oculis applicantur, sine offensa digerens, simile existens, quoad viscositatem attinet, albo ouorum liquori, discussoriam tamen habet facultatem, & moderate calfactoriam, ob idque multos dolores mitigare consuevit, 4. de comp. med. per loca: quod fomentum oculis ipsis adhibendum erit per spongiam semel, aut bis, ter, & quater, vel sæpius in die, prout vehementior dolor vrgebit: quanquam fomentum itidem fieri poterit non solū per fœnigraci,

114 nigræci, sed meliloti etiam decoctum. Vbi itidē dolor ex flatuoso spiritu fiet, vaporantibus ex milio, aut milio, & furfure faccellis paratis depelli poterit, aliisque digerentibus, euocantibus, ac dissiicientibus medicamentis, vitando astringentia, ac reprimentia medicamenta, Gal. 13. meth. Ad eundem modum aurium dolor, si fuerit a frigidityte, calfacientibus curabitur, oleo rutaceo, laurino, nardino, & similibus; oleo etiam in quo allium decoctum sit, vel capa. Gal. 13. de comp. med. per loca, euphorbii perquam exiguum portiunculā plurimo oleo veteri commixtam mirifice commendat, quod dolores ex frigore contractos ipsarum aurium strenue adiuuet. Amplius, mitigat lac muliebre. Sin autem a calida intemperie dolor fuerit, oleo rosaceo in aurem instillato, albo oui, lacte muliebri, solani succo, & huiusmodi demulcebitur: Vrgente autem dolore, qui vt Hipp. 3. progn. 15. cum vehemens, grauisque fuerit, periculum minatur, quod & mentem turbet, & hominem rapiat, ad leniter stupefacientia erit accedendum: & hoc, quod periculum sit, ne cerebrum neruo, per quem facultas audiendi distribuitur, vicinum per consensum afficiatur. Quo casu pauculum opii lacti muliebri, & oui candido miscendū, 3. de comp. med. per loca. Amplius, castoreo opiū tēperatur, vel æquali pōdere, Galeno auctore, vel duplicato castoreo, ad vehemētissimos qđē dolores equali, ad minores duplicato

*Oculorum
dolor ex flatuoso spiri-
tu.*

*Aurium do-
lor a frigi-
ditate.*

*A calida
intemp.*

*Stupefaci-
entia.*

Sapa.

*Auribus in-
stillantur
medicamē-
ta cū dolor
urget.*

*Dentium
dolor ab in-
temp frigida.*

*Serpentis
exuviae.*

*Stupefac.
vitanda.*

veluti excipiendo opii partem vnā, castorii partes duas, & cum lacte mulieris, seu oui albumine, aut vino dulci tepido instillētur. Vbi vehementior dolor extiterit aequali portione castorium opio miscet Galenus, & sapa prius trita diluit, quod sapa multo magis quam dulcia vina dolorem sedet. Quo autem pacto auribus vehementer dolentibus medicamenta sint iniicienda, 3. de comp. med. per loca, cap. 1. docet Galenus. quod medicamentum ex castoreo, & papaueris succo confectum non solum aurium sedat dolorem, sed etiam oculorum, & dentium, si auribus instilletur, Gal. 12. meth. Sed his vtendum erit tunc solum, cum maxime necessitas vrgebit, cum nonnihil, vt ait Galenus, partes laedat, ac eas imbecilliores reddat ex refrigeratione, veluti reliqua anodyna, & post tempore sanitatis partes ipsae sint excalfaciendae. Sequitur dentium dolor, qui quidem, vbi ab intemperie frigida ortum trahet, os colluendum erit aceto, in quo decoctū fuerit origanum, hyssopus, pulegiū. A totius essentiae proprietate senecta serpentis confert in vino, aut aceto cocta, 11. simpl. Eadem quoque exusta, ac trita, & cum oleo ad mellis spissitudinem redacta, dolentique imposita denti succurrit, Gal. 5. de comp. med. per loca Archigenis auctoritate. A stupefacientibus medicamentis cauendum, quod nonnisi in calidorū humorum defluxu eis sit vtendum, summa urgente necessitate. Vbi igitur dolor dentium
ab

ab intemperie calida ortū trahet, depelletur *Ab intemp. calida.*
 aceto, in quo fuerit decocta portulaca, sem-
 peruiuum minus. Vbi vero intolerabilis erit
 dolor, aceto in quo decocta sint semina lactu-
 cæ, & papaueris. Vbi aliquo modo etiā repri-
 mere voluerimus, vnice conducet acri aceto
 calido cum immatura galla colluere. Vrgente
 autem necessitate, & calore maximo, præser-
 tim in calidorum humorum defluxu, stupefa-
 cientibus erit vtendum, veluti decocto semi-
 nis, aut foliorum hyosciami cum aceto, vel *In dolore in- tolerabili stupefacien- tia admit- untur.*
 philonii drachma vna in aqua, aut vino diluta,
 & hyosciami foliis, aut semine papaueris hor-
 tensis, & semine lactucæ in aceto albo deco-
 ctis. Sequitur dolor ventriculi, qui sane statim
 est sedandus, quod ventriculus sensu tactus, *In ventri- culi dolore.*
 exactoq; sit præditus, præsertim ore suo. Vnde
 præter expellentia causam ipsam, materiā
 scilicet dolorificam, vomitu, aut eius deiectione,
 atque eius præparatione incidendo, ten-
 uando, tergendo, antequam vacuetur, vbi sci-
 licet in vetriculi tunicas materia erit recepta, *Anodyna.*
 7. meth. anodynus dolor erit sedandus, s. simp.
 cap. 18. quæ temperate calida sunt, & fere hu-
 mida, partemque relaxant, materiæ aliquid di-
 gerunt, tensionemque minuunt; veluti fotu
 cum vesica impleta, vel spongia imbuta deco-
 cto camomelli, meliloti, seminis lini, fœnicu-
 li; vel linimento ex oleo lini, camomelli, ane-
 thi; vel vnguento, cerato, emplastro simili ma-
 teria cōstante, vt farina seminis lini, fœniculi,

*Stupefaci-
entia.*

*Ventriculi
dolor a fla-
tibus.*

*Platus dis-
cutientia.*

radice althææ; cyathi etiam duo, aut tres, seu vncia tres, aut quatuor decocti camomelli potu mire iuuant. Quæ si vincantur, & dolor vires prosterнат, ad stupefacientia transeundum, sumta vt opiata zazomea Mesuæ, ad drachmas ij. vel athanasia Nicolai a drachma vna ad sesquidrachmam, vel philoniū romanum Auic. valentissimum, a semidrachma ad drachmam vnam, quod somnum conciliēt per quem vires instaurantur, nec dolor sentitur. Notandum autem huiusmodi remedia esse exhibenda virtute adhuc forti, quod vbi imbecilla est, reliquum calorem extinguere possint. Vbi vero dolor ventriculi pendebit a flatibus, siqua ipsos materia fouebit, apparanda erit & vacuanda, dein flatu dissoluendi; primum clementioribus, & temperate calidis, vt camomello, meliloto; dein valentioribus, vt baccis lauri, alliis, vt Galenus 7. met. & 12. aniso, cumino, galanga cum vino aromatite, aut cretico, dulci, seu maluatico, vel diacumino, dianiso, diagalanga, & valentiore his confectio ex baccis lauri. Amplius tum clysteribus, tum reliquis medicamentis extrinsecus adhibitis ea quæ flatum discutiant erunt permiscenda, vt cuminum, anisum, semen fœniculi, pulegium, origanum, calamintha, fursur, milium, caruum, daucum, anethum, & similia. Insuper drac. j. dianisi, aut diacumini, seu diacalaminthæ cum pauco vino albo præbere poteris. p̄ propriam tamen curationem quandam

dā fortitus est is dolor, qui spiritum flatuosum comitatur, ex cucurbitula scilicet cum flamma copiosa subinde admota, Galenus 12. met. quod præsidium in huiusmodi affectibus incantamenti cuiusdam simile quid efficere videtur, siue in intestinis, siue in quauis corporis particula fuerit excitatus. Ilico enim cucurbitula admota, qui spiritu flatuoso cruciantur tum a dolore liberi, tum omnino sani redduntur. iis igitur expellitur dolor a flatu pendens: cuius sane similis est curatio cum dolore, qui ortum habet ex crassis glutinosis, & frigidis succis, 12. metho. Gal. Sequitur dolor colicus, qui quidem ubi non cedit euacuationis ipsius causæ, & vehementissimus erit, primo anodinis ad moris, aut iniectis, hoc est calidis moderate, pugnandum erit non ultra primū gradum, ut partem materiæ clementer digerant, neque nouam vel attrahant, vel ex pituita ibi contenta excitent, & humidis, ut partes laxatæ tensioni magis obediant, ob idque minus doleant: qualia sunt decoctum seminis, & foliorum lini, fœnugræci, foliorum maluæ, althææ, anethi, fœniculi, florum camomelli, meliloti, & similium: vel clepsidra ex alto ventri vndique lana munito affusum, vel potius ex magna spongia expressa, aut in vesica admotum. Fetus item cum simili spongia, aut vesica ex oleo communi, lini, camomelli, anethi. stercus etiam vaccinum vtiliter ad-

Dolor ventriculi ex crassis & frigidis succis.
Colicus dolor.

Fetus.

Stercus vaccinum.

Infectus.

coctum calidum adinotum. infectus ventris totius inferioris per semihoram in balneo ex dictis plantis cocto. clyster etiam iniicietur ex decocti prædicti, vel iuris pinguis, vel olei camomelli, vel nucum, vel lini, quod efficacissimum est, libra vna, cum cassiæ & sacchari ana vnc. j. vitellis duobus ouorum. sumentur vero decoctum, vel aqua distillata camomelli, ius galli, aut gallinæ cum multo pingui, & croco multo. Quibus victis, & viribus deficientibus,

Narcotica.

ad narcotica erit accedendum, iniecta prius quam sumta, præsertim causa calida, quod frigidam augeant, & crassiorem reddant, siue pituita, seu flatus sit, fiatque dolor non multo post sæuior: veluti clysteribus prædictis commiscentes philonii romani drachmas duas vel tres, opium etiam castoreo correctum. vinum quoque aromaticum clystere iniectum in materia frigida & flatu, salubre est. Si sumi erit necesse, philonium ad drachmam vnā exhibendum erit, 12. metho. vel si commiscebitur cum purgantibus, tutissimum erit, vt cū hyere picræ Galeni mellitæ drach. vj. diapheniconis drac. ij. electuarii indi drac. j. quod calida opii vim frangant, & ipsum mox vacuent cum parte materiæ, opium contra calidorum violentiam obtundat, & tamen agat, sed moderatius. Illud autem diligenter aduertendum erit, nūquid causa doloris sit pituitosus crassus & viscidus humor, an potius calidus & acris. Sique fuerit frigidus & pituitosus humor, tametsi attenua-

*Opio corre.
ctio.*

attenuatione, incisione, & calfactione sit tollendus, ab iis tamen, quæ vehementer calfaciunt esse abstinendum, ne ab eis liquentur, & in flatum vertantur, Gal. 12. meth. quinimo ex moderate calidis ea erunt eligenda, quæ vim habeant discutiendi flatum, magisque siccandi: quemadmodum etiã infestissima sunt in huiusmodi causa frigida quæ torporem inducunt medicamenta, tum quod causam augeant, & humorem tum crassiores, tum motui ineptiores efficiant, tum quod frigidi humores, modo soli sint, dolorem vehementem non inducant, tum etiam ratione loci, quæ intestinorum tunicæ medicamentorum frigiditate densiores, minusque flatui transmittendo habiles redduntur, ut hac ratione concludat ibidem Galenus, tutius curari huiusmodi dolores medicocri victu (quanquã longiori tempore id fiat) quam ut violenter calfacientibus, aut torporem inducentibus medicamentis. Ut autem res clarior euadat, percurramus sigillatim medicamenta facientia tum ad colicum pendentem a materia frigida, tum ab acri materia calida: incipientes ab eo, qui a frigida. Igitur vomitus, ubi quis facile vomat, ante omnia, ante cœnam scilicet erit procurandus, Actio. postea diatrionpipereon, vel theriaca erit exhibenda, dein purgans medicamentum ex hyera Archigenis, in hunc modum: Ex pulpæ calfiæ nouiter tractę ꝑnc. j. ß. diacatholiconis dra. vij. pulueris hyeræ simplicis drac. j. ß. fiat bolus.

In dolore colico ab humore pituitoso vehementer calfacientia sunt fugienda.

Item stupefacientia.

Doloris colici a materia frigida curatio.

Bolus.

Clyster.

Clyster quoque in principio conueniens erit ex oleo communi, quod saepe vitream cū fecib. pituitam expulit, ac dolorē subito finiuit: aut ex eodem oleo, in quo prius fuerit decocta ruta, aut aliquod semen, q. flatū discutiat, Gal. 2. loc. aff. & 12. metho. illi aduicentes adipē anserinum, aut gallinaceum etiā, qui salis expers sit, nec admodum vetus, 12. meth. aut huiusmodi alius clyster conferet. Ex foliorū maluarum, althææ, mercurialis, & betæ ana man. j. anethi, rutæ, florum camomelli, fœnugræci, seminis lini ana manip. β. anisi, fœniculi, & cumini ana drac. ij. fiat decoctum in aqua fontana, cuius per colum transfusi accipe lib. j. mellis rosacei vnc. ij. olei camomellini, anethini, vel rutacei vnc. iij. salis communis drac. iij. cōfectionis de dactylis dr. iij. vel hyerē picræ simplicis vnc. β. fiat clyster: vel hyeræ compositæ dra. iij. vbi illa non sufficient. Vbi autē ex doloris vehementia clysteres nō retinebunt, glāde erit vtendum: Ex mellis cocti quantum sufficit, pulueris hyeræ ex septem rebus: agarici, & salis gemmæ an. drac. j. foliorum rutæ dra. ij. fœniculi, & cumini an. scrup. j. formentur glādes longiusculæ, digitorum fere sex. Fomento etiam erit vtēdum sicco ex milio, Gal. 12. met. vel sacco ex milio, furfure, camomelli floribus, meliloto, fœnugræco, lini semine, & anetho, in calfactis lateribus, vino albo prius irroratis calfacto. fotu etiam tali: Ex foliorum & radicum althææ, & maluarum an. pug. j. florū camo-

*Glandes.**Fomenta.*

camomelli, fœnugræci, feminis lini, anethi, meliloti an. m. β. anisi, cumini, & feminis fœniculi, an. dra. iij. bulliāt in hydræleo, & cū spongiis dolentibus partibus applicentur. *Inseſſus.* etiā ex fœnugræco, althæa, camomello, artemisia, anetho, lauro, & similibus: vel etiam iuuabit in oleum calidum, aut hydræleon descēdere: a balneo bibendo absinthii, & cumini æqua portione decoctum. *Cataplasma.* Cataplasmate etiā vti proderit ex foliorum & radicum maluarū & althææ an. m. j. farine feminis lini, fœnugræci, & milii an. vnc. β. anisi feminis, fœniculi, & cumini an. dra. ij. misce & cum oleo anethino, camomellino, aut rutaceo, & oxymellite fiat cataplasma. At vbi dolor colicus ex acribus, & mordacibus humoribus ortū trahet, ab acrib. *In dolore colico ex humor. acribus.* tum cibis, tum medicamentis erit cauendū, & ptisana erit vtendū, Galeno; adiectis mali punici granis. & tentandum erit vt humor dolo-rem inferens vacuetur medicamēto per sedē iniecto, clysteri sane ex ptisanæ cremore cū rosaceo, Galeno: vel decocto maluarum, althææ, fœnugræci, feminis lini, camomelli, & violarū, vitellis duobus, & cassia. Et vbi per sedem nō eiicietur hoc clysteri, purgante medicamento erit vtendum: aptissimū autē est amarū, quod ex aloe componitur, picra appellatur, ex Gal. r. loc. aff. & 12. met. Epicraſi etiā, seu temperamēto vtitur Galenus, vbi euacuari non poterunt quæ contristant excremēta: veluti ptisana, intibo, cichorio, lactuca, syrupo violaceo, & bal-

*Stupefaciē-
tia.*

*Lupinum
stercus au-
xiliatur o-
mni dolori
colico.*

*Dolor coli-
cus ex flatu.*

*Hepatis
dolor.*

neo ex aqua dulci. Et ubi his non cedit dolor, torporem inferentibus medicamentis uti cōcedit Gal. 12. meth. in huiusmodi humore calido, quod & vehementem calorem refrigerēt, & tenuem humorem incrassent, & sensum etiam stupefaciant: veluti drac. j. philonii perfici, aut romani, aut scrup. ij. aut eius quæ trifera appellatur, siue eius quæ magna requies dicitur, tantundem: semper hoc aduertendo, ut prius huiusmodi medicamenta stupefacientia admisceantur cum iis, quæ per sedem immittuntur; postmodum ubi per eam viam nihil effecerint deuoranda præbeantur. Vnum autem non est prætereundum, quod communiter omni dolori colico auxiliari scribit Galenus, cum a proprietate illud efficiat: nempe lupinum stercus, præsertim albidius, quale solent excernere ubi ossa comederint, & præsertim id, quod non in terram, sed in spinis aut herbis collectum sit, ex vino enim albo, & tenuis consistentiæ epotum, adeo auxiliatur huiusmodi dolori, ut 10. simp. affirmet Galenus, qui huiusmodi stercus potarunt, non amplius huiusmodi dolore fuisse inuafos, aut qui iterum inuasi fuerunt, non amplius eum grauitè passos esse: quod sane bibendum non tantum est in paroxysmis, sed etiam in interuallis. At ubi dolor ex flatu pendeat, cucurbitula cum flamma copiosa admota incantamenti fere modo dolorem penitus lenat, Gal. 12. meth. Sequitur hepatis dolor, in cuius sedatione eodem modo pro-

do procedendum erit, vt in ventriculi, & alia-
rum partium dolore, per remedia causa dolo-
rifica contraria, mixtis semper, quæ partis ro-
bur conferuent, quod hepar vt ventriculus,
ii. metho. actionem toti corpori communem
habeat. Eodem modo in lienis dolore. Ad eū-
dem modum in dolore nephritico a renum
calculo causato, in quo a purgatione medica-
menta erunt adhibenda, quæ laxare meatus,
& renum corpora valeant mollire. Quod fiet
fomentis ex decocto foliorum maluarum, fo-
liorum, ac radicum althææ, florum camomel-
li, scœnugræci, seminis lini in hydræleo cū spō-
giis sæpius supra affectum renem. Ex eisdem
infusiones parari poterunt: omnium tamen
optimum est balneum ex dulci aqua, aut hy-
dræleo constans, Alexandro. Vbi dolor vehe-
mentius infestabit, vnguento hoc renum re-
gio ac lumborum erit inungenda: Ex olei ca-
momellini, vel anethini, & amygdalarum dul-
cium ana vnc. j. β. adipis anseris, vel gallinacei,
& butyri recentis ana drac. iij. ceræ quod satis
sit, fiat vnguētum. Interim adiici poterit oleū
ex scorpionibus: aut hoc cataplasmate erit v-
tendum: Ex farina tritici, seminis lini, scœnu-
græci an. m. j. olei anethini, vel camomellini,
& amygdalarum dulcium an. vnc. j. β. mellis
vn. ij. resinæ terebinthinæ vnc. j. radicis althææ
contusæ drac. iij. misceantur arte, & fiat cata-
plasma. Conducet etiam cucurbitula absque
incisione, quæ sæpe lapidem velociter adeo

*Lienis dolor.**Nephriticus
dolor a cal-
culo renum.**In dolore
vehemen-
tiore vngu-
entum.**Cataplas-
ma.**Cucurbitu-
la.*

N n

transfert, vt subitam eius mali leuationem cō-
parare possint: lapide nimirum in locum am-
pliolem translato. Supra a renibus initium fa-
cientes ad inguina per obliquum earundem
partium (quas illa vocant) positionem proce-
dentes, quo loco dolores frequenter incedūt
propter situm meatuū, qui vretes appellā-
tur, lib. de renum aff. dign. & curatione: quan-
quam applicanda non sit dolore vehementer
urgente, sed ipso aliquantulum lenito, & vbi
non adsit inflammatio, Actio. Sequitur dolor
articularis, arthritis dicitur. cuius quidem do-
loris articularis, & podagræ præcipuæ causæ
cum sint, ex Galeno, articulorum imbecillitas
& redundantium humorum copia, quapro-
pter cum duplex etiam nascatur scopus, eua-
cuandi scilicet redundantem humorē, & cor-
roborandi partes debilitatas: cumque de cau-
sarum euacuatione iam satis superque actū sit
in causarū tractatione pro ratione redundan-
tis humoris: sequitur vt percurramus modum
tractandi medicamenta ad partes ipsas appli-
canda, quæ sane talia esse debent, vt habeant
vim repellendi id, quod influit, adiiciendi illis
robur & exsiccandi illud quod in eis contine-
tur: amplius, etiam discutiendi, vbi amplius nō
influet humor. Quare circa initia pars quæ do-
lebit, oleo rosaceo erit inungēda vino admix-
to, vbi in superficie dolor cōsistat: aceto vero,
vbi in profundo dolor hærebit, quod propria
sui tenuitate vsque in altum expeditam rosa-
ceo

*Arthritis
& podagra
duæ causæ
præcipuæ.*

*Topica
qualia esse
conueniant.*

*In principio
unguent.*

ceo viam exhibeat: æstate quidem tepefactis,
 hyeme vero calidis, Aetio, aut farina hordei
 diffoluta in oleo rosato, vel succo aut aqua so-
 lani, plantaginis, medulla quoque panis, præ-
 cipue secalini, lacte macerata & parum cocta,
 additis oui vitellis, & oleo rosato, aut cataplas-
 mate ex malis cotoneis vino maceratis, pane
 permixtis ac rosaceo. Et vbi dolor erit intole-
 rabilis, addenda erit prædictis opii drachma
 vna, croci nonnihil ad penetrationē. Vbi vero
 magnus sentietur calor, muccago ex semine
 psillii integro extracta, cum aqua rosarum vel
 solani, pauco etiam aceto ad penetrationem
 addito, cataplasmatibus modo apposita, & dum
 calescit mutata, idque sæpe: pars vero affecta
 nec aqua nec oleo erit abluenda, sed posca me-
 diocriter tepefacta, aut alterius plantæ auste-
 ræ decocto, Aetio: vel oleum rosatum, cui lū-
 brici terræ sint incocti, frigidum applicabis.
 Vbi autē materia fluere desierit, fouenda erit
 pars vino rubro austero, cui camomellum,
 melilotum, scænu-græcum, aiuga neruis robo-
 randis herba efficacissima, sint incocta. Vbi
 vero adeo magnus dolor vrgebit, vt ager eum
 ferre nequeat, torporem inducentibus medi-
 camentis erit vtendum, quanquam ab eorum
 liberaliori vsu erit cauendum, neq; diutius illis
 erit insistentum, sed eousq; quoad doloris ve-
 hementiam duntaxat lenierint, postmodū au-
 ferenda erūt finito doloris feruore, aliter ma-
 gis offenderent quam iuuarent, constringēdo

*Cataplas-
ma.*

Opiata.

*In arthriti-
dis magno
calore.*

*Quando ma-
teria fluere
desit.*

*In dolore in-
tol. rabili.*

*A stupefa-
cientib. qua
peragenda.*

Topica.

*In ischiade
repellentia
vitanda
sunt circa
iuncturam
coxendicam*

infectum humorem, eumque indurando, & sensum partis languidum, motumque difficilem reddendo. Quinimmo sedato dolore confestim pars est fouenda iis, quæ calfaciunt, medicamentis. In quem usum stupefaciendi sensum Gal. 10. de comp. med. per loca, hoc medicamentum ex Asclepiade commendat: Ex succi papaueris drach. iij. nos drachmas duas poterimus assumere, croci drach. j. cum lacte bubulo, aut caprillo terito: ac adiecto pane interno diligenter leuigato, ut molle cataplasma fiat, & rosaceo admoto mollito, ac vtere. Ad extra vero betæ, ac lactucæ foliis custodiendi eius gratia compositis: item opium & crocum cum lacte trita cerato rosaceo excipiebat, & linteolo infarcta imponebat. post anodynorum usum, thymi, origani, calaminthæ, satureiæ, saluiæ & similium decocto in aqua aut vino locus erit calfaciendus. Anodynis igitur ad hunc modum erit vtendum in articularibus doloribus, præsertim ex calidis humoribus ortum ducentibus. Ad eundem modum in ischiade seu coxendicum dolore, in quo hæc præcipue erunt aduertenda, quæ a Gal. 10. de comp. med. per loca, notata sunt: primū sane, quod tametsi pharmacis fluxionem repellentibus vti possimus, circa coxendicam tamen iuncturam id omnino est vitandum: quod cum in profundo sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus vasis ac musculis ad illam compellatur, ut ait Galenus. Neque solum a medicamentis habentibus vim

vim repellendi, sed etiam ab acribus pharma- *Item phar-*
 cis circa locum affectum etiam est cauendum, *maca acris*
 ante scilicet totius corporis vacuationem : & *circa locum*
 hoc , quod ægre curabilis reddatur affectio, *affectum.*
 copia indissolubiliter cōdēsata: quod crassa &
 viscosa fiat ob calorem , & siccitatem acrium
 medicamentorum , & veluti quodammodo
 assata: Quare in principio mitigatorius erit v- *In principio*
 tendum, quæ neque multum refrigerent, ne- *mitigatoria*
 que fortiter calfaciāt, quibus postea opus ha- *conueniunt.*
 bet, quod vt ait Galenus exacerbētur a nimia
 caliditate fluxiones, dum plus attrahit , quam
 impediāt, vt inquit Galenus. Quare sufficiet
 irrigare locum ex oleo camomellino, anethi-
 no, liliaceo, irino, sed etiā nardino, & rutaceo:
 vel rutam, chamæpitim, saluiam, camomelli,
 flores, althææ folia, radices decoque in oleo
 communi, demum exiguo adiecto vino, vel
 aceto albo cum spongiis, seu lineis, vel laneis
 linteis sæpius foueatur locus , & dein aliquo
 prædictorum oleorum irrigetur. In stranguria *Stranguria.*
 vero vbi dolor erit vehemens, remitteretur do-
 lor vel remittendo acrimoniam vrinæ morda-
 cem per vnctuosā, vel sensum tactus partium
 vetricarum modice stupefaciendo : veluti sy-
 17 rupo violato cum aqua lactucæ, portulacæ, so- *Vrina acri-*
 lani intibi : valentiore vero , vncia vna syrupi *monia com-*
 violati, syrupi papaueris semuncia, cum vnciis *pescentia.*
 tribus decocti seminum quatuor frigidorum
 maiorum, vel etiam minorū, vel seminis hyo-
 scyami albi, vel papaueris albi drac. j. cum præ-

*Valentiora
quomodo
reddenda
medicamen-
ta.*

*Hæmorrhoi-
dum dolor.*

*In dolore
hæmorrh.
cum calore.*

Infessus.

*Stupefaci-
entia.*

dictis aquis mane exhibendo, vel decoctum maluæ, violæ, & similium, aut lac humanum, caprinum, ouinum per catheterem breuem immittendo. Ita enim vrinæ acrimonia frangitur. Amplius, albumen oui agitato multo tractum donec lentum esse desinat, per se, vel cum papaueris decocto, vel cū lacte; valentius autem fiet remediū addendo caphuræ grana tria, vel quatuor. valentissimum addendo opii grana, vel scrup. j. trociscorum halicacabi aqua, vel decoctione papaueris solutorū, quod stupefaciant, vretici sint, & acrimoniam obtundant: amplius, virga in lacte calido, vel decocto papaueris albi tenenda, aut decoctum foliorū vitis, salicis, maluæ, violæ, in fessu, aut fotu ex vesica adhibendum. Dolor vero hæmorrhoidum, vbi scilicet causa doloris erit humor, & sanguis, causa doloris erit remittenda, aut lintheo nouo aspero, aut folio ficulno, aut stercore columbi, aut aliquo tandem acredine prædito. Dolor vero lenietur, si simul cum dolore aderit etiam calor, oleo violato, vel rosato, vel mica panis cum lacte, & oui vitello cocta, & albumine etiam oui. Infessu etiam ex decocto maluæ, althææ, violarum, florum camomelli, meliloti, seminis lini, fœnugræci, papaueris albi, hyosciami albi. Et vbi hæc non sufficient, ad stupefacientia erit accedendum; veluti balano ex bombace illito philonis antidoto, vel athanasia Nicolai vtēdo; aut eadem emplastri modo applicentur sedi; vel vnguenti populei

vncia

uncia vna, oui vitellū, opii drachma vna ad drachmas duas, croci parum, misce, & applica vbi dolor erit vehemētissimus. Sequitur dolor lateris, qui quidem ab Hippocrate fori p̄sertim depelli solet. Fodus autē duplex est, secundū q̄ materia hunc dolorem causans duplex precipue esse potest. Nam inflammationis causa aut esse potest sanguis calidus, renuis, biliosus, aut frigidus, crassus, & aquosus. Pro ratione igitur duplicis materiae in genere, duplici etiam fodus genere erit vtendum, altero humido, altero vero sicco. Humidus autem fodus inter omnia fomenta calida probatissimus, (quod a frigidis nemo adhuc dubitauerit esse abstinendum) Ille est Hippocratis 2. de ratione vict. in morb. acut. ex aqua calida in vtre, vel vesica, aut alio vasculo posita: aut spongiae mollis, magnaeque, atque ex aqua calida expressae applicatio, fomentumque linteo¹ erit vestiendum propter rationes ab Hippocrate ibidem enarratas. Ad eundem vsum eandem vim habens parari poterit fodus ex radice, & foliis althaeae, floribus camomelli, fœnugræco, sertula campana, ac semine lini in aqua decoctis, & eodem modo applicitis. Vbi vero dolor ortum trahet ab aquoso sanguine, altero fodus genere erit vtendum, sicco sane ex sale, milioque frixis, torrefactis, atque in sacculis conclusis; aut ex camomelli floribus, surfure, & milio compositis: aut ex milio, sale, semine lini, ac fœnugræco, dūmodo sicci semper appli-

Lateralis dolor fori depellitur Hip. Fodus duplex est.

Humidus in dolore a sanguine.

Siccus in dolore ab aquoso sanguine.

*Fotus in
sanguine
crassiore.*

*A melan-
cholia.*

*Abhumidis
solibus in
evacuandum.*

*Post fotus
unguenta*

centur. Vbi autem suspicio fuerit, sanguinem crassioresse, ex hordeo fotus erit componendus, & eruo, concisus, & comminutis, de-
mum ex aceto, & aqua excōctis, ita diluto ac-
eto ex aqua, vt paulo acidius sit, quā vt quis bi-
bere possit. Atque hæc semina madefacta, per-
fusaque & feruefacta in sacculos coniecta la-
teri dolenti sunt applicanda. Idem potest fur-
fur appositum, Hippocrati. Vbi vero humor **B**
verget ad melancholicū, fomento vtitur Tral-
lianus ex furfuribus in iure camomelli deco-
ctis. Illud autem memoriæ tenendum, etsi du-
plici fotu vtatur Hippocrates, semper tamen
incipiendum esse ab humido fotu, a quo etiā
Hippocrates incept: quod, vt ait Galenus, hi
humidi fotus non multum detrimentum af-
ferre possint, etiam quod materiæ peccantis
cognitionem perfectam non habuerimus; q̃
tamen faciunt ij, qui ex aceto solo, & orobo
fiunt, hi enim nisi propriam causam inueniāt,
non modo non mitigant dolorem, sed illum
etiam maxime augere possunt. Quapropter
humidis fere semper erit vtendum, quod ex-
quisitam affectus cognitionem difficile habe-
re possimus. aut si humidi fotus non iuuabūt,
post illos vnguenta admoueri poterunt: Ex o-
lei amygdalarum dulcium vnc. j. butyri recen-
tis vncia β. vel loco olei amygdalarum, oleo
camomellino vtendum erit, aut anethino; &
loco butyri, anseris, aut gallinæ pinguedine.
Et vbi dolor persistet, post septimum Actius
cucur-

cucurbitulam apponit, & cutim incidit ante, modo parua copia sit vacuanda, vt notat Tralianus; cū ex cucurbitulæ appositione dolor, licet vehementissimus, conquiescere soleat; nimirum ex alto extracta, quæ in affecto loco continetur materia. Illud autem etiam non est prætereundum, omni dolori valde infestanti ea, quæ somnum conciliât valde prodesse; veluti est lactucæ, & papaueris semen tum in cibo, tum in potu. similiter & syrupus de papauere post cibū. Sed hæc de remediis pro tollendis vitiis sensuum exteriorum. Sequitur vt percurramus medicamenta, quibus antiqui, præsertim Galenus vti solet pro tollendis vitiis sensuum interiorum: incipientes a vigiliis. Porro tollêtur vigilia, quæ vt plurimum a siccitate pendent, & conciliabitur somnus irrigatione capitis cum oleo de nymphæa, violaceo, seu ex papauere, pauco aceto addito; & inunctione narium, temporum, & frontis, populeone, vnguento cum pauco aceto, & proluendo faciem aqua, in qua papaueris tum albi, tum nigri capita sint decocta: quanquam assiduus vsus stupefacientium pharmacorum, ac irrigationum erit vitandus, quod periculū sit, ne a nimia vigilia ad nimium somnum eger transeat. Sequitur coma, seu cataphora, quæ quidē affectio varia medicamenta postulabit pro varietate causarum. Nam si ex humiditate tantum, exsiccantibus capiti admotis tolletur, irrigatione ex acerrimo aceto, rosis, & camo-

Cucurbitula.

Somnum conciliantia.

Sensuum interiorum vitia.

Vigilia.

*Ex frigidi-
tate.*

*Ex frigidi-
tate & hu-
miditate.
Coma vi-
gil.*

Lethargus.

*Memoria
abolita.
Fatuitas.*

*Amentia
pituita.*

mello permixto, atque eiusdem medicamen-
ti euaporatione per nares suscepta. Si ex frigi-
ditate, oleo camomellino calfacto: & in tantū
augenda erunt calfactoria medicamenta, quā-
rum intensā frigiditas erit, vt etiam pulegium,
& rutam incoquat Aetius, si ex frigiditate, &
humiditate causabitur; vt lethargus. Coma ve-
ro vigil, cum ex permixta, & contraria causa
pendeat, contrariis quoq; medicamentis erit
curandum, partim curatione lethargi, partim
phrenitidis, magis ad alterum contrarium de-
clinantes iuxta superabundantiam bilis ad pi-
tuitam; aut e contra. Lethargus vero, cum hu-
mor a capite in principio sit repellendus quis-
quis is fuerit, ex 13. metho. oxyrhodino erit re-
pellendus. temporis autem processu, casto-
reū, pulegium, thymum, origanum erit inco-
quendum, & frons illinienda, naribus etiam
admouenda, & sternutamentis erit vtendum
ex castoreo, pipere, seu elleboro: mox palatus
erit inungendus, vt Galeno placuit, valētibus,
& acris medicamentis; veluti mithridato,
theriaca, aut sinapi cū melle, & occipitio cu-
curbitulae erunt affigendae circa primam, & se-
cundam vertebam. Memoria vero abolita, 118
quanquam etiam stultitia, seu fatuitas, & amē-
tia, vbi a pituita pendeat, euacuata prius pi-
tuita ab vniuerso corpore, & a capite, curanda
erit apophlegmatismis, errhinis, sternutato-
riis, irrigationibus, sacculis: & tandem vbi non
cedat affectio, sinapismo in sincipite potius
quam

quam in occipite, Aetio, & aliis in intemperie frigida pituitosa cerebri enarratis. Sin autem pendebit affectio a frigida, & sicca cerebri intemperie, prius eradicato melancholico humore, medicamenta declinanda erunt magis ad humidum, quam ad siccum. Notandum autem, si cum ipsa memoria ratio quoq; deperdatur, eadem esse adhibenda, sed valentiora, quod ut ait Galenus 3. loc. aff. ex vehementi cerebri intemperie ortum trahat. Melancholia vero cum a sicca intemperie ortum trahat, victu humido bonique succi, taliter affectos, simul cum frequentibus balneis (ubi non diuturnus factus fuerit hic affectus) Gal. se curasse 3. loc. aff. testatur; vitando cuncta quæ gignunt melancholicum succum, de quibus ibidem Galenus. Cum autem affectus factus erit diuturnior, fortioribus postmodum erit utendum remediis. Quare si a toto pendeat, habita totius cura, balneis erit curandus, irrigationibus, vnguentis, odoramentis. Si vitio capitis, balneis item, & iisdem. Sin autem melancholia erit hypochondriaca, & flatuosa, habita prius cura, deorsum fouenda erunt hypochondria fomento, sacculo, cataplasmate: vomitu etiam a cibo, & flatus cucurbitula erunt discutiendi, 12. met. nec omittendum erit caput, etiam quod melancholia sit hypochondriaca. Mania vero, si fiet ex feruente sanguine, prius secta vena, irrigatione ex rosaceo, pauco aceto, ipsi sincipiti frequentius renouando, & irrigatione si ex flaua bile passata prius

*A frigida
& sicca in-
temp. cere-
bri.*

*Ratio cum
memoria
deperdita.*

*Melancho-
lia.*

*Melancho-
lia hypochō-
driaca.*

*Mania ex
feruente
sanguine.*

*Ex melan-
cholia ad-
usta.*

Catalepsis.

Caros.

Dispnoea.

Apnoea.

*Vini potus
multus in
dispnoea con-
uenit.*

euacuata, balneis aquæ dulcis erit vtendum; præsertim inclinante morbo; & aliis irrigatio-
nibus in intemperie cerebri enarratis, adden-
do semper quæ magis in frigidat, & humectât.
Sin autē pendebit ex melancholia adusta, nō
alio modo quam melancholia erit curanda.
Catoche vero, seu catalepsis, cum ex Galeno
pendeat ex frigida tantum, & sicca cerebri in-
temperie, quapropter curabitur irrigatione
ex oleo dulci tepido, camomellino, aut ane-
thino, dein coquendum erit in eis serpillum,
aut hyssopus, aut thymus, & iis tandem vtendū
erit, quibus melacholiam curari diximus. Ca-
ros vero curabitur similiter, vt lethargici cu-
rantur, quanquam in hoc valentioribus attē-
uantibus, ac incidentibus erit vtendum. Sto-
machi quoque erit habenda ratio, si pituita
erit repletus, cataplasmatibus, quæ præter quod
calfaciant, corroborandi etiam vim possideât.
Difficultas autē respirandi, velut etiā apnoea,
fere curationē suscipiet, 7. de compo. med. per
loca, seu nanque pharmaca, seu victus sit, qui-
bus velimus immutare causam dispnoeæ, quæ
est crassitudo, & viscositas humorum, omnia
humiditatem quandam habere debere inquit
Galenus. Ob id ait eis conuenire vini potum
multum ratione humectationis, vt facile effe-
ratur per tussim, quod in bronchiis contine-
tur. Medicamenta autem talia esse debent, vt
habeant vim humorum, crassitudinem, & vi-
sciditatem attenuandi, incidendi, atq; abster-
genci.

gēdi. Quoniā vero eiusmodi pharmaca tusses
mouent, 7. de comp. med. per loca, & s. simpl.
nec facile per sputum reiicitur, quod abster-
sum est, ob crassitudinem, ob id, vt facile effe-
rantur, humectatione multa opus habēt. Illud
B præterea notandum, vt extenuatio, & incisio
fiat ab iis, quæ citra vehementem calfactionē
extenuant, atque incidunt, Galeno: Et hoc,
quod crassi, ac viscosi humores a vehemēti
calore viscosiores reddantur, consequenter
difficilius auelli possunt. Qua ratione etiam a
valde refrigerantibus cauendū esse inquit Ga-
lenus, quod humores crassefaciant, & ægre e-
licibiles reddant: nec minus ab astringētibus:
ob id maxime eos iuuat acetum scylliticum, &
acetum mulsum, ex eiusmodi aceto confectū,
atque ipsa adeo scylla assa cū melle trita, & de-
linctā, Galeno. In quem vsū est decoctum ex
caricis, radice glycyrrhizæ, & fœnugræco, vua
passa, adianto, hyssopo in aqua, seu aqua mulsa.
Conducunt etiam medicamenta, quæ ore te-
nentur, ac sensim, & paulatim deglutuntur,
habentia vim attenuandi: ac detergendi frigi-
dos, crassos, ac lentos succos, de quibus cap. de
tussi. Extrinsecus vero vtendum cataplasmati-
bus, & vnguentis in pectoris obstructione di-
ctis. Addit Galen. ii. simp. vulpinum pulmonē
resiccatum, potui exhibitum asthmaticos iu-
uare. Tussis vero & ab intēperie calida,
& frigida prouenire possit; & hoc, aut cū ma-
teria, aut sine materia; si ortum trahet ab in-

*Incidentia
debent citra
vehementē
calfactionē
esse: atque
etiam frige-
rationem.*

*Astringen-
tia vitan-
da.*

*Topica.
Vulpinus
pulmo.
Tussis ab in-
temp. frigi-
da cum ma-
teria.*

temperie frigida, cum frigidis, ac crassis siccis defluentibus, extenuantibus, & incidentibus iuuabitur; veluti erit glycyrrhizæ, caricarum pinguium, adianthi, aut hyssopi decoctum in aqua fontana, cui parum mellis adiici poterit. Et vbi crassior erit pituita, marrubii, scabiosæ, radicis iridis decoctū: vel elegmata ore tenenda, & sensim deuoranda, veluti sanum, & expertum e pinu, vel hæc cum saccharo in aqua adianthi dissoluto ad tabellæ formam redigenda, quo agris gratiora fiant, & vt maiorem in ore moram contrahant. Ad extra vero inunctione pectoris oleo amygdalarum dulcium, liliaceo, irino, & vnguentis in intemperie frigida pectoris enarratis. Celsus probat ouum loribile pauco sulphure adiecto. Sin autem tussis orietur ex sola inæquali intemperie frigida sine materia, ex spiritus cohibitione, Galen. 2. de cau. sympt. curabitur, modo non valde magna sit intemperies. Sin autem pendebit tussis ab intemperie calida cum materia, seu distillatione acris, & tenui, medicamentis tolletur habentibus vim refrigerandi, spissandi, & acrimoniã obtundēdi; veluti syrupo violaceo, de papauere, & antidoto de papauere, & diatragacantho, vel diapenidio sine speciebus, ea sub lingua diu tenendo, quo paulatim liquescentia, asperæ arteriæ summum id, quod in ipsum defluit, sensim suscipiat, renitaturque ipsi oborienti tussi. præterea pilulæ bechicæ. Vbi vero ab asperitate tusses fient, per lenientia,

Topica.

Ex inæquali intemp. frigida ex cohibitione spiritus.

Ab intemp. calida cum materia.

tia, & mordacitatem arcentia sanabuntur. Ad
 cordis autem palpitationem Galenus quinto
 loc. aff. ait, victum extenuantem, & extenuan-
 tia medicamenta affectionem hanc curare: &
 hoc quod extenuent, dissipent, & discutiant
 palpitationis causam, quæ fere solet esse in-
 temperies frigida, faciens sputum flatuosum,
 crassum. Quare depelletur dianiso, diacala-
 mentho, aromatico rosaceo, & pluribus aliis
 vel morsulis ex his factis. exterius epithemati-
 bus, & sacculis cordi ad intemperiem cordis
 tollendam enarratis. Quod si cum frigida cor-
 dis intemperie frigidorum quoque aderit hu-
 morum redundantia, aut pituitosorum, aut me-
 lancholicorum, tollendi illi humores erunt:
 aduertentes semper vt purgantibus admisce-
 antur ea quæ corroborant. Spasmus vero, seu
 conuulsio si fuerit ex repletione, curabitur
 vacuatione repletionis facta per propria au-
 xilia, lib. de trem. rig. palp. conuul. prius tamen
 calfactis, extenuatis, atque incisis humoribus,
 vt expulsiōi sint paratiores. caput etiam erit
 purgandum errhinis, apophlegmatismis in
 memoria abolita, seu intemperie frigida cum
 materia ipsius cerebri dictis: & ceruix, ac tota
 spina inungenda ex oleo de castoreo, nardi-
 no, costino, nuce muscata, & cataplasma im-
 ponendum, caputque ipsum erit inungen-
 dum prædictis oleis, & sacculis. Curat Hippo-
 crati, & Galeno huiusmodi conuulsionē febris
 superueniēs, quæ p̄ initia nō fuerit, 2. ap. 26. &

*Ab asperi-
tate.*

*Cordis pal-
pitationis
Causa.*

*Spasmus ex
repletionē.*

*Febris su-
perueniens
curat con-
uulsionem.*

*In conuul-
sione ex in-
anitione &
siccitate.*

Ex consensu

*Ex ictu ve-
nenatorum
animalium.*

Incubus.

multa frigida aquæ perfusio, iuueni sane, æsta-
te media, ex accidenti: quanquam huiusmodi
remedium sit periculosissimū. Sin autem con-
uulsio fuerit ex inanitione & siccitate, hume-
ctatione tollitur a Galeno 12. meth. victu sane
humectante, & eos fouendo oleo dulci, aut
amygdalino calido, lauacro dulcis aquæ. Sin
autem fuerit conuulsio per consensum, cura-
bitur ex curatione partis primario affectæ, ve-
luti 12. metho. curauit Galenus adolescentem
quendam ex rodentibus succis os ventriculi
infestantibus, vomitu facto per potum aquæ
tepidæ. Sin autem cōuulsio fuerit ex ictu scor-
pionis, aut alterius feræ, rescindendum erit
membrum: quemadmodum nonnulli rustici
apud Galenum fecerunt, & sanati sunt. Aut si
noluerint rescindere membrum, faciēda erit
ligatura paulo supra affectam partem, veluti 3.
loc. aff. docet Galenus, partique affectæ medi-
camenta erunt adhibenda, quæ vehementer
attrahant. Id autem dupliciter fiet, vel medi-
camentis calfacientibus, iis scilicet quæ escha-
ram inducunt, & cauteriis, 13. meth. & theria-
ca ad extra imposita. quæ & ipsa lib. de theria-
ca ad Pisonem, venenum ad extra trahit: aut
cucurbitula, aut aliquo, qui ore suo virus ex-
trahat. Incubus vero si continget, post purga-
tionem ex stomachicis pilulis, aut Galeni hye-
ra cum agarico, ventriculus, & caput erunt ro-
boranda exhibitione diarhodonis, aromatici
rosati, & caput expurgandum apophlegmatif-
mis,

mis, errhinis in apoplexia, & epilepsia fieri solitis, & irrigationibus, & vnctionibus capitis calidis. Apoplexia vero, cuius morbus fere in-
Apoplexia causa praecipua.
 temperies frigida cū materia cerebri esse solet, si curari poterit, post clysteres, glandes, vincula, frictiones vehementes extremarum partiū corporis, pluribus cucurbitulis humeris affigendis, cucurbitula etiam occipitio cum scarificatione defixa, theriaca, & mithridato erit vtendum. & post capitis euacuationem, apophlegmatismis, pastillis mansilibus factis, & rubificantibus etiam medicamentis, sinapismis dictis, ac aliis admotis, quæ calfaciendi, ac dissoluiendi vim habent. Ad paralyin vero (cuius causa fere est intemperies frigida cum materia) proderit resoluti membri seu torpentis sumnam cutim exasperasse, vel vrticis casam, vel imposito sinapi: sic vt vbi rubere inceperit corpus, remoueatur: & cucurbitulas quādoq; sine ferro oportebit admouere, & vnguentis affectum membrum lenire. Eodem modo si
Paralysis ex frigore.
 resolutio fiat ex frigore, inuenta parte primaria affecta, dictis medicamentis curabitur, diffusius in curatione intemperiei frigida & humida cerebri dictis. Vbi autem pendeat, aut ab inflammatione, aut scirrho, ex eorum curatione sequetur affectionis curatio. In oris autem tortura seu cōuulsione canina, cerebri erit habenda cura, vt roboretur, prius ipso euacuato errhinis, apophlegmatismis, & pastillis, cucurbitulis in occipitio iuxta primam
Ab inflammatione a scirrho. Canina cōuulsio.

*Vertigo per
essentiam
cerebri.*

*Arteria su-
pra aures
insecta in
vertigine.*

*Vertigo per
consensum.*

*Epilepsia
per essentiam
in capite.*

vertebram affixis, & reliquis topicis cerebrū
roborantibus superius in morbis capitis enar-
tatis. Ad vertiginem vero, si fuerit per essen- **B**
tiam in cerebro proderit leuacuo prius cor-
pore vniuerso, & materia continente ipsius
obstructionis, apophlegmatismis, nasariis,
gargarismis, odoramētis vti. Vbi affectio per-
leuerabit, nec prædictis cedit, arteriæ ipsæ iux-
ta tempora sitæ supra aures erunt incidendæ,
præsertim vbi e vaporibus calidioribus per
arterias sursum elatis affectio insurget, Gal. 13.
loc. aff. quanquam, vt ait Galenus, non omnes
huius auxilii beneficio curati fuerint, tum
quod per altiores arterias, quæ ad cerebrum
ascendūt, vaporosus spiritus interim elabitur,
tum etiam quod spiritus flatuosus ex inæquali
cerebri intemperie oriri potest. Sin autē ver-
tigo per consensum fiat, præsertim a ventricu-
lo, vomitu curari poterit, aut purgatione ex
hyera Galeni. Vbi vero accessio aderit, glan-
dibus ex hyera, agarico, sale gemmæ, & despu-
mato melle, & clysteribus, & frictionibus, &
odoratis tollitur. Epilepsia vero cum possit
esse, aut per essentiam, aut per consensum: &
si per consensum, aut a ventriculo, aut ab ali-
qua corporis parte, si erit epilepsia per essen-
tiam in capite: huic sane victus ratio extenuās,
atque incidens vtilissima erit, Gal. lib. de atten-
uatione victus ratione: vbi huiusmodi victus
rationem epilepsias ait paruas, & etiamnum
incipientes eam penitus sanare, inueteratas
vero

vero ac consummatas iuuare nō mediocriter:
 (quanquam hanc viuendi rationem non so-
 lum epilepsia per essentiam, sed etiam epilep-
 sia per consensum postulet) Igitur in ipsa ac- *In epilepsia*
 cessione oportebit vti clysteri acri, glande, ex- *accessione.*
 tremarum partium forti ligatura, vomitus,
 proritatione: quo humores ex stomacho tra-
 hantur, & sensum irritantibus medicamentis
 naribus admotis, veluti bitumine, aut cedrina
 pice: & ab accessione purgato corpore vni-
 uerso ab eo humore incipiendum erit qui pec-
 cabit, & capiti sternutamentis, errhinis, man-
 silibus pastillis, cucurbitulis cum scarificatio-
 ne scapulis seu in occipitio affigendis, & po-
 steā cataplasmate: sed insuper etiā sinapis mus
 capiti erit adhibendus. Atque vbi nec his ma-
 lum cesserit, ferro candente occipitium & in-
 fra, quo loco summa vertebra cum capite cō-
 mittitur, adurendum erit, vt perniciosus hu-
 mor euadat: ad hoc etiam confert assumptio *Coagulum*
 leporini coaguli cum aceto ebibiti, erui ma- *leporinum.*
 gnitudine, quod summopere Galeno cōmen-
 datur 10. simpl. quotidie illud assumendo; &
 vbi non aderit, eius loco hœdinum erit adhi-
 bendum: Quoniam vero pueri huiusmodi af- *Epilepsia in*
 fectione plerumque laborare solent, quapro- *pueris.*
 pter sciendum, nutrici exhibendam esse eam
 viuendi rationem extenuantem, pueris vero
 mel despumatum ad delingendum, collo al-
 liganda pæoniæ radix, quæ semper stomachū
 contangat, 6. simp. Gal. & vtendum est glan-

*Epilepsia per
consensum
ventriculi.*

*Agaricus
epilepticus
prodest.*

*Epilepsia
per consen-
sum pedis,
manus aut
alterius.*

*Vitalis vir-
tutis sym-
ptomata.
Animi de-
liquiorum
duo prima
causa.*

de, clysteri, puluere capiti inspergēdo, sacculo
inunctione spinalis medullæ ex oleo nardino
&c. Sin autem epilepsia erit per consensum, si
fuerit ratione ventriculi, bonæ concoctionis
oportebit esse studiosos, 5. loc. aff. panis erit
optime præparatus, vino albo modice astrin-
gente madidus, vbi sitiet, quod huiusmodi
vinum, vt ait Galenus, vt ventriculum robu-
stum efficit, ita haud quaquam caput tentat:
exhibendumque erit medicamentum amarū
ex aloë singulis annis bis aut ter, quod hoc iu-
uenem quendam grammaticū a prædicto af-
fectu Galenus liberarit. & vbi vigeat pituita,
agaricum non erit prætermittendum, quod
6. simpl. morbo comitiali obnoxios sua facul-
tate san. postea os ventriculi ab extra inungen-
dum erit calfacientibus, & corroborantibus; 12.
oleo de absinthio, & huiusmodi. At si nec ca-
put, nec ventriculus epilepsia originē habeāt,
sed per consensum ab alia quadā parte ea ini-
tium sumat, siue pes, siue manus fuerit, confe-
rēt vincula superioribus partibus iniecta, Gal.
3. loc. aff. quod inspexit in puero a medicis hoc
modo sanato. postea parti affectæ medicamē-
tum ex thapsia, aut sinapi erit admouendum,
de quib. meminit 3. loc. aff. Galenus. Sequuntur
vitia seu symptomata virtutis vitalis: veluti est
æstuatio, lipothymia, syncope. Omnium autē
animi deliquiorum cū duo præcipua causarū
sint capita: resolutio scilicet & suffocatio, siue
inanitio nimia & repletio, hoc tamen omnib.
commune

commune est, quod etsi verane curatio sit ex
 curatione, seu remotione causarum nō atten- *Causarum*
 damus, necessarium tamen est causas prius cō- *cognitio in-*
 cipere: quoniam etsi, cum syncope deprehē- *dications*
 sus est eger, omnis sollicitudo medētis ad sym- *monstrat.*
 ptoma verti debeat, eas nolimus curare: diri-
 gunt tamen nos ad inueniendas indicationes
 recte curandi: veluti, si nimia euacuatio esset
 causa inducendi animi deliquium, volumus
 sistere ventrem, refocillandas esse vires causa
 ipsa docebit, & etiam qua via sit procedendū:
 & hoc, quia sciuimus nimiam euacuationem
 fuisse in causa deliqui ipsius animi: verum est,
 quod si syncope actu vexabitur ager, tunc o-
 mnis nostra curatio vertēda est ad symptoma.
 Sin autem adhuc nō premetur, vtriusq; simul
 erit habenda ratio: & vt symptoma non inci-
 dat, & vt morbus paulatim discutiatur, ex Gal.
 12. metho. Præter hæc in hoc quoque omnes *In omni syn-*
 syncopis species conuenire videntur, seu syn- *cope cordi*
 cope sit per essentiam, seu per cōsensum, cor- *prospicien-*
 dis semper esse habendam rationem, eiusque *dum est.*
 robur perpetuo esse seruandum, & hoc, quod
 nullū syncopes genus gigni possit, nisi ipsum
 quoque cor afficiatur. His prænotatis, sequi-
 tur vt percurramus curationem symptomatū,
 seu deliquiorum animi, incipiendo ab iis, qui
 fiunt ex resolutione, seu inanitione. Igitur syn- *Syncopa ex*
 cope quæ fiet ex inanitione & resolutione: ve- *inanitione*
 luti in his qui ex cholera & alui profluvio in *& resolu-*
 illam incidunt: & vt vniuersaliter dicam, syn- *tione.*

*Auerfionis
tres condi-
tiones.*

cope quæ fiet ex nimia euacuatione auerfione
tolleretur, feruando fitum, vt ait Galenus i. ad
Glauc. Seruabitur autem quoties materia tra-
hetur ad oppositum. secundo, feruando recti-
tudinem lineæ vasis. Tertio, feruando rationē
commertii ipsorum vasorum: quanquam sæ-
pe tertia conditio non adsit. Atque hoc est il-
lud, quod ait Hippocrates: dolente parte po-
steriore capitis, vena frontis incisa dolorem
fedari, vbi etsi adsit oppositio situs, & lineæ re-
ctitudo, tamen nullus venarum adest consen-
sus iuxta partem posteriorem, & anteriorem
capitis, nisi quod adest conspiratio corporis
vniuersi: verum est, quod vbi adest etiā tertia
conditio, melior est ipsa auersio, seu vbi non
adest, modo illa duo saltem seruentur, com-
mode etiam auersio fiet. Quare in omni auer-
sione seruandus erit situs: veluti in patiente
fluxum menstruorū, aut hæmorrhoidū, par-
tes inferiores sublimes erunt ponendæ, vt ex
illa depressione sanguis ab inferioribus ad su-
periora deueniat. Fluente autē e naribus san-
guine, opposito situ erit procedendum, modo
situs incommoditas non causet dolorem, quia
tunc dolor magis attraheret. Extremæ igitur
corporis partes vinculis vehementer erūt cō-
stringendæ: crura quidem si supra eruptio fiat,
manus vero, si infra. Igitur per inferiores par-
tes vbi fient euacuationes, manibus fortiores
erunt sedæ ligaturæ, veluti in fluxione sangui-
nis per hæmorrhoidas, aut ventris profluvio,
aut mensium fluore nimio. contra autem in

*Menstruorū
fluxus.
Fluxus hæ-
morrhoidū.*

*Hæmorrha-
gia narium.*

*Hæmor-
rhoidum
fluxus.*

B fluxu sanguinis per nares, & vomitu, crura for-
 titer erunt vincienda: tandemque semper erit
 trahendum ad oppositum ex Gal. i. ad Glau-
 aut ad communia membris patientibus, aut
 ad ea membra, in quibus creditur esse origo
 euacuationis: veluti in immodica vteri eua-
 cuatione, cucurbitulae mammis appositae eua-
 cuationem statim sedabunt. Quae vero fiet ex
 naribus, hepatis ac spleni appositae iuxta na-
 rem patientem. & ubi ex vtraque nare multus san-
 guis effluet, vtrique visceri erunt adiciendae.
 Praeter autem auersionem, cum syncope fiat
 ex nimia resolutione, atque inanitione, coar-
 ctatione erit vtendum. atque hoc est illud, cur
 Galenus iubeat, tales inspergendos esse aqua
 frigida: veluti aqua rosacea cum aceto, vt coar-
 ctentur spiritus per astrictione meatuū cutis,
 per quos diffillantur spiritus: acetū autē adiuuat
 penetrationem. Ita enim resolutio per aper-
 tionem emendatur coarctatione. Inanitio ve-
 ro emendatur aliqua repletionem. Atq; hoc est
 illud, cur Galenus iubeat etiā vini exhibitionē
 vt citissima possit fieri restauratio, quod citius
 & facilius sit potu nutriri quam cibo. Quoniā
 vero ex nimia apertione spiritus dissoluuntur,
 sequitur vinum calidum non esse exhibendū,
 quod calidi sit dilatare, & magis aperire. At-
 que hoc est illud, cur Galenus iubeat exhiberi
 vinum aqua gelida temperatū, vt a frigiditate
 calor detineatur. Quanquam si symptoma ad-
 esset, aut febris associata, aut aliqua corporis

*Alui profla-
uum.*

*Haemorrha-
narium.*

Vomitum.

Vteri im.

*modica eua-
cuatio.*

*Narium
fluxus imo
modicus.*

*Coarctatio-
ne opus est
praeter auer-
sionem.*

*Vinum ca-
lidum non
conuenit in
dissol.
spirituum.*

*Electio vini
in vetriculo
debili.*

*In eruptione
sanguinis.*

*Odores cito
resiciunt.*

Topica.

*Thoraci,
ventriculo,
hepati, vte-
ro frigida
non sunt ap-
plicanda.*

inflammatio, vinum non conueniret. Electio etiam vini penes modum substantiæ a membro affecto erit sumenda: ob id si ventriculus debilis factus sit, calor autem debilis crassum conficere non possit, hac ratione tenue erit exhibendum. In sanguinis autem eruptione, crassum, frigidum, acerbum, & nigrum erit exhibendum, vt ait Galenus: crassum quidem vt sanguinē crassum gignat, & fluxioni ineptū. acerbum vt astringat: & nigrum, magnū quin- etiā, vt nutriat. vnde tenue aperiret, & humo- res fluxibiles faceret. calidum idem inconue- niens adiunaret, & album. Animus etiā odo- ramentis erit reuocandus, quod nihil sit, quod vires citius odore reuocet, Gal. 2. aph. 11. Qua- re naribus admouendæ erunt rosæ, violæ, ma- la coronea, & huiusmodi: pauimentumque irrorandum erit, ac foliis internectum mirri, vitis, quercus, rubi, atque etiam rosas. Acr cu- biculi reddetur frigidus, & reliqua ad rationē victus attinentia. Sequuntur ea, quæ exterius sunt applicanda, in quorū applicatione, vt ait Galenus, sumēda erit indicatio a loco affecto, considerando naturā, substantiā, operationes, nobilitatem, & situm loci. Ob id vbi thoraci, vel ventriculo, vel hepati, vel vtero opus erit applicare astringentia, cauendum tamen erit a frigidis, quod frigida horum membrorum operationes, quæ a calido proficiuntur, de- struant. non enim thoraci, præsertim vbi san- guis exspueretur, quod cum tussis aliquando a sola

sola frigidity fiat, tussim excitarent medicamenta frigida, nec ventriculo & hepatis, ob eius operationes, nec vtero, quod frigida nervis sint inimica: sed frigida iis membris erunt applicanda, quæ a frigidity lædi nō possunt.

Qua ratione sanguine ex naribus fluente, frigida cerebro seu fronti poterunt applicari: tū quod cerebrum sit frigida, & humidæ temperaturæ, tum quod ratione plurimarum venarum, quas habet frigidis resistere possit: tum quod ab osse magno defendatur cerebrum: ut his rationibus capiti oxyrhodina frigidissima applicari possint. Balneum autem aquæ dulcis ubi syncope pendebat a ventriculi fluxione, commodissimum erit: & hoc, quod fluentibus humoribus a circumferentia, siue ambitu corporis vniuersi ad centrum, seu ventriculum, balneo trahamus a centro, seu ventriculo ad circumferentiam. Quod tamen balneum non conueniret, nec in fluxione sanguinis hamorrhoidum, vel narium, vel vteri: & hoc, quod dilatet, aperiat, humores attenuet, & sanguinem faciat magis fluentem, nec quibus ex nimio sudore deficit anima, quod ratione apertionis quæ sit a balneo, maior syncope fieret. sed potius cutis est refrigeranda, atque inspissanda mirtino, rosaceo, & cotoneorum oleo. Quæ tamen infrigidantia, & constringentia cutim in fluxionibus alui non conuenirent: & hoc, quod cum in ventris fluxione fiat motus materierum a circumferentia ad centrum, si in-

Capiti frigida adhibentur in hamorrhag. narium.

In syncope a fluxione ventriculi bal. aquæ dulcis

Balneum aquæ dulcis quando non conueniat.

In alui fluxionibus non conueniunt infrig. & constringentia.

*Syncope ex
nimia reple-
tione quid
differat ab
ea qua ex
inanitione.*

*In Syncope
ex repletionem
Notandum.*

frigidantia applicaremus, augetur motus & circumferentia ad centrum, & materia magis adhuc propelleretur: sed balnea, ut ait Galenus, hoc casu maxime conuenirent. Sequitur ars curandi deliquia animi ex nimia repletionem, seu suffocationem, quæ quidem in hoc differt, ut ait Galenus, a curatione deliquiorum animi ex inanitione, seu resolutione, quod in curandis iis, quæ fiunt ab inanitione, seu resolutione, prohibemus educationem: quinimmo aliquid introducimus. In curatione autem illorum qui a suffocatione, & repletionem, oppositum facimus, euacuamus, & nihil addimus. Cum igitur curationes sint contrariæ, sequitur quod etiam indicationes erunt contrariæ: unde repletio indicabit euacuationem, & determinata species repletionis determinatâ speciẽ euacuationis: repletio quidem plethorica, in qua adest plurima virtus, sanguinis missionem, cacochymia vero purgationem. Illud autem circa hoc non est prætermittendum, ut notat Galenus, etsi in syncope ex repletionem, euacuatio sit oppositum remedium, naturam tamen symptomatis esse perpendendam: unde cum in syncope virtutem debilem, & prostratam habeamus, etsi repletio, seu causa euacuationem velit, & suadeat, symptoma tamen eam prohibeat, quapropter vtriusq; habenda erit ratio, habebitur autem, si quidem euacuabimus, sed parce, quæ insensibilis euacuatio appellari solet. Atque hoc est illud, cur

cur 12. meth. nulli inquit talium, etsi vacuationem postulent, sanguinem esse mittendū sine maximo dispendio, nec purgationem sustinere posse, utpote quod hæc syncopen inuehere possint: sed tamen cum vacuari postulent, nullam aliam idoneam vacuandi rationem 12. meth. inuenit, ab Aetio, & Paulo etiam confirmatam, quam eam quæ sit ex frictionibus. Atque hoc est illud, cur primo ad Glau. laudet Galenus extremorum ligationem, & artuum frictiones. Frictio autem talis esse debet, ut sit mollis, lenis, longa, & materia calfaciente facta. lenis quidem, ut aperiat; nam aspera cutim constipat; longa vero, quod mollis, & lenis etsi apertionem faciat, & calfactionē, euacuationem tamen absq; longitudine facere non posset: materia vero calfaciente; veluti decoquendo vinum aromaticum, & oleum camomelinum, seu anethinum ad vini consumptionem: & hoc, quod non solum a motu, sed etiam a re calfaciente fiat maior apertio, maiorque humorū exhalatio. Hactenus declarauimus conditiones, quibus frictio insignita esse debet: sequitur ut magis particulariter modum ea vtendi percurramus. Igitur in principio morbi incipere frictiones oportebit linteis non admodum mollibus, sed aliquali asperitate participantibus, primum incipientes a cruribus
B superne deorsum & brachia eodem modo fricando superne deorsum. postea ad spinā dorsi transeundo, totamq; illā fricando prius sicca

*Euacuatio-
nes quomo-
do institu-
da sint in
syncope.*

Frictiones.

*Frictiones
quomodo
instituenda.*

frictione, dein oleo. ab hac rursus ad brachia, & crura reuertendum, exinde ad spinam. & vbi pulsus robore mediocris erit, æqualis, & minime intercisus, audacter alui aliqua erit habenda ratio, per inferius aliquid infundendo.

Fetus in syncope.

Odoramentum.

Epithematum cordi prospicientia.

Sacculi.

*Cibus.
Vinum.*

Ventriculus autem fouendus erit oleo, in quo absinthium ebullierit, aut emplastro quod fit ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloes, & mastice. Odoramentis quoque animus reuocari poterit hoc modo paratis: Ex aquæ rosarum, florum citrangulorum, & melissophilli ana vnc. ij. corticum citri, ligni aloes an. drac. j. moschi, & ambre vtriusque gr. iij. aceti vnc. j. Interim etiam cordi erit succurrendum ab extra adhibitis medicamentis; epithematibus scilicet, vel sacculis hoc modo paratis: Ex aquæ melissophilli, florum citrangulorum, & roris marini ana lib. ℥ aquæ rosaceæ vn. iiij. ligni aloes, corticum citri, singulorum drach. ij. cinnamomi, caryophyllorum, vtriusque drach. ℥. croci drac. v. ossis de corde cerui numero ij. moschi, & ambre singulorum gr. iiij. vini fului odoriferi veteris vnc. iiij. milce, & supra cor epithemata fiant. Sacculi autem hoc modo erunt parandi; Ex floribus melissophilli, roris marini, & citrangulorum, samplici, & serpilli, cum cinnamomo, croco, caryophyllis, corticibus citri, rosis siccis, ac ligno aloes simul commixtis, & contusis, additis granis tribus moschi, & totidem ambre, cū serico sacculi fiant. A cibo autem, & vino temperandum erit, vt

ait

ait Galenus, quod corpora malorum humo-
rum repleta quanto magis nutries, tanto ma-
gis laedes: balneum, & vinū ante materiae con-
coctionem fugiendum, quod balneum cum
exhibemus, humores debent esse parati, & in-
tra, & extra. Vinum etiam fugiendum, quod
præter quod nutriat, colliquet, distribuat, cō-
fertim per venas ducat. quorum nullum cum
frictiones efficiant, ob id frictiones etiam ma-
teria existēte inconcocta, fieri consueuerūt:
sed vice vini aqua malsa, quæ ex aqua, & melle
conficitur, inquit Galenus, erit exhibenda, in
qua decoctū sit pulegium, thymus, hyssopus,
& huiusmodi, vt concoctio adiuuetur incidē-
do, & abstergendo. Vt autem res in sympto-
mate tanti momenti clarior fiat, exemplum
ponemus syncopes prouenientis ex suffoca-
tione spirituum, & caloris, ex redundantia ex-
crementorum fluentiū ad ventriculū propter
eius imbecillitatem. Igitur prius considerāda
erit ipsa fluxio, & fluxionis ipsius materia: quæ
si, exempli gratia, erit frigida, ratione fluxio-
nis prius euacuandi erunt humores fluentes
(neque enim, vbi sit fluxio ad ventriculum,
incipiendum est a corroboracione, quando
humores syncopen causantes magis inculca-
remus, & sic maior syncope fieret) postea cor-
roborandus erit ventriculus, ne nouam ma-
teriam recipiat. Corroborabitur autem, vt ait
Galenus, huiusmodi emplastro: Ex vini aro-
matici (frigidam enim materiam respicimus)

Balnea.

*Syncope ex
suffocatione
spirituum
& humorū
redundan-
tia in ven-
triculo.*

*Corroboracio ventri-
culi.*

lib. j. farinæ hordei optime tritæ vnc. j. deco-
 quatur vinum cum farina ad mellis spissitudi-
 nem: dein accipe carnis palmularum secundū
 artem extractæ vnc. ij. & ponantur in hoc de-
 cocto, & ebulliant vna ebullitione lento igne,
 dein accipe mastices, aloes optimæ ana dra. ij.
 croci scrup. β misce, & fiat emplastrum, & loco
 applicetur. corroborat enim, penetrat, abster-
 git, mundificat, & calfacit. Sin autem adhuc
 non accesserit syncope, sed prope sit, & sentia-
 tur magna æstuatō in ventriculo, hoc modo
 faciendum erit, vt ait Galenus: ℞ olei mastici-
 ni, de absinthio ana drac. iij. olei de citoniis,
 vel melini drach. ij. vini lib. β decoquantur ad ¹²²
 consumtionem vini, vt addat subtiliationem:
 liquidius vero illud facit ne oneretur ventri-
 culus, & aliquod refrigerans apposit, quod
 modica refrigeratio non exstinguat, sed exci-
 tet calorem, sicut flabellus excitat ignem. & in
 hoc, vt ait Galenus, succus vuarū acerbæ est præ-
 ferendus, quod non solum refrigeret, sed etiā
 astringat. At si suffocatio caloris, & spirituum
 fiet ex fluxione humorum calidorum ad ven-
 triculum, vnde sequatur syncope, vel sit secu-
 tura, aqua frigida confert, vt ait Galenus, mo-
 do sit opportune data; nimirum quod si pen-
 deret a materia frigida, maxime noceret: Vn-
 de prius recte, & exquisite erit præcognoscē-
 da materia. Cognoscetur autem esse bilis, &
 non aliud, ex ætate, temperatura, anni tempo-
 re, ventriculi caliditate, ac bilis vomitione.

Illud

*Ex fluxione
 humorum
 calidorum
 ad ventri-
 culum.*

Illud tamen adhuc satis non erit, nisi etiā præ-
 scierimus humorem calidum non esse imbi-
 bitum in profundo tunicarum ventriculi. Nā
 tunc ratione frigiditatis istius aquæ, poros
 membrorum constiparemus, quare humor
 impactus putresceret, & ita syncopim auge-
 ret. Cognoscitur autem esse imbibitus in ven-
 triculi tunicis, ex eo, quod nauseam habebūt,
 & non euoment. sed vbi euoment aliquid, tu-
 ro dari poterit aqua frigida, a qua deponitur
 bilis ab ore ventriculi ad ipsius fundum. Sed
 haftenus dictum sit de curatione actionū læ-
 sarum. Sequitur vt agamus de curatione secū-
 di generis symptomatum; excrementorū sci-
 licet immutatorum. Quoniam autem vitiorū
 circa excremēta, etsi multiplex sit genus, quod
 tamen frequentius contingit, est circa quan-
 titatem excrementorum; quoties scilicet aut
 abundantius exeunt, & fluunt, quam par sit:
 aut e contra minus exeunt, & in corpore re-
 tinentur, cūque contraria contrariis curen-
 tur: fluxionis autem contrarium cum sit ipsa
 suppressio, suppressionis autem fluxio: sequi-
 tur igitur, vt percurramus prius quid sit vnū-
 quodque illorum, incipientes a suppressione,
 qua mediante excrementorum fluxio emen-
 dari solet. **SUPPRESSIO** est excremen-
 torum corporis humani retentio facta ab
 iis, quæ motum auferre possunt, ne vires
 propter nimiam fluxionis copiam proster-
 nantur. Ideo autem dicitur: Suppressio-

*Quomodo
cognoscendū
an humores
sint in ven-
triculi tuni-
cis imbibiti.*

II.

*Excremen-
torum im-
mutatorum
vitia.*

Suppressio.

*Expulsio est
species mo-
tus.
Motus tri-
bus perfici-
tur.*

*Expulsioni
quæ sint ne-
cessaria.*

*Excremen-
torum fluxio
validior
unde fiat.*

nem esse retentionem, quod retentio sit pro-
ximū genus ipsius suppressionis, quæadmodū
expulsio est proximū genus ipsius fluxionis. Et
q̄ sequitur esse retentionē excrementorū cor-
pori humani, notat symptomatū genus, circa
q̄ versatur huiusmodi remedii genus: Quod
postmodum additum fuit, suppressionem fieri
ab iis, quæ motum auferre possunt, notat cau-
sas efficientes ipsius suppressionis: quæ quidē
facile apparebunt, si procedamus ex cognitio-
ne causarum efficientium motum ipsorū ex-
crementorum, seu fluxionum suppressioni
oppositam. Porro cū expulsio sit species quæ-
dam motus; & motus tribus saltē perficiatur;
mouēte, mobili, & spatio, per quod fit motus:
sequitur igitur quod etiā expulsionī tria præ-
cipue erunt necessaria; vis pellēs id, quod pel-
litur, & spatium, seu loca, seu viæ, per quas ha-
bet fieri pulsio; dummodo talis sit inter hæc
tria proportio, vt virtus pellens validior sit vi
existente in eo, quod pellitur: quod autē pel-
litur ita inualidius sit ipso pellente, vt veluti
victum virtuti pellenti sequax sit, & obedi-
tissimum: neque spatium virtuti pellenti resi-
stat. Vbi sane hæc omnia conuenerint, neces-
sario sequitur pulsio. Nunc sequitur vt osten-
damus quibus ex causis validior, abundantior,
& crebrior fit excrementorum fluxio. Porro
validior fit expulsio, vel ratione alicuius acri-
monia stimulantis, vel exquisitoris corporis
sensus, vel ratione imbecillitatis facultatis cō-
tinentis,

B

tinentis, vel ratione lubricitatis ipsius materie
 fluentis, vel ratione excrementorum aliunde
 refusorum, & ingenti ciborum copia, vel ra-
 tione latitudinis, amplitudinis, & laxitatis ip-
 sarum viarum. ad hæc vbi in partem excipien-
 tem imbecillem, atque situm decliuiorē flu-
 xio decumbet. Cum igitur his ex causis fluxio
 excrementorum validior, abundantior, cre- *Excremen-*
 briorque erumpat; veluti vrinæ, deiectiones, *torū suppress-*
 sudores, atque menses: sequitur igitur quod *sionis caus*
 suppressio, quæ est opposita ipsi fluxioni, ac *sa.*
 veluti quies quædam, oppositis ex causis pro-
 cedet; nimirum tollendo acrimoniam stimu-
 lantem, partium expellentium sensum obtu-
 siorem reddendo, facultatem expellētem im-
 becillem, & continentem validam efficiendo,
 materiam crassam, & motui ineptam reddendo,
 & prohibendo excrementa aliunde refusa,
 alimentorum paucitate vias angustando, vel
 obturando. Ad hæc vbi pars recipiens ex im-
 becilli corroborabitur, & reddetur fortis, at-
 que ex loco decliui sursum versus, & opposito
 situ erit situata. Et quod sequitur: Suppressio-
 nem excrementorum recte, & conuenienter
 factā ad hoc esse, vt ne vires propter nimiam
 fluoris copiam prosterantur, notat causam
 finalem, propter quam medicus suppressionē
 excrementorum fieri iubet; nempe quod nū-
 quam fluor aliquis est cohibendus, nisi cum
 periculum est, ne vacuationis copia vires de-
 iiciat, aliter nunquam recte, & conuenienter

Suppressio-
nis excre-
mentorum
causa fina-
lis.

P p

*Critica ex-
crementorū
expulsiones
non sunt in-
hibenda.*

fiet; quemadmodum discurrentes singulas excrementorum species magis particulariter ostendemus. Amplius, vbi fluxiones excrementorum fient per modum crisis, ita quod per eam totum corpus, aut aliqua eiusdem corporis pars expurgetur, ac vtiliter ea excernantur, quæ sint corporis commodo, minime reprimere, seu inhibere, & suppressere conueniet, ne materia in aliam conuersa partem, prauos alios affectus generet, veluti pleuritim, aut lethargum, aut perniciosas parotidas, vt aiunt Alexander, & Aetius: sed cum salubriter a natura aliena euacuantur, aut vsque quo eadem omnem curam suam impenderit, expectare oportet, aut ipsius etiam motus adiuuare. Nā vt Alexander fatetur, vidit quandoque ventris initio affectus ad quartum quintumue diem profluxisse, & postea fluorem, aut per se, aut medici auxilio substituisse, vnde agri in magnū periculum inciderunt, vtpote in aliquem prædictorum affectuum: quod a Galeno etiam notatur 9. meth. Postquam iam expediuius artem supprimendi nimiam excrementorum fluxionem: sequitur vt ostendamus quomodo ab hac arte directi qui praxim exercent, in cuiusque generis excrementorum fluxione, aliquo istorum, vel omnibus vtantur pro suppressione, & quibus materiis, seu medicamentis procedere soleant, incipientes a fluxione pituitosa a cerebro fluente, quæ catarrhus appellatur. Atque hoc est illud, cur practici in
catarrho

catarrho præter ordinatam viuendi rationem, *Catarrhus*
 materiæ præparationem, eiusdem purgatio- *pituitosus.*
 nem, & auersionem, catarrhum suppressant,
 sistant, & incrassent; quâdo scilicet ab eo lon-
 giore suffocationis periculum impendet, aut
 ab eo acriore, aut tenuiore excoriatio, aut ab *Catarrhi*
 utroque tussis aspera, & insomnia. Alioquin *longioris,*
 enim sistendus non est, nec materia in cere- *pericula.*
 brum partem principem regerenda. Qua-
 propter suppressere, seu sistere illum volen-
 123 tes, iis vtuntur quæ astrictione sua suppressunt:
 veluti bolo armenia, spica, thure, gummi iu-
 niperi, mastiche: nec enim pectori nocent,
 præcipue spica: ad hæc materiam incrassant.
 & præter hæc etiam adhibetur succus glycyrrhizæ,
 syrupus eiusdē, & violarum, iulep violatus,
 saccharum violatum, penidia, diatragacanthum,
 syrupus papaueris, elegma eiusdem, diacodion,
 trochisci bechici in ore retenti, cum aliorum quædam
 deuorentur, & suffiantur, vt thus, gummi iuniperi,
 mastiche: quædam gargarizentur, vt syrupi cum aqua
 rosarum, oxalidis: cætera ex Mesue sumi possunt.
 Illud etiam notandum, quod notat Galenus 6. de valet. tuen. In quouis defluxu a ca-
 pite ad subiectas partes, capiti saltem prospiciendum
 esse, ipsumque sanandum veluti mali fontem, ac firmandum,
 modo liceat: Etenim origo, & principium catarrhi a capite nascitur:
 hoc prænotato, vbi defluet ad nares materia calida,
 cōueniet ex aqua tepida per nares vaporē

Aphorismus.

Catarrhi origo in capite.

*Catarrhus
ad naves in
os defluens.*

*Catarrhi
materia fri-
gida.*

*In materia
catarrhi
calida.*

*Scopi in ca-
tarrho acri.*

excipere, aut ex maluarum, hordei, violarum,
& florū camomeli decocto. Et si materia de-
fluet frigida, ex decocto hyssopi, betonicæ. vbi
autem decider in os, & raucitatem faciet, con-
ferent, compositiones, quæ sub lingua tenen-
tur, modo supinus cubet æger. ex Galen. 4. & 5.
meth. & 7. de comp. med. per loca, & sunt pi-
lulæ bechicæ, & looch de papauere vbi mate-
ria erit calida: looch autem sanum, & de pinu
in frigida: etiam glycyrrizæ radix sub lingua te-
nenda, atque ex Gal. 7. de comp. med. per loca
glycyrrizæ decoctum cum sapa admixtum: &
vbi magis discutere, & extergere velis, carica-
rum adhibebitur decoctum, aut cū aqua hor-
dei, vel in qua radix dulcis fuerit decocta. Quo
modo autem, & quibus tollatur capitis intē-
peries tum calida, tum frigida, quæ sunt causæ
catarrhi, superiori libro morbis dicato dictū
fuit: veluti frigidam quidem cerebri intem-
periem in materia catarrhi frigida, sacculis &
saluia, maiorana, milio, thure, sale, & lotionē
capitis ex vino aromatico vel maluatico, cui
plantæ capitales sint incoctæ: suntis quoque
electuario diamoscho dulci, & amaro, plirifar-
cotico, theriaca. In materia autem catarrhi ca-
lida, syrupis frigidis, cōseruis, & admotis oleis,
& vnguentis frigidis in curationē morborum
cerebri enarratis. At si catarrhus fuerit acris
distillatio humoris, præsertim ad pulmonem
aut pectus, toti corpori cōsulendum erit, quo
sistatur erosio, omnesque per hæc tria curan-
dos

dos esse fatetur Gal. s. metho. sanguinis missione, purgatione, & per ea quæ caput roborant: quod in huiusmodi affectu non sit incipiendū a paruis auxiliis, vt Erasistrato visum fuit. Quapropter sanguis statim detrahendus erit, præsertim, vbi corpus non multum gracile, & siccum erit. Postmodū acredo distillationis erit contemperanda syrupo violaceo, rosaceo, ex nimphæa, seu papauere, cum hordei, buglossi, seu borraginis aquis, postea purgatione erit vtendum: capiti etiam prospiciendum erit, ne ex eo in pulmonē aut pectus aliquid defluat. In quem vsum conducet si æger assumet dra. j. infra scripti pulueris. Ex seminis hyosciami, & papaueris albi, singulorum scrup. s. seminum coriandrorum præparatorum dra. j. corticum thuris gr. ij. mastiches gr. iij. pulueris hirundinis præparatae drac. s. iacchari vnc. iij. hæc assumendo per duas, vel tres horas a cœna ante somnium, vel pilulas duas de cynoglossa Nicolai, loco medicamenti, quod diaspermation appellatur. Vbi si tussis aspera, & insomnis nō vincitur prædictis, pilulæ de cynoglossa Mesue sunt dandæ, quæ ad omnes morbos catarrhus succedentes valere dicuntur, quia opiatae sunt quanquam his non sit vtendum, nisi affectus curatione deplorata. Excerati quoq; vsu, quod fit ex thapsia, capiti prouidebitur, vt testatur Galenus, in huiusmodi acri defluxu: vice cuius eo loco quo sagittalis sutura coronali cōmittitur, aut sinapismo, aut ignito cauterio vteris:

1.
*Sanguinis
missio.*

2.
*Purgatio.
Puluis præ-
seruans pe-
ctus ab in-
fluxione.*

*Tussis aspe-
ra & in
somnia.
Pilula de cy-
noglossa
Mesue.*

Cauteria.

*An in destil-
latione acri
acria me-
dicamenta
conueniant
Galenus cō-
tra Alexan-
defensus.*

*Cauteria
quando ad-
hibenda.*

aut si tutius eo uti volueris, quamuis minus quoddammodo conferat, inter primam & secundam vertebram ceruicis locū inures; quamquam aduersus Galenum acriter insurgat Alexander, asserens capiti adhibenda non esse acria medicamenta, quæ ex thapsia, ac columbarum stercore, aut sinapi parantur: & hoc, quod acriorem reddant humorem fluentem ad thoracem, & ad pulmonem: caputque ipsum adhuc magis distemperent. Quinimmo inter initia ait refrigerantibus & humectantibus esse utēdū, veluti rosaceo cū modica aqua frigida balneoque. Non vidit autem Alexander Gal. s. metho. mox circa initia in acri distillatione acria medicamenta adhibere, non ut curet capitis intēperiem, quæ sane calida est, sed ut acris humor partim auertatur ad oppositum, partim etiam consumatur medicamentis siccis, quod ut ait Gal. s. meth. oporteat de hoc in principio esse valde sollicitos, ut ex capite nihil defluat, quod tussim causet in partibus illis, in quibus nisi defluxus statim inhibeatur, insanabiles penitus fiunt. Verum est, quod exhibita auersa, & exsiccata fluxione, caput postea ad melius temperamentum est reducendum, inunctione ex rosaceo, eoque ex crudo oleo, quod omphacinum appellatur, æstatis tempore composito. 6. de tuen. val. Aduertendum autem erit, cauterium nec ex iis quæ actu, nec ex iis quæ potentia inurēdi vim habent, capiti adhibēdum esse, nisi malum ex fluxu

fluxu acrim humorum fuerit, quod ex caut-
 terio capiti adhibito, præsertim qua parte sa-
 gittalis futura coronali committitur, aut occi-
 pitio inter primam & secundam vertebra-
 (quo loco tutius fit) non exiguum commo-
 dum suscipiunt, Gal. 5. metho. med. hoc sæpius
 experto: licet nec de iis, quæ igne fiunt caute-
 riis, nec de determinata capitis parte sermonē
 faciat. Sequitur eruptio sanguinis e naribus:
 pro cuius curatione & si frigidis medicamen-
 tis, & astringentibus sit vtendum, non tamē o-
 mni tempore illis est vtendum, ex 5. meth. sed
 postquam in alia loca prius auerteris: venæ se-
 ctione paulatim facta, cum hoc auxilio reuul-
 sorio fateatur Gal. lib. de cur. ratione per venæ
 sectionē, validam se sanguinis ex naribus eru-
 ptionem sedasse, vel affixa in summa ceruice
 cucurbitula: quamuis occipitio tam apponat
 Paulus, & Aetius. Fronti postea medicamenta
 erunt imponenda, veluti sponsia ex aqua fri-
 gida, seu rosacea. Vel hoc emplastrum; Ex suc-
 ci poligoni, portulacæ, semperuiui, seu solani
 vnc. ʒ. boli armeni, ac terræ lemnæ an. drac. ij.
 omphacitidis gallæ drach. j. lapidis hæmatitis
 drac. j. ʒ. cum ouorum albumine, pauco aceto,
 ac aqua rosacea paretur medicamētum, quod
 fronti imponatur, epithematibus iecori ap-
 positis, potissimum si ex altera nare fluat san-
 guis. Naribus autem ipsis medicamentū hoc
 indit Gal. 5. metho. Ex manna thuris, & aloë,
 candido que oui liquore confectū per contor-

*In hemor-
 rhagia na-
 rium quan-
 do frigidis
 & astring-
 entibus v-
 tendum.
 Vena sectio.*

Emplastrum

*Naribus in-
 denda me-
 dicamenta.*

*Aurium ob-
suratio in
hæmorrhag.
narium.*

*Hæmorrhag-
iæ curatio-
nis indica-
tiones.*

tum linamentum intus, extrinsecus vero le-
poris pilis additis, naribus admoueat : vel
thus confringito, & poligoni, aut porri succo
diluito, in eoq; linamentum obuolutum in-
dito, 3. de comp. med. per loca ex Heraclide, ex
cuius etiam sententia mentam tritā, aut spon-
giam siccam immittendam præcepit. Insuper
ait Galenus, commodum esse per ceram, aut
lincola aures obturare, & in ore aquam plu-
uialem frigidam continere, caputque non in
sublime leuare, sed alias partes, quæ infra ca-
put sunt, sublimes facere, eiusdem Galeni de-
creto. Amplius huiusmodi hæmorrhagiam e
naribus, seu sanguinis eruptionem (modo san-
guinis per nares profluvium criticum non sit,
quia tunc non est sistendum, nisi copia vires
immodice prosterнат,) ad hunc modum siste-
re solent, ex 5. metho. ubi habetur omnis hæ-
morrhagiæ curatio, præter enim viuendi ra-
tionem refrigerantem, & astringentem vias
per quas fertur sanguis, præter auersionem, in
qua spes curationis præcipua versatur, sangui-
nem sistunt, & cohibent huiusmodi sumtis &
admotis, nunc frigidis tantum, sanguinem ve-
lut glaciantibus, & ob id ad fluendum ineprio-
rem reddentibus, viasque densantibus, & cō-
trahentibus, per quas sanguis fluit, vt lactuca,
portulaca, & alimentis aliis refrigerantibus.
ad hæc, mannæ vnc. j. vel fescuncia syrupi rosa-
ti, oxalidis, cidoniorum, granatorū, præsertim
ubi tenuior sanguis : vel si is etiam est inflam-
matus,

12.

matus syrupi omphacii, limonum, acida par-
tis citri cum duplo aquarum plantaginis, ro-
sarum, oxalidis, solani, & cum scrupulis duo-
bus, aut dra. j. trochiscorū terræ lemnix sigilla-
tæ, vel trochiscorum electri, quæ etiam in na-
res immitti possunt trita, & fronti applicari. Et
præter hæc, si necessitas vrget, hyosciammo, o-
pio, & opiatis recentibus, sed a mitioribus in-
cipiendum, & impese frigida capiti parti prin-
cipi, & frigida non adhibenda, quod sangui-
nem, & spiritum animale glaciunt, ac extin-
guant. nunc etiam astringentibus, & vasa siue
oribus hiantia, siue tunicis rariora, siue rupta
vel incisa vel erosa vnientibus & contrahen-
tibus, veluti rosas, balauftis, gallis, malicorio,
rhu. Nunc emplasticis, & meatus obstruenti-
bus, vt farina molendinorum tenuissima, aloë,
oni albo, casco, gipso, muccaginibus. Nunc es-
charoticis: quæ vrendo escharam gignūt, quæ
crusta est hiatus vasorum operculi vice, vt cal-
ce viua, facie vini vsta, sed potius calcitide &
calcantho, & similiter astringentibus simul &
vrentibus, vt ab iis escharam valentius hæreat:
quæ ab aliis effecta prompte cadit, & aucto
hiatu hæmorrhagiam maiorem, & periculo-
siorem reuocat, Gal. lib. 5. meth. Nunc iis quæ
sanguinem sistunt tota sua substantia, seu pro-
prietate occulta, & nobis ignota ante experi-
entiam, vt succo basilici, porri, vrticæ, vel tritis
ipsorum foliis in nares immixtis (mixto tamen
his impense calidis refrigerante aliquo, vt ca-

*In inflam-
mato san-
guine.*

Opiata.

*Astringen-
tia.*

Emplastica.

Escharotica

*Sanguinem
sistensia to-
ta sua sub-
stantia.*

*Stupefaci-
entia.*

*Refrigeran-
tia & astringen-
tia qui-
bus aliis
partibus
applicanda.*

*Hæmor-
rhagia ar-
teria.*

Aloe.

phura) stercore asini recente in nares cum bombace immisso , vel ipsius siccati puluere in nares per calamum adacto : puluere item sanguinis columbæ, vel limacium simul cum testa assatarum similiter adhibito, aut cum oui albo subacto, cerebellis gallinarum , iaspide. Nunc stupefacientibus (vbi scilicet facultate prædictorum omnium victa salus est deplorata) quæ sanguinem glaciant , vt athanasia recente, philonis antidoto , a drachma dimidia propinando ad drachmam vnam : hæc enim cum somnum quoque concilient , hoc etiam modo fluorem sedant. Refrigerantia autem, & astringentia non solum lumenda , aut narisbus sanguine fluentibus immittēda, sed fronti quoque, & vertici capitis, & collo, & interscapulio, & lumbis, & testibus, & hypochondrio narem fluentē respiciēte applicanda ex bombace aut linamentis in hæc mersis, & modice expressis: ad hæc vertici ex alto torrentis modo hæc illidi, vel incidere est multo efficacius, vti & aquam e stillicidio in verticem illabi. Galenus autem ad hæmorrhagiā etiam arteriæ, aloem & thus cum oui albo subigit , & pilis leporū mollioribus excipit. Sunt qui per bolum armenam, & sanguinem draconis, & oui albumina idem præstant: nec verenda aloem, foris enim admotam glutinat, licet sumta venarum ora adaperiat, Mesuæ, cum 3. de temp. nihil sumtrum , & foris admotum vires eadem habeat. præter hæc autem causam hæmorrhagiæ

B

morrhagiæ auferre nituntur, vt medicamen-
torum cholagogis si biliosus, & acer, & mor-
dax is fuerit, vel glutinantibus remediis, si vas
apertum est, & cæteris, quæ abunde. s. metho.
docet Galenus. Sequitur sputum cruentum, *Sputū cruen-
tum per
vomitum.*
de quo sane diligenter est agendum. Igitur in
spuitione cruenta semper erit aduertendum
an sanguis exeat per vomitum, an vero aliquo
alio modo inferius dicendo. Et si per vomit-
tum; aut igitur ex quo sanguis exit, erit vas
paruum, & modice apertum, ita quod qui ex
eo fluit sanguis paucus sit, ex s. metho. aut vas
erit magnum, & vehementer apertum, ita vt
multus sanguis exeat. Si igitur paruum erit *Ex vase
paruo re-
serato.*
vas, aut modice reseratum, modice etiam a-
stringentibus erit vtendum, s. metho. ex vino
nigro austero: & vbi presto non erit huiusmo-
di vinum, aqua pluuiæ, aut in qua chalybs ig-
nitus fuerit extinctus, in quib. aloe, manna
thuris, pini cortex, lemnium sigillum, ac lapis
hæmatites, & rubi germina, aut mirti, aut len-
tisci, fructus quoque, siue cortex, siue germen
maxime cotoneorum, mirtorum, & mespilo-
rum decoquantur. Vbi autem maius vas erit, *Ex vase
maiore.*
& maxime hiabit, balauftio, hypocistide,
rhoë, omphacio, acacia, gallis immaturis, &
malicorio, & lapide hæmatite cum succo mali
punici. Et succum aut portulacæ, aut sangui-
nariæ, aut plantaginis vsq; ad vncias quatuor,
vel quinq; bibedū oportebit præbere, breui-
terq; refrigerantibus, & astringentibus curadi

*Astringen-
tia & frigi-
da in sang.
Sunt quan-
do adhi-
benda.*

Vnguenta.

*Epithema-
ta.*

*Sanguis
grumescent
in ventri-
culo.*

sunt, Hipp. 7. aph. 37. Possunt extrinsecus pro-
fluenti particulæ ventriculorum, iocinori, &
spleni admoueri tum astringentia, tum citra
strictionem frigida. quanquam illud est no-
randum, quod non sine discrimine, nec omni
tempore loca, quæ circa particulam sunt po-
sita, vnde sanguis effluit, refrigeranda sunt,
Gale. 5. metho. sed prius facta auersione ad alia
loca non semel tantum, sed pluries: nec ad vnâ
duntaxat partem, sed plures: nec vno auersio-
nis modo, sed pluribus, veluti sanguinis mis-
sione, artuum frictione, & deuinctione. Tunc
enim circa partem afflictam tum astringentia,
tum frigida admoueri possunt, aliter lædere-
tur ager; & hoc, quod sanguinem intro com-
pellerent, ac venas, quæ in alto sunt, impelle-
rent. Quare post factas auersiones, ventriculi
partes ab extra illiniendæ ex rosaceo, melino,
aut myrteo, cum aceti modico, aut vini austeri
& crebrius linimenta erunt immutanda, ne si
excalfaciant, rursus ab eis sanguinis cōmotio,
atque irritatio nascatur. Et epithematibus hoc
modo factis; Ex succi plantaginis, portulacæ,
seu sanguinariæ, aut omphacii ana lib. j. aquæ
plantaginis, & rosarum vnc. viij. aceti vnc. ij. o-
mnibus simul mixtis fiant epithemata, quæ
non minus conferent, si etiam iecori, aut li-
eni admoucantur, vbi ex iis sanguis profluet.
Quod si sanguis in ventriculo instar grumi
concreuerit, tum leporinum coagulum, aut
thymus, aut thimbra cum aceto potanda erit,
Paulo.

Paulo. Vbi vero non per vomitum fiet sanguinis reiectio, sed ex gingiuis prodibit, hoc modo curabitur, oris collutione ex plantaginis, poligoni, ac portulacæ decocto in aqua pluuiæ, pauco aceto addito, vel vino rubeo astringenti: aut ex succi portulacæ, polygoni, & arnoglossæ vnc. iij. cum rosacæ, seu myrtinæ aquæ lib. j. aceto modico, misce, & vttere. Et vbi grauitur erumpet, impetus eius erit coercendus, ad mota eius occipitio cucurbitula, si ex faucibus, aut gurgulione, astringentibus prædictis per collutiones, aut gargarismata adhibitis. Huc etiam facient, ea quæ in angina, & gurgulionis inflammatione dicta sunt: Si a capite sanguis feratur, per nares erit deriuandus, si multus erit, acacia ex aceto frontis, atque temporum partes illiniendæ: & perseverante fluore cucurbitula, subiecta flamma plurima, occipitio erit apponenda. Sin autem cruenta spuitio ex instrumentis spiritus prodibit, aut prodibit ratione refrigerationis instrumentorum, aut ratione reserationis, seu ruptionis ipsorum vasorum, aut ratione excisionis ipsorum. Si fuerit ratione refrigerationis, post venæ sectionem bis eodem die factâ, & postridie etiam fiendam, Gal. 5. met. ratione diuersionis factam: atque artuum, atque extremitatum partium frictione, & ligatione: toti pectori ceratum, quod ex thapsia conficitur, post alteram sanguinis detractionem secunda die erit imponendum, mox vesperi, ne supra,

*Sputum
cruentum
ex gingiuis.*

*Sanguinis
eruclatio ex
faucibus
aut gurgu-
liene.*

*Sanguinis
eieclatio a
capite fluens.*

*Sputū cru-
entum ex
instrumen-
tis spiritus
ratione re-
frigeratio-
nis.*

*Ex reser-
tione aut
ruptione
vasorum.*

*Sanguinis
missio mox
in initio
conuenit.*

*In resera-
tione vaso-
rum quara-
tione calida
conueniant
& tenuium
partium.*

modum calfaciat, auferendum: & rursus ter-
tia die ad tres horas apponendum: & corpore
vacuato diaspermation ad vesperam exhibe-
bat, non semel duntaxat, & hoc, quod som-
num conciliabat, sensum doloris leuabat, &
siccandi vim habebat, postremo Thabias ægrū
mittebat. Sin autem cruenta spuitio ex resera-
tione vasorum, aut ruptione prodeat, post in-
cisam statim venam cubiti internam, bis, ter-
que extrahendo sanguinem, quod gratia di-
uertendi id fiat, aut vena ex talo, vbi ea nō ap-
parebit quæ in cubito, quam magis proficere
testatur Alexander, utpote ad longinquiores
partes diuertente. Notāter autem dixi, statim
esse fiendam venæ sectionem, quod Galenus
(ut ait) nonnullos hac affectione laborantes
curauit: ad quos, statim ut malum senserunt,
potuit accedere, donec cruentum adhuc vul-
nus erat, & antequam phlegmonē excitaret,
quod phlegmone semel excitata, & inuadēte,
exiguam spem habebat Galenus eius glutinā-
di, quanquam in longius tempus trahi possit,
potissimum pulmonis vasis disruptis. Quare
post venæ sectionem statim fiendam, atque
post artuum frictionem, & ligaturam, posca-
tum diluta, tum tepida ad vncias tres, vel
quatuor, qualibet vice erit exhibenda, postea
iis erit vtendum, quæ & astringendi, & empla-
sticandi vim habeant: cū quibus admixta sint
medicamenta, tum calida, tum partium ten-
uium existentia. Quod etsi vasorum rupturæ,

ac

ac reſerationi ſint infeſtiſſima, tamen quod aſtringentia, ac viſcoſa, & tenacia (quod ſibi ipſis viam præcludant) huiusmodi viam facilitantibus opus habent, in reiectione ſanguinis, aut ex pulmone, aut thorace, aut arteria aſpera, 4. met. & 7. de comp. med. per loca, ob id omnibus medicamentis, thoracis, & pulmonis ulceribus deſtinatis, mel admifcet, vtpote vehiculum celeriter tranſiens, digerensque 4. met. *Mel in ulceribus thoracis & pulmonum.*

Quare puluerẽ ex rhabarbaro ſine ſpica dra. j. vel ſcrup. iij. mumie gr. ſ. rubie tinctorum gr. iij. cum aſtringenti vino rubeo, aut plantaginis aqua exiguo aceto iniecto exhibebis; quod hoc medicamentum nedum concretum ſanguinem reſoluat, ſed foras propellat, atque expurget, ruptumque vas, aut reſeratum ſanct. *Sanguinem concretum propellens & vas ruptum ſanans medicamentum.*

Ex compoſitis medicamentis, trochiſcis de ſpodio, aut terra lemnia, aut e ſuccino, aut ex ſyrupis, mirtino, roſaceo, ſaccharo roſaceo, vel ex iis hoc elegmate licebit vti: Ex ſyrupi mirtini, & e portulaca an. vnc. ij. ſacchari, mellisq; roſacei an, vnc. j. tragacanthi, amili an. vnc. j. ß. pulueris radicis ſymphiti, terre lemnie, boli armeni, & lapidis hamatitiani ſcrup. ij. fiat in modum elegmatis, quod æger in ore ſapius contineat, paulatimq; ſupinus permittat in aſperam arteriam deſluere, quod hoc modo nedum vis, ſed medicamenti etiã ſubſtantia ſenſim, & paulatim per aſperam arteriã influat, 4. & 5. met. & prædicto medicamẽto addi poterit etiã dra. j. ex prædictis trochiſcis: Et vbi maluerit

Elegmatum.

Tabella.

*In sanguinis
profluvio
quando ex-
hibeat Ga-
lenus stupe-
facientia.*

*Irrigatio-
nes.*

æger medicamentum in forma solida ore te-
nere, hoc modo parabitur; Ex diacodii dra. ij.
boli armeni, corallorum rubeorum, lapidis
hæmatitis ana scrup. j. pulueris radice symphi-
ti, & terræ lemniz ana scrup. ß. tragacanthi, a-
mili, gummi arabici ana dra. ß. syrupi mirtini,
aut de portulaca, & sacchari rosacei ana dra. iij.
cum saccharo dissoluto in aqua rosacea, aut
mirtillorum quantum satis sit, fiat medicamen-
tum in tabellis. Virgente vero sanguinis pro-
fluvio, nec prædictis medicamentis cedente,
viribus præsertim non imbecilibus existen-
tibus, audet tunc Galenus stupefacientibus
vti, admixtis cum medicamentis ad hæmophtho-
icos paratis, tametsi huiusmodi pharmacorum
genus infestissimum sit, 7. de comp. med. per
loca, & hoc, quod altiore somnum, & sopo-
rem inducant, & commodissima sint iis, qui
tussi lancinantur, quod sistant nimium sangui-
nem, qui ad affectum vas deferretur, ratione sue
frigiditatis; veluti scrup. ij. aut dra. j. philonii
perlici, aut romani, cum astringenti vino, aut
plantaginis aqua, non tantum semel, sed bis,
& ter, & quoties opus fuerit, quod toties erit,
quoties urgebit symptoma, seu sanguinis pro-
fluvium. Ad extra vero pectori fiat irrigatio
ex vino astringente cum oleo rosaceo, aut mir-
teo, addendo quoque vinum austerum, quan-
doque acetum, præsertim multa sanguinis ex-
sistente eruptione in estate, robusto, & carno-
so ægro, nec tussi existente: Vel hoc cataplas-
mate:

mate: Ex foliis plantaginis, portulacæ, sanguinariae ana m. j. contusis, addendo mannae, thuris, aluminis, malicorii, ac radicis symphiti ana drac. j. hordeaceæ farinae drac. ij. palmularum, & cidoniorum in vino austero decoctorū ana drac. iij. fiat cataplasma cum posca, aut vino austero, aliquando permiscendo cum iis aut acaciam, aut aloen, aut omphacium. Galenus vero s. meth. ex melino, rosaceove pectus maderi (si æstas sit) iubet vndique, si hyems nardino vnguento: & concedit etiam vltum aliorū emplasticorum medicamentorum. Vbi autē vasa fuerint exesa, ad quorum excisionem sequatur cruēta spuitio, per renutritionē partis erosæ fienda erit curatio, 7. de comp. med. per loca, fiet autem renutritio per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, sarcotica græcis dicta, quæ sane temperare, mutare, & alterare humoris acrimoniam possint, nisi profusior hæmorrhagia fuerit, quoniam tunc iis, quæ vehementissime astringunt, erit vtendum, quoad vehemens eius impetus frangatur, Galen. s. meth. quod fiet suillorū pedibus, aut hœdorum, aut castratorū cum prisana decoctis. & vbi aderit humoris acrimonia, præsertim vbi ex acri distillatione pulmōni, seu thoraci erosio fiat, distillationi & acredini succurrendum erit, de quibus cap. de curatione fluxionis catarrhi, seu distillationis actum fuit. Sequitur cholera, quæ sane ex Aetio et si astringentia postulet tum in cibis, tum in me-

Cataplasma.

Cruēta spuitio ab excisione vasorum.

Renutritio fit per sarcotica.

Hæmorrhagia profusior.

Cholera.

dicamentis, præsertim cum simul ingruit vomitus, & alui fluor, ea tamen moderata esse debent, nec a principio: & hoc, quod si quis in principio, aut coaceruatim ea quæ efferuntur, cohibere aggrediatur, is maioris mali auctor erit; quod inutilia euacuatione opus ha-

*Cholera ex
cibis corruptis.*

beant. Quare si cholera ex corruptis cibis pedit, prouocandus erit vomitus aqua tepida, aut mulsa, quæ & vomitum, & aluū ciere potest. & vbi materiæ erunt paratæ vt excernantur, per aluum magis medicamento leni erūt adiuuandæ: cauentes semper ne quidquā tribuatur, quod vomitum, vel aluum cieat, vbi vehementer, & vomitus, & deiectione vexabūt; sed optima iuscula cum aliquo astringente, vt aqua rosacea, & huiusmodi, erunt exhibenda.

*Cholera cū
vomitū in-
tolerabili,
& fluxione
alui.*

Et vbi fluxio intolerabilis exsistet, ita vt vires deiciat, mica panis in vino astringentis vim habente erit exhibenda. Et vbi ne his quidem cedit affectio, cucurbitula erit admouenda assumpto cibo quod valide retrahendo vomitum fieri prohibeat, & quod vbi diutius adhaereat, concoctionem iuuat, & ventrem ne amplius fluat, prohibeat, Alexādro. Frictionibus item vtendum, & extremorum ligaturis, superiorum vbi per aluum, inferiorum partiū vbi

*Cholera cū
copia bilis.*

per vomitum cholera fiet. Vbi vero aderit bilis copia, ptisanæ cremore erit vtendum habente vim refrigerandi, & mali punici succo, & syrupis ex omphacio, & ribes, ac vnguentis, & cataplasmatibus habentibus vim astringēdi oleoque

oleoque masticino, de absinthio, nardino cū vino exiguo fouendus ager erit: Vbi humorū excretio quieuerit his localibus vtentes. Ad dyarrhœam vero, seu alui profluuium (si facta *Diarrhœa critica.* erit per modum crisis, ita quod per eam aut totum corpus, aut aliqua eiusdem corporis pars expurgetur, atq; vtiliter ea excernantur, quæ sint corporis commodo) minime reprimendum, nec cohibendum, ne materia in aliā partem conuersa prauos alios affectus gignat, velut phrenitim, aut lethargum, aut parotidas, Alexandro, & Aetio. scd permittendum erit vt fiat euacuatio donec videbimus id a natura salubriter fieri. Quinimmo si natura deficiet, adiuuanda erit, vt ex coniunctis amobus perficiatur, id quod sequitur Galenus 9. metho. per eandem tamen viam naturam adiuuantes, per quam incepit euacuare: euacuationem molientes pro ratione materiæ, quæ aut biliosa sit, aut pituitosa, aut melancholica, prius tamen paratæ, ac temperatæ: postea medicamento pro materiæ ratione materiam euacuantes, & cum medicamento astringentia magis, & minus admiscentes, prout magis, & minus alius laborabit profluuium, & vires ipsæ magis, vel minus euacuare permittent. At *Diarrhœa vires consumens.* a purgatione, vel vbi alui profluuium diutius perseverauerit, vires consumens, ac habitum colliquans, tunc sanè fluxioni resistere oportebit tum per ea, quæ per os sumuntur, tum quæ per anum infunduntur: atque ea, quæ

*Diarrhœa
biliosa.*

*Pisana pra-
paratio in
diarrhœa.*

*In fluxioni-
bus biliosis
in pœgion.*

*In fluxione
biliosa de-
iciente vi-
res, astringen-
tia.*

ad extra applicantur, Aetio, & Alexandro: quod ubi alius modum excedit, cohibenda sit, ut inquit Paulus. Quanquam ubi biliosa fuerint recrementa non statim admodum astringentibus medicamentis cohibenda erit fluxio, sed prius contemperanda erunt, & salubria magis reddenda; veluti cibus bonum, & crassiorem succum gignentibus, cuiusmodi ptisana est, & eius cremor, praesertim si hoc modo paretur: Ex hordeo torrefacto probe contuso, seu extenuato, & aqua pluuiali, adiectis mali punici granis, ac oxalidis foliis in iure gallinarum, seu pullorum hordeum sic paratum decoquentes. Quanquam ad cohibendas fluxiones biliosas nullum compendiosius remedium reperiatur, quam lac caprillum, aut bubulum tepidum, recensque mulctum, aut ad ignem decoctum, & assidue agitatum, donec ad tertias sit redactum, aut per silices fluuiales ignitos, & candentes ferri laminas in ipso extinctas coctum, & potui datum, dummodo febris absit, aut non urgeat. Vbi autem fluxio adhuc non cedit, sed vires ex fluxione biliosa incipiant deiici, astringentibus quoque resistendum erit; in biliosa quidem fluxione syrupo ex citri acido, aut e ribes, aut mirtino, aut eo, qui ex rosis siccis conficitur, aut cidoniorum succo: addendo ubi videbitur puluerem margaritarum, cornu cerui vsti, & seminum oxalidis, ac plantaginis scrup. j. vel ij. cum vnc. j. vel ij. aliquorum ex dictis syrups. Confert etiam saccha-

faccharū rosaceum vetustum cum aqua oxa- *Trochisci de*
 lidis, vel plantaginis exhibitum. & vbi hæc nō *spodio.*
 suffecerint, ad trochiscos de spodio, seu e suc-
 cino, seu terra lemnia erit deueniendum: simi-
 liter iis, quæ per aluum infunduntur erit resi-
 stendum, veluti ex decocto plantaginis, rhu- *Clysteres.*
 obsoniorum, balaustiorum, hypocistidis, ac
 hordei non decorticati, accipiendo quantita-
 tem sufficientem huius decocti, cum vnc. iij.
 olei rosacei omphacini, & tantundem succi
 plantaginis, & duos vitellos ouorum. Ad ex-
 tra vero irrigationibus ex oleo omphacino, *Irrigationes.*
 rosaceo, mirteo, seu citoniorum, cum vini al-
 bi quarta parte, quod astringens sit, & vnguē-
 tis, ceratis, & emplastris, & irrigationibus fa-
 ctis ex astringentium decocto. Sin autem pi- *Diarrhæa*
 tuita fuerit, quæ nimis quam par sit fluat, syru- *pituitosa.*
 po ex absinthio, e corticibus citri, mirtino, cū
 hoc puluere: Ex vtriusque menthæ siccæ drac.
 ij. cinnamomi, maceris, galangæ singulorum
 scrupul. j. seminis plantaginis, cornu cerui vsti, *Puluis.*
 seminis oxalidis ana drac. ij. fiat puluis: Et me-
 dicamento Gal. 6. de tuen. val. ex succo coto-
 neorum, gingibere, pipere albo, aceto, & mel-
 le cōfecto, minuēdo piper & gingiber, prout
 venter magis, vel minus frigida intemperie
 laborabit, aut cum aliquo ex dictis syrupis scr.
 ij. vel drac. j. trochiscorum e spodio, seu e terra
 lemnia, aut mora immatura adhuc acerba ad
 solem desiccata, deinde trita, & obsoniis ad-
 mixta maximum sunt astrictioni remedium.

*Irrigationes**Emplastrū**e galla.**Sacculi.**Auersio ad**renes.**Alui fluor a**catarrho.**Dysenteria.**Mictus san-**guinis.*

Ad extra vero oleo masticino, de absinthio, cum tertia parte vini odorati irrigare oportebit ventrem: & emplastro e galla, quod a Gal. describitur i.art.cur.ad Glauc. quod constat ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloe, ac mastice: & sacculis ex milio, sale, aut panico, aut etiam ex furfure, & hordeo torrefacto habentibus vim exsiccandi, Alexandro: & auersione ab intestinis ad renes, 4.aph.vltimo: veluti cumino, & apii semine: semper prospicientes (quod sane perpetuum esse debet in omnibus affectibus ex fluxione profectis) & in primis parti fluxionem transmittenti, veluti si fluor alui erit a catarrho, vel acri, & pungente, & salso, vel vitreo, vel acido, vel insipido, vel dulci ex cerebro ruente nūc per œsophagum in ventriculum, nunc per mēterecum in intestina, nunc in vtraque, qui vim retentricem vel qualitate, vel quantitate molestat, aut lubricam, & ad continendum ineptam reddit: cerebro in primis erit succurrēdum per dicta prius remedia in catarrho: dein partib. fluxionem recipientibus, vt ventriculo per remedia ante dicta in ventriculi imbecillitate. Dysenteria autem quibus medicamentis sit tollenda, libro morbis dicato in curatione soluta vnitatis longius dictum fuit. Mictus autem sanguinis, qui fieri solet, vel ob quantitatem, vel qualitatem acrem, & biliosam, vel aquosam, vel ab imbecillitate potentiae secrete tris hepatis, renum, vel ob erosionem vasis in partib. vreticis,

vr̄eticis, calculi attritu lacerato, rupto, lapsu,
 percussu, vel alio motu violento: sæpe etiam
 coitu immodico, interdum crisi, vbi ob redū-
 7 dantiam fiet, vel criticus erit, non erit suppri-
 mendus, nisi immodica euacuatione vires de-
 iiciat: si biliosus est, aut aquosus, suntis cho-
 lagogis, & hydragogis, vel hydroticis auertun-
 tur huiusmodi materiæ a partibus vrinariis,
 & a sanguine vacuantur. Si facultas secretrix
 est imbecilla, illinunt lumbos oleo myrtino,
 rosaceo, cidoniorum, cerato Galenus sand. vn-
 guento comitissæ de se. seu crocato flosculo
 rosarum, quam antheram vulgus vocat: foru
 ex balaustiorum, malicorii, gallarum, hypo-
 cistidis decocto in aqua rosarum, plantaginis
 ferrata: sumendo etiam syrupū rosatum, myr-
 tinum, cidoniorum, cum aqua solani, rosarū,
 plantaginis, lactucæ & drachma vna boli ar-
 meni, vel trochiscorum spodii, cum semine o-
 xalidis a Rasi scriptorum, lactis ouini vnc. iij.
 vel 6. mane cum drachma vna boli armeni
 sumtæ sunt in id efficacissimæ, & renes va-
 lenter roborant, modo non dormiat ager, aut
 exerceatur. quæ remedia etiam sunt glutinan-
 tia, ob id salubria, si vas est apertum casu, vel
 laceratu, vel alia ratione: si vero ob calum est
 cruentus mictus, prius erit auertendum secta
 basilica dextra: si purulentum erit lotium, ter-
 gentibus erit vtendū, dein glutinantibus præ-
 dictis astringētibus: præterea calidissimū serū
 lactis, decoctū hordei saccharatū bibendū, &

*Criticus.**Obredun-**dantiam.**Biliosus.**Aquosus.**A facultate**secretrix**imbecilla.**A vase lac-**cerato.**A casu.**Lotium pu-**rulentum.*

*Cautio.**Vrina incō-
tinentia.**Diabetes.**Vrina incō-
tinentia.*

iniiciendum: trochisci quoque Rasis liquorē aliquo ex prædictis soluti, salubriter in vesicā iniiciuntur tunc solum, quādo ab ea fluet sanguis. Notandum autem erit in hac affectione, ab iis quæ urinam ciunt, & coitum, ex Aetio, omnino esse abstinendum. Ad urinae vero incontinentiam, notandum erit huiusmodi affectionem communia habere auxilia cum ea affectione, quæ resoluit collum vesicæ, urinam ducentia erunt vitanda, vesicæ porcina per se vsta, & in potu exhibita iuuat, similiter & cinis ouillæ vesicæ. Eandem vesicam ouillam seu caprillam vstam ex posca 9. de comp. med. per loca præbet bibendum Galenus, & castorei drac. j. in vino odorato in potu præbet: nec nō & leporis testiculum in vino odorato feruefactum, oblinireque iubet pudendum cimo-liaterra cum perdicii succo. Diabetes vero, est transitus urinae continuus, aut verius potionis non mutatae, vt lienteria cibi, Galeno bis tantum visa. Vbi igitur inuitis excidet urina, vt etiam lectum æger permeiat, causa primum erit auferenda, quæ a potu largiore, parcius bibendo: si a potus aut cibi qualitate falsa, acri, ab iis erit abstinendum: si ab hepatis imbecillitate, curanda erit hepatis imbecillitas, quæ a sphinctere vesicæ resolutio ob frigiditatem, sananda erit ea paralyssis per calorifica omnia: si ab hepatis & renum calida intemperie, sananda erit sumtis & admotis refrigerantibus sæpe dictis: si a retentione imbecilla vesicæ, intemperiei-
cuius

eius causa erit per sananda contrariis. thuris etiam scrup. j. vel drachma dimidia cum aqua absinthii multis est remedio, & spodium, & ex eo, vel balauistiis, vel terra sigillata trochisci ad drachmam vnam, & puluis glandis assatae, & syrupus mirtinus, ex omphacio, de ribes, de infusione rosarum, post corporis expurgationem a vitioso humore. Et ubi his affectio non cedit, licebit uti stuporem inducentibus, ex Actio; veluti scrup. ij. vel drac. j. philonii persici seu romani, cum poligoni decocto, ac paucio vino nigro: & extrinsecus illinitionibus, vnguentis, & cataplasmatibus saepe dictis. Sequitur icteritia, quae sane si erit ratione crisis, velut in febribus, facile curabitur, Galen. 9. de

*Ictericia
critica in
febribus.*

B comp. med. per loca ex aquarum potabilium balneis, & olei discussorii affricu, & omnibus cutem rarefacientibus, quale est oleum anethinum, camomellinum. Et victu humido, qui humorum crassitudinem extenuare possit. 5. loc. aff. Si vero fuerit ex venenata causa, per theriacae potionem eum curabis: sicuti Galenus imperialem serum viperarum venationi deputatum, 5. loc. aff. Si fuerit ex partium solidarum calore, cibis refrigerantibus & humectantibus, prifana, cichoreo, & balneis ex potabili aqua tepida: Si ex iocinore male se habente, si erit intemperies aut obstructio, aut scirrhus curabitur ex horum morborum curatione. At si vitio vesicae bilis obstructa, cibis aperientibus, & extenuantibus, & iis, quae bi-

*Ex causa
venenata.*

*Ex calore
partium so-
lidarum.*

*Ex iecoris
vitio.*

*Ex vitio
vesicae felle.*

*Purgatio in
ictericia.*

*Ictericia
nigra.*

*Lactis re-
dundantia.*

*Ex vitio
corporis re-
dundantis
a sanguine.*

lem ducere possunt, erit curanda, Galen. 5. loc. affe. & purgatione bilis: nam venæ sectionem prætermisit Gal. 5. loc. aff. In purgatione autē hoc erit obseruandum, vt sit fortis, quod ob ventris siccitatem fiant imbecillitates, & naturam non habemus adminiculantem expulsionem: cum ratione obstructionis non possit expellere: quibus tamen duobus indigemus ad hoc, vt prompte noxii humoris fiat euacuatio medicamento detrahente. Natura vero expellente primo aph. 22. Galenus Archigenis auctoritate, 9. de cōp. med. per loca coagulatum leporis commendat, cum meraco addies quinque, vel sex exhibitum. Ictericia vero nigra aut erit ratione intemperiei, aut obstructionis, aut inflammationis, aut scirrhi lienis: & tūc ex ratione horum morborum erit tollenda: sin autem erit ex intemperie iocinoris, iocinori erit prospiciendum: si vero ratione vtriusque tum lienis, tum iocinoris, vtriq; erit medendum, & magis vni quā alii, prout morbus vnius altero magis vrgebit. Lactis vero in redundantia, præter victus rationem talem, vt ex ea paucus procreetur sanguis, quod huic malo præ cæteris inedia cōferat, venæ sectione erit vtendum in poplite seu talo: quod venæ sectio optimum sit remedium, vbi menses erunt retenti: quod vt ait Galenus, quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mamillis, multum præsertim, non colligitur. Vbi autem erit vitio corporis sanguine redundantis, primum

mum interna in cubito, dein in poplite, & cucurbitulis, frictionibus, & vinculis erit diuertendus sanguis: postea spongia pura molli posca e gelida imbuta, expressaq; super mammas fasciis erit accommodanda, atq; exsiccantibus & digerentibus medicamentis erit vtendum, quæ tamen leniter fluxionem reprimant; ne ad pulmonem impetu quodam trudatur sanguis. His autem tuto vti poterimus, quod neq;

*Medicamē-
ta tūiora.*

cogi, nec caseari lac permittat, & a futura inflammatione penitus mammas liberet: veluti ex fœniculi, apii, petroselini, maluarum, & althææ, ami radicibus an. pug. j. foliorū lauri, & florum camomelli singulorum m. ℥. quibus decoctis in aqua, tectis panno lineo mamillis, mamillæ erunt fouendæ, postmodum eodem decocto abluendæ, dein post ablutionē rosaceo omphacino illine: postea resinæ terebinthinæ quantum sufficit, vino albo odorifero, & aqua rosacea sæpe abluatur, & addatur duo, aut tria oua tota, ac croci scrupulus vnus, & fiat emplastrum seu ceratum addita cera, quod super linteo lineo extēdatur, perforato in duob. partibus, ex quibus mamillarum papillæ extra prominere possint, & mamillis imponatur.

Sequitur mensium fluxio, seu menstrua purgatio largior. Quæ quidem vbi pēdebit a san-

*Mensium
fluxio lar-
gior a copia
sanguinis.*

128 guinis copia, supprimeretur sectione venæ inter-
næ dextræ, & victu tenui, fugā ouorū, carniū,
vini & aliorū sanguinē augētū: si ob mixtā bilē
a cholagogis, vt mirobalanis citrinis vacuāda,

*A bile mix-
ta.*

*A pituita
serosa.*

A lapsu.

Ab ulcere.

sanguisque refrigerandus syrupo granatorum, rosarum, ribes, oxalidis, cum aquis plantaginis, rosarum, oxalidis si a serosa pituita sanguini mixta, chebulis vacuanda: si a lapsu, glutinanda rupta: si ab ulcere, tergendum, glutinandum, ac cicatrice tegendum, ut in mictu sanguinis diximus: Sanguis quoque erit reuellendus secta dextra basilica, cucurbitula magna sub mammis affixa, foru, & ligaturis, & frictionibus dolorificis brachiorum, astringentibus quoque, & frigidis simul erit sistendus, cogendus, & repellendus: tum sumptis, ut syrupo rosato, mirteo, cidoniorum, granatorum cum aquis plantaginis, rosarum, solani, additis trochiscis terræ sigillatæ, vel electria scrup. ij. ad drac. vnam, vel lapide hæmatite, corallio rubro, ferri scoria, triphera phenonis. tum impositis ledi, & vteri collo balanis ex bombace, oleo refrigerante & astringente illitis, vel aqua, vel succo plantaginis, solani, rosarum imbutis, insperso post puluere aliquo astringente: amplius, decocto astringente venter inferior fouendus, aut totum corpus eodem suffiendum, lumbos, pectinemque refrigerantibus, astringentibus: tum oleis rosato, cidoniorum, mirteo: tum vnguentis ac emplastris sandalino, ex flore rosarum, (antheram vulgo vocat) comitissæ, insperso etiam his puluere astringente ex rosarum foliis, flore, malicorio, balaustiis, gallis, hypocistide, acacia, bolo armena, sanguine draconis, & similibus: ex quibus etiam prædictum

dictum decoctum faciendum. In vterum quoque per metrenchitam iniicienda vnc. tres, seu quatuor succi depurati, vel aquæ plantaginis cum bolo armenia, sanguine draconis. vbi hæc non sufficiant, philonii, vel athanasii drachma vna cū aqua plantaginis sumta, sanguinem moueri ineptiorem facit: viribus tamen validis adhuc detur, ne imbecillis calor natius exstinguatur. Pessos autem causticos tentare non consulerem, multo minus iniectiones, nisi essent vlcera depascentia, qualia sæpe etiam dysentericis adsunt, tunc enim leuiora tentari possunt, veluti est pastillus Passionis, Polyidæ, aqua plantaginis solutus. Sin autem erit propter nimiam osculorum vteri apertionem, a qua nimia itidem mensiū fluxio prodeat, astrictione itidem erit tollenda, post venæ sectionem internam in cubito reuulsio- nis gratia factam, & reliqua: in potu præbenda erunt succus polygoni, vel plantaginis cum vncia vna cornu cerui vsti, aut corallorum rubeorum tandem, aut scrup. j. lapidis hæmatitis. Extrinsecus autem vteri loca erunt fouenda oleo rosaceo, melino, mirteo, pauco vino admixto, & vnguento, quod vulgus medicorum comitissæ appellat, pauco aceto addito, lumbos etiam vngendo, cataplasmatibus etiam ex ordeï, fabarumq; farina, symphiti radice, polygoni ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocistide ex posca compositis, aut ex pal- mulis, malis cidoniis, malicorio, balauistiis, a-

*Pessi & cau-
stica vitan-
da.*

*Vterum de-
pascentia
vlcera.*

*Mensiū
immodera-
ta fluxio ab
apertione
osculorum
uteri.*

*Vnguenta.
Cataplas-
mata.*

Inseffiones.

lumine, gallis, acacia, & hypocistide cum eadem polca: inseffione ex foliis mirti, rosarum, plantaginis, poligoni, symphiti, virgultorum rubi, ac lentisci decocto: pessulis quoq; ex foliis plantaginis, poligoni, aut myrtillorū, symphiti que radice contusis, pauca addita manna thuris, hypocistide, balaustio, cum eiusdē plantaginis seu poligoni succo, linteo serico, aut lineo tenui exceptis, & ad formam humani digiti redactis, & in rosaceo intinctis, qui immittantur penitus vsque ad os vteri: infusionibus etiam per instrumēta ad hunc vteri vsum parata, factis cum plantaginis, poligoni succo, similiter acaciæ, vel hypocistidis, vel decocto

Infusiones.

in aqua pluuiali malicorii, gallarum, balaustiorum, hypocistidis, ac foliorum lentisci, cū poligoni, seu plantaginis succo, aut etiam acacia. Quare fluxio ratione vasorum dilatatorum & apertorum per astringentia hæc erit curanda, prius tamen artubus, & extremis partibus superioribus vinculis ligatis, & cucurbitula magna sub mammis affixa, Hipp. 5. aph. 50. & venesectione reuulsione gratia in cubito: ruptum autem per conglutinantia citra mordacitatē resiccantia, veluti est terra lemnia, & samius aster, 7. de comp. med. per loca. Vbi autem erit propter vasorum erosionem, mediocriter exsiccantibus, & sine morfu detergentibus, vt quæ carnem gignāt. 3. met. & 2. de comp. med. per genera. Galenus autem ex vtero sanguinis profluuium quaternis iam diebus profluens, cum

*Mensium
immoderata
fluxio ab
erosione va-
sorum.*

cum nullo alio potuisset sistere remedio, plā-
taginis succo vtens prorsus sanauit, s. met. Se-
quitur gonorrhæa, seu seminis profluuium; *Gonorrhæa.*
quæ sane curanda quemadmodum omnis flu-
xio curatur. Quare refrigerantibus, atque ex-
siccantibus tum cibis, tum medicamentis erit
vtendum: quanquam vbi tenue, acre, ac bilio-
sum fuerit semen quod emittitur, refrigeran-
tibus magis quam exsiccantibus erit vtendum.
Nam hi contemperantia & refrigerantia re-
quirunt, vt genitura sensim crassior, & tempe-
rata reddita, non amplius effluat. Quare potu
aquæ frigida, in qua extinctum sit ferrum, &
simul cum aqua iis, quæ semen extinguunt: &
extra illinitionibus, cataplasmatis, in sessionib.
vnguentis: item pastillis & vnguentis in cura-
tione morborū iam enarratis. Sequitur pro-
fluuium muliebri, quod Gal. lib. de prælag. ad
Posthumum, iis ait esse curandum, quæ citra *Fluor mu-
liebris ruber.*
immodicum calorem exsiccant, cum affectus
sit humidus. Aut igitur fluor erit ruber, & tūc
vtendum sectione venæ in cubito, quæ non
solum ab utero diuertit, sed detentionē etiā, &
constrictionem efficit. A venæ sectione lum-
bis & inguinibus lintea frigidis succis imbuta,
& reliquis medicamentis in mēsum fluxione
dictis erit vtendum. Vbi autem profluuiū erit *A vitiosis
humoribus.*
vitiosorum humorum, aut biliosorum, aut pi-
tuitosorum, aut serosorum, expurgandi erūt, &
ab utero diuertendi. Ita autem Galenus ibidē *Boethi ux-
oris curatio.*
in Boethi uxore processit, quæ hac affectione

laborabat. Primum enim medicamento per aluum educere vsus est. Secundo iis, quæ per urinam ducere valent. tertio iis quæ per cutim euacuare possunt. Quibus remediis quindecim diebus cum fuisset vsus, prorsus prædictâ mulierem a morbo liberauit, & proinde Boethus quadraginta aureos ad eum misit. Quare prius purgato humore qui peccabit : & vbi vna purgatio satis non erit, alia iterata, in minori tamen quantitate, vt ibidem fecit Galenus: a purgatione vreticis erit vtendum, & totius corporis frictionibus humor erit euocandus, primum mollibus linteis, dein asperis. Quibus medicamentis vniuerso corpori adhibitis huiusmodi fluores sanauit Gal. 6. loc. aff. intacto vtero. Et vbi hæc non sufficient, iis erit vtendum, quæ conferunt in menses profluuium, non tamen multum efficacibus. Notandum etiam, 10. simpl. Gal, leporis coagulum si cum aceto bibatur, sanare profluuium muliebri: semper aduertendo ne ab humoris acrimonia influentis, & sanie vlcus excitetur. Vnde assidue calida aqua erit eluendum, & moderate astringentibus, & vires abstergendi obtinentibus, veluti rosaceo, mirtino, melino illiniendus erit locus. Vteri vero exitus, si ex laxatis erit humore multo ligamentis, vel abscessu, ac vlcere exesis, aut partu improspero, vel lapsu ab alto ruyis, causa erit auferenda, 12. & vterus loco natiuo restituendus, nisi inflatio prohibeat, quam fotu ex cumino, aniso, baccis lauri,

Leporis coagulum.

Cautio.

Vteri exitus.

Vteri inflatio.

lauri, & similibus; hydromeliti, aut vino rubro astringente incoctis dissipabis : mox, ne recidat, insperges pulueribus stipticis ante dictis, postea repones: suffitu etiam rerum graueo-
Suffitu.
 lentium, vt pennarum perdicis, assæ, fœtidæ, castorii, & similium, excepto per infundibulum, vel cathedram perforatam. Sunt qui ouû sub gallina corruptum, fractum, agitatum, lanis illiniunt, & imponût vuluæ. Odoret simul iniucunda, & docta obstetrix manibus subseruiat, vel instrumento virgæ virili proximo: postea clunib. elatis cubet aliquot diebus. Ad
Ani proci-
dentia.
 podicis autem, seu ani, seu sedis proci-
 dentiam, si erit ab humida intemperie, laxatis musculis sedem releuantibus siccandum erit, si frigida calfaciendum: si vtraque, calfaciendum, & siccandum. puluis ex hypocistide, acacia, balau-
Puluis.
 stis, malicorio, rosis, gallis, cortice thuris, scor-
 ria ferri: vel ex iis, vino, si calor abest, aut aquæ hordei si adest incoctis: forus, vel illitum, post
Forus.
 lotionem vnguentum sandalinum, oleum
Vnguentum
 rosatum, mirteum, cidoniorum, puluere dicto post insperso, vel postquam erit, aluo deie-
 cta, repositum, balanus ex bombace prædictis
Balanus.
 immergatur, illiniatur, inspergatur, & cluni-
Ani proci-
dentia ex
decubitu
pituita.
 bus altis, & inunctis quiescat. Si sedes proci-
 dit non a violento desidendi, & cohibitæ respira-
 tionis conatu, neque ex mora longa in aqua frigida, aut super lapidem, sed ex decubitu pi-
 tuitæ, coquenda erit, & vacuanda, post intem-
 peries impressa erit castiganda. Si a tumore

R r

*Atumore
præter na-
turam.*

*Dolor in
præcipientia
ani.*

*De excre-
mentis re-
tensis.*

Fluxio.

*Fluxionis
causa effi-
cens sumit-
ur ex co-
gnitione.*

*Causarum
suppressionis*

præter naturam, is curandus, appositus cuique tumorum generi, & tempori præsidis. si dolor adest, applicetur decoctum camomelli, meliloti, maluar, althææ, seminis lini, fœnugræci. Sed hæcenus de arte supprimendi nimiorum excrementorum fluxionem. Sequitur ut percurramus artē pellendi excrementa intra corpus retenta. Quod quidem suo opposito, & contrario cum habeat fieri: suppressionis autem contrariorum cum sit ipsa fluxio, sequitur igitur, ut penitus percurramus quid sit ipsa fluxio. FLUXIO est expulsio excrementorum corporis humani recte, & conuenienter facta ab iis, quæ motum inferre possunt, ut excrementa nimis quā par sit retenta pellantur ad extra. Ideo autem dicitur, Fluxionem esse repulsionem, quod expulsio sit proximū genus ipsius fluxionis. Et quod sequitur: Fluxionem esse expulsionem excrementorū corporis humani, notat symptoma, circa quod versatur ipsa fluxio. dein quod sequitur: Fluxionem fieri ab iis, quæ motum inferre possunt, notat causas efficientes ipsius fluxionis: quarū sane cognitio, & numerus facile apparebit ex cognitione causarum ipsius suppressionis. Etenim cum fluxio, & suppressio oppositæ sint, & contrariæ, sequitur quod earum quoque causæ effectiue erunt contrariæ. Atqui cum causæ suppressionis sint priuatio acrimoniæ stimulatæ, partium expellentium sensus obtusior, propellentis facultatis imbecillitas, & cōtinentis robur

robur validum, materia motui inepta, prohibitio excrementorū aliunde refusorum, viuendi ratio parca, viarum angustia, & obturatio, recipientis partis imbecillitas, & situs ex decliui sursum situatus: sequitur modo, vt ad inducendam, & efficiendam fluxionem excrementorum acrimonia aliqua stimulans sit inducenda; corporis sensus exquisitior erit conseruandus; expultrix erit roboranda: & continens facultas erit reddēda imbecillis; materia erit lubricanda, & fluida reddenda, excrementa aliunde erunt refundenda; & copia ciborum largior erit iubenda; viarum latitudo, & laxitas erit fienda, excipiens pars reddenda erit imbecillis, situsque decliuor. Quæ quidem ars inducendi fluxionem in excrementis suppressis, vt clarius appareat, discurremus per aliquot excrementorum genera suppressa, incipientes a suppressis excrementis ipsius vrinae (ischuria appellatur) in qua sane cauendum erit a ducentibus vrinam. Aut igitur symptoma hoc proueniet propter vesicæ imbecillitatē, aut ratione crassorum humorum, aut lapidis, aut grumi, aut inflammationis, & ex huiusmodi morbis. Igitur si fuerit ratione imbecillitatis vesicæ, Galeno, æger figuratur, & ait manibus tumorem præter naturam comprimēdū, ita vt vrina expellatur, musculiq; abdominis, maxime medii, ægroti manibus, seu alteri^o comprimēdi, 6. loc. aff. postea vtendū erit fomētis, cataplasmatibus, & vnguētis in curatione morbo

*Ischuria ex
imbecillitate
vesicæ.*

Rr 2

*Ex crassis
humoribus.*

Ex calculo

Ex grumo.

*Ex inflam-
matione.*

Stranguria.

*Renum cal-
culus.*

rum harum partium dictis. Et vbi his non cedit symptoma, cathetere erit vtendum. Sin autem fuerit ratione crassiorum humorum, tenuanda erit, & incidenda huiusmodi materia, & eodem modo erit comprimendum, & vtendum erit iisdem fomentis, in sessionibus, & vnguentis. Sin autem fuerit ratione lapidis, conandum erit vt lapis ex meatu recedat. Recedet autem hoc modo, vt ait Galenus, supinum figurando ægrum, vt crura reliquo corpore sint sublimiora, multifariam ipsum concutiendo: & vbi non cedit, rursus concute, sed vehementius: Nam sic & lapidem a ceruice repelles, & vrinam reuocabis, 6. loc. aff. vel cathetere, vel candela cerea oleo intincta, vel digiti condylo per perinæum celeriter acto sedē versus. Si in meatum totus iam inciderit, trahendus erit suctu virgæ dilatato prius meatu per infessum, vel fotum. Si grumus in causa fuerit, ipsum oxymel in potu dandum erit, 6. loc. aff. Vbi autem causa fuerit, aut inflammatio, aut alius morbus, ex curatione illius morbi erit tollenda. Sequitur stranguria, quæ sane si fuerit causa acrimoniæ, contemperanda erit humectantibus, & aliquantulum refrigerantibus extra balneo aquæ dulcis, & fotu pubis easdē vires habentis. Vbi autem causa fuerit frigida vesicæ intemperies, calfaciente vino, & reliquis medicamentis in dysuria fieri solitis. Sequitur calculus renum, in cuius curatione, ex Gal. 6. mor. vulg. ab iis erit cauendum, quæ du-
ram

ram substantiam habent, & quæ ægre conco-
quuntur, quæ sunt tenuia, & crassa. Vomitus
erit prouocandus, lib. de cur. affectuum renū:
& alius clysteribus erit tentanda. Nam licet
non ab affectu, ab accessione tamē liberatur,
Galeno. Et vniuerso corpore vacuato, medi-
camentis erit vtendum, quæ renum corpora
molliant, & meatus relaxent, fomento, inun-
ctione, cataplasmate in morbis partium cor-
poris enarratis, & cucurbitulis absque incisio-
ne a renibus ad inguina, quæ habent vim trās-
ferendi lapidem ab eo loco. Ad calculum au-
tem vtendum iis, quæ secandi, & abstergendi
vim habent, 10. de comp. med. per loca, quæ
tamen non sint admodum calida, 6. san. tuen.
quod calculorum igneam intemperiem cal-
culi effectricem causam augeant; veluti sunt
radices asparagorum, betonica, acetum scylli-
ticum, 5. simpl. asplenii quoque decoctum,
quod cetrach appellatur, cum oxymellite ip-
sum lapidem frangit, 6. simpl. Gal. & puluis in
morbis partium positus. Eiecto autem calcu-
lo, vbi voluerimus præseruare agrotum, ne a-
lii in eo gignantur, vtendum erit extenuanti-
bus citra magnum calorem, vnde alius semper
sit laxa: & a cœna sæpe vomat, & ante omnem
cibum bibat aquam tepidam, quod nihil sit
quod adeo renes recrementis vacuos, tempe-
ratosque reddat, vt non amplius calculos pro-
creare possint: & hoc, quod temporis spatium
igneus ipsorum calor a tepore aquæ extin-

*In calculo
vehemen-
ter calida
sunt fugien-
da.*

Præseruatio

*Renes excre-
mentis bene
vacuant a
qua tepida.*

*Calculus
vesicae.*

*Calculus
urinae meatus
obstruens.*

*Lactis defectus,
ex defectu sanguinis.*

*Ex sanguine deteriore
ratione bilis.*

*Ratione
pituita.
Mensium
suppressio.*

*Ex reple-
tione.*

guatur. Ad eundem modum, & iisdem vesicae calculus erit tollendus. In hoc variat, quod ratione situs, validioribus remediis est utendum. Si calculus meatus urinae obturabit, curandus erit, quomodo diximus ex Galeno agri concussione. Sed Alexander longa experientia comprobatum laudat caprillum, seu hircinum sanguinem calidum extrinsecus super vesicam impositum, praesertim in calido balnei aere. Sequitur lactis defectus, qui quidem aut procedet defectu sanguinis, aut ex sanguine facto deteriori. Si ex defectu sanguinis proveniet, seu paucitate ipsius victus ratione calfaciente, & humectante emendatur, Gal. 5. simp. Sin autem fuerit ex sanguine facto deteriori; aut erit deterior ratione bilis, aut atrae bilis, aut pituitae, si fuerit bilis, purganda erit, mox eodem victu utendum 5. simp. Gal. si atrabilis eodem modo. At si pituitosus fuerit sanguis, Gal. calfacientibus, aut primo, aut secundo; non tamen exsiccantibus utitur, quod ab his pituitosi humores excalfacti vertantur in sanguinem. Sequitur mensium suppressio, quae sane aut erit ob plenitudinem, aut ob nimiam caliditatem cum humore bilioso: aut ob frigidam corporis intemperiem cum succorum frigidorum redundantia; aut ex atrae bilis affluentia. Si erit ex repletionem, venae sectione in poplitibus, aut malleolis, Gal. curat lib. de rat. cur. per venae sectionem, tempore ante quatuor, aut quinque dies temporis mensium statuti, Gal. & cucurbitulis

curbitulis pubi, & inguinibus affixis, 13. meth. Si ob caliditatem cum copia bilis, purganda erit bilis, & pubi, & inguinibus cucurbitulæ affrigendæ, & frictionibus, & vinculis partibus inferioribus factis, & intus, & extra alterantibus in temperiem calidam: intus decocto, pastillo: extra infessionibus, vnguentis, pessis, in morbis partiū positis, & balneo aquæ dulcis.

Sin autem fuerit ob nimiam intemperiem cū humoribus frigidis, prius præparatis, & post præparationem frigidis humoribus euacuatis.

Ab humoribus frigidis.

Eodem modo si fuerit atrabilis postea vtendum erit euocantibus menses, quæ quidem

Ab atrabile.

excalfacientia sunt, non tamen multum exciccantia, Galenus 5. simpl. veluti pulegium, sabina, cinnamomum: & nepitum, & pulegium in mellicrato cocta, aut contusa arida, cribroque, subtili discreta, ac rursus trita, vsque dum pollinem tenuitate referant: & inde in mellicrato inspersa mire educunt, Galenus libro de cur. ratione per venæ sectionem.

Menses prouocantia.

Amplius, medicamentum quod amarum appellant drach. j. exhibitum cum aquæ calidæ cyathis tribus, 2. de comp. med. per loca. Et ibidem, pastillorum e myrrha drach. j. cum aqua mulla, aut capillorum veneris. Item pastillo, infessionibus, sacculis, suffitu, vnguentis, pessis in morbis partium dictis. Sequitur mola, quæ sane tolletur medicamentis siue intus, siue extra adhibitis, quæ habeant laxandi vim, ac molliendi; veluti infessionibus,

Mola.

*Secunda re-
lieta.*

Lumbricus.

*Triplex
lumbrico-
rum genus.
Teretis.*

Latus.

fotibus, vnguentis, cataplasmatibus, pessis, & iis tandem medicamentis, quæ mensium suppressionem adiuuare solent, in morbis partiū positis. Ad secundam autem derelictam, omnia menses ducentia erunt conuenientia. & præter hæc sternutatio, spiritus detentio, oris, & narium obturatio, 5. aph. 49. Hipp. Et castorei, ac pulegii drac. j. ex aqua mulla potata, Actio. Sequitur lumbricus, qui sane cū sit in numero eorum, quæ tota substantia sunt præter naturam: e corpore est eiiciendus, 14. metho. Ratione vero qua est excrementum viuens, ideo prius est interficiendus, postea eiiciendus. Quoniam vero triplex est genus lumbricorum, nec vni generi conuenit ita vehemens medicamentum sicut alii, ibidem Galenus: quare sciendum, teretibus absinthium conuenire, Galeno, præsertim si pueri non fuerint. cremor autem ipsius est sumendus. in summa amara omnia nedum ad interficiendos lumbricos sunt idonea, sed etiam ad fœtum viuum enecandum, & mortuum eiiciendum, 8. simplic. vbi de filice, & myrrha agit. Laudat Paulus oleum immaturum, omphacinum scilicet ad cochlearia duo, quod sui amaritudine interficiat, sui vero lubricitate eos cum stercore eiiciat. aloë lota optima est: acetum scyllinum in adultioribus, clyster mulla factus, quod dulcedine capti deorsum descendant. Latus vero lumbricus etsi iisdemet, Galenus tamen vehementiora medicamenta

menta postulat, quam teretes: huiusmodi autem medicamentum ait Galenus ibidem esse filicem, præsertim eius radix, 8. simplic. si drac. iij. in mellicrato exhibeatur, latum lumbricum interficit, Galeno. Ascarides vero adhuc vehementiora, Galeno. Quare aut absinthii decocto oleo admixto sunt vacuandi; vel centaury decocto cum nitro, & melle, & salis momento. Quoniam vero adsunt qui lumbricis cum alui fluore inuaduntur: quare iis plantaginis succus erit præferendus. Et si ipsa plantago arida absumatur, ex æquo vtriusque, & fluori, & lumbricis efficax est. Sed hætenus dictum sit de curatione symptomatum.


*Ascarides.**Lumbrici
cum fluore
alui.*

131

IO. PAULI PERNVNIA
PATAVINI.

De Curatione affectuum simul
implicitorum.

LIBER OCTAVVS.



AFFECTVS, alias corporis humores, alias corporis partes, alias actiones, atque excrementa infestant: & hi rursus modo solitarii sunt, modo comitati. Cumque hætenus expositæ fuerint curationes af-

Rr 5

*Connexio
huius libri
cum praece-
dentibus.*

*Curationis
tria summa
capita.*

*Quid Fe-
bris.*

fectuum omnium qui solitarii sunt, & seiuncti: Sequitur ut percurramus modum curandi eisdem affectus simul associatos: ubi scilicet & corporis humani partes morbo aliquo premuntur, & aliquod symptoma, aut actiones, aut excremēta, aut utrunq; perturbat, eorumque causae efficientes praesentes adhuc adsunt. Quo scilicet ordine, & qua arte sint auferendi, quibusque ingeniis remedia ita vni applicari possint, ut alteri quoq; prosint, aut saltem nihil obsint. Febris autem cum ceteris frequentius aliis affectibus associetur: quapropter de curatione febris primum agemus. Quoniam vero ut initio huiusce operis dictum fuit, curatio tunc recte & conuenienter dicitur esse facta: quoties trium praecipue habebitur ratio: affectus, corporis affecti, & circumstantiarum: quapropter sequitur, ut etiam in febrium curatione horum omnium sit habenda ratio. Incipientes igitur exercere in morbis associatis artē curandi propositam, incipiendum erit a recta, & exquisita febrium cognitione. Porro FEBRIS est intemperies calida cordis, facta ab iis, quae caliditatem praeter naturam in corde inducere possunt, ut fiat actionum laesio, vel interitus. Ideo autem dictum fuit esse intemperiem, ut notaretur sub primo morborum genere febrem contineri, ratione cuius distinguitur a tribus aliis morborum generibus. Ea vero ratione, qua dictum fuit esse intemperiem calidam, seiungitur ab omnibus aliis intemperierum specie-

speciebus. Ratione vero, qua in corde existit, notatur locus affectus, seu subiectum, in quo sedem tenet ipsa febris: modo per cor intelligantur partes cordis similes, quæ sunt subiecta materia ipsius febris. Fit autem, atque introducitur huiusmodi intemperies calida in corde, vel a causa calida recedente post factam impressionem, vel permanente. & si recedente, vel ab extrinseco adueniente, veluti aeris feruore, cibo & potu nimis calidis, & medicamentis, aut quantitate, aut qualitate peccantibus. aut ab intrinseco: & hoc vel ab animi accidentibus, veluti ira, mærore: vel a corporis accidentibus, ut nimio motu, lassitudine: vel vtriusque; ut vigiliis: & si a causa permanente, aut a meatuum constipatione, vel frigidityte extrinsecus cutis poros claudente, ita ut calor diffilari non possit; vel a putredine vapores calidos ad cor mittente. Fit autem actionum læsio, earum sane, quæ cordi propriæ sunt; veluti sunt pulsus celer ac frequens, solius calidioris cordis proprius; virium languor, & imbecillitas cum spontanea corporis dissolutione: & hoc, quod necesse sit corpus vniuersum consentire laboranti cordi. Qualitas præterea corporis vniuersi mutatur ad caliditatem: foris sane acrem & pungentem, aut intus certe molestam, hæcque omnia sequuntur ad febrem, quatenus febris. Habita iam cognitione naturæ febris in vniuersali, sequitur ut percurramus differentias, seu species febrium, eas assumentes ex dissolutione ma-

Febrium causa.

Actionum læsio in febribus.

Tres febrium differentia.

teriarum subiectarum in diffinitione febris positarum. Porro cum subiecta materia febris sint partes cordis similes: partes autem cordis similes ex tribus principiis ortum trahant: ex spirituosam, humoralem, & solidam: sequitur quod tria etiam erunt febrium genera, nec plura, nec pauciora: quarum prima, quae spiritum occupabit, in calfacto esse: reliqua vero in calferi, ephemera appellatur. secunda, quae eodem modo humores occupauerit, putrida: tertia, quae solidam cordis substantiam, hectica esse dicitur. Igitur ephemera erit intemperies calida spirituum cordis facta ab iis, quae spiritus calfacere possunt, ut fiat actionum laesio, vel interitus. Illud autem non ignorandum, quod etsi febris, quatenus febris, sit causa laesionis actionum cordis, differenter tamen ephemera laedit actiones cordis vitales ab aliis febrium generibus: nempe quod ephemera tametsi ratione qua febris est pulsationes cordis immutet, eas tamen aequales remanere sinat: & hoc, quod in ephemera non adsit materia, a qua pulsus in motu impediri possit: veloces tamen sunt, quo aucta sit necessitas euentandi. Qualitas vero corporis, caliditas sane, tactu mitis percipietur: quae in putridis atque hecticis mordacior esse solet, atque excrementa corporis, ut vrina, substantia, colore, sedimento, aut nihil, aut minimum a naturali distabit. Sequitur secundum genus febrium, quod putridum appellatur, si prius, illud praenotatum fuerit, reperiri

1.

2.

3.

1.

Quid ephemerum.

Actionum laesio in ephemera differt ab aliarum febrium laesione.

Qualitas corporis. Excrementa non multum mutantur.

reperiri quoddam ephemerarum genus quod non simplex, sed compositum appellatur, an-
 ceps & ambiguum, inter ephemeram & putri-
 dam, ortum trahens a duabus causis simul cō-
 iunctis, ab augmento sanguinei caloris in
 substantia aucti, & meatuum constipatione,
 (& synochus absque putredine appellari solet)
 oriri solitum, ut ait Galenus, nō in corporibus
 debilibus, sed in quadratis corporibus. cuius
 sane tres differentiæ assignari solent ex vario
 constipationis modo desumptæ: prima, in qua
 plures sint pori constipati quam aperti, acma-
 stica: secunda, in qua pauciores sint constipati
 quam aperti, paracmastica: tertia in qua æqua-
 les sint aperticum constipatis, omotona: iis-
 demque ex causis proficiscuntur huiusmodi
 febres, quæ tamen vehemētiores sint, ex qui-
 bus diariæ, iisdemque accidentibus & notis
 apparent, sed aliquantulum manifestioribus.
 Sequitur secundum febrium genus, quod pu-
 tridum appellatur. Porro febris putrida est in-
 temperies calida in humoribus cordis sedem
 tenēs, facta a vaporibus putridis, cum humo-
 ribus cordis commixtis, ut fiat actionū læsio,
 vel interitus. Quod quidem putridum genus,
 ratione qua humores cordis occupat, seiungi-
 tur ab aliis duobus generibus febrium: nimi-
 rū quod ratio ephemerarum simplicium sit,
 ut caliditas insit in spiritibus cordis absque ad-
 ditione alicuius substantiæ: hecticarum vero
 simplicium ratio sit, ut calor & ipse auctus sit

*Synochus nō
putrida.*

*Synochi tres
differentia.*

Acmaistica.

*Paracma-
stica.*

Homotona.

II.

*Quid putri-
da.*

*Putridarū
ab epheme-
ris & hec-
ticis differen-
tia.*

secundum solam qualitatem absq; extrinseco additamento, in substantia cordis existens: sed ratio febris putridæ sit & ipsa intemperies calida cordis, sed cum additione putridorum vaporum commixtorum cum humoribus cordis: ita vt cordis humores duntaxat inficiantur, & non putrescant. Notanter autem dictum fuit, putridos vapores commisceri debere cum humoribus cordis: & hoc, quoniã tametsi in corpore adesset putredo, atq; ab eo loco nõ eleuantur putridi vapores, qui commiscerentur cum humoribus cordis, non esset putrida febris. Ratione vero, qua positum fuit, huiusmodi vapores putridos cõmisceri debere: ita vt inficiant solum, non autẽ putrefaciant cordis humores: sciungitur a pestilenti febre. Causa autem huiusce febris eadẽ esse solent, quas etiã & febris in vniuersali esse diximus, & quæ ephemeram etiam causare solent, modo non leuissimæ sint, ac veluti præterfluentes, sed ita vehementes sint, vt humorem spiritib. difficilius alterabilẽ inficere possint. Actionem autem cordis ita obledere solent, vt pulsum faciant inæqualem tum vnius, tum pluriũ pulsationũ: vnius quidẽ quod velocior sit systole: diastole vero tardior: Et hoc ratione materiæ, quam natura systole depressa arteria conatur excludere. Plurium vero pulsationum etiam inæqualitas apparet, modo scilicet celerem, modo tardum pulsum faciens: & propter inæqualitatem, & varium putredinis motum: & rursus

*Putridos
vapores necesse est cõmisceri cum humoribus cordis.*

Putrida & pestilentis differentia. Putridarũ causa.

Actionum lesio in putridis.

rursus modo fortem, modo languidum, alias quidē oppressā, alias leuata natura. Excremēta vero tali modo immutat, vt vrina vel penitus cruda, vel obscure appareat cōcocta, idq; maxime initio: qualitatēq; corporis adeo immutat, vt acris mordax & tangētis sensum acriter ferire incipiat, nō quidē ipso inuasionis initio, sed vel in augmento, vel in statu. Atque hæc sane est ratio putridæ febris. Cuius sane species, ac differentias facile inueniemus, si prius illud fuerit prænotatum, quod ex duplici putridorum humorum situ & loco, duo putridarum febrium prima genera ortum trahunt: alterum ex putredine humoris intra venas, atque arterias existentis, humores cordis continuo inficientis, & labefactantis, quæ etiam putrida continua appellatur: alterum vero ex putredine a venis ad extra venas emissā, quæ cum non assiduo cor inuadere possit, intermittens appellatur: putridæque febris cōtinuæ adhuc modum (non autem genus) duplicem esse: alterum earum febrium quæ ab initio in finem perseverant, nullo stato excandescentiæ ordine: cuiusmodi solet esse synochus putrida, & quæ causus appellatur: alter vero earum, qui etsi nunquam intermittat, remittit tamen, & excandescit alia quidē quotidie, alia alternis diebus, alia quarto quoque die. Qui quidem duplex modus inde ortū trahit, quod primus modus earum, quæ excandescentiam non habent, sit propter materiē in venis cordi proximis existentem, ratione cuius putre-

*Excremen-
torum mu-
tatio.
Corporis
qualitas.*

*Putridarum
duo sunt
prima gene-
ra.*

*Putrida in-
termittens.
Putrida cō-
tinua mo-
dus duplex.*

*Synochus
putrida.
Causus.*

*Duplicis
modi ratio.*

do cor ipsum assidue pari vehementia exercere potest. secundus vero, qui, etsi nunquam intermittat, remittit vero, causam sui habet in venis aliquantulum a corde disiunctis: ratione cuius distantiae putredo in cor pari impetu assidue fieri nequit: quanquam nec istarum excandescencia vel a rigore, vel ab horrore, vel a frigore initium habet, ut intermittentes, nec sudore solvuntur. His prenotatis, sequitur modo, quod febris putrida continua erit interperies in cordis humoribus existens, facta a putredinali caliditate humorum intra venas existens, ut fiat actionum lesio, vel interitus. Nam in eo, quod ait definitio, esse interperiem calidam existentem in humoribus cordis factam a putredinali caliditate humorum, notat vniuersale genus omnium putridarum tam continuarum quam intermittentium. Quod autem ait definitio, huiusmodi putredinalem caliditatem intra venas existere, seiungit hoc genus putridarum continuarum a genere intermittentium: & hoc, quod putredo humoris ad intra existens sit ratio, per quam continua ab intermittente seiungitur, seu modo putredo intra venas existens omnes, aut saltem maximas venas aequaliter inuadat; aut ex vna quapiam initium ducat, in ceteras postea sensim continuatione perreptans. Cuius quidem duplicis modi causae solent esse duae, aut quia putrefaciens causa vni quam alteri venae propinquior existat, aut quia sanguis non in

Quid putrida continua

Putridarum continuarum et intermittentium differentia.

Continua putrida duplex modus.

in omnibus æque venis sui similis habeatur. *Continua*
 Actionem autem cordis hoc modo immutat *putrida di-*
 putrida continua, pulsus inæqualitatem ultra *plex modus.*
 vigintiquatuor horas exporrigendo, neque ut *Actionum*
 intermittens sensim hoc tempore desinit, sed *lasso.*
 hoc modo perseverat dum prorsus conquie-
 scat. Nec actionē motionis depravat præter-
 gresso frigore, sed repēte calor hominem ad-
 oritur, quo ad excrementa sudor manifestus
 non apparet, ut in intermittente, quæ manife-
 sto sudore desinit. Quanquam huiusmodi læ-
 siones nō vno, sed duplici modo apparere so-
 leant, secundum quod duplicem diximus esse
 continuæ febris modum: nimirum in iis, quæ
 sunt continuæ ab initio in finem perseveran-
 tes nullo stato excandescentiæ ordine, cuius-
 modi sunt synochus putrida, & causus, gravio-
 res apparent: in iis vero, quæ secūdi modi sunt
 continuæ remittentibus aliquando, nunquā
 tamen intermittētib, leuiore: veluti in ter-
 tiana cōtinua leuiore, in causione vero mul-
 to graviores. Cui si tanta accedat pernicies, ut
 interiores partes, ipsaque viscera vri videātur,
 simulq; extrema frigeant, peculiari nomine,
 lypyria febris euadet, ardentium omnium de-
 terrima. Declarata iam putridæ continuæ na-
 tura, sequitur ut inquiramus eius differentias, *Lypyria*
 illas eliciētes ex putridæ cōtinuæ natura. Por-
 ro cum putrida in humoribus sedem teneat,
 sequitur etiam, quod tot erunt putridæ con-
 tinuæ species, quot erunt humorum differen-

Sf

*Putridarum
continuarum
quinque sunt
differentia.*

*Continuarum
& intermitten-
tium dif-
ferentia.*

tia. Cumque humores quatuor sint, sanguis, bilis, pituita, melancholia, horumque vnusquisque dupliciter putrescere possit, vel vnusquisque per se & solitarie aliis illaesis, vel simul omnes: lequitur quod etiam putridarum continuarum differentia quinque erunt, nec plures, nec pauciores: alia quidem, in qua sanguis ex quatuor humorum æquabili permixtione temperatus putrescat, incendioque prædatur, synochus putrida dicitur: alia vero ex vincen- tis humoris natura speciem sortientur, ex putredine sanguinis sanguinea, ex putredine bilis biliosa, cuius si magnum sit incēdium, ca- lus euadet, ex putredine pituitæ pituitosa, ex putredine melancholiæ melancholica. A qui- bus eisdemet humoribus intermittētes quo- que originem trahunt, nec quo ad causas a cō- tinuis differunt, sed per motum duntaxat, & situm: motu quidē, quod in interpolatis ma- teria moueatur a venis ad extra venas: in con- tinuis vero eademet materia in venis maneat. ¹³ situ vero, & loco, quod locus interpolatarum sit extra venas, locus vero continuarum intra venas exsistat, vt non absque ratione Galenus quandoque dixerit, quod si tertiana esset con- tinua, euaderet calus, & si calus fieret inter- polatus, euaderet tertiana. quod de aliis quoq; quartana, & quotidiana dici potest. Inuentis putridæ continuæ differentiis, sequitur vt cu- iusque naturam percurramus, incipientes ab ea, qua quatuor humores æquabili permix-
tione

tione constitutos putredine, incendioq; prehēdit, synochus putrida appellatur, quæ est intemperies calida existens in humoribus cordis, facta a putredine omnium humorū intra venas existentium, vt fiat actionum læsio, vel interitus. Porro quod ait definitio, synochum putridam esse intemperiem calidam existentē in humoribus cordis, eo pertinet, vt notet vniuersale genus omnium specierū putridarum febrium. At quod additur, fieri a putredine omnium humorum, eo spectat, vt per hanc differentiam contrahatur genus illud ad hanc solā speciem; nempe quod ceteræ omnes putridarum species non fiant ab omnium putredine, sed a putredine aliquorum duntaxat. Illud tamen non est ignorandum, per omnium humorum putredinem, non esse intelligendā massā sanguineam, sed ichores omnium humorum. At quod additur, huiusmodi putredinem omnium humorū intra venas existere: eo pertinet, vt separetur ab iis putridarū speciebus, quæ intermittentes sunt, quæ quidem non intra, sed extra putredinē suā sortiuntur. Læsiones vero actionum eadē fere huiusmodi febrem insequuntur, quas synochū simplicem sequi diximus, sed insigniores, pulsusque nō modo magnus, vehemens, celer, ac frequēs, sed inæqualis, & inordinatus: Quoad exētia, vrina crassa erit, rubra, turbida, sedimentoq; nullo. Quoad qualitatem immutatā calor in hac acrius, quā in synocho simplici cōtactū feriet:

Quid synochus putrida.

Synochus putrida differt ab aliis putridis.

Humorum omnium putredo in synocho putrida.

Actionum læsio.

Excrementa & qualitas mutata.

Causa.

& hoc, quod ab iisdemmet causis originem trahat, a quibus synochus simplex, sed multo validioribus: quæ non modo inflammationē, sed & putredinem accerere possint, hancque omnium efficacissimam esse, non solum cutis simplicem constipationem, sed impactis multis crassis, viscosisque humoribus obstructionem veram, quæ non solum cutim, sed & re-
nues iecoris, habitusq; corporis venas infarciat. Postquam declarauimus naturam putridæ febris continuæ. Sequuntur illæ, quæ sunt

*1.
Quid putrida continua sanguinea.*

putridæ continuæ, ex putredine vnius duntaxat humoris, incipientes a sanguinea, quæ est intemperies calida existēs in humoribus cordis, facta a putredine sanguinis intra venas existentis, vt fiat actionum læsio, vel interitus. Porro intemperies calida existens in humoribus cordis est genus vniuersale omnium februm putridarum. Ob id, vt seiungeretur a cæteris putridis cōtinuis, additum fuit in definitione, huiusmodi intemperiem calidā humorum cordis factam esse a putredine sanguinis. Quod vero additum fuit intra venas existētes, eo pertinet, vt distinguatur a febre sanguinea interpolata, tametsi maximum dubiū sit, vtrum sanguis ab aliis humoribus contra distinctus putrescere possit in venis. Læsiones vero actionum, quæ insequi solent huiusmodi febrem, eadem ferme sunt, quæ insequi solent biliosam, ac melancholicam febrem. Sequitur secunda, quæ fit ex putredine flauæ bilis intra

A febre sanguinea interpolata differensia.

Actionum læsio.

lis intra

lis intra venas, continua tertiana dicitur: quæ
 3 sane erit intemperies calida existēs in humo-
 ribus cordis, facta a putredine flauæ bilis intra
 venas; aliquantulum tamē a corde disiunctas,
 nunquam intermittens; remittens vero alter-
 nis diebus, vt fiat actionum lassio, vel interitus.
 Quæ sane ratione qua sedem tenet in humo-
 ribus cordis, seiungitur ab ephemeris, & he-
 cticis, & reponitur sub genere putridarum: ra-
 tione vero, qua putredo intra venas existit,
 seiungitur ab interpolatis putridis: ratione ve-
 ro, qua humor putrescens est flaua bilis, seiun-
 gitur a cæteris continuis putridis: ratione ve-
 ro, qua huiusmodi humor putrescēs intra ve-
 nas reperitur aliquantulū a corde disiunctus,
 seiungitur ab illis putridis continuis, quæ cor
 assidue pari vehementia exercent, atq; ab ini-
 tio ad finem nullo statō excandescentiæ ordi-
 ne perseuerant; cuiusmodi sunt synochus pu-
 trida, & quæ causus dicitur: quod etiam per a-
 liam particulam expressum fuit, quæ ait, nun-
 quam huiusmodi febrem intermittere, sed
 duntaxat remittere. Quoniam vero erant aliæ
 quoque putridæ continuæ remittentes, nun-
 quam tamen intermittentes, ob id, vt separe-
 tur huiusmodi febris tertiana continua ab om-
 nibus aliis exacerbantibus: additum fuit,
 huiusmodi febrem continuam remissionē suā
 alternis diebus efficere: quod non facit aliqua
 aliarum putridarum continuarum remitten-
 tium: sed earum aliæ quotidie, aliæ vero quar-

II.

*Quid ter-
 tiana con-
 tinua.*

*Tertiana
 continua ab
 ephemeris,
 hecticis, in-
 terpolatis
 putridis &
 cæteris con-
 tinuis putri-
 dis discretio.*

*Actionum
lesio.
Excremen-
ta mutata.*

to quoque die remittūt. Læsiones vero actio-
nū efficere solet, nullo frigore, aut rigore mo-
tionem deprauans : & quo ad excrementum
immutatum, nullo insequente sudore mite-
scit, sed alternis diebus manifestam habet re-
missionem, ac manifestū exacerbationis mo-
tum.

III.
*Quid conti-
nua quoti-
diana.*

Sequitur tertia species continuarum ex
putredine vnius humoris, qui pituita appella-
tur, continua quotidiana dicitur; quæ sane erit
intemperies calida existens in humorib. cor-
dis, facta a putredine humoris pituitosi intra
venas existentis, nunquam intermittēs, quo-
tidie tamen remittens, vt fiat actionum læsio,

*Continua
quotidiana
ab aliis dif-
ferentia.*

vel interitus : ratione putredinis intra venas
differens ab interpolatis: ratione humoris pi-
tuitosi putredinis intra venas differens ab in-
terpolatis; ratione humoris pituitosi putrescē-
tis differens ab aliis speciebus putridarum cō-
tinuarum. Ad quod etiā pertinet id quod ait,
hanc febrem nūquam interrompere, quotidie
tamen remittere: cum nulla aliarum quotidie
remittat, sed vel alternis diebus, vel quarto

*Actionum
lesio.*

quoq; die. Actiones autem lædit pulsus non
eadem celeritate, frequentia, aut inæqualitate
feriendo atq; in cæteris, exacuiturq; nullo fri-
gore, aut horrore motionem deprauans, mi-
tescitq; quotidie nullo sudore. Sequitur quar-

IIII.
*Quid conti-
nua quar-
tana.*

ta species continuarum putridarum ex melā-
cholia ortū trahens; quartana appellatur: quæ
sane & ipsa erit intemperies calida existens in
humoribus cordis, facta a putredine humoris
melan-

melancholici intra venas existentis, nunquā *Continua
quartana
ab aliis dif-
ferentia.*
intermittens, remittēs vero quarto quoq; die,
vt fiat actionū læsio, vel interitus: ratione pu-
tredinis intra venas differens ab omnibus pu-
tridis interpolatis: ratione vero qua humor pu-
trescens ad intra contingit esse humor melā-
cholicus, differens a cæteris putridis cōtinuis:
ad quod etiam pertinet id quod dictum fuit,
huiusmodi febrem nunquā intermittere; re-
mittere vero quarto quoq; die, cū nulla aliarū
quarto die remittat. Actiones autem lædit, ex- *Actionum
læsio.*
acuiturq; nullo frigore, aut horrore motionē
deprauans, mitescitque nullo sudore quarto
quoque die. Hactenus declaratis, & decursis
omnibus speciebus primi generis putridæ fe-
bris, quod continuum appellatur: sequitur vt
aggrediamur secundum genus putridarum, q̄
interpolatū dicitur, in vniuersum prius illud
declarantes. Porro putrida febris interpolata

34 est intemperies calida existens in humoribus
cordis, impressa a putredinali caliditate hu-
morum extra venas existētium, vt fiat actio-
num læsio, vel interitus. Quæ diffinitio sane
secundum omnes particulas eodem modo est
intelligenda, quomodo superius fuit declara-
ta. Et ratione qua dictum fuit, causam extra ve-
nas existere, seiungitur a genere putridarum
continuarū. Actiones autē cordis hoc modo *Actionum
læsio.*
lædit, pulsū reddendo inæqualē, sed ultra vi-
ginti quatuor horas sensim desinit, motionēq;
deprauat prægresso aut frigore, aut horrore,

Si 4

*Quid febris
interpolata
putrida.*

*Februm
putridarum
interpola-
tarum qua-
tuor differ-
entia.*

*Interpolata
sanguinea.*

*Quid ter-
tiana inter-
polata.*

*Causa exsi-
perantia
bilis.*

aut rigore: non autem calore repente hominē
adoritur, atque in eius desinentia, sudore ma-
nifesto, qui tamen in continuis latens erat, ap-
parere solet. Declarata natura putridæ febris
interpolatæ in suo genere, sequitur ut percur-
ramus eius differentias: quæ quidem sicuti et-
iam continuæ ex numero humorum, in qui-
bus sedem tenet, trahi debent. Atqui cum hu-
mores quatuor sint, sanguis, bilis, pituita, me-
lancholia: sequitur etiam quod quatuor erunt
interpolatarum febrium putridarum differē-
tiæ (nam quintam speciem interpolatū genus
habere non potuit, quam tamen continuarū
genus habuit) & hoc, quod impossibile sit san-
guinem extra venas exsistere qui bene tempe-
ratus sit, quique ex æquabili quatuor humorū
permixtione constitutus, putredine, incēdio-
queprehendatur, sicuti fieri diximus synochū
putridam. Sequitur modo ut singularum na-
turam declaremus, prætermittā interpolata,
quæ sit a sanguine, utpote quæ diuersos perio-
dos a tertiana, & quartana non faciat. Igitur
tertiana interpolata erit intēperies calida ex-
sistēs in humoribus cordis, facta a putredinali
caliditate humoris biliosi extra venas exsistē-
tis, ut fiat actionum læsio, vel interitus: quæ sa-
ne ratione putredinis humoris biliosi seiun-
gitur a reliquis speciebus febrium interpola-
tarum. Causæ autē superuacanei humoris bi-
liosi petendæ erunt a temperamento natura
calido, & sicco, habitu gracili, ætate florente,
laboribus,

laboribus, vigiliis, mœroribus, curis, ardoribus, victu parco, calido, & sicco, ac iecore im-
 pense calido: a quibus omnibus sequi solet fla-
 uæ bilis exsuperantia, maxime quidem æstate,
 calidis, siccisque regionibus, atque æstuoso
 cœlo: quorum aliquo deficiente exquisita ter-
 tiana esse non potest. Actiones autem cordis
 hoc modo lædit, pulsus sane efficiens inæqua-
 lem, quod hoc proprium sit putridi generis
 febrium; minimum tamen erunt inæquales
 ob tenuitatem ipsius materiæ, maximum, &
 velocissimum, ob maximam necessitatem e-
 uentandi humoris maxime calidi: motionem
 deprauat prægresso rigore, ac cōcussione: sen-
 sationē vero prægresso frigore, ac capitis do-
 lore: appétitionem immutat ad frigidum, &
 humidum: & vigilias inducere solet. Qualita-
 tem autem corporis mordacissimam facit, ci-
 to tamen ob eius tenuitatem pertranseuntē;
 ita vt paroxysmus tertianæ longitudinem duo-
 decim horarum non pertranseat: & quo ad ex-
 crementa, sudore in fine desinere, vomitumq;
 bilis inducere solet. Ad eūdem modum quo-
 tidiana interpolata erit intemperies calida ex-
 sistens in humoribus cordis facta a putredina-
 li caliditate humoris pituitosi extra venas ex-
 stentis, vt fiat actionum læsio, vel interitus,
 ratione putridi humoris pituitosi differens a
 cæteris putridarum interpolatarum febrium
 differentiis. Superfluitatis autem huiusce hu-
 moris pituitosi causæ erunt temperamen-

*Tertiana
exquisita.*

*Actionum
læssio.*

*Corporis
qualitas
mutata.
Excremen-
ta mutata.*

*Quid inter-
polata quo-
tidiana.*

*Causa su-
perfluitatis
pituita.*

St 5

*Actionum
læſio.*

*Qualitas &
excrementa
mutata.*

*Quid inter-
polata quar-
tana.*

*Cauſa ſu-
perfluitatis
melanchol-
iæ.*

tum natura frigidum, & humidum, habitus obelus, ætas ſenilis, otium, ſomnus longior, victus frigidior, & humidior, aſſidua crapula, tempus hyemale, regio frigida, & pluuiolum B
cælu. Actiones vero cordis hoc modo lædet, pulſum efficiendo minimū: & hoc, quod propter humoris frigiditatem pauca adſit neceſſitas euentandi: ſenſitiuam & ipſa deprauans frigore, ſed multo longiori ratione humoris frigidi, & humidi calori rebellis, ſenſusq; facit obtuſos, reddens homines obliuiolum, ad motum tardos, & ſomnum procliuſes: & quo ad excrementa ſudore in ſtatu apparet: qualitateque corporis facit non acrem, ſed hebetē tangētī, quæ agre augeſcit, & magna inæqualitate, qua modo calor, modo frigus percipitur: totaq; acceſſio erit horarum octodecim, intermiſſio ſex. Ad eundem modum quartana interpolata erit intemperies calida exiſtens in humoribus cordis, facta a putredinali caliditate humoris melancholici extra venas exiſtentis, vt fiat actionum læſio, vel interitus: ratione putridi humoris melancholici differente a cæteris ſpeciebus interpolatarum; cuius cauſæ erunt, temperamentum natura frigidū, & ſiccū, habitus corporis gracilis, & glabrus, ætas conſtans, vel iam inclinans, curis præſertim, & mœroribus confecta, viuendi ratio in cibo craſſior, terrena, ac omnino ſœculenta, vinum craſſum, atque potens, regio frigida, & ſicca, tempus anni autumnale, cœlique conſtitutio:

stitutio inæqualis, ac turbulenta. Actiones au- *Actionum*
tem hoc modo lædet, pulsum efficiens paruum, *lesio.*

tametsi non ita paruum sicuti quotidiana: &
hoc, quod non ita impediatur instrumentum
a vaporibus frigidis, & siccis, sicuti a crassis, &
viscosis, inæqualem sane magis quidem quam
in tertiana, minus vero quam in quotidiana.

sensitiuam deprauat prægresso frigore, sed
maximo, & longo, quod humor sit maxime
frigidus. Quo ad exeuntia, aliquando desinens
cum sudore, aliquando sine sudore. Quo ad

qualitatem corporis, calorem in corpore in- *Qualitas*
ducit medium tertianæ, & quotidianæ, qua- *corporis &*
dam frigoris permixtione, cuius excessio qua- *excrementa*
tuordecim horas non excedit. Haftenus di- *mutata.*

ctum sit de simplicibus, & exquisitis febribus
putridis ex vnius duntaxat humoris simplicis
putrefactione proficiscentibus, in cuius hu-
moris generatione omnes causæ, nempe na-
tura, ætas, victus ratio, regio, anni tempus, cœ-
li status, & alia omnia concurrunt. Sequitur vt

percurramus febres compositas proficiscen- *De febribus*
tes ex causis simul complicatis, & compositis, *compositis.*

a quibus etiam solent procedere, atq; effluere
læsiones in actionibus qualitate, atque excre-
mentis compositæ, si prius illud prænotatum
fuerit: febrium compositionem dupliciter in-

telligi posse: primo modo, si fiant ex diuersis *Febrium*
humoribus, eodem tamē loco permixtis, atq; *compositio*
confusis: ratione cuius simul etiam incipi- *dupliciter*
unt, simulque desinunt: earumque læsiones, *accipitur.*

& notæ simul sunt confusæ, nomenque sorti-
untur ab eo humore, qui prædominatur in
confusione, vt quæ plus bilis quam cæterorū
humorum possidebit: tertiana, sed notha ap-
pellabitur: quotidiana nota, quæ plus pituitæ,
quartana notha, quæ plus melancholiæ. Secū-
do modo cū fiunt ex diuersis humoribus, sed
non eodem loco positīs, quorum sit sua cuius-
que sedes, sua essentia, suusque motus, quarū
læsiones, & notas tanquam seorsum essent, ac
solitaria, non sit difficile internoscere. Hæ igi-
tur febres cōpositæ cum dupliciter fieri pos-
sint: quas primo modo compositas esse dixi-
mus, confusas appellabimus: quas vero secun-
do modo, implicitas quarum sane differentiæ
& numerus facile elicietur ex varia complica-
tione diuersorum humorum putrescentium
simul confusorum. Quoniam vero sæpius oc-
currere solet confusio illa humorum, in qua
tamen plus bilis adsit, quam cæterorū humo-
rum, quæ tertiana notha, sed illegitima appel-
latur: quapropter huius duntaxat naturam, tā-
quam futurum exemplum aliarum confusio-
num, percurremus. Tertiana notha erit intē-
peries calida existens in humoribus cordis,
facta a putredinali caliditate bilis cum pituita
commixtæ extra venas existentium: vt fiat a-
ctionū læsiō vel interitus: ratione putredinis
bilis cū pituita seiungitur ab omni specie in-
terpolatarum simplicium, quarum nulla sit
ex putredine plurium vno simplici humore.

Quorum

*Febres con-
fusa.
Febres im-
plicita.*

*Quid ter-
tiana notha*

Quorum duorum humorum causę euidentes
 eadem erunt, quę simplices gignere solent,
 sed simul vnitę, noxasque actionum tales in-
 uehent, quę sapient lęsiones vtriusq; simpli-
 cium, tum febris tertianę, tum quotidianę.
 Sequitur vt percurramus febres secūdo mo-
 do compositas, quę proprię implicitę appel-
 lari solent. Porro cum materia implicitarum *Implicitarū*
 febriū sint simplicia prima duo genera, quo- *febrium*
 rum alterum continuum, alterum interpola- *materia.*
 tū dicitur: sequitur quod quotupliciter simul
 poterunt commisceri, ac implicari hęc duo
 genera, etiam tot consurgent genera februm
 implicitarū. Atqui simul implicari potest vel *Implicitarū*
 continua cum continua, vel intermittens cū *differentia.*
 intermittente. Cumque implicatio continuę
 cum continua potius confusio quam implica-
 tio euadat, & hoc, quod in duabus continuis
 humores putrescant in venis maioribus, in iis-
 que agitati permiscantur, ratione cuius simul
 confunduntur: sequitur igitur quod implica-
 tio proprię fiet vel intermittētis cum inter-
 mittente, vel continuę cum intermittente.
 Quarum implicationum differentię, & nu-
 merus hinc facile apparebit, incipiendo a dif-
 ferentiis & speciebus implicationis intermit-
 tentis cum intermittente. Porro cum materia *Differentia*
 implicitarum intermittētū sint tres species *implicatio-*
 simplices intermittētium: nimirum tertiana, *nis inter-*
 quotidiana, quartana: cumque vnicuique cō- *mittentis*
 plicari possit altera cum altera vel ex eiūdem *cum inter-*
 mittente. *mittente.*

*Differentia
implicatio-
nis cōtinua-
rum cum
intermis-
sionibus.*

*Quid ha-
emistritæus.*

*Hemistritæi
ab aliis dif-
ferentia.*

generis, vel ex diuersi generis implexu: eiusdē quidē, veluti simplex tertiana, quæ etiā frequē-
tius cōtingit, duplex quotidiana, duplex quar-
tana: ex diuersi vero generis implexu intermit-
tentiū, veluti tertiana, quotidiana, tertiana, quar-
tana, & huiusmodi. Quæ sane implicatio inter-
mittentium, diuersi generis intermittentium
perquam rara est. Ad eundem modum ex va-
ria complicatione continuarum cum inter-
mittentibus, variæ etiam ac multiplices diffe-
rentiæ oriri possunt: Quæ sane cum ex mutua
simpliciū inter se complicatione colligi pos-
sint, ab earum enumeratione supersedebo,
putans satis fore si eas implicationes, quæ fre-
quentius euenire solent, tãquam aliarum im-
plicationum exempla proponam: veluti solet
esse implicatio illa, ex diuersis generibus, ni-
mirum altera continua, altera intermittente:
quæ quidem cōtinua quotidiana sit, & tertia-
na sit interpolata, hemistritæi nomē sortietur.
Igitur hemistritæus erit intemperies calida ex-
sistēs in humoribus cordis facta a putredinali
caliditate duorum humorum, bilis scilicet ac
pituitæ: alterius quidē, bilis sane, extra venas:
alterius vero, vt pituitæ, intra venas existētis,
vt faciat actionum læsionem vel interitum. ra-
tione putredinis duorum humorū differēs ab
omnibus febrib. putridis, quæ simplices sunt:
ratione vero, qua duo isti humores bilis scili-
cet & pituita, differens a cæteris febribus cō-
plicitis, in quibus putredo inuasit duos diuer-
sos

sos humores, veluti bilem, & melancholiam:
 B ratione vero, qua alter horum humorum, bi-
 lis scilicet extra venas, pituita vero ad intra
 putrescit, differēs ab implicitis ex duabus cō-
 tinuis, & duabus intermittentibus, & reponi-
 tur in numero earum implicitarum, quæ sunt
 diuersi generis, vt alterius continuæ, alterius
 intermittētis: nec adhuc omnium istarum,
 sed eius speciei implicationis duntaxat, quæ
 ortum trahit ex tertia intermittēte, & quo-
 tidiana continua, quæ nomen hemitritæi
 proprium fuit adepta. Cuius febris læsiones *Hemitritæi*
 ex nocuentis febrium simplicium, ex qui- *læsiones.*
 bus ortum trahunt, facile desumi possunt,
 præsertim cum vnaquæque illarum seorsum
 consistat, propriamque essentiam habeat. Sed
 hæc de secundo febrium genere, quod putri-
 dum appellatur. Sequitur tertium genus fe- *Quid hec*
 brium, quod hæcticum dicitur. Porro hæctica *ctica.*
 erit intemperies calida substantiæ cordis, fa-
 cta ab iis quæ cordis substantiam in calfacto
 esse reponere possunt, vt fiat actionum læsio,
 vel interitus. Quæ quidem differt ab alis duo- *Hæctici a*
 bus generibus febriū, ratione qua huiusmodi *reliquis*
 febrium genus solidam substantiam partium *differentia*
 similiarium cordis occupauit: ephemera vero
 spirituosa, putrida vero humoralem. Cuius
 quidem causæ erunt eademmet, quæ ephe-
 rarum, modo aliquantulum sint vehementio-
 res. Quæ vbi vehementius perseverabunt, nō *Tabes en*
 solum hæctica, sed tabes etiam, quæ est termi- *hæctica.*

*Hæctica pu-
trida.*

*Hæctica pe-
stilens.
Actionum
lasio in hæ-
ctica.*

Cautela.

nus arefactionis, inducent. Notandum autem est, quod si causæ tales erunt, vt nō solum qualitatem, sed etiam materiam, veluti putridos vapores admisceant in substantia cordis, tunc non amplius hæctica simplex, sed hæctica putrida euadet. Qui vapores putridi vbi non tantum admixtione substantiæ cordis contenti erunt, sed prætergressi substantiam cordis putrefaciant, tunc hæctica pestilens euadet. Hæctica vero febris actiones hoc modo lædit, pulsum efficiens imbecillimum, ita vt tacta arteria statim cedat: durum, quod cor siccum fiat: vacuum, quod exhausti sint spiritus, qualitatemque corporis immutatam ad calidum, semper æqualem conseruat, quod huiusce generis febrium proprium duntaxat existit. Nā tametsi semper acutior fiat, non tamen habet paroxysmorum excrecentias, quas, quodcunque aliud febrium genus habere solet, seu sit continua, seu intermittens, in quibus necessario in aliquo tempore calor exacerbatur. Sed hæc de tribus febrium generibus, & speciebus generis cuiusque. Notandum autem, præter hæc dari quoddam febrium non dicam genus (nam quomodo plura tribus generibus esse possunt, si plura tribus in quib. fundatur, subiecta non reperiuntur?) sed modum quendam, qui malitia, seu pestilentia appellari solet: vt hac ratione tum putrida, tum hæctica, vbi ad tantam pernitiem peruenit, putrida pestilens, atque hæctica pestilens appellari solet. Nam putrida

trida febris, quæ rationem putridæ tenet, donec vapores putridi sunt permixti cū humoribus cordis, si ad tantam vim & malignitatem procedat, vt putrefaciat humores cordis, putrida maligna, seu pestilens appellatur. Atque hectica, si præter caliditatem quam induxit in substantia cordis, substantiam cordis etiam incipiat putrefacere, non amplius hectica simplex, sed hectica pestilens appellabitur. Cuius quidē malignitatis causa erit vehementia causarum, & maior putrefactio humorum putridorum. Actiones vero hoc modo lædit, nempe efficiendo pulsum paruum, languidum: tandemque actiones omnes prosternere solet. Et hoc, quod cor tam alte labefactet, quod est principium & fons reliquorum omnium membrorum. Quo ad qualitatem corporis, nō sentiunt magnam caliditatem. Quæ tamen noxæ in putrida pestilenti leuiore, in hectica vero pestilenti grauiore erunt. In hoc tamen conueniunt, quod raro solent pertransire quartā, & vbi quartam pertransire contingit, aliquid boni prognosticari, & sperare possumus. Sed hæc de cognitione essentiae, causarum, specierum, atque accidentium ipsarum febrium. Sequitur vt percurramus tempus, & quantitatem, seu magnitudinem, & paruitatem ipsarum febrium, incipientes a tempore: cum tempus, quo salubriter nutriri debet ager, a temporibus ipsarum febrium sit sumendus. Cum igitur vnaquæque febrium species deprehensa fuerit

Putrida pestilens.

Hectica pestilens.

Actionum lesio.

T t

non manere a tui principio vsque ad finem secundum eandem dispositionem, seu consideremus febris essentiam, seu causam febris efficientem: hoc est ipsum humorem, seu eius accidentia, propter igitur hanc variam dispositionem, quæ fere quadruplex apparebat, assignarunt medici febribus ipsis quatuor tempora: primum quidem tempus principium appellant, in quo febris essentia, calor sane, debilis est: & causa seu materia febrim faciens per urinam nullo pacto a calore naturali, vel præter naturam mota deprehenditur, dum scilicet nullum in urina coctionis apparet vestigium, vel coctioni contrarium apparet. Vbi autem incretueret essentia febris, caliditas scilicet febrilis: & causa ipsius, seu materia inciperet ostendere aliquod coctionis vestigium, & accidentia ipsius inualescerent, tunc huiusmodi dispositionem augmentum appellarunt. Vbi autem febris essentia, caliditas sane, consisteret, & eadem appareret atque eius causa, humor scilicet aut coctus, aut pessime se habere appareret, & accidentia ipsius in eodem esse etiam permanerent, statum tunc febrium esse dixerunt. Vbi vero omnia, tum febris essentia, caliditas sane decretueret, materiaque consumeretur, vel insensibiliter vel extra corpus detruderetur per aliquam euacuationem sensibilem, accidentiaque penitus euanescerent, declinationem febris esse dixerunt. Quæ sane quatuor dispositiones seu tempora in salubribus quibusque

*Tempora
febrium.*

1.

Principium.

2.

Augmentum.

3.

Status.

4.

Declinatio.

busq; febribus, seu longæ sint, aut breues, etiam si vnus tantum accessionis sint febres ipse semper reperiuntur (quâquam in mortalibus declinatio non ad sit, vtpote quod in statu frequentius hominem mori contingat) quæ tempora in febribus sunt maximi momenti: & hoc, quod ex ipsorum varietate necesse sit etiâ auxilia ipsa variare. Patet igitur, principium febris totum illud tempus esse, quandiu humor, in quo febris est, crudus existit. Vbi coqui incipit, augmentum; vbi maxime cōcoquitur, vigor seu tempus morbi totius vehementissimum, vbi symptomata minuuntur & humoris declinatio: vt hac ratione cōctio humorum obscura, principium: manifesta, augmentum, perfecta statum determinet. Ex his autem temporibus statum præcipue præcognoscere oportet, & hoc, quod ad ipsum inspicientes omnem victum instituamus. Quoniam vero pro recta febrium curatione ad victus rationem instituendam, non solum totius morbi duratio ex totius morbi temporibus vniuersalibus constituta, quæ morbi constitutio appellatur, est attendenda; sed & febrium accessiones sunt obseruandæ, in quibus cauemus agrum nutrire: quapropter sequitur vt etiam accessiones febrium percurramus: (per accessionem autem intelligo partem periodi, & circuitus febrilis priorem, & peiorem: intermissionem vero posteriorem & mitiorem) cui quidem accessioni etiâ quatuor

*Tempora
febrium
variant
auxilia.*

*Constitutio
morbi.*

*Accessionis
febrium
quatuor
tempora.*

Intermissio.

*Accessionis
tertiana
principium.*

Augmentū.

Status.

*Declinatio
Intermissio.*

*Accessionis
continuarū
tempora.*

tempora fuerunt assignata; principium sane, augmentum, vigor, declinatio. quod vt clarius B appareat, exemplis illustrabimus, tum in febribus intermittentibus, tum cōtinuis. Principium sane accessionis tertianæ erit dū quis inhorruit: duratque hoc tempus cum summa illa caloris & frigoris inæqualitate, donec æqualiter totum corpus caleat, pulsu duriori, & minori, idque horis tribus, pluribus, paucioribus. Calore mox insigni augescente, & in partes etiam exteriores extenso, & pulsu ob eum maiore, velociore, frequentiore, fit, augmentum. Perseuerante æquali caloris magnitudine, & perseuerantibus dictis pulsum differentiis, quātum sensu iudicare possumus, fit status seu vigor, & summa accessionis magnitudo. Decrescente vero paulatim calore fit declinatio, quam finiunt halitus quidem percutim, ac sepe sudores. Post declinationē succedit integritas, seu quies, seu intermissio, seu interuallum, seu infeblicitatio, in qua cessat calor, & pulsus ex magno, veloci, crebro, ad habitum naturalem redit. Atq; hæc sane sunt quatuor tempora intermittentium febrium accessionis, seu particularia, calore, & pulsibus maxime distinguenda. Continuarū vero quotidiana, & tertiana finitimarum (nam rara est admodum continua quartanæ affinis) tempora, quanquam sunt in accessionis portione intermittentes imitantes, eadem tamē sunt obscuriora, vt sepe principium in augmentum coeat;

coeat : status tamen iis semper adest, sed pro integritate habent solum inclinationem quādam, & caloris febrilis, atque eius symptomatum remissionem. Quæque in vna accessione, aut cōtinuarum reduplicatione per simplices periodos temporis notauimus : in reliquis accessionebus, & in reduplicationibus facile erit obseruare, nunc breviora, nunc longiora, pro varietate ipsarum causarum. Sed hætenus de natura ipsarum febrium, & temporibus. Earū curationem percurramus (nam de earum magnitudine & paruitate, de natura corporum affectorum, remediorum, & ipsarum circumstantiarum in curatione ipsarum sermo fiet.)

De curatione febrium.

Porro cum curatio recte & conuenienter dicatur fieri, vt initio huius operis notatum fuit, quoties quatuor rerū præcipue habebimus rationem: nimirum affectus, corporis affecti, remedii, & circumstantiarum: sequitur quod etiā in curatione febrium horū omnium erit habenda ratio. Illud autem prænotandum est: ex tribus horum, affectu scilicet, corpore affecto & circumstantiis. affectum, & quæ circa affectū considerantur, omnia indicare suū ipsius ablationem per contraria: corpus autem affectum in morbis indicare suū conseruationem per similia: quod vt ait Gal. in therap. temperamentum vitiatum in morbis nō liceat mutare: circumstantiæ vero, veluti aer quodammodo mediis inter hæc duo, quandoque suū postulant conseruationem, quandoque vero per con-

In curatione quatuor potissimum spectanda sunt.

Affectus.

Corpus affectum.

Circumstantia.

Et remedia.

Indicationes in febribus.

*Indicationes sumta a sympto-
mate.*

I.

Indicatio a morbo sumta.

Febris ephemera & hœctica ablatio.

traria immutationem : conseruationem sane sui ipsius, cum aer temperiem habebit morbo cōtrariam, alterationem vero, & immutationem per contraria, cum habebit temperaturam morbo similem. Incipientes igitur exercere artem curandi propositam, incipiamus ab affectu. Diximus affectum esse diuidendum in morbū, causam morbi, & symptoma morbi. Ergo & in hoc affectu, qui febris appellatur sumenda erit indicatio a febre, quæ est morbus, a causa febris, & a symptomate febris, quanquam a symptomate non quatenus symptoma sumenda sit indicatio, sed quatenus aut habet rationem causa morbum augmentis, aut vires debilitantis. Incipiētes igitur a febre, FEBRIS primum in quantum morbus est, indi- 13
cationem etiam exhibebit generalem, videlicet eius ablationem per contraria. Quatenus vero talis morbus seu febris, exhibebit indicationem magis limitatam, non quidem ablationem absolute, sed determinatam ablationem per determinata contraria : nempe per remedia refrigerantia: Quapropter vbi febris erit simplex, absque causa, ita quod causa iam desierit, veluti est ephemera, & hœctica, frigidis solum & humidis erit auferenda, per sumenda, admouenda, educenda, facienda, quæ calorem redundantem æquabili excessu refrigerando abigāt. Quoniam vero diximus aliud remedii & alimenti genus esse exhibendum affectibus solitariis, vt in febre absque causa, videlicet

videlicet causa iam desita, vt diaria, & hectica: *In febribus
cum causa,
causa prius
tollenda est.*
aliud in affectibus implicitis, vt febre associata
cū causa, ita vt adhuc sit in generatione, quod
causa eam accendens prior erit summouēda,
quemadmodum diximus in arte curandi: aut
si pars febris iam genita erit, pars adhuc erit in
generatione, vtrique simul erit consulendū,
prius accendentem causam amouendo, dein
accensam febrim extinguendo. Nec hoc suf-
ficit in affectionibus simul associatis, & impli-
citis, nisi etiam perpēdamus, an in huiusmodi
cōplicationibus morbus, id est, febris, & eius
causa sint cōtraria, an vero similia: & hoc quo-
niam tamen morbus, & causa morbi hoc ha-
beant commune, quod per contraria sunt ab-
igenda, non tamen semper eodem remedio
contrario & morbo & causæ erunt tollenda:
veluti contingit in febre cum causâ contraria:
Nam quod morbo erit contrarium, causâ erit
simile, & ipsam fouebit, atque contra. Sed tūc
potentioris indicationis erit habenda maior
ratio, altera non neglecta. Vbi autem febris,
& causa simul implicita non erunt contraria,
sed inter se similia, cum vtriusque indicatio tū
causæ, tum febris simul consentiant, idem etiā
vtrique contrarium conueniens erit, & tunc
omnibus modis erit refrigerandum, & hume-
ctādū. Exemplis hoc fiet manifestius. Febris. n.
si sit pituitosa, cuius causa est pituita, aut febris
ab humore melācholico, prior vtiq; cā postu-
lat calida, & sicca; secunda calida, & humida. at

*Indicatio-
nes a causa.*

*Morbo &
causa non
eadem con-
traria com-
petunt.*

*In febribus
quando hu-
metandum
& refrige-
randum.*

*Febris pitui-
tosa.*

*Febris me-
lancholica.*

Febris biliosa.

*Symptoma-
tum in fe-
bribus con-
sideratio.*

Dolor.

Sitis.

calida, & sicca febrim augment: victus enim frigidus, & humidus febricitantibus omnibus confert: victus postea talis causam febris exacerbat. Quare in hac complicatione morbi cum causa, inter se contrariis, & consequenter indicationum pugna, maioris erit habenda ratio, cause scilicet, aut morbi, a quo maius predebet vitæ periculum. Vbi autem & febris, & cause erunt similes, veluti est febris biliosa, victus frigidus, & humidus, tum causam, bilem sane, humorem calidum, & siccum, tum febrim morbum calidum siccum oppugnabit, tumq; audacter omnibus modis erit refrigerandum, & humectandum. Hæc de morbo simul cum causa: sequitur vt consideremus etiam febrim, & causam febris, cum symptomatibus quæ febrim insequi solent. Porro ad hunc morbum, qui febris dicitur, quæ est intemperies calida, & sicca cordis, quanquam etiã ad eius causam multa accidentia insequi soleat, vt plurimum tamen concomitari solent capitis dolor, sitis, & vigilia: quæ symptomata sane similia sunt cū ipso morbo. Dolor enim a multis vaporibus acerbis ab vniuerso corpore elatis causari solet, quapropter repulsione erit vtendum, quæ cū fiat rebus frigidis, febrim etiã extinguunt. Sitis etiam similibus remediis febrim etiam obtudentibus tolli solet; veluti oris madefactione ex aqua hordeacea cū mucilaginis Baidoniorum, vel psyllii, aut lactucarum, aut seminum communium frigidorum maiorum, aut

aut iulep violato cum aqua hordei: quæ omnia
 & linguæ ariditati, & nigrori conferre solent.
 Vigiliæ itidem mulſione papaueris cum iure
 lactucarum, a cana lotione extremorum cum
 decoctione foliorum vitium, lactucarum, ſa-
 licis, & capiti papaueris, & odoramento ex
 decoctione iuſquiami. Tuſſis quinetiam ſi fe-
 bri ſit aſſociata, vbi ex ſiccitate partiũ pectoris
 pendebit, linitione thoracis ex oleo violato,
 & lacte; quæ omnia febrim etiam tollunt. Sed
 hæc de ratione curandi, & alendi in febris,
 indicatione ab affectu ſumta. Sequitur quã-
 titas curandi, & alendi. Nam affectus, & quæ
 circa affectum hucusque conſiderauimus, vi-
 ctus qualitatem magis indicant refrigeratẽ,
 humectantem, caſtacentem ſiccãtem potius
 quam quantitatem. Sequitur igitur poſt qua-
 litatem remediorum, & cibariorum, vt per-
 curramus quantitatem cibariorum, magis ſci-
 licet & minus nutritoriam, tum continuam;
 veluti cibi, potusque meſuram, tum diſcretã
 videlicet quoties die nutriendus ſit ager. Quæ
 ſane quantitas a totius morbi ſtatu erit eliciẽ-
 da; morbis quidem bilioſis (quod cito etiam
 ſiant, & creſcant) ſtatim victus tenuis erit ſalu-
 ber; pituitofis autem, & melancholicis diutur-
 nis initio plenior, in ſtatu, & ante ſtatum ten-
 uior, quod vt ait Hipp. Quibus morbus ſtatim
 conſiſtit, iis ſtatim tenuis victus adhibendus;
 quibus vero poſterius debet conſiſtere, iis &
 in ipſo conſiſtendi tempore, & paulo ante il-

*Vigilia.**Tuſſis.**Medicame-
torum &
alimentorũ
quantitas.**Victus in
morbis bi-
lioſis.**Pituitofis.**Melancho-
licis.*

illud cibus subtrahendus: prius vero vberius
 agendum, vt ager sufficiat, quod quādo mor-
 bus in suo vigore constiterit, tunc victu ten-
 uissimo sit vtendum. Vbi autem morbus per-
 acutus est, statim extremos habet labores, id
 est statum. Nam dum morbi cōsistunt, omnia
 & febris, & eius symptomata sunt valentiora,
 & extreme tenuissimo victu est vtendum: Vbi
 vero non, sed pleniorē victum contingit
 adhibere, tantum cibi est indulgēdum, quāto
 morbus extremis est mitior. Quæ omnia vt
 manifestiora fiant, hæc prius erunt intelligē-
 da, victū in tres præcipuas differentias distin-
 gui, crassum, symmetrum, & tenuem: crassum-
 que illud alimentum appellari, quod vires
 augere valet: symmetrum, quod seruare: quod
 minuere, tenue. Notandum autem tenuis vi-
 ctus rationem hoc modo esse intelligendam,
 nimirum de imminuente tenui; non quia ve-
 re vires imminuat, sed quia non sufficienter
 roborat. quod elicitur ex 3. de ratione victus
 ex illo loco, vbi ait: Damnata autem propterea
 &c. quo in loco ait: imbecillitare, nullo pacto
 nutrire, & parum nutrire non esse idem: quo-
 niā inquit diminuunt vires sanguinis eruptio,
 deiectio superflua, sudor immodicus: & per
 accidens cibi abstinencia: & hæc vere imbecil-
 litare dicuntur. Quæ vero nullo pacto nutriūt
 vt aqua, eam imbecillitare, nec roborare quis
 dicet, nisi per accidens? tertio loco quæ exi-
 gue nutriunt. & posset quidē, si quis solis ipsis
 vltis

In vigore.

*Victus tres
differentia.*

*Victus ten-
nis.*

vsus fuerit, mori, non quidem quia vires dimi-
 nuant, sed quia non sufficienter roborant: ex
 his est nulla. Nā si quis diebus quatuor cibo
 priuatus interire possit, is nullæ vlu nō quin-
 tam modo diem, verum quoque & sextam at-
 tinget. Notandum autem vt ex libro de prisca
 medicina elici potest, quod etsi vniuersa viuē-
 di ratio, vt in aphorismis habetur, triplex sit,
 crassa, tenuis, & tenuissim¹; videlicet quæ cō-
 eduntur, sorbentur, & bibuntur; & quarta
 postea, quæ vltimo tenuissima appellatur in
 aphorismis, quam Galenus omnimodam cibi,
 138 & potus abstinentiam interpretatur: ita vt to-
 tus victus quadrifariam diuidatur: in ea quæ
 comeduntur, sorbentur, bibuntur, & omni-
 modam cibi, & potus abstinentiam. Sorbitio
 nanque cum partiatur bifariam, in crassam, &
 tenuem sorbitionem, sequitur quod vniuer-
 sus victus in quinque differentias erit partien-
 dus. ex quibus quinque differentiis quatuor
 acute ægrotantibus cōueniunt: nempe crassa
 sorbitio, tenuis sorbitio, pocula, & omnimoda
 cibi abstinentia. de quibus meminit Hippoc.
 lib. de rat. victus in acutis. Quare ea conside-
 rando quæ comeduntur, crassum sorbitiones
 crassæ, vt tota prisana: tenuem, tenuis sorbitio,
 vt prisana cremor: exacte tenuem; potus, vt
 mellicratum; sicut omnimoda cibi abstinentia:
 vltimo tenuissimum victum constituunt. His
 iactis fundamentis, ex Gal. & Hipp. desumtis,
 sequitur vt accōmodemus singulis morborū

*Victus ratio
 tota qua-
 drifaria est.*

*Victus to-
 tius quinq;
 in vniuer-
 sum diffe-
 rentia.*

*Ratio vi-
 ctus in mor-
 bis acutis.*

*In morbo
peracuto
omnimoda
cibi absti-
nendum.*

*In morbo
acuto qui
ad septimū
terminatur.*

*Qui ad vn-
decimum.*

*Qui ad duas
septimanas.*

*Acutorum
terminis
quatuor vi-
ctus forma
respondent.*

acutorum suam determinatam viuēdi formā,
iuxta status distantiam præscriptam. Porro
morbo peracuto, quique intra quartum diem
sit terminaturus, ultimo tenuissimo victu ute-
mur, id est omnimoda cibi abstinencia: quod
ut ait Hippo. vbi peracutus morbus fuerit, &
statim ultimos labores habet, ultimo tenuissi-
mo victu est utendum. & sequens ait: Vbi vero
non, paulo pleniorē, id est vbi morbus ab
ultima symptomatū vehementia proxime de-
generabit, qualis est qui ad septimum termi-
natur, eo utemur victu, qui inedia proximus
est: qualis est victus per pocula, ut mellicratū,
& huiusmodi. Quod statutum fuit etiam a Gal.
I. de ratione victus, & in aphorismis: In quibus
inquit, non ultra primam septimanam protra-
huntur, forti existente natura, solo est utendū
mellicrato. Qui autem morbo acuto laborāt,
ad vndecimum terminū accessuri, tenui sor-
bitione erunt alendi, ut cremore ptisanæ. Qui
vero morbo simpliciter acuto laborabūt, cu-
ius terminus ad duas finitur septimanas, crassa
sorbitione utētur: exempli gratia, tota ptisana
vbi debent. Pater igitur hucusque, quomodo
Hippo. & Gal. ab huius termini distantia victū
agrotantibus diffiniant. Cumque quatuor ab
Hip. assignētur in dies quatuordecim quater-
narii, quibus ut plurimum morbi acuti termi-
nare solent, singulis suam victus formam de-
finiuit, prout morbi adinuicem acumine dif-
ferunt: ita ut quatuor, qui intra dies 14. sunt,
terminis

terminis , quatuor similiter victus formæ re-
spondeant. His stantibus, sequitur modo vt o-
stendamus quanam febres intra quartū , quæ
intra septimum, quæ intra vndecimum , quæ
intra decimumquartum terminare soleant:
quoniam hoc habito, facile erit cuique febriū
differentiæ suam etiam determinatam appli-
care viuendi formā. Porro Causus legitimus,
hoc est, febris ardens a bile impermixta ortū
trahens, atque synochus , si cum inquietatio-
ne erunt associatæ, ad quartum terminabunt.
Eadem si cum vigiliis , aut capitis dolore, aut
delirio cōtinuis fiant, intra septimum. Febres
vero continuæ, quarum in die quietiori sym-
ptomata vtcunque ægrum molestabunt , ad
vndecimum. Quarum vero apud inclinatio-
nem febris symptomata omnino euanescent,
ad decimumquartum. Hoc est illud quod ait
Hipp. libris de ratione victus, & libris de mor-
bis vulgaribus. Quibus inquit, ardētes febres
cum inquietatione fiunt, si robusta sint virtu-
te, & habitu denso, difficulter spirabili , si ab-
stinentiam longam citra insigne incommodū
pati assueti sint, hos in omni seruabis inedia.
Si aliquid horum deficiat: nempe virtus sit im-
becillis, aut habitus rarus, facilis resolutionis,
aut humores nimium tenues, potibus hunc

B nutries. Quod si febris ardens citra inquieta-
tionem sit, & vigiliis torqueat, virtuteque va-
lente, & reliquis vt oportet habentibus, po-
cula ministrato. Quod si illorum virtuti non

*Febrium
termini.*

*Causus legi-
timus.
Synochus.*

*Febres con-
tinua.*

*Febres ar-
dentes cum
inquieta-
tione, qualē
victum re-
quirant.*

*Febres ar-
dentes sine
inquieta-
tione.*

*Febres con-
tinua.*

*Ars alendi
in omni fe-
brium gene-
re.*

*Artis alēdi
requisita.*

I.
*Alimenti
genus.*

fidas, aut in præsenti, aut in posterum: tenuem sorbitionem exhibeto. Febri autem, cuius symptomata in die tranquilliori nō quiescūt, si cum robore virtutis accidant, tenui sorbitione. Quod si ob imbecillitatem præsentem, aut ob habitum rarum, in posterum illum nō posse sufficere speres; præcipue si multo sit cibo assuetus, & humores tenues fuerint, crassa sorbitione hunc nutries. Quod si febris continua sit, cuius symptomata in die quietiori omnino euanescūt, crassa sorbitione ales. Quod si imbecillis fuerit virtus, aut habitus rarus, aut tenues humores affuerint, aut multo cibo sit assuetus, præcipue si hyems fuerit, huic cōcedendū dabis quod facilis sit coctionis. Quoniam vero particularium cognitione, atque vsu rerū cognitio certior euadit: quapropter sequitur vt percurramus modum curandi singulam speciem febrium, incipientes ab arte alendi. Porro ars alendi, vt tertio libro notatū fuit, consistit in eligendo alimēti genere, quātitate, & tempore; secundo in consideratione ipsarum circumstantiarum. Genus autem cibandi sumitur a genere ipsius affectus: cibandi autem genus attenditur penes qualitates; vt intemperies calida frigidam vult diætā; obstructio aperientia, rarefacientia, vnitatis solutio condensantia. Amplius alio modo exhibendum est alimenti genus in affectibus simplicibus, & solitariis, aliud in affectibus implicitis, vt vbi, morbus causæ, aut morb. symptomati, aut

aut causa symptomati implicita. Idque aut similia inter se, aut dissimilia, aut contraria. Quantitas vero alimenti sumenda est a quantitate affectuum, ut longis morbis crassiorem exhibemus viuendi rationem, breuibus autē, & acutis tenuem. Breues autē, & acuti morbi cum triplices sint, ad quartam, septimam, & decimam quartam; breuibus ad quartam, tenuissimum, veluti mellicratum, (quanquam antiqui nihil exhibebant) breuibus ad septimam tenuiorē, succum sane ptisanæ, antiqui dabant mellicratum. breuibus autem ad decimam quartam, ptisanam non colatam. Amplius, huiusmodi quantitas alimenti exhibenda dupliciter exhiberi potest, vel vniuersa, ac semel: vel pluribus vicibus; videlicet vel semel in die, vel bis, vel pluries. Tempus vero exhibendi alimentum a temporibus morborum etiam est sumendum; nempe quod iis temporibus, in quibus natura est valde oppressa, tenuior etiam conueniat viuendi modus: ut hac ratione, & in statu, & in particulari morborū paroxysmo cibus sit aut remouendus, aut diminuendus. Atque hæc de iis quæ sumuntur ab ipso affectu. Secundo considerandam diximus esse naturam corporis, in quo reperitur affectus, quod eorum temperamenta similib. semper sint seruanda. Amplius, quod non omnes temperaturæ in cibi abstinentia sint seruandæ, aliquos enim videmus difficile tolerare inediā, alios facile: difficile quidē calida, &

2.

*Alimenti
quantitas.*

*Acuti mor-
bi triplices*

3.

*Alimentū
exhibendi
tempus.*

II.

*In arte alex-
di consido-
retur.
Corpus affe-
ctum.*

III.
Alimentum.

III.
*Circum-
stantia.*

*Alendi ars
in ephemeris.*

*Ephemeris
ab constipatione poro-
rum & synochus sine pu-
tre dine au-
xiliatur
vena sectio.*

sicca corpora, vt necesse sit etiam in accessio-
nibus eos cibare: facile vero corpora frigida,
& humida. Diximus tertio, quod consideran-
dum est ipsum alimentum; nempe modus sub-
stantie ipsius: & hic vel penes alterationem, vel
motum localem, vel nutritionem: quantitas,
& hæc vel molis, vel virtutis. qualitas etiam tū
prima, tum secunda. Diximus quarto conside-
randas esse circumstantias; primum sane soli-
tarias, dein simul associatas, aut inter se, aut cū
affectu, aut cū corpore affecto, aut vtriusque,
atque in horum omnium ponderatione con-
sistere artem recte alendi. Sequitur modo vt
artem hanc alendi applicemus ad vsum singu-
larum febrium, incipientes ab ephemeris: quā-
quam in ephemeris pauca sit opus alendi arte,
quod parum & paucio tempore recedant a na-
turali vnde prisana conuenientissima erit, aut
vice prisane panatella ex optimo pane confec-
ta, potus vero aqua hordei cocta: atque hæc
declinationis tempore erunt administranda.
Sequuntur putridæ (nam ephemeræ, quæ ha-
bent pororum constipationem tanquam cau-
sam annexam, & synochus sine putredine, om-
nem fere curationis spem ab euacuatione per
venæ sectionem habens, vtpote quæ refrige-
randi, aperiendi, & simul euacuandi vim ha-
bēs, febris intemperiem calidam, obstructio-
nem simul, seu cor stipationem, & humorum
quantitatem acrem tollat.) Quod tamen atti-
net ad alendum, cum synochus sine putredine
ratione

ratione morbi nullas habeat intermissiones, *In synocho*
 cum raro accidat in corpore calidi & sicci tē- *sine putre-*
 peramenti, aut habitus rari, consequenter ra- *dine.*
 ro cum imbecilli facultate, potu solo conue-
 nienter nutrietur ex aqua hordei parata, vt in-
 fra in cibandis causo laborantibus parāda. *In synocho*
 Synochus vero a putredine, ratione causā, nem- *putrida.*
 pe humorum, qui corrumpuntur, cum natura
 citius labatur a febre & putredine simul inua-
 dentibus, quam ex sola febre, solidiori victu
 erunt nutriendi, videlicet sorbitiuncula tenui
 ex hordeo, aut pane per horam in aqua endi-
 uiā infuso, & acetosa cocta, & potu aqua hor-
 dei cum acetosa cocta. In causo vero cum hu- *In causo cū*
 more bilioso eius causā, & siti eiusdem sym- *humore bi-*
 ptomate, in corpore talis habitus, vt nō facile *lioso & ha-*
 exsoluatur: & ex circumstantiis cum virtute ro- *bitu denso.*
 busta, potu erit nutriendus, cōfecto ex hordei
 parte vna, aque partibus viginti, in quibus ho-
 ra vna antequam ab igne amoueatur, recētes
 violæ insimul fuerint coctę, aut syrupi acetosi,
 aut syrupi violarum parum. At si, aut corpus *In causo in*
 affectum sit habitu raro, ex circūstantiis vires *habitu raro.*
 aut sint imbecilles, aut etiamnum constantes
 sint, dubiū sit ne solo potu perdurare possint
 vsque ad crisis horam: & cōsuetus sit multum
 egrotus comedere: aquam hordei vt supra pa-
 rato, & linteo raro hordeum fortiter expri-
 matur, ita, vt hordei exeat medulla, multaque
 aqua admiscendo, fac tenuē sorbitionē, parū
 syrupi acetosi addendo. aut hoc modo: micam

*Hippocrat.
de victu in
causa sen-
tentia.*

*In causa le-
gitimo fu-
gienda sunt
vehemen-
ter frigidā-
tia & astrin-
gentia item
in synochis
& febribus
continētib.*

panis in paruulas partes rasam infunde in a-
quam frigidam ter innouatam, dein coque in
aqua hordei, violacea, illi addendo succi acc-
tosorum granatorum, & sacchari tantū, quan-
tum ægri palato placeat, panemque multa a-
qua diluens fac tenuem sorbitionem. Nam &
Hippocrates agens de curatione huius febris,
aquæ mulsæ coctæ, & aquosæ quantum æger
voluerit, concedit: & hoc potu ægrum vsque
ad crisis horam ducit, aitque sorbitiones non
non esse dādas nisi dies indicatorii transierint:
quanquam Galenus id intelligendum esse in-
terpretetur si virtus ægotātis robusta esse vi-
deatur. Cauendū autem erit in legitimo causo
(quidquid aliqui dicant) a potenter refrigerā-
tibus, & astringentibus. & hoc, quod cum ex
4. de ratione victus, legitimus causus fluxu san-
guinis: aut sudore soluat, quæ nimis frigida
sunt, & quæ astringunt, utriusque obstant termi-
nationi. Ad eundem modum in synochis, &
continentibus febribus ab herbis potēter re-
frigerantibus, & astringentibus erit cauendū:
& hoc, quod, cum huiusmodi febres valde a-
cutæ sint, natura eas diu ferre non potest, quin
cito fiat crisis, qua aut natura vincit, aut vin-
citur, vt hac ratione maxime cauendum sit, ne B
aut humores, aut corporis vias a crisis disposi-
tione diuertamus, prohibēdo aut fluxum san-
guinis narium, aut corporis sudorem ex hu-
morum in dispositione, astringentibus vero
corporis vias coarctando, per quas febris re-
missio

missio ex efferuescentium humorum transpiratione fieri solet, cum pori totius aperiuntur. At si causus sit associatus cū causa, quæ sit materia pituitosa salsa, in corpore habitus qui non facile effluat, viribus robustis, & consueto vivere parce: tunc ratione causæ potus non erit victus idoneus, sed sorbitio tenuis, aut ex ptisana, aut ex pane superius descripto, addendo loco succi granatorum, syrupum acetosum acrem, qui scilicet plus aceti recipit. Et ubi aut corpus erit habitus rarioris, aut virtus imbecillis, aut futura imbecillis, aut ob alium liquidam, aut alterius causæ ratione, & consuetus sit æger multum comedere, pullum gallinaceum cū hordeo & aqua coquito: aduertendo quod nec in causo notho, nimis frigida sunt conuenientia: & hoc, quod humor huiusmodi febris sit difficilis coctionis, frigidus, glutinosus, & crassus: ut hac ratione. 4. de ratione victus, abscellu soleat terminare. Sequitur tertia continua, quæ sane cum dupliciter intermittat: aut enim in intermissione, quiescunt symptomata, aut solum remittuntur. Si erit tertiana continua talis, ut in eius remissione non omnino symptomata quiescant, veluti sunt capitis dolor, vigilia, sitis magna, delirium, grauitæ æger feret morbum. si corpus affectum tale erit, ut non facile in halitus digeratur, ex circumstantiis virtus sit robusta; & consuetudo sit ad parce viuendum, ptisanæ sorbitione utendum erit cū syrupo acetoso ut supra parata: aut panis ossa infusa in

*In causo
cū materia
pituitosa,
salsa, habi-
tu denso.*

*In habitu
corporis ra-
riore.*

*Frigida
sunt vitan-
da in causo
notho.*

*In tertiana
continua
permanen-
tibus sym-
ptomatis &
habitu
denso.*

*Habitu raro & ca-
teris.* aqua endiuiae, & succo granati acidi. At ubi affe-
ctum erit habitus rari, aut virtus
imbecillis, aut multo cibo ager assuetus, cras-
siori sorbitione hordeo expresso in ius pulli
prabeto, aut medullam panis in aquam endi-
uiae infusam, in iure pulli dissolutam. Vbi autē
*In tertiana continua
quiescentib.
symptomatis, habitu
denso.* febris tertiana continua talis erit, vt in inter-
missionibus quiescant omnino symptomata,
& habitus duræ resolutionis, virtus robusta,
consuetudo ad parce viuendum, alteram di-
ctarum sorbitionum exhibeto. Habitu vero
Habitu raro. existente facilis resolutionis, aut virtute de-
bili, aut consuetudine multum comedendi,
alteram adhuc dictarum sorbitionum, & pulli
extremities addes. Vbi vero febris continua
*In tertiana continua
nullis aut
paruis con-
currentibus
symptomatis.* nulla aut parua afferet symptomata, habitu
duræ resolutionis, virtute robusta, consuetu-
dine parca, hoc eodem victu ager erit nutri-
endus. Vbi vero aut habitus erit facile resolu-
bilis, aut virtus debilis, aut consuetudo larga,
præter dicta, pulli etiam carnes addendæ, eaq;
quæ comeduntur. Febris autem continua a
*In febre cō-
tinua a pi-
tuita, habi-
tu denso.* pituita in corpore duri habitus, cum virtute
robusta, consuetudine parca, sorbitione ex
hordeo in iure pulli cocto, aut ex pane, & pul-
læ carnes hora quietiori dato, aperientia etiā
Aphorismus & præcidentia simul coquendo, modo cauea-
mus ab aperientibus & incidentibus ante to-
tius euacuationem: quod in continuis febrib.
vbi est suspicio de pororum obstructione, pe-
riculosa sint ante totius euacuationem aperi-
entia,

entia, & incidentia. Virtute autem existente imbecilli, exhibeto phasianum: potus autem sit, aqua decocta cum hordeo, & semine fœniculi. Febris vero phlegmatica, quæ latica seu latens dicitur, cum in ea humidi natiui multū exsoluatur, & corpus ab humore assiduo laxetur, ob id cibus multi nutrimenti erit exhibendus, qui maxime virtutem corporis augere possit, more hecticae febris, cui valde assimilatur: veluti perdicis assæ carnes, aut phasiani, cū vino albo imbecilli, & decoctione radicū plantaginis. Et vbi carnes perdicis, aut phasiani digerere non poterit, succus ipsarum complete assarum per linteum expressus, cū pane, aut modico vini albi mixtus exhibebitur. Tertianā simplex pura, crassa sorbitione ex hordeo, aut pane in aqua endiuia infuso, acidōq; arancii de super expresso, traducenda. Magna enim in hoc cibo vis inest refrangendi bilio si humoris acrimoniam, & extinguendi ventriculi, & iocinoris immoderatum ardorē. Ab hoc tamē cibo cauendū erit vbi aderit pororū obstructio, aut cōdensatio, aut corporis cōstrictio: quanquā in cōtinuis febribus a venæ sectione secure exhiberi possit. Die trāquillo carnes erunt exhibendæ: cum a paroxysmo præterito, & ab instante intersint horæ decē & octo, quibus natura vires resumit. Neq; enim tenui victu in tertiana pura ytraque die nutriendus est æger: cum huiusmodi ægros gracilis habitus, & naturæ calidæ & siccæ faci-

*In Febre
phlegmatica
latente.*

*In tertiana,
simplicia
pura.*

*In febrili
pituita dul-
ci.*

*In febrili
pituita cras-
sa & lenta.*

*Dubitatio
an in ter-
tiana vel
pituitosa
plus sit a-
lendum.*

*Solutio sum-
pta a morbo
& circum-
stantiis.*

le sit deducere in marasimum. Febris vero a pi-
tuita dulci, sorbitione facta ex phasiano, aut
capo, aut pulla, cocto cū petroselino, thymo:
modo ante cibum deglutiat oxymellitis co-
chlearia duo, mellis rosari colati vnum, quod
plurimum conferat ad mundificandum sto-
machum, & rectam ciborum coctionem. Vbi
autē febris pendebit a pituita crassā lenta, sor-
bitione facta ex capo aut pulla cocta cum thy-
mi, hordei, passularum ana m. i. pulegii duos,
& modico sale. Sed oritur difficultas. Nam si
crassities victus, & eius contrarium a distantia
status sumuntur, & morbi qui breuius finiun-
tur, magis tenuem, qui vero tardius crassiorē
victum exposcunt: sequitur quod cum febris
hæc longior sit, quam tertiana, quod etiā cras-
siori victu sit tractanda. Respondendum, ibi
maiori alimonia opus esse, vbi virtus magis
exsoluitur, cumque in tertiana plus exsoluatur
corporis virtus, quam in febre phlegmatica,
sequitur quod plus sit alendū in tertiana, quā
in pituitosa, ratione sumpta a virtute: ratione
vero sumpta a morbo, quoniam in tertiana vna
integra die, & nocte sunt a morbo liberi, at in
febre phlegmatica cum omni die corripian-
tur, & non raro prima adhuc non euanescente,
proxima subintret: sequitur quod necesse sit
febricitatem alere, priore febre adhuc aut nō
soluta, aut saltim ad futurum paroxysmū pro-
xima, modo cum febre adhuc non euanescente
minus cibi, & tenuioris sit exhibendū ex arte
alendi.

alendi. Sequitur quod in febre phlegmatica magis tenui victu vtendum sit, crassiori vero in cholerica. Haftenus hoc probauimus ratione sumpta a circumstantiis, & a morbo: probatur etiã ratione sumpta a causa morbi: nempe quod pituitosus humor, quo repletus est ventriculus, intestina, & meseraicę, vltior coctione in sanguinem verti possit, & nutrire. non autem sic humor biliosus: ratione etiam sumpta ab ipso remedio, quod ob multitudinẽ materię, quę solet esse in febre phlegmatica, cibus non parũ obstat eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre autem cholerica cibus non solum nõ lædit, verum etiam iuuat ad reprimendam humoris acredinem, & inducendam humori nimis tenui crassitiẽ debitam. In summa enim in omni febre longę terminationis, cum materia nutritioni est inepta, ex abstinẽtia, aut subtili victu febri- citantes grauitè læduntur. Quartana vero febris sorbitione ex pulla crassa cum scolopendrii mani.j cocta, & parum antequam ab igne amoueatur, florum boraginis m.j. Sequuntur putrida non simplices: & primum ex confusis

B tertia simplex non pura a bile permixta cum pituita, sorbitione indiget ex hordeo cum pulla gallinacea cocto, & thymo, & perroselino: qua vti poteris cessante febre, & ante aduentum paroxysmi horis septẽ ante accessionem, carnes comedendo in diebus quietis, aut pisciculos saxatiles in aqua coctos cum

*Solutio a
causa morbi
sumpta & ab
ipso remedio*

*In cholerica
crassior vis
tus conueni-
nt quam
phlegmaticis.*

*Aphorismus
In febre
quartana.
In putridis
non simplicibus.
In tertiana
simplici
non pura.*

*In putridis
implicitis.
In tertiana
duplici.*

*In hemitri-
tao vero.*

satureia, thymo, aceto, sale, & oleo. Sequuntur putridæ implicitæ ex febribus eiusdem generis, veluti est duplex tertiana, in qua sanè tenti-
co magis victu erit vtendum, quantum in ea minus quiescit natura, & a carnibus erit abstinendum, nisi vires sint imbecilles, aut nisi multo cibo sit assuetus. Vtrique autem febrī conueniens potus erit aqua hordei. Sequuntur putridæ implicitæ ex diuersis generibus febrium, veluti est hemitritæus verus: nempe quotidiana continua, & tertiana interpolata, quæ sanè mediæ rationis victū exposcet, nempe qui subtilior sit, quam qui in febribus interpolatis conueniat, & crassior quam continuis ab vno humore, cum singularum qualibet sit longior. Etenim cum duobus qualitate & substantia contrariis humoribus pugna sit, viribus & temperie indiget, vt ambos vincat. Cum igitur in superioribus, in simplicibus febribus cibis ea admiscuerimus, quæ peccatis humoris qualitates reprimant, oportebit in hemitritæo simul ea, quæ contrariarū sunt qualitatum admiscere, quoniam ea; quæ alterum illorum solum respiciunt, administrare non licet. Quare aut cibus erit accipiendus, in quo vtraque qualitas reperiatur, aut in cibo erunt miscenda ea, quæ contrariarū sunt qualitatum, & præterea incisiuus. Ex simplicibus erit acetum, quod vtrique humori competit, præsertim si cum abstergente misceatur, veluti saccharo: cuiusmodi erit mixtio illa ex saccharo,

charo, & acri aceto, quæ syrupus acetosus appellatur. Victus igitur hoc modo erit fiendus: Ex hordei ab vno cortice exuti, & thymi, & petroselini, ana m. i. bulliant cum pulla crassa quâ tum satis fit. Accipe huius decocti libram vnâ, syrupi acetosi acris, quantû sufficit a gri palato: iterum bulliant quousq; misceantur, quâ vteris ante accessiõnem vehemẽtiorem, & in eius inclinatione. In die vero mitiori eisdem vtitor, pullæque extremitatibus. Sciendû etiam mixtionem ex pipere, & succo violarû magni esse iuuamẽti in hemitritæo. Vbi vero in hemitritæo humor pituitosus præualebit, sorbitionem parabis ptisanæ ex pipere & oxymellite: vbi vero bilis, ptisanam cum pulla, ex petroselini, & apii radicibus, acetoq; parabis. Cognoscetur autem pituitam præualere bili, vbi frigus ad horrorem magis accedet: bilem vero pituitæ præualere, vbi frigus ad rigorem magis accedet. Febris vero illa, in qua exteriora calêt, & interiora frigêt, epiala dicitur, & ortû habet a putrescente bile calore febrilẽ excitante, & phlegmatib. crassis, quæ in interioribus partibus concreta dissoluuntur, ex quorû dissolutione partes internæ frigesunt. Amplius etiam febris est illa, in qua e contrario exteriora frigent, & interiora calent, quæ lippyræa dicitur: quod ab eisdem humoribus ortum habent, sed situ diuersis, nempe a bile putrescente, in qua phlegmata crassa in exterioribus partibus existentia dissoluuntur, & accidit

In hemitritæo præualente humore pituitoso.

An bilis vel pituita præualeant quomodo sciendum. In epiala.

In lippyræa.

partes externas infrigidari æstuantibus inter-
 nis. In vtrisque vero his febribus vtẽdum erit
 iis cibis, quos hemitritæo conuenire diximus.
 In hoc solum erit differentia, quod in ea, in
 qua exteriora calent, & interiora frigent, lipi-
 ria sane appellata, victus copiosioris alimonie
 erit exhibendus, quod minus periculosa sit
 hæc febris, vtpote præternaturali calido in ex-
 ternas solum læuiente partes: in ea vero, in
 qua e contra exteriora frigent, & interiora ca-
 lent, subtiliori victu erunt regendi, quod peri-
 culo nõ vacet huiusmodi febris: & hoc, quod
 febrilis calor multoties in seipsum reduplicetur
 transpiratione prohibita. Quare victu sub-
 tiliori erunt regendi, cui admixta sint ea quæ
 aperire, & valenter incidere valeant, post cali-
 dam, & asperam totius corporis fricationem.
 Hæctica vero cum sit intẽperies calida, & sic-
 ca, exposcit victum refrigerantium, & hume-
 ctantem. Ideo cum actu refrigerantia præstā-
 tissima sint, sed periculosa, vtendum erit iis
 quæ potentia refrigerant, & humectant, ob
 id ptisana erit optima, vel panatella ex pane
 infuso, ex chondro, alterando iuscula cum la-
 ctucis, portulaca, endiuia. Potus etiã non actu,
 sed potentia sit frigidus, ne incurramus in ac-
 cidentia a Galeno enarrata: & hoc, ratione vẽ-
 triculi excarnati, in quo sit virtus vel seminum
 cucumerum, vel melonum, citrulorum, endi-
 uia, lactuca, portulaca, parum aceti admiscẽ-
 tes, quo nil præstantius, quoniam etsi habeat
 aliqualem

*In hæctica
 actu refri-
 gerantia
 sunt pericu-
 losa.*

Acetum.

aliqualem caliditatem, & vim exsiccandi commixtam, tamen cum aqua amittit siccitatē illā, & facit, vt acetum penetret per singulas corporis partes, vbi aqua ex se non penetraret, idē dicit Melues de syrupo acetoso ratione aceti. Maligna vero febris, seu pestilens febris, non eam quam reliquæ acutæ febres, victus rationem exposcunt, quia in illis tenuem victum ministramus, vt natura coctioni materiæ morbi fortiter vacet: sed in pestilenti, seu maligna febre, cum substantia spiritus fortiter exsoluatur, & materia ad eorum ingenerationem indisponatur, conādum erit vt cibo, & potu conuenientibus, materiæ generationi spirituum conueniens suppeditetur. Sequitur igitur, qd cibaria debēt esse facilis coctionis, vt cito vertantur in spiritus. Periculum autem quoniam est, vt exsistentia facilis coctionis a pestilenti contagio prius immutentur, (crassa vero cibaria, quod a calido naturali, vtpote languido vinci non possint, etiam non sunt exhibenda, quod hac ratione periculū sit vt in pestilētem causam abeāt.) Sequitur igitur quod cum difficile sit reperire in simplicibus cibum, qui facilis sit coctionis, & pestilenti contagio difficulter cedat: quod alimentum hoc modo erit conficiendum, ex iis quæ facilis sint coctionis, & iis quæ habeant vim exsiccandi, & resistēdi: veluti immittendo ouum integrum in aquam frigidam mixtum cum aceto per tres horas. Tandem ouū rumpito, albumq; extra mittito

In febre pestilenti spirituum generatio procuranda est.

Victus ratio

Cibi preparatio.

succoque arancii, aut aceto albo capacitatem impleto, salis tantum addendo, vt mediocriter salum fiat. Coquito supra cinerem calidum, miscetoq; donec crassum reddatur, & eo vtere cum succo mali citrei, loco arancii, aut aceti. Item perdicis carnosæ, aut phasiani, aut capi, aut iuuenis columbæ viscera effodito, eamq; sale condito, quæ per diem ita maneat, postmodum in eam mali citrei frusta immittito, & petroselini, vt quod inane est impleatur, eamque ad ignem lentum coquito. Cumque mediocriter assa fuerit, perdicem in parua frusta secato, & in linteum dimittatur, & totus eius succus extrahatur, multum enim nutrit, spiritus substantiam auget, ventriculum roborat, & pestilenti infectioni valde obsistit. At dices, salsa febrilem calorem acuunt. Respondendum ex Galeno: In complicatis affectibus, ad id, quod vicem causæ habet, aut magis vrget, attendendum esse, nempe corruptioni grassanti magis, quam feбри, aut eius causæ vrgēti. Adde quod humectus præter modum ventriculus, & relaxatione laborans, ob idque cibum cito euomēs, tali exsiccatione curatur, B præsertim, cum in pestilenti febre laborantium virtutes semper vrgeant, ob incessantes vomitus. Potus autem huic malitiæ conueniens talis erit. Etenim cum dictum sit, potum illum esse conuenientem, qui aut morbo, aut eius causæ contrarius sit: cumque febris pestilens caliditate, & humiditate nocua sit, sequitur quod

Dubitat.
de falsis.
Solutio.

Potus.

quod conueniēs potus erit frigidus, & siccus, veluti aqua cum aceto; aut plantaginis, aut acetosæ aqua cum arancii succo. Sed variandus postmodum potus erit iuxta maiorem, & minorem vrgentiam virtutis, & morbi, vt hac ratione respiciens virtutem Celsus, quæ maxime in hac febre vrgere solet, ob ingentem spirituum exsolutionem, vinum calidum exhibeat. Qui vero ad morbum magis mentem dirigunt, vinum recte prohibent, aquamque mixtam cum aceto iubent. Et vbi vtriusque habenda erit ratio, tum morbi, tum virtutis, vinum cum aqua acetosa, aut plantaginis erit miscendum. Sequitur febris colliquans, quæ victum crassiolem, quam pro morbi ratione postulabit, vt corporis dissolutioni subuenire possit, infrigidantem, & modice astringentem, 4. de ratione victus. vbi agens de febrium curatione cum aluo liquida absumente, & contabefaciente corpus, iis ait esse ministrandas sorbitiones frigidiores, & crassiores, potusq; vinosiores, & astringentiores, delirio non obstante. Igitur victus præparandus erit, qui habeat rationem febris, iuxta scilicet febris acumen, humoris, seu causæ, & etiam corporis affecti, quod dissoluitur. Habebimus autem rationem morbi, seu febris, si vtemur sorbitionibus crassis; humoris vero, si victus erit infrigidans, & aliqualem astringens. Notanter autem dixi aliqualem, quoniam ea, quæ insigni vi astrictoria pollent, causam morbificam intra

*Vinum ad
conueniat.*

*In febribus
colliquan-
tibus.*

*Pro ratione
morbi hu-
moris.*

*Corporis**Prisana
confectio.**De victu,
ratione
symptoma-
rum.**Quæ sym-
ptomata
victum
mutent.*

corpus detinent, cum ad omnem euacuatio-
nem vias obstruant. Corporis vero habebitur
ratio, si victus præstabit corpori multum nu-
trimentum, & facilis sit coctionis: cuiusmodi
erit iste: prisana scilicet hordei non colata, hoc
modo confecta: Capum iuuenem coquito cū
tribus hordei excorticati pugillis, plantaginis
vno, modicum antequam ab igne amouea-
tur, immittendo granorum mali granati acidi
pugillum vnum, quod coquatur tandiu donec
rumpatur hordeum, & tenerimum fiat. ex-
trahe hordeum, & adiecto paucō saccharo
administretur. Nam infrigidat, roborat, & est
facilimæ coctionis, & parum astringit. Hacten-
us de ratione viuendi in ipsis febribus, habi-
ta ratione tum febris, tum causæ, tum sympto-
matum. Quoniam vero plerunque sympto-
mata, curationis indicationem ad se trahunt,
sic etiam & victus rationem, quemadmodum
ab Hippo. & Gal. i. de ratione victus videmus
fuisse obseruatum: Sequitur modo vt agamus
etiam de victu, habita ratione symptomatum
vehementium, quæ febres insequi solent. No-
tandum autem est, quod non in quacunque,
sed in determinata quadam symptomatis ra-
tione, & magnitudine, victus rationem im-
mutare licet. Nam in eo, quod ait Hippocra-
tes: si multa sitis fuerit, mellicrato, & aqua, eli-
citur, non a symptomatum quacunque mag-
nitudine, sed ab ea, quæ effatu digna est, cura-
tionis scopum esse mutandum: quoniam sym-
ptomata,

promata, vt effectus sunt, nullius sunt capacia indicationis, nisi prout effatu dignam accrescant magnitudinem. Hoc autem modo symptomatum magnitudo erit diffinienda, quoties scilicet ad id deuenierit, vt alicuius præternaturalis dispositionis fiat causa, quæ aut in morbum addat, aut naturæ vires exsoluat. Horum quodcunque eueniat causa magnitudinis symptomatum, victus rationem mutare licebit, dummodo in victus mutatione ea minustremus: quæ aut morbo, si fieri possit, conueniant, aut saltem incommoda non sint: veluti phrenetico parum sitienti victum exhibebis, quem morbus ipse exigit: vbi vero multa siti vexabitur, non iis quæ morbum, & eius causam respiciunt, sed iis quæ sitim mitigant, vt eris: & hoc, quod multa sitis sputum exsiccat, morbum incoctilem reddat, febrisque calorem augeat. Sed indicatione a symptomate sumpta, mellicratum, & aquam exhibebis, sumpta a symptomate indicatione; etiam quod aqua doloris maturationi sit aduersa. Igitur febricitanti vigilias patienti panem purissimum in exiguas abraide particulas, tribusque aquis lauato, dein amygdalarum succum ex aqua hordei exhibeto, simulque cum pane coquito ad lentum ignem semper agitando. Conuenit enim hic cibus exsiccat, & supercalfacto cerebro, frigidos & humidos halitus ad caput mittens. Notandum autem, quod vbi ob doloris vehementiam procedent vigiliæ, cibus

*Quando a symptoma-
tis sint pe-
tenda indi-
cationes.*

*Phrenetico
sitienti
quam
exhibenda.*

*Vigilia in
febris.*

*In vigiliis
ob vehemen-
tiam doloris
cibi non co-
ueniunt.*

*In vigiliis
continua
dolore vi-
ctus.*

*Sitis vehe-
mens.*

*Sitim sedā-
tia.*

*Affectus
siccus signa.*

omnium inducere non erit sperandum, sed aut ad medicamen, aut chirurgiam erit transendum. quinimmo hora doloris cibus quicumq; culpa non vacat; vt hac ratione prisana, cibus aliqui febricitantibus conuenientissimus, in vehementia doloris ab eo damnetur, Ideratione victus in morbis acutis: formaq; victus eodem modo erit sumenda a terminatione longa, & breui symptomatis: quemadmodum de morbo diximus. Vnde vigilię continuę a dolore causatę cum sint vnum ex iis symptomatibus, quę morbum ad septimum terminant, sequitur iis victum per pocula esse ministrandum. Sitis vero vbi erit talis vehementia, vt aut materia morbi coctionem remoretur, aut nimia sputum exsiccatione inhibeat, aut ab ea corpus arefiat, rationabiliter ab ea viuendi ratio erit sumenda: quod fiet cibo & potu, actu & potentia, frigido & humido. Omnium autem quę sitim vincunt primum est aqua frigida, secundum aqua hordei, tertiū syrupus violaceus multa aqua dilutus. aut hoc modo: Aquę coctę partes viginti, syrupi violarum depurati, aut eius iulep partem vnā, bulliant lento igne donec permisceātur, dein sub dio exposito ad septentrionem, & frigidum exhibeto. Quare solo potu erit vtēdum, ex Hippocrate, qui ait, in morbo vltra modū sicco, solo potu humectante nutriendos esse laborātes, donec ariditas soluatur. Cognoscetur autem siccus affectus ex signis ibi a Galeno enarratis,

enarratis, vbi ait: Et sane superfluitatum nihil excernere, siccorum omnium morborū nota est. Quare solo potu humectante vtendum erit in iis, quorum lingua, totumque corpus vltra modum arida sunt. Ratio est, quoniam si iis cibum, aut sorbitionem exhiberemus ante corporis humectationem, partes sorbitionis, quæ crassioris sunt substantia, ventriculi tunicis præ nimia earum siccitate adherentes a febrili calore deurerentur potius, quam coquerentur, non aliter quam cibus ollæ adhaerens comburi solet humore aquo deficiente. Quare in siti cū validissima siccitate cibus erit parcendum, & solo humectante potu nutriendi erunt agrotantes. Non ignorandum tamen est, cum sitis quandoque a ventriculo, quandoque a iecore, quandoque a pulmone, quandoque a renibus provenire possit, ex libris de lo. aff. quæ a ventriculo potu aquæ frigidae: quæ ab hepate, aquis distillatis frigidis, quæ a pulmone, aqua hordei cum syrupo violarum: quæ a renibus, aqua decoctionis liquiritiæ maxime sedari. In fluxu ventris, qui vi morbi potius, quam naturæ actione regulariter agentis eueniat, hac victus ratione erit vtendum. Cognoscetur autē esse vi morbi, si inter morbi initia eueniet: & hoc, quod quoties natura est auctor est effluxionū, non morbi initio, sed post crisim sequuntur. Quare indicabitur a natura symptomatis roborandā esse naturā a morbi violentia oppressā, cibo crassiori, quam pro

*In siti cum
validissima
siccitate ci-
bus discon-
uenit.*

*Sitis a di-
uersis par-
tibus oritur.*

*Victus ratio
in fluxu vē-
tris a vi
morbi.*

*In causo
cum aluo
liquida.*

*In morbillis
& variolis.
Morbilli
quid differant a va-
riolis.*

morbi acuminis ratione, quod symptomati sit indulgendum: vt si quis causo labore cū aluo liquida, tunc nō potu solo, quem victum alias caulus exposcit, sed sorbitiuncula ex ptisanæ cremore erit nutriendus: & hoc, quod suspicandum sit imbecillitatem virtutis ab euacuatione illa ortum habere: vt hac ratione quantum euacuationi occasionis dat, eo tantu tenui victui parcendum est, & crassiori indulgendum. Quare succus perdicis assæ, aut phasani, aut pulli in hoc erit optimus, & reliquis viuendi modus in colliquatibus febribus supra descriptus. In morbillis vero, & variolis, quæ duo in hoc conueniunt, quod vtraque pustula ab ebullitione sanguinis sit, natura prauum ab eo quod purum est separante, & ad cutem detrudente: in hoc differentes, quod morbillus in cute est instar morsus pulicum, variola autē cutem magis in tumore attollit. Quare cibus talis erit conficiendus, qui vim expulsiuam nec sui crassitie, nec multitudine, nec dura coctione distrahat, aut impediat; quinimmo vt opus virtutis expulsiuæ, pellendi scilicet humorem noxium extra ad cutem, melius compleatur: cibus parandus erit qui parum infrigidet, & leniter astringat, vt particulae roboratae melius a se noxium humorem expellere possint: veluti esset ius lētium cum herba acetosa, & aceto, & ptisana sorbitio eo modo parata, quo diximus esse parandam in febribus colliquantibus, & potu ex aqua hordei cum polytricho,

richo, vitādo inter initia gallinaceorum iura.
Vitanda erunt etiam vehementer refrigeran-
tia, quod expulsionī naturæ vehementer ob-
stent, & eruptionem pustularum retardent
sua vehemēti frigiditate. Vitanda etiam sunt
calida, & fumosa, ne augeatur ebullitio, solū
que ea erunt ministranda, quæ modice refri-
gerent, & astringant, vt per hæc roboratis, siue
in se collectis particulis, melius fiat ab intra ad
extra pulsio. Solent aliqui vti piscibus salitis,
inter quos tertio de alimentis pretiosissimam
ait esse sardæ salituram. Qui sane tunc laudādi
sunt, cum natura segniter opus expulsionis
aggrediatur, ob salis incisiuam qualitatem, &
acutam penetrationem, & crassos humores
in tenues soluendo, tenues in fumum dige-
rendo, fumum, & fuligines ad cutim, pellēdo.
& vbi lentos humores ad expulsionem talem
ineptos præpararunt, viarum etiam occlusio-
nes aperiunt, & partes corporis, ob salis com-
pressionem in se inuicem collectas roborant
tamen si melius sit eos in succo acetosæ per diē
integram prius macerare. Sed hæc de ratione
viuendi in febribus. Quoniam vero nōn so-
lum alteratione indigent humores vitati, sed
etiam euacuatione: quæ propter perpenden-
dum erit, vtrum euacuatio fienda sit vitati
humoris duntaxat vtili relicto, an vero om-
nium humorum: Et si opus erit euacuatione,
id solum quod vitatum est, quod medicami-
ne fieri debet, vt recte, & conuenienter fiat,

*Refrigeran-
tia calida
& fumosa
vitanda.*

Pisces saliti.

*Ad purga-
tionem re-
cte instituē-
dam 4.
requiruntur.*

*Purgandi
uantitas.
Tempus.
Locus.*

*Præparatio
purgationi
præmitten-
da est.*

*Cōsideratio
circumstan-
tiarum in
purgatione.*

ipsa quoque ex quatuor rerum obseruatione
erit fienda: affectus scilicet, loci in quo reperi-
tur affectus, & ipsius medicamenti, amplius & 14
circumstātiarum: affectus quidem vtrum sim-
plex sit humor qui purgari debet, an implici-
tus: quantitas vero purgandi a quantitate hu-
moris replentis, & ab humoris vario situ, pro
vario trium regionum in corpore existētium
situ: tempus vero purgandi tum a coctione
materiæ morbi, tum a materiæ impetu: locus
vero per quem cōmode purgatio fieri potest,
tum ex indicatione humoris purgandi, tum a
facultate expultrice illius humoris, tum a va-
forum consensu, per quem humor inclinans,
& a natura pullus a vi medicamenti duci de-
bet. Quanquam humor antequam ad extra
corpus ducatur, præparatione, eaque duplici
opus habeat, altera vacuandi humoris, altera
vero corporis, quo viæ in aluum pertinentes
patentes sint. In circumstantiis vero, primum
virtus occurrit, vtrum valida sit, an imbecillis:
& quodcunque horum sit, an cum multa, an
vero cum pauca cacochymia associata: deinde
consideratio habenda ætatis, quod nec puerū,
nec senem liceat malignis medicamentis pur-
gare, nec prænantem, nec qui habitu sunt
raro & macilento, nec qui animi accidentibus
subiecti sunt, nec æstate, nec hyeme, nec in re-
gione quæ sit aut nimis calida, aut nimis frigi-
da. Sin autem opus erit euacuare non quidem
vitiatum humorē vtili relicto, sed vniuersum
san-

sanguinem, & omnes humores sanguini ad- *Missionis*
mixtos, ad eundem modum & ipsa recte fiet *sanguinis*
euacuatio ex obseruatione eorum, quæ dixi- *requisita.*

mus esse obseruanda in arte curandi, affectu,
loco, & circumstantiis, (nam hoc remedii ge-
nus nihil habet quod indigeat emendatione)

Ex affectu quidem, quod genus repletionis
indicet genus euacuationis, & distincta, & de-

terminata species repletionis, distinctam, &
determinatam speciem euacuationis. Quare

*Indicatio-
nes ex reple-
tione.*

perpendendum erit an repletio sit simplex, id
est quo ad quantitatem solum, videlicet quod

quantitas sola sanguinis peccet: an implicita,
ita quod & quantitas sanguinis peccet, & qua-

litas aliorum humorum a sanguine, idque aut
omnium, aut vnius humoris determinati. & si

simul cum quantitate sanguinis peccet aliquis
determinatus humor, an humor ille determi-

natus non multum recedat a natura sanguinis,
an vero multum recedat: & si multum recesserit,

utrum recedat secundum quantitatem, an
secundum qualitatem, an vero secundum utrū-

que. Quod ubi peccet sanguis secundum qua-
ritatem, solum, euacuandum sit per phleboto-

*In synocha
non putrida
missio san-
guinis.*

miam usque ad syncopim; quemadmodum fit
in synocha absque putredine. Vbi autem pec-

cat non solum quantitas sanguinis, sed etiam
qualitas aliorum omnium humorum sit vitia-

ta, cum virtus in huiusmodi complicatione
adesse non possit, velut in pestilentibus, pro

*In pestilen-
tibus eua-
cuatio qua
competat.*

sectione cum cucurbitulis procedimus, pro

Xx 3

*Purgatio
debet pra-
cedere phle-
botomia.*

*Circumstā-
tia in mes-
sione san-
guinis.*

*De euacua-
tione in fe-
bribus.*

euacuatione vero cum medicamento, epicra-
sim facimus. Sin autem simul cum quantitate
sanguinis, aliquis determinatus humor vitia-
tus sit, qui non multum recedat a natura san-
guinis, sectione venæ solum satisfacere pote-
rimus. Vbi autem simul cum quantitate san-
guinis aliquis humor determinatus vitiatu-
s redundabit, aut vitiū sit penes qualitates, aut
penes quantitatem, aut vtrunque, iis omnibus
vtriusq; succurrendum erit, tū medicamine, tū
phlebotomia. In his omnibus tamen erit in-
cipiendū a medicamine, postea sanguis mittē-
dus erit, dummodo in ea quantitate non mit-
tatur, qua mitti solet peccante sola sanguinis
quantitate. Circa circūstācias vero, in sectione
venę virtus valida esse debet: etas nō debet esse
puerilis, nec in diebus canicularibus, nec in
regione calidissima, nec vbi adsunt sympto-
mata, veluti ventriculi imbecillitas, aut vteri
gestatio, præsertim octauo, aut nono Men-
se. His iactis fundamentis, sequitur vt percurra-
mus modū euacuādi febres. Cū quatuor enim **B**
sint species febrium, quotiescunq; peccāt hu-
mores febris, sanguinea, choleric, phlegmati-
ca, melancholica, fiantq; hæ febres putrescen-
tibus quatuor his humoribus, quotiescunque
peccat sanguis, id contingit vel ratione quan-
tatis sanguinis, vel ratione sanguinis putre-
scētis: si ratione quantitatis, dictum est quo-
modo huius speciei febris curanda sit per san-
guinis missionē: si vero ratione sanguinis pu-
trescētis,

trescentis, dictum fuit superius ex sanguine
 putrescente quod subtile in sanguine est verti
 in bilem, quod crassum in melancholiam, ut
 iam constet febres triū specierū tantummodo
 per euacuationem curari, secundum febrē ex
 bile, febrē ex pituita, febrem ex melancholi-
 ca. Et quāuis possint inuicem postea compli-
 cari hæc febres, nihilominus in præsentia tan-
 tummodo percurremus modū euacuandi sin-
 gulas species simplices harum febriū, quoniā
 ex simplicibus facile compositarum euacuan-
 di modum habebimus. Incipiendum ergo est
 a febre biliosa, quam dicunt tertianam, cuius
 medicamenta euacuantia sunt in duplici diffe-
 rentia, vel simplicia, vel cōposita: simplicia sunt,
 cassia, manna, & his leuiora pruna damascena
 exsiccata ex hispania, quæ omnia bilem ipsam
 educunt: composita vero sunt syrupus rosatus
 solutius, electuariū rosatum Mesuæ, electua-
 rium ros. Nicolai, rhabarbarum in infusione,
 cum decoctione florum, fructuum cordialiū.
 Cæterū a proprietate præstantissima sunt hæc
 medicamenta, rhabarbarum & scammonē,
 quæ medicamenta fere ingrediūtur pharma-
 ca omnia eductiua cholerae. Phlegmaticæ vero
 febris tum simplicia tū cōposita medicamēta
 eductiua, sunt semina carthami, agaricus, co-
 locynthis, etsi laboriose soluat, nihilominus
 auxilia sunt propinanda omnib. illis adiunctis
 quæ possunt naturam effrenē eius corrigere,
 composita autē sunt Diaphinico, Diacartamū,

*In febre ter-
 tiana medi-
 camenta
 euacuantia
 simplicia &
 composita.*

*Bilem va-
 cuantia.
 In phlegma-
 tica febre
 vacuantia.*

*Pituitam
 vacuantia.*

*In febre me-
lancholica
vacuatio.
Melanchos-
liam pur-
gantia.*

*In febribus
mixtis quo-
modo va-
cuandum.*

Diatribith, electuarium lenitutum cum agarico trochiscato, & possunt etiam hæc omnia inuicem misceri. Febris autem melancholicæ simplicia auxilia sunt, radices ellebori nigri præparatæ, sicuti docebat Gal. in raphano: lenē non modo folia, sed etiam folliculi: & de compositis electuariū Indum, cōfectio Hamech, decoctio Epithymi descriptione diuini Mesuē, quæ omnia educunt melancholiā ipsā; & in propinandis his omnibus medicamentis ea omnia consideranda sunt, quæ dicta fuerūt ratione temperaturæ, ætatis, sexus, regionis, temporis anni, exercitiorum, & propriæ vniuersi cuiusque naturæ: eo modo ægrotis offerenda, & sub ea forma, quæ facilior videbitur, vel vt deglutiant, vel vt sorbeant. Et hæc fere sunt medicamēta eductiua humorum in febribus ipsis simplicibus pēdentibus ab vno humore tantum. Sin autem fuerint mixti humores, ex consequenti mixtæ febres, vt puta tertiana cū quotidiana, vel tertiana cum quartana: tunc consideranda erit febris illa quæ intensior sit, vt si inuicem medicamēta misceantur, maior portio sit illius medicamēti quod respicit humorem febris intensioris, non neglecta altera febre, hocque modo educuntur, siue euacuabuntur humores singularum febrium dictarum. Hactenus dictum sit de curatione febris implicitæ cum causis & symptomatibus diuersis, habita etiam ratione corporis, & circumstantiarum. Vt autem curatio affectuum simul

44 simul implicitorum magis elucescat, sequitur
 vt percurramus quosdam alios affectus simul
 implicitos, in quibus cerebrum ipsum sit affe-
 ctum. Sit, exempli gratia, intemperies in cere-
 bro continens, materia sit humor quicunque,
 corpus etiam vniuersum sit, repletum, ad quā
 capitis intemperie sequatur hoc symptoma,
 quod dolor appelletur. Pro recta horum affe-
 ctuum simul implicitorum curatione, prius
 oportebit memoriæ habere artem illam cu-
 randi, vnde hauriuntur modi recte admini-
 strandi remedia, & depellendi affectus. Hac
 autem cum tria sint in genere, affectus, locus
 affectus, & virtus cum reliquis virtuti annexis,
 & morbus, vtrum sit in complexione, vel cō-
 positione, vel solutione continui, an morbus
 compositus: & si intemperies, vtrum simplex
 vel composita: & quodcunque horum sit, cum
 materia, an sine materia. Etenim si erit cum
 materia, tunc non solum indicabit eam esse
 alterandam aut remouendam per contrariū,
 cum sit præter naturam, licet magis compositam
 exhibebit indicationē: nempe alteratio-
 nem & euacuationem: materiaque erit distin-
 guenda vtrum sit in loco præter fomentum
 aliunde, an cum fomento: etsi cum fomento,
 vtrum foueatur ab aliqua corporis parte, an a
 corpore vniuerso: quoniā fluxa indicabit eua-
 cuationem, fluxura vero auersionem ad partē
 oppositam: primumque fienda erit auersio
 fluxuræ, quam euacuatio materiæ fluxæ, de-

*De affectib.
 aliis impli-
 citis.*

*In dolore
 capitis ab
 intemperie
 cerebri con-
 tinente cor-
 pore vni-
 uerso reple-
 to.*

*I.
 A morborū
 considera-
 tione indi-
 cationes.*

*In intemperie
 cum mate-
 ria indica-
 tio.*

*Materia
 fluxa &
 fluxura
 quid indi-
 cet.*

II.
*A loci affe-
 cti conside-
 ratione
 indicatio-
 nes.*

*In cura ner-
 uorum va-
 lide abster-
 gentia &
 mordicantia
 sunt fugi-
 enda.*

mun fluxa erit euacuanda: Ad sciendum autē quo instrumento sit euacuanda, distinguenda erit materia: quia si tota erit bona, per phlebotomiam: si tota mala, per pharmacū: si partim bona, partim mala, per hoc, & per illud instrumentum: ante medicamen præmittēdo semper antecedentem præparationem & concoctionem. distinctus autem præparandi modus sumendus erit a qualitatibus ipsius materia: viscida scilicet abstergendo, crassa incidendo, acria obtundendo. His decursis quo ad morbi cognitionem, considerandus dein erit locus affectus, vtrum sit nobilis vel ignobilis: quoniam membrum nobile, vt cor, ventriculus, cerebrū, indicabunt statim esse occurrēdum: membri operationes, verum vitæ necessariae, veluti cordis & cerebri, indicabunt calorem innatum, & spiritum recreari debere, & augeri: toti corpori necessariae & ministrantes, vt ventriculi, & hepatis: esto quod relaxantibus indigerent, indicabunt tamē calorem innatum in illis esse retinendum, & constringentibus aliquo modo vtendum, quæ tonum membrorum conseruet, membri sensibilitatē. Ob id in nervis cauet Galenus a valide abstergentibus, & mordicantibus, etiam quod valida abstersione indigeamus: membri considerata etiam fuerit temperatura, & gradus tēperaturæ, membriq; habitus, vtrum laxis an durus: membri insuper communicantia, qua ratione Hip. 4. de ratione victus in acutis, commiscēda esse voluit odorata,

odorata, ratione communicantiæ, oris ventriculi cum corde: & in cura neruorū cauemus a mordicantibus ratione communicantiæ cū cerebro: Situs membri, quia profundis fortiora, vt in affectibus pectoris, superficialiis mitiora exhibemus. Deinde ad virtutem erit accedendum, quæ indicationem longe diuersam a morbo, & loco affecto indicabit: Nam sicuti morbus semper indicat ablationem, & depulsionem, ita virtus semper indicat conseruationem, & sui retentionē. locus vero affectus inter hæc duo medius, vtrumque indicat, ratione morbi ablationem, ratione vero sui vt conseruetur. Virtus autē in duobus consistit, in spiritibus, & mēbris solidis: addamus & humores, quæ Hippocrates appellare solet solida, impetentia, & fluentia. Vnde spiritus, si pauci erunt, indicabūt se esse multiplicādos. Si ratione humorū virtus erit affecta, aut erit ratione sanguinis, aut ratione aliorum humorum a sanguine: si ratione sanguinis, aut quia diminuti, aut quia aucti, vt in plethora. si primo, erunt augendi, si secūdo, diminuēdi phlebotomia copiosa: si ratione aliorum humorū, medicamento euacuandi. Sin autem hoc erit ratione solidorum, vel erit propter nimiam soliditatem, & astrictionem, ita vt spiritus collidantur, tuncque erit aperiendum: si propter nimiam laxitatem, erit stringēdum. Igitur cōceptis prius indicationibus, quæ ab his tribus desumūtur, accedemus postea ad intēpericē exi

III.

Indicationes a virtute.

Virtus consistit in tribus.

Virtus affecta propter spiritus.

Virtus affecta ratione humorum.

Ratione solidorum.

Curatio doloris ab in temperie capitis, cum sanguine peccante.

Ante euacuationem materia non competunt percussiones.

Repercussio nis scopus.

Repercussio nis qualia esse conueniat.

stentem in capite, a qua proueniat dolor: & si erit sine materia indicabit alterationē solam: sin autem erit cum materia, indicabit alterationem & euacuationem simul. Vtrum autem phlebotomia, vel medicamine sit euacuanda, indicabit id diuersitas ipsius materiæ: Etenim si pendebit a sanguine, phlebotomandū erit a cephalica eiusdem lateris, vbi est dolor. Facta euacuatione, fidenter poterimus accedere ad repercutientia materiam fluentem ad caput, conseruantem & augmentem dolorem. Neque enim percussiuā recte & conuenienter apponuntur, nisi prius præcellerit euacuatio. Quoniam stante multitudine, si ante euacuationem inciperemus a repercutientibus, maior esset vis, atque impetus multitudinis superius ascendentis, quam vis medicamenti percussiuī: vnde periculum esset propter prohibitionem euacuationis, ne fieret sphacelus. Repercussio autem cum fiat, vt fiat repulsio vaporum, seu materiæ ascendentis ad caput, causantis malam temperatiam, & solutionem continui: repercutientia autem frigida sint & crassa, cōsulendus erit locus affectus: qui cum sit caput, caput autem habeat cutim crassam, craneum crassum, ambas meninges, vt difficilis sit trāsitus, eorum quæ frigida sunt & crassa, ad ipsum cerebrum, nisi quid sit quod penetrat, ob id indicabitur, suscipiēda quidem esse frigida, sed in subtili substantia fundata, cuiusmodi sunt acida. Cum autem quæ subtilia sunt pungant,

pungant & mordicent, consequenter dolorē augeant, ob id indicabitur, acidis esse commiscenda ea, quæ crassioris sunt substantiæ, vt crassities obtundat subtilitatem & acrimoniā: hoc postea, vel illud augentes, secundum indigentiam maioris & minoris penetrationis. Atque hoc est illud, cui Gal. in libris de comp. med. per genera, emplastrum frigidum excicere cōfectum nervis adhibeat, tamen si mordeat, & hoc, quod cum haberet spatium penetrandi magnum, illius frigiditas in itinere remittatur. Igitur in dolore capitis optimum re-percussuum erit aqua rosacea, oleo rosaceo & aceto admixta. Neque enim timenda est stipticitas olei rosacei, quoniam vt ait Gal. 3. de sim. med. cap. 9. eius stipticitas non solum non im-

In nervorum affectum emplastrum

pedit penetrationem, quinimmo eā adiuuat, & est veluti vehiculum: & dat exemplum: si corium oleo rosaceo illinatur, magis intrinsecus humectabitur, quam ab alio oleo. Et hoc, quod rosaceum modica illa stipticitate vtatur tanquam manu exprimente. Oleum igitur rosaceum optimum erit tum ratione penetrationis, tum etiam quia sedat dolorem. Ob id

Rosaceum oleum.

in inflammationibus membrorum capitis, timentes inflammationem chirurgi, semper infundunt oleum rosatum. Ponitur autem aqua rosata, quod sit subtilior oleo rosato, & magis humectet. Apponitur autem acetum propter penetrationem, quæ si super niuem erunt refrigerata, adhuc erunt meliora: & hoc, quod

Inflammationes membrorum capitis.

tunc non solum potentia, sed actu quoque frigida sint. Etenim quæ actu frigida sunt, calorem præter naturam magis vincunt quod non ita efficere potest id, quod potentia frigidum est: cum prius, quam refrigeret, ad actum habeat deduci ab ipso calore. Atque hoc est illud, cur Gal. 2. de comp. med. per loca, omnia remedium genera in niue refrigerata conficiat. Non ignorandum tamē est, in usu horum repercutientium, si dolor non cessabit, in illis non esse perseverandum: & hoc, quod ut ait Gal. 13. meth. vtētes frigidis, & in illis perseverantes, ad talem cōstipationem possemus devenire, vt calor naturalis exstingueretur. Vnde corpore mundificato, tuto poterimus procedere cum iis, quæ habent vim subtiliandi, & maturandi sine vi calfactiua; vt accipientes semina vel radices, aut folia ibisci, aut althææ, vt ait Gal. cap. de ibisco, quia maturant, resolvunt, & dissolunt sine attractione, in hunc modum, extrahentes mucilaginem ab ipsis seminibus althææ; accipiendo seminum althææ vnc. ij. agitentur quousq; viscositas extrahatur. Quoniam autem medicamentum ex se est crassum, ideo addendum erit acetum, vt possit deducere medicamentum, quod alioquin ex se est viscosum. Euacuato sanguine, applicitis repellentibus, victus ratio erit instituenda. Cumq; ex dictis adsit dominiū sanguinis, indicabitur abstinendum esse a carnibus & vino, vt recte etiā ait Rasis: & hoc, quod plurimum in se habeant

Actu frigida.

Frigidis & repercutientibus quousque utendum.

Maturantia & resolutiva sine caliditate.

Althææ semina.

Victus ratio in dolore capitis a sanguine.

beant alimenti. Quoniam vero peccat humor sanguineus calidus, & humidus, indicabit victus rationem frigidā, & siccā. Quorū vtrunq; cum lentes habeant, ob id pro cibo maxime *Lentes.* conuenient. Etenim dum parum nutriunt, consulant alimento, quod intus gerunt: dum vero frigidum, & siccum alimentum prebent, qualitatibus morbi obuiant: Poterit addi accētū, quod habet vim extenuandi, & exsiccandi. Et si lentes decoquantur in aqua cum herbis frigidis, cuiusmodi sunt lactuca, endiuiā, & huiusmodi, adhuc magis refrigerabūt. Euacuato sanguine, applicitis repellentibus, ordinata victus ratione: transeundum erit ad medicamentum, quæ quidem leuibus medicamentis erit agenda: & hoc, quod in ægitudinibus a calida materia pendentibus, a fortibus medicamentis sit cauendum, quod magis calfaciāt & exacerbent. Atq; hoc est illud, cur Gal. 2. reg. acut. ad- moneat euitandū esse elleborū, & peplium in pleuriticis, quæ sunt medicamenta calida: tamet si Hippocrates iubeat illa exhiberi debere: & hoc, ne illis agitentur humores, qui possent precipitari ad aliquem locum nobilē. Sed purgandum erit benedictis medicamentis in hunc modū: Ex mirobalanorū citrinorū vnc. iij. habent enim vim mundificandi sanguinē a cholera, & reddēdi ipsum magis benignū, qui grosso modo conterantur, & infundantur in aqua endiuiæ per noctē, prunorū numero 10. intelligo autem pruna hispāna, non autem

Curatio.
In affectibus
calidis faci-
enda sunt
med. fortia.

Pleuriticis
elleborus &
peplium
vitanda.

Mirobalani
citrini pur-
gant bilem.

*Pruna da-
mascena &
hispana.*

*In dolore
capitis ab
intemperie
cerebri a
materia
biliosa pur-
gandum
leniter.*

*Missio
sanguinis.*

*Victus
ratio.*

Lentes.

Acetum.

damascena, quæ sunt acerba, & constringunt. Quare hispana, aut alterius generis dulcia erunt eligenda, quoniam ratione dulcedinis sequitur laxatio, tamarindorum drac. vj. decoquantur, & addantur vnc. ij. sacchari albissimi. Sed hætenus dictum sit de curatione intemperiei cerebri causantis dolorem, & associatæ cum materia sanguinea. Sequitur ut aggrediamur curationem intemperiei cerebri, pendētis a materia biliosa. In qua quidem non erit incipiendum a phlebotomia, sicuti diximus fieri debere ubi adest materia sanguinea: sed incipiendum erit a solutione ventris cum mitibus, & lenibus, cuiusmodi sunt myrobalani, tamarindi, pruna, cassia, manna, & huiusmodi: & hoc, quod in maximis doloribus, & febrib. non conveniant fortia medicamēta, & scamoneata. Facta ventris solutione si dominium B bilis non multum distabit a natura sanguinis, mittendus erit sanguis, sed parce, in ea quantitate quæ videbitur prudenti medico. Quod si dominium bilis tale erit, ut plurimum distet a natura sanguinis, nullo modo mittendus erit sanguis. Victus autem ratio eadem ferme conveniet, quam diximus convenire in intemperie a materia sanguinea, de herbis illis frigidioribus nemini dubium. Lentes etiam convenient, quoniam cum bilis sit tenuis, & erodens indiget alimento obtundente, habente substantiam emplasticam, quæ humorē crassificat, & degenerare facit. Acetum mire conveniet,

ueniet, quoniam vt ait Hippoc. 3. acut. 16. acetum ideo conuenit picrocolis quia facit degenerare bilem in pituitam. Nam tametsi in frigiditate vix primum gradum pertranseat, refrigerat tamen magis quā ea, quæ frigida sunt in tertio. Et ratio sumitur a Galeno 11. simpl. cap. de castoreo. Nam castoreum, etsi non sit virtutis ita calidæ, & exsiccantis, sicuti sunt alia multa, longe tamen magis exsiccat, & calfacit iis, quæ ipso calidiora sunt & sicciora: & hoc ratione tenuitatis substantiæ suæ, quæ penetrat ad profundum: quod nō faciunt alia crassiora, licet calidiora sint. Eadem ratione acetum dicitur esse frigidum, quod sui tenuitate possit penetrare ad in frigidāda loca, ad quæ alia peruenire non possunt. Vt hac ratione Galen. 4. simp. med. 11. dicere potuerit, si accipiatur mel & acetum simul in pari portione, quod in hoc composito longe magis refrigerabit acetum, quam calfaciat mel, cum tamen totum oppositum facere deberet: & hoc, quod mel calidū sit in secundo, acetum vero frigidū in primo. Quod alia ratione nō contingit, nisi quia mel est crassæ substantiæ, acetum vero tenuissimæ, ratione cuius subtilitatis potest ad ea loca peruenire, ad quæ nunquam mel peruenire posset. Postea descendendum erit ad loca, naribus iniiciendo frigida, & humida, vt oleum violatum, quod frigidum est, & humidum circa secundum. Notandum autem, quod vt ait Galenus secundo, & tertio de sim.

Castoreum.

*Acetum
plus refrige-
rat quam
ea quæ sunt
in 3.*

*Topica.
Oleum vio-
latum.*

Y y

*Ab oleo non
desumitur
denomina-
tio.*

*Auribus
frigida in-
fusa nocent.*

*Capiti fri-
gida adhi-
bentur.*

*Odoramen-
ta.*

medic.oleum est materia omnium liquidorū
sicuti lithargyrium durorum. Vnde quidquid
coquitur in oleo, ab eo nullam sumit quali-
tatem, sed a simplici accipit denominationē.
Poterit igitur in eo decoqui cucurbita frigi-
da & humida in secundo, vel nenufar, & fieri
oleum nenufarinum: & horum quodlibet su-
per niuem infrigidatum capiti poterit appo-
ni. Quæ tamen in auribus, aut alio sensus in-
strumento absque offensione non poneren-
tur ita in niue refrigerata: & hoc, quia non so-
lum offenderentur ratione qua sensus instru-
menta, cum operationes omnes a frigiditate
maxime lædantur, sed etiam quia neruola. Qua
ratione Galenus 2. de comp. med. per loca, ad
aurium inflammationem docet apponere in-
fusiones tepidas in auribus, & 6. & 7. therap.
Capiti tamen olea illa in niue refrigerata ap-
poni possunt: & hoc, quod frigiditas habeat
percurrere per partes crassas, vt per os cranei,
antequam perueniat ad substantiam cerebri.
Præter hæc conuenient etiam odoramenta ad
sedandum dolorem, præter infusionem in na-
ribus, & auribus factam, veluti caphura, aqua
rosata, & huiusmodi: veluti conficiendo po-
mum expulvere nenufaris, violarum, rosa-
rum, florum salicum, addendo caphuram, in-
uoluendo hæc omnia in syndone, & sæpe ir-
rorando aqua rosacea, vel violarum, vel vtra-
que simul. Quod si dolor non cessabit, sed in-
ualefcet maxime, tunc audet Rasis vti stupe-
facientibus,

146 faciētibus, opii scilicet, & caphurę granis duo- *stapes faci-*
 bus hordei. quod tamen opium Gal. 2. de cōp. *entia.*
 med. per loca, contra Apollonium, non esse
 exhibendum præcepit, nisi in doloribus, in
 quibus vel mortē, vel syncopim expectamus.
 At cum nunquam dolor capitis ad tantā ma- *Capitis do-*
 gnitudinem peruenire possit, vt valeat ægrum *lor an la-*
 interficere, vel in syncopim hominem trahere, *thali.*
 nunquam etiam erit administrandum. Ob
 id Galenus non accedit ad hæc mortificantia,
 nisi cum timet mortem: sed contentus est the-
 riaca noua, diaspermaton. Qua ratione 12. met.
 nunquam inquit esse occurrendum iis stupe-
 facientibus, nisi cum adsunt symptomata, quæ
 habentia rationem causæ ducant ad interitū.
 Quem secutus Auicenna dixit: Cum prouo- *Rhases ex-*
 caturus es somnum, non transeas papauer *hibet opium*
 album. Notandum etiam vnum aliud, quod *mixtum*
 Rasis audet exhibere opium cum re frigida *cum re fri-*
 commixtum, vt cum caphura, quod tamen *gida.*
 nunquam facit Galenus: sed vt habetur ex se-
 cundo de comp. med. per loca, calida medica-
 menta apponit, vt lac muliebre. Ob id in in-
 flammationibus auriū accipit opiū correctū,
 & duplum castorei. Quare vbi eo opus erit *In dolore*
 vt, eo vtemur admixto, vel cum croco, vel *capitis ab*
 cum castoreo. Sequitur curatio intemperiei *intemperie*
 cerebri, quæ sit associata cum materia pitui- *cerebri cum*
 tosa, & melancholica, a qua proueniat capitis *materia*
 dolor. Notanter autem materiam pituito- *pituitosa &*
 sam, & melancholicam simul posuimus, vt *melancholica.*

*Pituita &
melancho-
lia sunt ma-
teria affo-
ciata.*

*Localia non
sunt appli-
canda ante
vacuatio-
nem.*

*Odoramen-
ta.*

& Rasis: & hoc, quod si quis abundet atra bile, pituita etiam abundare soleat, 2. de temperamentis, quod utraque sint materia frigida. Qua ratione etiam antiqui in omni medicamento atram bilem euacuante magnam portionem ponunt eorum, quae pituitam purgant; cuiusmodi sunt hiera Archigenis, Galeni, Ruffi, Logodii, in quibus sunt colocynthis, agaricus, & genera titimalorum. Igitur in huiusmodi intemperie cum materia frigida, materia cum phlebotomia euacuari non possit, medicamine erit purganda, ante tamen erit praeparanda, & coquenda oxymellite, vel simplici, vel composito, vel scyllino, secundum fortitudinem subiecti, & materiae crassitiem: cum decocto betonicae, maioranae, salviae, cymini, vel anisi ad incidendum. Concocta materia euacuanda erit pilulis cochiis. Post corporis euacuationem, nempe quod nunquam sint applicanda localia ante euacuationem, localibus erit utendum, infusionibus capiti applicitis, & in naribus ex oleo sambucino, & oleo de been, quod est glans vnguentaria apud graecos, vel fiet pomum odoratissimum ex xiloaloe, ambra, & musco. Praebentur autem odores, quoniam odor est vapor tenuissimus ascendens ad caput, habens exsiccandi vim superfluitates, & sui vapore penetrans ubi non penetrat oleum. Poterit etiam insufflari muscus in naribus, praesertim in iis, in quibus est maxima frigiditas, & obstructio cerebri. Quod si dolor multum infestabit,

festabit, deueniendum erit ad extrema remedia, ad euphorbium, ad castoreum. In euphorbio enim est vis calida in quarto, cum ardore: castoreū vero & ipsum est maxime calfactiuū ratione tenuitatis substantiæ. Quātitas autem sumi poterit a Gal. i. de comp. med. per loca, cap. de alopecia, vbi ait quod singulæ vnciæ euphorbii adsit libra vna olei. hoc igitur modo confici poterit: Ex olei sambucini vnc. semis euphorbii, castorei anagrana 10. misce, & infundantur in aures. Sed hæc de curatione intemperiei capitis associatæ cum suis causis, & symptomate hoc, quod dolor appellatur. Sequitur vt agamus de curatione obstructionis ductuum cerebri, a qua prouenit amissio sensus, & motus, quod symptoma apoplexia appellatur. Quæ quidem recte fiet, si ab arte curandi ad curationem obstructionis ductuum descendamus. Cum igitur symptoma hoc, amissio scilicet sensus & motus remoueri non possit, nisi causa & morbus depellatur: cumque morbus sit obstructio existens in ductibus cerebri, indicabitur ab existentia huius morbi, cum sit in compositione, aperiendum esse. Amplius, considerandum erit, vtrum obstructio sit facta, an vero adhuc fiat, quoniam facta simplicem præbebit indicationem aperiendi. Sin autem adhuc fiet, complicitam, nempe aperiendi eam, quæ facta est, & prohibendi futurā, auertentes causam facturam obstructionem. Accidentia hu-

*Euphorbiū.
Castoreum.*

*Apoplexia
curatio.*

*Obstructio
quid indicet.*

*Apoplexia
morum
cognitio.*

Tempora.

*Apoplexia
causa.
Aer.*

*Missio
sanguinis.*

ius morbi adeo saeva sunt, ut saeviora excogitari non possint, quibuscum si associata erit virtutis debilitas, indicabitur nihil esse tentandum. Mores huius morbi cognoscantur ex dictis symptomatis, & ex causis; quoniam si a sanguine, benignior erit: si a pituita, minus: si a melancholia, desperata erit, quod humor sit rebellis, nec cito euacuari possit, prout indiget saevum symptoma. Tempora in hoc affectu non erunt consideranda, licet adsit humor crudus, quia aegritudo non dat inducias ut concoquamus, sed extremo morbo extrema erunt adhibenda remedia. Motus autem huius morbi cum sit praecipuus cum difficultate anhelitus, indicabit non dari inducias, & statim esse agendum. Dein erunt considerandae causae ipsae morbi, seu obstructionis: & primo procatae: unde aeris erit habenda maxima ratio. Quare obstructione pendente a multitudine sanguinis suffocantis, aer frigidior, euentabilis, eligendus erit; si a pituita, aer calidior. dein ab intrinseca erit accedendum, primumque ad antecedentem quae si fuerit sanguis, indicabitur euacuandum esse per sanguinis missionem diuertendo. Ratione vero qua non dat inducias, indicabitur diuersionem non esse fiendam ad partes admodum longinquas, ut a saphenis: & hoc, quod ut ait Gal. 2. reg. acut. remedium vel esset tardum, vel nullum. Ob id altera cephalica, vel utraq; erit eligenda, & post duas, aut quatuor horas scindendae erunt apoplecticae post

post aures: et si necessitas vrgebit, incipiendum erit ab apoplecticis, indicatione sumta a motu præcipiti: vt fiat prompta deriuatio, & auersio. Sin autem causa erit pituita, indicabit euacuationem per medicamentum. Quoniam vero nõ possumus exhibere medicinas, veluti sunt pilulæ, cum non adsit in hoc morbo tempus illas exhibendi, quare indicabitur euacuatio- nem clysteribus acutissimis esse fiendam, indicatione tamen sumta a corpore affecto, & temperatura. Quoniam in puero, & etiam in muliere non erit faciendum ex colocynthide, & elleboro albo, & centaurea ponenda erit in minori quantitate. Frictionibus etiam vti solent, quæ in hoc morbo sunt leue remedium; vt deficiente instrumento phlebotomiæ, raro habeamus instrumenta quæ valeant ad huiusmodi morbum. Frictiones autem lenes esse debent, vt aperiantur pori, & materia exhalare possit, cum pannis calidis, & manibus fricantium tali medicamento inunctis: Ex olei amygdalarum amararum vnc. vna, euphorbii dra. j. castorei drac. ij. simul commixtis. Ratione enim olei, & castorei euacuamus poros: ratione euphorbii adurimus, dolor infertur, & sensus excitatur, bonum etiam erit oleum laurinum, de euphorbio, præcipue oleum de tartaro. Amplius, ligaturis vtendum erit dolorosis, quæ trahant deorsum, in brachiis supra cubitum, & coxis supra genu factis, cum frictionibus salis educentes.

*Pilula non
exhibentur.
Clysteres.*

Frictiones.

*Ligatura
dolorifica.*

47

Yy 4

*Localia
quando ad-
hibenda.*

*In suffoca-
tione spiri-
tuum a pi-
tuita.*

*Arthritis
curatur
paralyſi.*

Dein accedendum erit ad eam cauſam morbi coniunctam, vtentes localibus. Non ignorandum tamen eſt, localibus non eſſe vtendum, niſi prius diuerteris a ſuperioribus ad inferiora, & niſi prius euacuaueris materię coniunctam. Vnde male operantur, qui incipiunt capiti apponere patellam ignitam, cum plus materię attrahant. Amplius vtendum erit iis, quę faciunt euentationem. Si fuerit ſuffocatio ſpirituum a pituita, calidis digerentibus vtendum per poros, vel attenuantibus, vt deſcendat per nares, per os, vtque tandē fiat paralyſis: & hoc, vt amittamus potius partem, quam corpus vniuerſum. Vel euacuando cauſam coniunctā ſimplici deriuatione, vt apponendo ſanguisuga poſt aures, vel ſecando venas aut naſi, aut frontis deriuādo. Quod ſi huiusmodi dum ſiūt diuerſiones, continget raptus ad caput, ſupra caput ponendum erit oleum roſatum cum aceto. Factis hiſ omnibus, quoniam non erit amplius intentio reperiendi, remouendū erit oxyrhodinum, & ventolaſ apponemus cum ſcarificatione, abraſo prius capite, fouentes, caput decocto anethi, camomillę liliorum alborum, vt materia per halitum exhalet abſque attractione. Item circa nares ſternutatoria vtroque elleboro, ſucco ciclaminiſ cum melle in naribus inſtillato, ſucco elaterii, inſufflantes penna piper. Quod ſi materia tranſeat ad paralyſim, tunc ad partem affectam conabimur trahere, & materia trahetur ad

tur ad locum, ut ager euadat paralyticus. Hactenus dictum sit de curatione obstructionis exsistētis in duobus cerebri, a qua proueniat apoplexia, & cuius actuali paroxysmo affligatur patiens. Sequitur ut agamus de curatione huiusce morbi, cum iam sublatus est paroxysmus. Etenim etsi remoto paroxysmo coniuncta causa sit remota, cum tamen causa antecedens non sit remota, quæ totum corpus obsidet, sequitur circa causam antecedentem esse insistendum. Et quoniam locus affectus, cerebrum scilicet, propter paroxysmum tam sauium euasit imbecillum, tum propter spirituum resolutionem, tum propter refrigerationem, sequitur locum quoque affectum curandum esse. Quoniā vero remoto apoplexiæ paroxysmo, non propter hoc remouetur omnia symptomata, sed aliquando post ipsam relinquitur paralytis, stupor sensuum, priuatio vocis & sermonis: sequitur & huiusmodi symptomata esse remouenda. Quo igitur ad causam antecedentem cum sit materia, indicatur eius euacuatio: euacuari autem cum non possit, nisi prius præparetur: modus præparandi sumendus erit a qualitatibus ipsius materiæ. Cū igitur sit viscida & crassa, indicabit absterisionem & incisionem. Huiusmodi autem præparatio fieri poterit duplici instrumento: tum victus ratione in sex rebus non naturalibus, tum iis quæ habent rationem medicamenti. Quo igitur ad victus rationem, cum intentio sit inci-

*Apoplexia
post paroxys-
mum cura-
tio.*

*Causa ante-
cedentis
curatio.*

Præparatio.

Vitius.

dere & attenuare, eligendus erit aer calidus, vel arte erit parādus rebus calidis, siccis, odo-

*Aeris calidi
preparatio.*

ratis, quæ tamen non repleant caput. Poterūt igitur cum aceto exstingui. vnde caryophyl- lum conueniet, nux muscata, nigella in olla

*Somnus &
vigilia,*

puluerizata, vbi sit acetum cum aqua rosacea, quæ bulliant in cubiculo. Ita enim aerem cal- facient, & exsiccabunt. Quo ad somnum & vigilias, inclinet potius ad vigilias, & somnum præcipue meridianum, tanquam caput replē- tem, aufugiat. Quo ad animi accidentia, irasca-

*Animi ac-
cidentia.**Motus &
quies.*

tur, vt accendantur spiritus, & calor innatus. Quo ad motum & quietem, bonum esset ex- exercitium, si posset exerceri. Ob id iussit Pau- lus, vt super currum portetur: quod tamen tu-

B

tum nō est: sed loco exercitii melius erit vt fri- ctionibus longis calidis vtatur, manibus ante præparatis cū oleo calido & sicco. Quo ad cibū

*Cibus &
potus.*

& potum, tenuis sit & attenuans, id est subti- lians, vt materiæ concoqui possint. Vnde alte- randum erit alimentum calidis & siccis, & a-

cribus, quæ humores attenuent, veluti carne pullorum, hædina, auium montanarum par- uarum habentium paucam superfluitatem, in

iufculis decoquentes anethum, caryophyllos, anisum, macim, cyminum, atque ea quæ sunt amara, vt incidant, vrinam prouocent, & ma-

*Aphorismus
de affectib.
rigidis.*

teriam concoquant: quæ regula communis est ad omnes ægritudines frigidas a pituita pē- dentes. vinum aufugiat, quoniam tametsi cal- faciat, & spiritus recreet, & vtroque indigea-

mus

mus calfactione scilicet cerebri refrigerati, & spirituum recreatione: quoniam tamen cum est in ventriculo euaporat ad caput, ideo ab eo cauendum erit: Quemadmodum etiā in syncope alicuius habentis ventriculum imbecillum, cum plurimo indigeant alimento, ratione cuius nil esset melius carne porcina: ratione tamen imbecillitatis ventriculi non poteris concoquere, ab ea abstinemus: sed loco vini exhibendum erit oxymel simplex, vel oxysaccharum simplex, in quo sit decoctum permixtum vel cymini, vel anisorū, vel fœniculi, vel cinnamomi, vel macis, vel nucis muscatæ secundum varium gustum. Sed hæc de victus ratione in sex rebus non naturalibus præparante, & concoquente. Sequuntur ea quæ cōcoquunt, attenuant, & abstergunt in ratione medicamenti: & sunt omnia genera syruporū, quorum electio indicabitur ab ipsius materiæ modis: quæ cum sit admodum crassa & viscida, indicabit sumendos esse syropos multum abstergentes, & incidētes, veluti oxymel scylliticum, quod ratione amaritudinis ipsius scyllæ abstergit, ratione vero acrium; vt aceri, incidit. Sin autem materia non erit ita crassa & viscida, syropos etiam eligemus minus incidentes, & abstergentes, vt oxymel simplex, syrupum de stœchade, de betonica, de hyslopo, pro varietate varii modi ipsius materiæ varium etiam eligentes præparandi genus, respiciendo semper pro eligēdis syrupis præpa-

Vinum nocet ratione vaporum.

Caro porcina cur imbecillo ventriculo non conveniat.

Syrupi abstergentes & incidentes.

*Vehementer
abstergetia
& incidetia
quibus no-
ceant.*

*Incidetium
correctio.*

*Aqua om-
nes distilla-
ta sunt fri-
gida.*

Vacuatio.

rantibus locum affectum. Quoniam etiã materia maxime abstergentibus & incidentibus indigeret: vbi tamen erunt contrariæ indicationes, vt puer vel mulier, vel stomachus debilis, non dabimus hæc vehementer præparantia, quoniam facerēt mordicationem. Ob id Gal. 2. meth. oxymellitis acrimoniam melle rosato corrigit, vt frāgat nimiam absterfionē, & acutiem quam timebat. Correctio autem maxime attenuantium fienda erit cum recreasfaciente. Et quoniam incidetia omnia acria sunt, cum emplastice eorum acrimoniam moderabimur: veluti ex oxymellitis scyllitici, syrupi de betonica, vel de stæchade, mellis rosati colati an. vnc. ß. decocti anisi, vel fœniculi, vel cinnamomi, vel omnium simul, vn. iij. misce, & detur in aurora, ad incidendum & abstergendum, tot syrupos exhibētes, quoad in vrina appareat concoctio. Notanter autem addidi horum decoctum, nō autem aquas: & hoc, quod aquæ omnes distillatæ frigidæ sint, etiã si a calidissimo aliquo simplici distillentur, præsertim ab herbis, etiam si fuerint fœniculi, maioranæ, calamenthi, absinthii. In materia vero calida aquas non timerem, veluti endiuia, violarum &c. Præparata materia, euacuanda erit pilulis cochiis, vel fœtidis, vel cum hermodactilis, confectioe hamech, vel hyera colocinthidis. Et vbi erit in loco, in quo non adsint hæc composita, opus erit habere artem componendi medicamentum. Haftenus de curatione,

rione, seu purgatione, & præparatione mate-
 riæ antecedentis. Sequitur vt aggrediamur lo-
 ci affecti curationem. Cerebrum enim post
 paroxysmum ita permanet attonitum, licet a-
 ctu non sit in paroxysmo, vt nonnulli attoniti
 & stupidi fiant, nonnulli vocem amittant. Hęc
 autem cum duabus præcipue de causis eueni-
 ant, tum quod facta sit maxima spirituum re-
 solutio, ratione quorum fiunt animales ope-
 rationes; tum etiam maxima cerebri refrige-
 ratio: sequitur igitur, cum omnis indicatio fiat
 per oppositum, ratione resolutionis spirituum
 spiritus novos esse gignēdos: ratione vero ce-
 rebri refrigerati cerebrum esse calfaciendum.
 Spirituum autem generatio cum fiat, vt ait
 Gal. 6. & 7. de paci. & libro de vtilitate respira-
 tionis ex aeris consolatione: & hoc, quod spi-
 ritus cerebri ex illa aeris attractione nutrian-
 tur, cumque apoplexia ex multitudine pituitæ
 pendeat: sequitur igitur aerem declinare de-
 bere ad caliditatem, & siccitatem, vt cerebrū
 etiam refrigeratum calfiat. Amplius cū odor
 ita se habeat ad cor, sicuti sapor ad nutrimen-
 tum, & sicuti sapor amarus gustui est ingratif-
 simus, quod scilicet maxime contrarius sit sa-
 pori dulci, quo maxime nutritur homo: ita o-
 dor gratus indicat talem rem esse spiritibus fa-
 miliarem, a quibus recreantur, sicuti a fœtore
 terrentur. Quoniam vero spiritus animales
 non tantum gignūtur propter aeris attractio-
 nem, sed etiam ex sanguine calidiori tenuiori

*Apoplectici
 post paroxy-
 smum stu-
 pidi & ma-
 ti.*

*Spirituum
 generatio.*

Aer.

*Odoramen-
 tu.*

*Spirituum
nutritio.*

*Cerebri
calfactio.*

*Sinapismi.
Dropacismi.*

Pix.

*Theriaca.
Mithrida-
sum.*

nutriuntur: ideo indicabitur quod præter aerē cibaria quoque sint tenuis substantiæ, vt conuerti possint in bonum, calidum, & subtilem sanguinem. Et hæc quo ad indicationem, quā præbet spirituum resolutio. Cerebri vero refrigeratio calidis depelli poterit vel exterius applicitis: non quidem actualibus illis, quibus vtitur Rasis cum adest paroxysmus, sicuti patella ignita, sed rebus potentia calidis, vt sinapismis, & dropacismis factis ex rebus in tertio calidis, quæ attrahant ad extra: veluti sagapeno, pipere, pirethro, quæ calfaciunt, sed vesicas non faciunt, neque escharas. Pix etiam derafis capitis pilis illita rubificat, & mire calfacit. Sinapismi vero (vesicatoria appellantur, quod vesicas inducant) fiunt ex rebus in quarto calidis, cuiusmodi sunt sinapi, nasturtium, cantharides, thapsia, euphorbium. Aduertendum autem erit, iis non esse vtendum, neque aliquid capiti applicandum esse, nisi prius euacuata causa antecedente. Per interius vero calfacientia, & exsiccantia, adhibenda, sicut acores conditi. Et quia non inueniuntur, condiendus erit calamus aromaticus, nux muscata cōdita, caryophylli, zedoaria. Composita quinetiam, vt diacalamentum, diaspoliticum, diacyminum, diatrionpipereon, de quibus s. de tuen. sanat. Amplius theriaca, mithridatum, quod maxime facit ad calfaciendum, & spiritus roborandos, cum modico sacchari rosacei dra. ij. Amplius celebratū illud apud Arabes, & Græcos

cos remedium, quod cōfectio anacardina dicitur. Sequitur curatio symptomatum, quæ remanent post apoplexiam, vt est amissio vocis, & paralytis. Quæ quidem curabuntur eadē cura qua diximus curari refrigerationem, cōfectione anacardina, sinapismis, gargarismis.

Quo ad vocis amissionem, cum vocis harmonia duplici de causa possit amitti, vel propter deperditionem imaginationis & memoriæ: & hoc, quod non possit formari vox, nisi prius

Vocis amissio post paroxysmum apoplecticū.

B fiat imaginatio: quæ quidem erit curanda curatione amissæ memoriæ, & discursus: vel propter impedimentum in organo vocis, vt quia musculi linguæ sint resoluti, & laringis, & nervi reuersiui humoribus sint repleti: & hæc erit

Vocis harmonia duplici de causa amittitur.

curanda curatione paralytis: Sed sumendo indicationem a loco affecto, curanda erit per gargarismata, masticatoria ex rebus calidissimis facta, qualia sunt sinapi, nasturtium, piper longum, nigella, gingiber, calamentum, radix thapsiæ. Ratione vero qua opus est vt diutius in ore permancant, vt pluries possit masticari, indicabitur esse masticatorium fiendum cum cera. Quoniam vero mastix plurimum valet ad saluam prouocandam (vt forte masticatoria a mastice sint dicta) ob id mastix etiam ponetur in hunc modum: Ex staphisagriæ, pyrethri, gingiberis ana scrup. ij. masticis drac. j. ceræ vnc. ss. fiant pastilli parui, qui mandantur. Nam ratione masticis saluam maxime prouocabunt, ratione ceræ pertinaciter adhærebunt, & non re-

Mastix.

Pastilli.

*Curatio
phrenitidis.*

*Quid phre-
nitis.*

*Indicatio-
nes a ma-
teria flu-
ente.*

*Phrenesis
ex pleuri-
tide.*

soluentur, ratione vero aliorum pituita maxi-
me educetur. Sed hæc de curatione obstru-
ctionis ductuum cerebri. Sequitur ut agamus
de cerebri inflammatione illa, quæ phrenitis
dicitur. In cuius curatione eodem modo, sup-
posita methodo indicationum unde sumatur,
ut ab affectu, loco affecto, & circumstantiis, in-
cipiendum a morbo est, cuius prius distincta
cognitio cum sit habenda, cumque phrenitis
sit inflammatio, seu tumor præter naturam cau-
satus a defluxu materiæ calidæ ad locum cere-
bri, distinguenda erit hæc materia calida, utrum
sit ichor sanguinis, vel bilis, vel pituita salsa: &
quodcunque horum sit, utrum peccet quan-
titate, vel qualitate. Nam si quantitate pecca-
bit, indicabit quod debet euacuari: si qualita-
te, ut si caliditate, & siccitate, quod debet alte-
rari, refrigerari, & humectari. Demum distin-
guendus erit iste defluxus, utrum iam fluxerit,
vel partim fluxerit, partim fluat: & utrum de-
fluat a toto corpore, vel a parte ad partem, vel
a capite tantum. Quoniam si a toto, indicabi-
tur totum esse euacuandum: si a parte, ut eua-
cuemus illam partem, & trahamus versus par-
tem mandantem: ut si ex pleuritide fiat phrene-
sis, trahendum erit ad locum, qui prius erat
affectus, ad partes thoracis, cum scarificatio-
nibus, rubificantibus, sinapismis, frictionibus,
diuertendo humorem ascendentem ad caput:
& hoc indicatione sumpta a loco mandante. Si
vero fuerit in capite tantum, aduertenda erit
pars.

pars affecta. Et supposito quod exterius sit
 causa, vt ambulatio in sole, a qua caput calfiat,
 ex qua calfactione materia trahatur per venas
 demum ad membranas, tunc caput euacuan-
 dum erit, circa verticem capitis apponendo
 ventosas, vt a centro ad circumferentiam edu-
 catur materia: & in spatulis, dum modo in toto
 non sit plenitudo, quia tunc materia trahere-
 tur ad caput. Sin autem deueniet inflammatio
 per fluxum materiae per venas, cum humor sit
 permixtus sanguini, euacuandum erit per san-
 guinis missionem, eam copiosam & non co-
 piosam facientes, secundum quod magis vel
 minus humores distabunt a natura sanguinis: vt
 in ichore sanguinis, copiose; in bile mixta cum
 sanguine, minus, in pituita salsa mixta cū san-
 guine, adhuc minus. Et hæ erunt indicatio-
 nes a materia fluente. Indicationes autem a
 materia fluxa duplices erunt, secundum quod
 materia dupliciter potest esse fluxa. Nam vel
 erit fluxa hoc modo, ita quod adhuc existit in
 venis circumiacentibus & paruis, vel in cavi-
 tatibus loci affecti, vt repleat locum, & faciat
 tumorem; vel ita erit fluxa vt iam fecerit ab-
 scessum. Si erit fluxa primo modo, non pote-
 rimus euacuare a loco affecto, quia locum af-
 fectum irritaremus, plus attraheremus ad lo-
 cum, & aggritudinem augeremus. Vnde hic nō
 conuenient scarificantia, & resoluentia, nec
 diuersiones a longinquo, quia conueniunt
 materiae fluenti. Quare in materia hoc modo.

*Phrenesis
 ab ambula-
 tione in
 sole.*

*Indicatio-
 nes a ma-
 teria fluxa.*

Z z

Indicationes a temporibus morbi.

Phrenitis lethalis.

Phrenitis alia est per essentiam alia per consensum.

fluxa tantum deriuabimus procedentes cum repercutientibus. Sin autem materia ita fluxa sit, vt fecerit abscessum, tunc non amplius conueniet deriuatio, quia materiã putridam circa venas traheremus, quæ tendit ad saniem, sed conueniet vel scarificatio, vel resolutio cum calidis. Decursis indicationibus a morbo, & a causis morbi, deueniendum erit ad indicationes quæ sumuntur a temporibus morbi, quæ quatuor sunt; principium, augmentum, status, & declinatio. Ex quibus quatuor temporibus, principium est incommodius reliquis. quoniã cum morbus sit præter naturam, indicat ilico & in principio esse occurrendum. Secundario est declinatio. melius tamen est in principio, ne producat morbus. Augmentum est tertium, minus tamẽ commodum, maxime versus statum. His visis consideranda erit etiã pro recta cognitione morbi, malitia ipsius morbi, vtrum lethalis sit, vel non. Quoniam licet omnis phrenitis sit lethalis, aliqua tamen est quæ habet spatium, quæque est minus lethalis. Quæ quidem indicatio facit medicos cautos, vt videntes morbum lethalem, non exhibeant medicinas, ne calumnientur remedia, vt monet Galenus 11. metho. Amplius pro recta cognitione naturæ morbi, considerandum erit vtrum sit per essentiam, aut per consensum: & vtrum sit morbus verus, an non verus. Quoniam videmus aliam esse phrenitim verã, quæ est inflammatio membranarum cerebri ab humore

humore acri tenui, seu sit ichor, seu bilis, seu pituita salsa, non vera; aut ratione loci, vt quia non sit in mēbrana, in qua sit exquisita phrenitis, sed in substantia cerebri, aut ratione materia, veluti cum humor non erit tenuis, sed crassus, qua ratione etiam non habent veras vigilias, sed inclinantur etiam ad somnum: & hoc, quod media existat inter phrenitidem, & lethargum ratione humoris pituitosi. Habita cognitione indicationum quæ sumuntur a natura morbi, a morbo scilicet, causis, temporibus, & eius natura: perpendendus erit locus affectus, vtrum membrum sit carneæ substantiæ, an neruosa, an laxa, an dura, quas operationes habeat, an vitæ necessarias, an utiles, an ad superfluitates excrementorum excernendas, an nobile, an habeat communicantiam cum nobilibus, cuius sensibilitatis, an sit in profundo, vel emineat, an habeat vias, an possit recipere sanitatem. Vnde cum ipsa phrenitis sit in membranis cerebri: cum sciamus membranam esse valde sensibilem, elicimus medicamentum non debere esse mordax: Quia cum sit valde sensibilis, si dolor augeretur, periculum esset ne homo periret. Ratione vero qua scimus membranam esse in profundo, & quod intermedia dura sunt, & membrana quoque solida est, elicimus medicamentum locale debere esse subtilissimæ substantiæ. Ratione vero, qua scimus quod ex affectu membranæ simul quoq; sub-

Indicationes a loco affecto.

*Hordeum.**Indicationes a virtute.*

stantia cerebri afficitur, in qua fiunt operationes tam nobiles, elicimus cauendum esse a multum infrigidantibus, & spiritus corroboramus, quibus plurimis indigemus pro tot operibus obeundis. Ob id odorata miscemus, sicuti fecit Rasis, qui in locali pro phrenitide hordeum miscuit propter familiaritatē, quam habet cum natura, cum sit alimentum, spirituum confortatiuum. De ductibus, per quos cerebrum potest euacuari, cum multi sint commodiores eligemus. His perpēsis quo ad morbum, & locum affectum, accedendum erit ad virtutum, a qua quandoque nullam indicationem sumemus, quandoque totam, ita quod ipsi penitus est attendēdū aliis neglectis: quandoque vero medio modo, altero oculo ad virtutem, altero ad morbum respicientes. Virtus igitur si erit valida, negligemus eam, & ambos oculos vertemus ad morbum, ut illum tollamus. Sin autē debilis erit, ambos oculos vertemus ad virtutem, non respicientes morbum, cum natura sit operatrix, medicus vero solum minister, ut Gal. 12. meth. qui in syncope ex dolore nutrit in principio accessionis, neglecto prorsus morbo. Si vero virtus medio modo se habebit, ut nec morbus ita saeuus sit, nec virtus ita debilis; tunc respiciendum erit altero oculo ad virtutem, altero ad morbum. Nam morbus vel erit breuissimus, vel brevis, vel longior. Si breuissimus erit, ita ut terminetur in quatuor diebus, victu tenuissimo utemur, ita ut

ita vt nihil demus , ac tantum cibi indulgen-
dum erit, quantum morbus erit vel longior,
vel breuior: ea omnia considerantes, de quib.
diximus cum ageremus de arte tractandi pri-
mum instrumentum medicorum. His tribus
consideratis, perpendemus etiam alia septem
annexa, quæ coadiuuant. Nam si morbus erit
calidus, & siccus in regione calida & sicca,
sciemus quod morbus acrior erit, & sic de cæ-
teris. Sin autem hæc omnia erunt contraria,
minus, quia tunc habebunt rationem reme-
diorum. His omnibus recte cōsideratis, quo-
niam postea contingit vt duo adsint impedi-
menta, quæ impediunt rectam hanc curandi
operationem, viæ sane impediriæ, (vnde cor-
pora cum quis purgare voluerit opus est flui-
da facere) humores crudi, id est, a bono non
separati, igitur primo oportet eos concoque-
re, intelligendo per concoctionem separatio-
nem, & præparationem: quia concocta medi-
cari, atque mouere &c. Præparantur autē cum
sunt tenues, & acres, obtudentibus; cum ni-
mis crassi, incidentibus; cum nimis viscidi, ab-
stergentibus. Quandoque vero licebit inter
initia, stante humorum cruditate, euacuare: &
hoc, vbi cum humorum cruditate inter initia
contingent accidentia sæua; quod extremis
morbis extrema remedia conueniant. & cum
morbi incoant, si quid videtur mouendum
moue. & in acutis non nisi in principio. Quare
cum hæc contingent, comparabit medicus

*Humorum
præparatio.*

*Incocta
quando
euacuanda.*

*Cura co-
acta.*

*In phreniti-
de & pleu-
ritide con-
uenit sang.
missio.*

*Phrenitidi
in principio
non cōuenit
reuulsio
simplex.*

*Nec simplex
deriuatio.*

moram cruditati, & si videbit quod accidentia adeo sœua sint, vt nō valeat æger sufficere donec fiat preparatio: tunc materia existente cruda, & mobili, erit euacuādum: & hæc cura coacta a modernis appellatur. Sed hætenus dictum sit de indicationibus operandi. Igitur sumta indicatione a causa morbum faciente, cum sit bilis, seu pars subtilior sanguinis defluentis ad locum, qui imbibitur in membranis cerebri, conueniet missio sanguinis, sicuti etiam conuenit in pleuritide, cum tam phrenitis, quam pleuritis a subtili humore proueniat, & vtraque sit in eodem membro, scilicet in membranis, differens solum ratione situū, quod altera costas succingit, altera vero cerebrum contegit. Quare vtroque mittendus erit sanguis, sed indicatione sumta a loco, differentes erunt. Indicat enim locus nō a pede, nec a basilica, sicut fit in pleuritide, quia locus non est membrana costas tegens, sed ratione loci affecti, & membri, cephalica erit eligenda eiusdem lateris: & hoc, quod cum phrenitis sit in principio, non sit eligenda reuulsio simplex, quæ fit per maximam distantiam: quoniā talis reuulsio debetur materiæ fluxuræ, vt assuescat humor, qui fluere solebat ad caput, & epilepsiam, exempli gratia, facere, trahi ad pedes. Neq; debemus vti deriuatione simplici, quæ opposita est reuulsioni simplici, cum hæc proxime ad locum affectum trahat: sed cum inflammatio medio modo se habeat, habens humorem

humorem partim fluxum, partim fluentem, debet etiam remedio medio modo se habente adiuuari, qui fluxurum reuellat, & fluxum euacuet. Vnde cum nec per locum proximum possimus euacuare, ne trahamus materiam, quæ est in motu, ad locum affectum: nec per valde longinquum, reuellendo, quoniam ut ait Galenus 2. reg. acut. de pleuritide loquens, remedium vel esset nullum, vel tardum, eligenda erit vena media eiusdem lateris, ut per eam habeamus euacuationem a loco proximo simul & reuulsionem. Quare missio sanguinis in phrenitidis indicabitur a peccato sanguinis, a qua autem parte (quia scilicet a cephalica eiusdem lateris) indicabitur a loco: quantitas sanguinis, confuse tamen indicabitur a magnitudine morbi, atque a dominio sanguinis, sed certam quantitatem postmodum determinabit virtus tanquam regina. Haftenus dictum sit quomodo in curatione phrenitidis euacuandum sit per sanguinis missionem. Sequitur ut percurramus secundum instrumentum, quomodo tractanda sit ratio victus. Porro ut ait Galenus, & Hippocrates 1. reg. acut. comm. 9. cum scopus alendi agros sit propter custodiam virtutis: & hoc, quod morbus ut morbus nullum prorsus cibum expostulet, sed duntaxat ut contrariis tollatur: si igitur contigerit, ut morbus talis sit, & virtus talis, ut videatur ex motu eius, & arte prognostica, quæ habetur ex libro de crisi, & arte prognostica,

Missio sanguinis in phrenitide indicatio.

Victus ratio in phrenitide.

Morbus ut morbus cibum non postulat.

*In morbis
acutissimis.*

*Ptisana
morbus acu-
tis satisfa-
cit.*

*Vicibus quā-
titat.*

*In phreniti-
de & omni
bus acutis
valida
pharmaca
vitentur.*

morbum per crifim terminari poffe, abfque aliquo alimento, vt fieri folet in morbis acutiffimis, vt in angina, vtemur tenuiffima dieta, & nihil profecto dabimus, fi videbimus cito terminaturum morbum, & virtutem fufficere poffe. Sin autem cogemur alimenta exhibere, indicatione a virtute fumta, cōfiderandus erit etiam ipfe morbus: & indicatione a morbo fumta, talia alimenta erunt exhibenda, quæ morbo remedia fint. Qua ratione ductus Hippocrates, & Rafis in phrenitide, inuenerunt dandam effe ptifanam in morbis acutis, quæ habens rationem nutrimenti, virtuti facit, cum obftructiones aperiat, abftergat, & infri- gidet: morbis acutis facit fatis, qui calidi funt vt plurimum: licet epilepfia, & apoplexia ratione loci duntaxat fint acuti, & tamen frigidi. Quare ptifana optima eft. Quantitas vero ipsius fumenda erit a morbi quantitate, & cōfuetudine. Nā fi phrenitis erit terminatura in quarta, ptifanam colatam exhibebimus. Sin autem morbus terminaturus erit in quartadecima, non colatam. Indicatione fumta a confuetudine, fi quis affuetus erit quater in die comedere, optimum erit eius cibationem partiri in quatuor vicibus. Sequitur vt percurramus tertium instrumentum pharmacandi in phrenitide? Porro perpetuum erit documentum in phrenitide, & tandem in acutis omnibus ægritudinibus, a validis pharmacis effe cauendum: ita vt etiam rhabarbarum fit fufpectum.

Qua

Qua ratione ductus Rasis, elegit decoctum fructuum, exempli gratia mirobalanorum eitrinorum, & indorum ana drachmas duas, decoquantur in duabus libris aquæ violarum usque ad dimidium, & in decoctione addantur pruna numero decē dulcia, qualia sunt hispana, non autem damascena, quæ sunt austera, tamarindorum dra.ij. qui cōterantur minute, & iterum decoquantur omnia quousque remaneat vn.j. decoctionis, & facta expressione, dissoluatur manna vnc.j. & s̄ & erit medicina benedicta. Sequitur vt localia percurramus. Notandum autem erit localia in principio dūtaxat competere, cum scilicet phrenitis sit, quoniam cum facta est, nō amplius est percutiendum localibus, nec vlla localia conveniunt, tametsi moderni catulos recenter dissectos apponāt, & columbaceos pullos ad resoluendum, sed parum proficiunt. Quare paret tempus applicandi localia in acutis agnitudinibus. Locale autem erit hoc. Ex olei rosacei vncijs tribus, aceti vncia vna. Aduertendum erit autem aliquando convenire maiorem portionem aceti, minorem olei; aliquando maiorem olei, minorem aceti. Si enim aderit magna caliditas circa caput, & instantia vigiliarū, maior sit olei rosacei, minor aceti, cū habeat vim exsiccandi: sed tanta quantitas adsit, quæ sufficiat ad faciendam penetrationem. Sin autem inclinatet phreniticus ad somnū, maior erit aceti, quæ habeat vim exsiccandi humidū

Rhabarbarum suspectum.

Topica in principio tantum conveniunt.

Locale ex oleo rosaceo & aceto quomodo variandum.

*Tempus ap-
plicandi
localia.
Modus
vtendi.*

*Dolor in
phrenesi.*

*Symptoma-
tū in phre-
nitide cu-
ratio.*

Vigilia.

Lac.

causans cataphoram. Tempus autem applicandi locale, est cum inflammatio incipit. Ratio autem, seu modus vtendi locale talis erit: Actu frigidum accipere oportet oxyrhodinū, & pannos lineos infundere tenues, ne calfiat æger, & applicare circa commissuram coronalem. Melius imprimet si ex alto cadat in caput, facta corona ex pasta, ne oleum decidat. Quod si dolore afficietur phreniticus, cauendū erit ab embrocatione, ne nimia perfusione augeatur dolor, & consequēter inflammatio. Sequitur vt accidentia corrigamus, quæ in phrenitide contingere solent; cuiusmodi solet esse nimia vigilia: quæ symptomata cum habeāt rationem causæ, curationem expostulant, & ipsi tanquam causis primo est occurrendum, vt ait Galenus 12. therap. rationē autem causæ habebunt, vbi calfacient, & exsiccabunt, quæ omnia sunt aduersissima phrenitidi. Quare tollendæ erunt vigiliæ, si phrenitidem curare voluerimus: vnde caput erit inungēdum lacte admixto cum oleo violaceo. Lac enim humectat cum modica caliditate, quæ tollitur ab humiditate olei. Additur autem vt seruetur præceptum commune omni medicinæ exhibendæ, vt cum medicamento exhibeatur aliquid, quod naturæ sit familiare, & spiritibus. Erit autem naturæ familiare, quoties habebit rationem alimenti, vt eo mediāte natura postea melius deducere possit ad actū medicamentum secum coniunctum. Quare
hac

hac ratione additum fuit lac, vt natura melius
 etuare possit medicinam: tum etiam vt sua vi
 emplastica vim bilis obtundat, & ex lentore
 suo adhæreat, & non effugiat: ponitur autem
 oleum violaceum, quod humectet in secun-
 do, & infrigidet: & hoc, vt concilietur somnus
 qui fit a frigido, & humido, & remoueantur
 vigiliæ, quæ fiunt a calido, & sicco. Hactenus
 percurrimus cerebri intemperiem associatâ
 cum causis, & symptomatibus, atque eiusdem
 obstructionem cum suis causis, & symptoma-
 tibus: item & eius inflammationem cum suis
 causis, & symptomatibus adiunctam. Nunc
 sequitur vt exempla proponamus multiplicis
 generis morborum simul implicitorum, ad
 quos sequuntur sua symptomata; nempe malæ cõ-
 plexionis, & malæ compositionis simul, quæ
 duo genera morborum associata cum suis causis
 produciunt hoc symptoma, quod spasmus ap-
 pellatur. Pro cuius curatione, mente semper
 opus erit habere artem illam curandi, & qua-
 tuor locos illos vnde indicationes omnes re-
 151 ete curandi sumuntur: nempe affectum, lo-
 cum affectum, circumstantias, & remedium,
 atque ab illis vniuersalibus toties supra enar-
 ratis ad hanc particularem spasmî curationem
 descendendum erit. Vnde cum in arte curan-
 di dictum sit tria esse præcipue, a quibus su-
 muntur indicationes, morbum, locum affe-
 ctum, & virtutem: & quo ad morbum, cum in
 eo quinq; cõsideranda sint, eius essentia primo.

*Oleum vio-
 laceum in
 vigiliis.*

*Spasmî
 curatio.*

In spasmo

1.

*Indicatio-
nes a morbi
essentia.*

*Spasmus est
morbus ma-
la comple-
xionis &
compositio-
nis.*

Igitur spasmus essentia cum talis sit, ut sit morbus in complexione per affluxum materię, vel per ariditatem, & in compositione, quia spasmus chordam, vel caput musculi abbreviat, & propter hoc actio musculi læditur, & corripitur. Ex cognitione igitur istius essentię incipit nasci cognitio curationis, & recte operadi. Nam ex quo scio quod est morbus in complexione, cum sit res præter naturam, indicatur quod debet remoueri: si fuerit sicca indicabitur, quod per oppositum sit remouenda cum humectantibus: si fuerit ex repletionem per affluxum materię, indicabitur quod euacuanda sit materia: quo ad malam compositionem indicabitur nobis, quod eam reducamus ad naturalem suam longitudinem. Secundum quod in morbo considerandum esse diximus, est terminus morbi. Igitur & in spasmo considerandum erit an factus sit, an adhuc fiat: quia si adhuc fiet, indicabitur nobis quod remoueamus iam factum, & prohibeamus futurum ne fiat. Tertium symptomata morbi. Quæ sanæ cum in spasmo & multa & magna esse soleant, ut alienatio, impedimentum anhelitus, præsertim cum in musculis colli tetani fiunt, ut cum protenditur ad musculos thoracis, sequitur suffocatio, & impedimentum anhelitus, fiunt etiam syncopes, quæ curari debent: dein sequi solet dolor adeo intensus, ut necessariū sit sedare dolorem, si spasmum sedare velimus præsertim cum ita sæuus existit, ut habeat rationem

2.

*Indicatio-
nes a morbi
termino.*

3.

*A sympto-
matis.*

tionem causæ, & noui morbi, vt aliquādo co-
gamur (ne sequatur interitus) vt tollatur sym-
ptoma, cum similibus occurrere aegritudini:
quemadmodum in dolore colico aliquando
contingit a pituita causato: qui cū adeo sæuus
existit, vt totam curandi rationem ad se ver-
tat, cogimur philonium, & opium exhibere,
quæ tamen similia sunt causæ ipsius morbi.
Quarto motus spasmi, qui quidem cum velox
& acutus sit, cum cito terminetur vel ad salu-
tem, vel ad mortem, indicabit nobis modum,
vt cito agamus. Quo ad victus rationem penes
quantitatem indicabit, parum esse cibandum:
quo ad quantitatem cibariorum indicatio e-
rit a causa faciente morbum: quæ si erit pitui-
ta, cum sit crassa, indicabit vt attenuemus &
abstergamus, vt mundificemus, vt commode
euacuari possit. Quinto, consideranda erit cru-
ditas & concoctio materiæ morbi. Quoniam
si materia erit concocta, & natura vincat mor-
bum, sciemus quod concocta oportet medi-
cari, atque mouere non cruda: & quod si erit
cruda, quod non erit querenda ipsius euacua-
tio (nisi acuties morbi, & symptomata cogāt)
sed concoctio modo. At si in spasmo, qui acu-
tus est, cum sæuis symptomatibus contingat
esse cruda, quid erit agendum? cruditas enim
indicabit nihil esse agendum, celeritas autem
spasmi ex altera parte indicat vt statim aga-
mus. In indicationibus his contrariis id erit a-
gendum, quod diximus ex Gal. 9. & 10. therap.

*Symptoma-
ta curam
quandoque
ad se trahūt
Dolor colic-
us a pitui-
ta.*

4.
*A motu
spasmi.*

5.
*Victus ra-
tionem in-
dicantia.*

*Dubit. an
materia in
spasmo cru-
da sit va-
cuanda.*

*Indicatio-
nes a causis
spasmi
extrinsecis.*

perpendēda erit harum indicationū dignitas, & cum videamus cruditatem, & ex præcepto Hippocratis non sit euacuandum, quia concocta medicari: ex altera cum immineat periculum, & mors ægri, eligenda erit via media, non quidem totam, neque confertim euacuantes, sed partem materiæ concoctæ euacuantes, partem vero reliquam paulatim concoquentes. Et hæc de indicationibus, quæ sumuntur a natura spasmi, quæ in quinque consistit, sicuti consistit consideratio naturæ cuiusque morbi. Sequitur ut percurramus indicationes quæ sumuntur a causis morbi, & a causis spasmi. Porro causæ spasmi quædam erunt intrinsecæ, quædam extrinsecæ. Quo ad extrinsecas, spasmus vel erit humidus vel siccus: si erit siccus, indicabit ut eligamus cubiculum, in quo nulla sit exsiccatio: sed preparandus erit cum frigidis & humidis: item cibus non exhibebitur siccus, sed humidus. Somnus erit prouocandus, quando aliter non poterit prouocari, cum opiat. Circa motū, & quietem eodem modo erit procedendum, & omnia morbo breuiter debebunt esse contraria, ita quod si aduersantur morbo, permittantur: si fouent, corrigantur. Sin autem spasmus erit a causa frigida, procurandum erit ut omnia exterius adhibenda & cibus, & potus, & reliqua sint calida, & sicca: ut etiam febris sit procuranda in spasmo a pituita pendente. Demum erunt percurrendæ indicationes, quæ sumuntur a

tur a causis intrinsecis morbi. Quarū cū quæ- *Ab intrin-*
dam habeant rationem causæ antecedentis & *secis.*
remotæ, quædam vero proximæ, distinguen-
dum erit, vtrum hæc causa intrinseca materia-
lis sanguis sit, an alius humor a sanguine. Nam *Sanguinis*
si erit ipsius a materia sanguinea, eligemus *missio in*
euacuationem per sanguinis missionem. Pro *spasmo a*
euacuatione remotæ causæ sanguineæ eligē- *materia*
sanguinea.
tes auersionem, & in auersione conuenientē
venā, quæ erit conueniēs quoties rectitudinē
seruabimus: & hoc, vt tutius & citius euacue-
mus: vt existēte in parte dextra, in dextra par-
te, & si in sinistra, in sinistra. Ab antecedeute
causā ad cōiunctā erit trāseūdū: & pro ei⁹ eua-
cuatione, cū dupliciter eam possimus euacua-
re, vel deriuādo (deriuabimus autem quoties *Deriuatio*
eligemus venam proximam, quæ cum loco af- *causa con-*
fecto colligantiam habeat) vel euacuando ab *iuncta.*
ipso loco: quod quidem fieri poterit, vel per *Euacuatio.*
scarificationem, vel per applicationem solue-
tium calidorum & humidorū, lenium tamē.
Cauendum enim ab euacuātibus calidioribus *Calidiora*
ac siccioribus: quia subtilioribus partibus re- *& sicciora*
solutis, crassiores relinquuntur, & sequuntur *euacuantia*
postea cancri & anthraces. Vnde non erit per- *sunt vitan-*
transcundum oleum liliorum alporum, & ca- *da.*
momellinum: & si sanguis feruentior erit, o-
leū rosaceū conferret, vel violaceū, vt caliditas
illa refrangatur. Sin autē materia fuerit bilis, *Indicatio-*
vt contingit in spasmis non proportionatis ad *nes a mate-*
materiā, causā remota nondū fluxa, indicabit *ria spasmi*
nempe bile.

vt euacuetur auertendo ad oppositum, quod fane est commune omnibus materiebus, & cū peccet bilis, indicabit non esse fiendam euacuationem per phlebotomiam, sed cum iis, quæ bilem euacuant. Quæ autem sint bilem euacuantia simplicia & composita, libris de curatione causæ antecedentis & continentis fuit enarratum. Quo vero ad materiam biliosam coniunctam, nec hic vtendum erit phlebotomia, sed euacuanda erit & ipsa dupliciter, deriuando: quod quidem fiet, & ligaturis & frictionibus ad oppositum trahentes, faciendo lenem dolorem & calorem in parte opposita, vt materia subtilis defluat ad propinquā. Atque etiam euacuando a loco, cauentes a fomentis calidioribus, & vt non pertranscamus fomentum liliorum alborum, & camomellinum cum oleo rosaceo & violaceo, vel cum modico aceti ad penetrationem: quoniam vt monet Galz. ad Glauc. & 3. therap. cauendum est a fomentis calidis simul & a frigidis, quod frigidiora exacerbent, calidiora vero ad ariditatem deducant. Sin autem materia erit pituita, easdem indicationes exhibebit cum aliis materiebus communes: nempe antecedens vt euacuetur, euacuando ad oppositum his medicamentis simplicibus, & compositis alibi declaratis. Coniuncta vero, ipsa quoque tum deriuando, ac trahendo ad propinqua. Quod quidem & cauterio & causticis fieri poterit ad attrahendum violenter, tum euacuando materiam

*In materia
spasmi bilio-
sa non con-
uenit vene
sectio.*

*Fomenta
qualia re-
quirantur.*

*Indicatio-
nes a mate-
ria spasmi
pituitosa.*

teriam in loco iam fixam. Vbi cauendum erit ne incipiamus a valde aperientibus, & incidētib, cum trahant subtile, & relinquant crassum ingypsatum: sed ab emollientibus erit incipiendum, eligentes calida & humida circa primum gradū, quæ maturantia sunt, & emollientia. Quod si voluerimus etiā concoquere, eligemus calida in secundo: cuiusmodi sunt anethum, myrrha, bdellium, ammoniacum, sagapenum, crocus: & præcipue bdellium, & ammoniacum, quæ efficacissima sunt pro concoctione materiæ pituitosæ: reliqua calidiora tanquam adurentia omittentes. Facta postea concoctione accedendū erit ad calida & sicca in tertio gradu: sicuti sunt ciminum, fœniculum, calamentum, pulegium, maiorana. Et vbi hæc non suffecerint, veniemus ad dropaces, qui trahunt violenter a cētro ad superficiem, & rubificant: qualia sunt pyrethrum, pix, opopanax, succus cyrenaicus, quæ differunt a sinapismis, eo quod non solum rubificent, & resiccent, sed escharam quoque inducant, vt sinapis, thapsia, flammula Iouis, euphorbium, cantharides. Hactenus de indicationibus a causis tum intrinsecis, tum extrinsecis ipsius spasmi sumtis. Sequitur vt percurramus indicationes a loco affecto sumtas. Porro cum in spasmo id quod afficitur sit chorda, vel neruus ac quo ad eius substantiā sit exsanguis & dura: quo ad situm sit in profundo, indicabitur acuta remedia conuenire, quæ possint excutere

*Emollientia
incidentib.
pramittēda.*

*Concoquen-
tia pituitā.*

Dropaces.

*Indicatio-
nes a loco
affecto in
spasmo.*

A a a

*Spasmi &
paralysis
curatio, in
quo conue-
niat.*

*Dub. de dro-
pacis in
affect. ner-
uorum.
Solutio.*

*In curatio-
ne affectuū
neruorum
cordis & ce-
rebrī semper
habenda
ratio.*

materiam in membro solido infixam, atque impactam. Qua ratione ducti Paulus, Auicenna, & Rasis dixerunt, quod quantum ad materiam coniunctam eadem est curatio spasmi, quæ est etiam paralysis, differunt autem in hoc solum, acutioribus frictionibus, fomentis, & linimentis ut utamur: & hoc ratione loci affecti, quod in paralysis musculus patiatur: consequenter materia ab eo facilius excuti possit. Præterea quo ad temperaturam, scimus nervum esse temperaturæ frigida & sicca: consequenter indicabit nec multum humectandum, nec multum calfaciendum. Sed cur, inquires, acerrimos dropaces, & sinapismos adhibemus nervis, si multum acria non conveniunt? Respondendum, hoc fieri non ratione temperaturæ nervi, sed indicatione a situ sumpta: quoniam cum nervus sit in profundo situs, applicamus fortiter acria, quia novimus quod remedia cum sua tanta acrimonia ad locum non accedent: & hoc, quod in via multum acrimoniæ amittant, ut ex Galeno ostendimus 2. catageni: cum nervi maximam cum cerebro habeant colligantiam, & cum corde, & stomacho, ut fiat syncope. Ideo curantes affectum nervorum, cerebri quoque, & cordis semper habenda erit ratio, corroborando cum odoratis: nempe quod odorata spiritus corroborent, & ex spirituum corroboratione cor & cerebrum, qui sunt duo fontes spirituum, corroborentur: ventriculo præterea odorata, & modice

& modice astringentia erunt adhibenda: Quo
 ad facilitatem patiēdi, cum nervus a quolibet
 nocumento extrinseco patiatur, ideo cauebi-
 mus a quocunque mordicante. Ob id Gale-
 nus cauet etiam a terebinthina, cum non ad-
 est aliquod spatium notabile intermedium.
 Canendumque erit a quocunque motu, qui
 nervum laedere posset, ac dolorem excitare.
 Quæ ratione male Herculani sentit in spas-
 mo trahēdum esse membrum ad oppositum:
 quoniam morbus cresceret, & attraheretur
 materia multa: sed blande, & leniter est redu-
 cendum. Quo vero ad operationes, & si ner-
 uorum operationes magnæ sint, cum nervi
 sint delegati ad motum & sensum, tamen cum
 aliis non deseruiant, non multæ etiam ab eo-
 rum operationibus sumentur indicationes.
 Hæc de indicationibus a loco affecto. Sequi-
 tur virtutis indicatio, quæ reperitur in ipso
 spasmo. in qua sane perpendēdum erit an vir-
 tus sufficere possit necne: quod morbus indi-
 cet quid agendum sit, membrum porro affe-
 ctum qualiter agendum, seu modum agendi
 indicat: virtus vero vsque ad quem terminum
 sit agendum, limitans tantum duntaxat esse
 agendum, quantū indicat: esto quod morbus
 & locus affectus alio modo indicarent. Vt autē
 res manifestior fiat, proponemus exemplum
 alicuius patientis spasmodum. Primum enim in
 eo quod a nobis erit faciendum illud erit, vt
 nosemus naturam morbi, & formam. Natu-

*Odora cor-
roborat.*

*Terebin-
thina in
affectu ner-
uorum.*

*Herculani
error.*

*Indicatio-
nes a virtu-
te in spasmo.*

*Exemplum
patientis
spasmodum.*

*Natura
spasmi.*

*Spasmi
forma.*

*Spasmus a
repletionem
sanguinis.*

ra morbi considerabitur, quoties cognouerimus sub quo genere sit, vtrum in complexione, vel compositione, vel continui solutione. Forma vero, considerabitur enim in hoc motu conuulsio, considerando vtrum spasmus, qui est inuoluntaria contractio musculi ad suum principium, sit ad anteriora, vel posteriora, vel tetanus. Et supposito quod contractio fiat ad posteriora, iam habebimus speciem determinatam affectus, & quod est malus, non tamen omnium pessimus. Cum autem possit esse vel ab inanitione, vel repletionem, supposito hoc, quod ex sanguinis sit repletionem, vltius erit considerandus eius motus. & cum habeamus quod est velocis motus, quodque est acutus opisthoronos, ita quod in quatuordecim diebus terminabitur: consideranda erunt symptomatica: & supponendo quod sit cum maximo dolore & vigiliis: & supposito etiam quod sit partim factus, partim fiens, ita quod habeat causam antecedentem, & coniunctam, qui procedat augendo: considerando etiam naturam patientis: & supposito, quod sit quadraginta annorum, & temperaturæ humidæ, in actiuis temperatæ, in regione frigida, & anni tempore autumnali. his omnibus consideratis & cognitis, accedendum erit ad prognosticum, et si videbimus curationem difficilem, cum protestatione ad opus erit accedendum. Cum autem sit a repletionem, & sit partim factus, partim fiens: consequenter habeat causam antecedentem, &

rem, & coniunctam: prius erit incipiendum ab antecedente: & hoc quod prius intercipi debeat materia *fluens*, postea fluxa: aliter nunquam curatio fiet: præsertim cum symptomata, ut ait Galenus, habent rationem causæ, 12. meth. quod est dictum, cum faciunt ægritudinem deterio-rem. Quoniam vero duo adsunt symptomata, vigilia, & dolor, quæ si non tollantur, curatio non sequetur: igitur simul & semel accedendum erit ad remotionem causæ antecedentis, & etiam symptomatum ablationem: & hoc, quod, ubi purgare volueris, prius sedandus sit dolor, Avicenna. Prima igitur die anodynus dolor erit sedandus, priusque cum iis, quæ qualitate manifesta illud agere possunt absq; attractione, ut oleo camomellino, liliorum alborum, decocto althææ, butyro recenti, axungia porcina, oleo sesamino seu anethino, & tandem omnibus calidis & humidis citra primum gradum: dein iis quæ occulte agunt: ut renib. noviter extractis ab ariete, actu calidos applicando circa principium nervorum ubi fit contractio. Amplius sacculo salis circa nucham applicito, præsertim si a capite descendat materia, quia exsiccatur. Præterea perpetuo, ut ait Avicenna, & moderni, adsit lana succida super loco, quæ sæpius ex iis oleis illiniatur, & foveat locum, quoniam ex continua illinitione fit perpetua resolutio. A stupefacientibus autem erit cavendum, quia cum nimis inculcent materiam, ægritudinem faciunt pertinacem. Quo

*Antecedens
causa prius
tollenda debet.*

*Symptoma-
tum cura-
tio.*

*Dolorem
sedantia.*

*Dolores
spasmi a
proprietas
occulta se-
dantia.*

*Stupefaci-
entia.*

*Vigilia in
spasmo.*

*Pituita pri-
us preparā-
da quā va-
cuanda.*

*In spasmo
cruda va-
cuanda sunt
aliquando.*

vero ad vigilias, odoramentum ex iisdem faciendum cum modico croci, & capitis lotiones, & post cibum aliquid vini. ..., deinde accedendum ad materiam antecedentem, quæ quidem cum sit pituita, ac pituita non possit euacuari nisi prius præparetur, præparatio autem fiat concoquendo, incidendo, & abstergendo, & vias aperiendo. Hæc autem cum nō possint fieri nisi in morbo qui dat inducias, sicut erat in paralyfi, non autem in morbo, qui non dat inducias: tū quia morbus est præceps, & in quatuordecim diebus terminaturus: tū quod ratione symptomatum, doloris & vigiliæ virtus soluitur: ideo cum maxima sit differentia inter causam antecedentem ipsius spasmi, & ipsius paralyfis: tum in spasmo morbus præceps cogat nos diuertere a recto tramite procedendi circa causam antecedentem pituitosam, differenter etiam operabimur: vnde non exspectando concoctionem, exhibenda erit medicina fortis debilis, vt solet dicere Auicenna fortem ratione qua potenter euacuat: debilem vero, ratione qua in pauca quantitate exhibetur: veluti aut pilularum cochiarum drac. j. aut cassiæ drac. vj. & agarici præparati scrup. iij. Nam tamen si indicatione sumpta a cruditate nihil esset agendum, nec euacuandum nisi prius concocta materia: quia tamen motus morbi, & celeritas cum symptomatib. indicat vt cito agamus, in his opponendis indicationibus eligimus viam quandam mediā, vtrisque

utrisque satisficientes : euacuantes quidem, sed non multum. Nam ex parte qua euacuamus , satisfacimus celeritati ægritudinis, ex qua imminet periculum mortis ægro. Ex parte vero qua partem euacuamus , satisfacimus cruditati materiæ. Pro remotione etiam huiusce causæ antecedentis incipiemus a clysteribus. Hoc enim modo euacuabimus materias prius præparatas, incipientes a clysteribus lenibus, ne nouam materiã attrahamus. Clyster autem erit ex anetho , camomello, lilio, furfuribus, omnibus in aqua coctis vsque ad consumptionem medietatis : accipientes heminam vnã huius decocti, in qua apponatur oleum liliorum alborum, camomellinũ, anethinum, rutaceum, mellis rosati vnc. iij. aceti etiam tantum: Hoc enim est præceptum Galeni, & Hippo. 26. de rat. vict. acut. ne detur cibus patienti ægritudines acutas, nisi euacuato prius ventre, aut clystere, aut balneo si clysterem tolerare non possunt. Nam hoc modo per successionem adiuuatur etiam euacuatio materiæ antecedentis. Sequitur vt percurramus quomodo sit administranda viuendi ratio, cum necessarium sit vt nutriamus ægrum, vt viuere possit. Cumq; quantitas cibi a motu morbi sit eligenda, vt in morbo velocis motus parum cibando, in morbo vero tardi motus, multũ & copiose, laph. Cũ igitur in quatuordecim diebus sit terminaturus, cibus & potus ita moderandus erit, vt sufficere possit in toto

*Clysteres
causam an-
tecedentem
euacuantes.*

*Victus ratio
Cibi quantitas.*

*Ciborum
qualitas a
causa morbi
petitur.*

*Pituita quæ
cibum in-
dicat.*

*Incidentia.
Potus.
Vinū quan-
do cōueniat.*

hoc tempore. Vnde conueniens diætā erit illa
quæ sit media inter tenuem, & crassā. Quare **B**
si fuerit assuetus plurimo cibo, duas vel tres
auiculas montanas comedere poterit. Electio
vero quantitatis ciborum, vtrum scilicet exhi-
benda sint alimenta calida attenuantia incidē-
tia, an potius emplastica frigida crassefaciētia,
indicabitur a causa faciente morbum. Quin-
imo quod omnes sex res non naturales variā-
tur, prout variantur causæ facientes ægritudi-
nem. Vnde cum sunt contrariæ ægritudini,
appellantur & sunt auxilia: cum vero aduer-
santur naturæ, & augent causam & morbum,
sunt nocumenta. Exemplum sit in spasmo, quæ
præ manibus habemus. Iam scimus ex eius
motu, qui velox est, non multum esse ciban-
dum. Qualitas vero cibariorum indicabitur a
causa faciente morbum: quæ cum sit pituita,
ideo indicabit cibum calidum & siccum, quia
frigida est & humida: & quia crassa est, abster-
gentem & mundificantem, vt commodè eua-
cuari possit. Quare victus ratio erit subtilians.
Ad quod exsequendum nil præstantius mon-
tanis auiculis: pulli etiam iuuenes præparati
cum radice petroselini, seminibus, vt aniso,
fœniculo, pipere, caryophyllo, cinnamomo.
Quæ omnia habent vim incidendi: panis sit
salitus, bene coctus, aut bis coctus, in quo sit
anisum, aut aliquid tale, quod habeat vim ex-
siccandi. Quo ad potum, a vino erit abstinē-
dum, ne materiæ crudæ distribuuntur ad locū,
& augeatur

& augeatur affectus. Vnde ante vini exhibitionem prius erunt educendæ materiæ : & post educationem materierum exhibendum erit vinum, quia deducit materiam ad vrinam. Sed interim potus sit decoctū conueniens ex cinnamomo cū modico macis, vel caryophyllorū, & anisorū cū saccharo. Potus enim hic erit gratissimus, & ad incidendum efficacissimus.

Aer si frigidus erit & humidus, arte parandus *Aer.*

erit calidus, & siccus cum suffumigiis calfacientibus & exsiccantibus. His peractis in prima die, secunda die exhibenda erit medicina *Vacuatio.*

fatis debilis: vt scr. iij. pilularum cochiarum, aut floris cassiæ cū modico agarici præparati. Hoc enim medicamēto fiet euacuatio materierum crassarum a primis venis. Hoc enim *Syrupi.*

necessarium est, si volumus exhibere syropos die sequenti, aliter deducerēt materiam illam ad locum neruorum. Visa commoda euacuatione, sicuti prima die apposueramus fomēta, oleum camomellinum, liliorum alborum, anethinum, addemus quod est efficacius ad *Topica.*

resoluendam materiam facientem spasmus, quodque neruis est opportunum ratione virtutis exsiccantis. Dein ordinabimus syrupum vesperi, qui habeat easdem intentiones, quas diximus habere debere cibum & potum, exhibendo duos syropos singula die, indicatione a motu morbi sumpta. Parandum autem erit *Decoctum*
decoctum aliquod validum ad incidendum, vt *incisorium.*
ex cimino, ameo, caruo, fœniculo, pipere, gin-

gibere in aqua decoctis, addito syrupo de storachade simplici, vel composito, de betonica, de hyssopo, melle rosato, oxymellite completo Iuliani: quinta die euacuabimus, vel cum pilulis cochiis ad drachmam vnam secundum tolerantiam corporis, vel exhibebimus Logodionis drach. iij. vel Ruffi, vel colocynthidos drach. iij. vel confectionis hamech. drach. iij. Facta hac euacuatione materiae antecedentis, non amplius erimus contenti localibus iam adhibitis, sed sexta die accedemus ad oleum costinum, de euphorbio, ad nardinum compositum: & hoc, quod in aliis oleis multa ingrediuntur, quae habent magnam vim incidendi. Facta hac euacuatione, accedendum erit ad oxymel scylliticum cum illis decoctis: & ita concoquetur materia cum iis acrioribus usque ad nonam, vel decimam. Postea si apparebit virtutem deficere, nec adsit aliqua crisis, iterum dabimus pharmacum efficacius: & hoc, quod materiae erunt magis preparatae; ut hyera Logodii, colocynthidos audacius, quod in ipsa sit maxima vis educendi materias crassiores. Demum accedemus ad causam coniunctam, incipientes primum a dropacismis, quae rubificant, ut accipientes magnum corium, vel linteum, ita ut super ipso pix mixta cum galbano extendatur, in quibus apponetur aliquid quod incidat, abstergat, & a profundo trahat, ut nasturtium, euphorbium, sinapim. Rubificato loco, oleo miti locum liniemus, cum oleo liliorum alborum,

*Colocynthis
Causa continens
in spasmoe
enratio.*

Dropacismi.

alborum camomellino, vel anethino. Et vbi defierit rubor, iterū post tres horas super locum ponemus, vt attrahatur noua materia, iterumque illiniatur locus. Neque erit desistendum quousq; materia deueniat ad cutim. Vbi vero post hos dropaces materia pertinacius adhærebit, transibimus ad synapismos, vt *Synapismi.* non solum faciamus rubificationem, sed etiā vesicas. Et his factis, vbi defecerit symptoma, *Imbecillitas* & perseverabit imbecillitas, vt puta frigiditas *post spasmū.* in loco inducta, his corroborantibus erit vtendum, ponēdo hominem in tina, in qua camomellum, anethum, maiorana, fœniculum, stœchas, & alia sint decocta, totusque maneat in tina. deinde corroboretur gignentibus spiritum, & calorem, sanguinē, & conseruantibus membrorum tonum. Hactenus percurrimus intemperie cerebri cum suis causis, a quibus nam prodeat deprauatio sensus tactus, quæ dolor appellatur indicando: atque vnde procedat obstructio ductuum cerebri associata cum suis causis, & hoc symptomate, amissione sane sensus, & motus, & inflammatione cerebri cum suis causis, ad quā sequatur hoc symptoma quod vigilia appellatur: necnō intemperies, atque mala compositio simul cum suis causis, a quibus procedit deprauatio sensus, & motus, quod symptoma spasmus appellatur. Nunc sequitur vt percurramus qua arte curatio fieri debeat, vbi propter aliquē morbū, & *Catarrhi curatio.* causas immutantur excrementa cerebri, ita vt

*Fluxionis
curatio.*

Quid fluxio.

*A fluxione
dua oriuntur
indicationes.*

*I.
Ratione
recipientis.*

Attractio.

Corroboratio in fluxionibus quid.

nimis defluant quam par sit. Pro cuius curatione cum catarrhus sit fluxio pituitosa emanans a cerebro: sequitur prius esse percurrentem artem curandi fluxionem ipsam. Cum igitur fluxio sit expulsio præter naturam de vno membro ad aliud, facta vel vitio membri mandantis, vel recipientis, vel vitio vtriusque: sequitur etiam quod duæ orientur indicationes curandi; altera ratione membri mandantis: altera vero ratione recipientis. Ratione autem recipientis, curandum erit ne amplius recipiat. Non recipiet autem, si hæc duo obseruabimus: alterum, attrahendo materiam ad aliam partem, ipsam auertendo ad oppositam partem. Quæ sane auersio vtrum sicca sit vel phlebotomia, vel pharmacia, a differentiis ipsius materie fluentis erit sumenda. Alterum vero corroborando membrum recipientis. Quæ quidem corroboratio etsi proprie nihil aliud sit, quam reductio membri ad habitum naturalem, in fluxionibus (tamen si in his quoque naturalis habitus desideretur) corroboratio erit, quoties efficiemus membrum durum, solidum, densum, vias latas non habens, cum viarum laxitas, & amplitudo, & membri raritas sint maxima occasio fluxionis ad membrum. Quare corroboratio in fluxionibus erit astrictio membri recipientis: astrictio autem fiet refrigerantibus, & exsiccantibus: refrigerantium autem, & exsiccantium gradus moderandus erit secundum morbi naturam. Haftenus de membro recipiente.

B

piente. Postea ad membrum mandans erit ac-
 cedendum. Prohibebitur autem mandans ne
 amplius mandet excremēta iis duobus: nem-
 pe totius corporis, atque ipsiusmet membri
 euacuatione. Quod si corroborato membro
 recipiente, atque euacuato mēbro mandāte,
 ac toto corpore: ratione membri mandantis,
 ne attrahens a toto continue habeat unde tra-
 hat & aliorum mandet, si inquam adhuc flu-
 xio perscuerabit, arguemus membrum illud
 mandans laborare aliqua intemperie, quæ
 causa sit redundantia huiusce excremēti pro-
 pter deficientiam in concoctione. Quæ quidē
 deficientia cum fiat ratione frigiditatis & hu-
 miditatis, arguemus membrum mandans la-
 borare frigida & humida intemperie, idque
 præsertim, ubi videbimus excrementa frigida
 & humida. Quapropter cum euacuatio totius
 ac membri, fluxionem sistere non poterit, co-
 gitandum erit de rectificatione membri mā-
 dantis. Rectificabitur autem membrum mā-
 dans cum oppositis, cum exsiccantibus. Qui-
 bus rationibus ductus Gal. 5. meth. in catarrho
 fluente ad pectus, ad tria curationem deduxit:
 ad corroborationem membri recipientis, to-
 tius corporis exquisitissimam euacuationem,
 ac cerebri exsiccationem: primumq; exsequi-
 tur frigidis & siccis cum theriaca noua, dia-
 spermaton frigido. Exquisitam vero totius
 euacuationem, pilulis quæ constant ex aloe,
 scammonio, colocynthide, agarico, & bdellio.

II.

*Ratione
 membri
 mandantis.*

*Fluxio post
 corroboracionem &
 euacuationē
 permanens
 quid indicet*

*In catarrho
 fluente ad
 pectus tres
 indicatio-
 nes Galeni.*

*In fluxionū
principiis
duo vulga-
res errores.*

*Errata in
principio
fluxionum
pessima.*

Tertium vero exsequitur cum exsiccantibus membrum mandans, proponens sinapismos ex stercore columbino, cum puluerib. calfacientibus, cum dropacibus, deueniēs ad sinapismos qui adurunt, & tandem ad cauteria actualia. Atque hoc est illud quod ait idemmet Galen. 13. therap. 5. meth. & 2. ad Glauc. cap. de inflammationibus: duos maximos errores in principiis fluxionum esse aduertendos, alterū omittendo totius euacuationem, cū ex totius euacuatione nō possint amplius mandari excrementa ad membrum mandans: consequēter nec mandans possit mandare quod nō est, alterum vero ratione membri recipientis ne ipsum calfaciamus & humectemus, sicuti amethodici quidam faciebant, cum membrū relaxetur, rarefiat, & consequenter augeatur fluxio: sed frigidis & siccis est corroborādum. Quod quidem ita necessariū esse duxit Galenus, vt ad dolorem sedandum procedat cum frigidis & siccis, timēs apertionem. Quare, vt ait Galenus, aduertendum est hoc maxime in principiis omnium fluxionum: & hoc, quod errata in principio fluxionum facta affectus prorsus incurabiles reddant, vel difficillime sanabiles. ob id. 5. meth. qui (inquit) negligēter in principio curant catarrhos a leuioribus incipientes, agris parant interitum longum. Et ratio est, quoniam si permittimus materiam fluere ad locum quē velimus rarefacere, tunc tāta moles deuenit ad locum, vt exstinguatur calor, &

calor, & fiat gangrena, sphacelus, vel scirrhus incurabilis. Neq; hæc satis erunt pro recta curatione membri mandantis & recipientis, nisi vt supra diximus, habeamus etiam modū corroborandi membrum recipiens. Qui quidem modus corroborandi sumendus erit a natura ipsius mēbri, considerando eius temperaturā. *Corroboratio membri recipientis.*

Qua ratione caro aliter quam nervus corroboratur: nimirum quod cum caro sit calida & humida, consequenter non multum exsiccantia petat, astringentibus in primo gradu corroborari poterit. Nerui vero cum sicci sint, *Carnis & nervorum corroboratio.* magis etiam exsiccantia petant, & tolerant.

55 Eadem ratione deueniente materia ad ventriculum, & hepar, iisdem corroborantibus non erit vtendum, sed diuersis, maxime astringentia, & exsiccantia ventriculo exhibendo, *Ventriculi corroboratio.* veluti absinthium, quæ tamen hepati nocerēt: & hoc ratione diuersarum temperaturarum; quod ventriculus nervosus cum sit, maxime astringentia velit: hepar vero carnosum astringentia magis moderata petat, qualia sunt spica, & rhabarbarum. Amplius considerandæ erunt membri operationes: quia quo operationes sunt nobiliores, eo magis calida competunt: *Operationes sunt per calidum.* cum operatio fiat per calidum. Ob id si fluxus erit ad hepar, quod est opifex sanguinis, non erit tantum refrigerandū, quin habeatur ratio caloris innati. Qua ratione in refrigerandis huiusmodi morbis semper aliqua erunt apponenda, quæ calorem innatū corroborēt. Amplius

*Communi-
catio mem-
brorum.*

*Membrorū
nobilitas.*

Obiectio.

*Solutio, in
fluxionibus
criticis non
esse repercu-
tiendum ex
toto.*

consideranda communicantia, quæ ratione membro habente situm suum membro nobili vicinum, vt cordi, vel hepati, indigebimus repercutientibus, non tamen applicabimus valde frigida, ne materia repercutiatur ad illud. Hac enim ratione fluente materia ad mûsculos thoracis, non multum repercutimus, ne ad interiora penetret, vbi adsunt membra nobilia. Amplius consideranda erit nobilitas, vel ignobilitas ipsorum membrorum, & utrū sint deputata ad excretionē: quia si fluxio erit ad hæc loca, veluti sunt adenes, quæ sunt carnes glandulosæ circa emunctoria illa existentes, ac cutis quæ habet vsum vestis pro tegēdo corpore: aut si fluxio erit ad aliquas partes, quæ sint deputatæ ad excretionem, vt intestina, vesicam, vterum, hæmorrhoidas; fluente materia ad huiusmodi loca, multoties non indigemus percussione. At inquires. Cur igitur aiunt in omni fluxione fienda esse repercutientia? Respondēdum, quod cum fluxio sit expulsio præter naturā excrementorum ad aliud membrum, nulli dubium membrum recipiēs corroborari debere ne recipiat. At si contingat expulsionem fieri ad debita loca, vt ad emunctoria propria, hæmorrhoidas, intestina, vesicam, critice, vel per motum crisis similē: tunc cū huiusmodi fluxio non sit ex toto præter naturam, cum aliqui habeant huiusmodi fluxiones adeo sibi consuetudinarias & naturales, vt si interciperentur, interficerentur: si-
cuti

cuti videmus de mēstruis in mulieribus: nulli dubium his calibus non esse ex toto repercutiendum, nisi cōtingat quod fluxio peccet vel in quantitate vel in qualitate. Quia si nimia erit, aut nimis maligna, cum his rationibus incipiat esse præter naturam, sistenda sane erit, eligendo ex duobus modis intercipiendi fluxionem, non quidem modum illum intercipiendi fluxionem qui fit cum astringentibus, sed auersionem vt ad adenes, aut ad loca recipientia excrementa fluxio decumbat. Sed hætenus de curatione fluxionis, sumpta indicatione a membro mandante, & recipiente. Quoniã vero dictum fuit, fluxionem esse expulsionem præter naturam alicuius excrementi: sequitur igitur vt consideremus etiam materiam illam quæ fluit, & demandatur a membro mandante ad recipientem. Hoc enim modo ingrediemur etiam in considerationem ipsarum causarum. Cum igitur materia fluens possit esse multiplex, sequitur quod etiam indicationes variæ fient pro varietate ipsius materiæ. Materia autem fluens cum possit esse vel sanguis, vel alius humor sanguineus: & si sanguis vel peccans quantitate, vel qualitate, vel vtroque, ratione cuius multiplicis vitii multiplices etiam oriuntur indicationes: altera a quantitate, altera a qualitate, alia ab vtroque. Ea quidem quæ oriuntur a quantitate, & multitudine, non solum sanguinis missionem indicabit, sed copiosam, quousque tamen virtus tolerabit. Sin autem a

*Materia
fluxionum
considera-
tio.*

*Indicatio-
nes a mate-
ria sumun-
tur varia.*

*In fluxione
sanguinea
indicatio-
nes.*

Bbb

*Sanguis
tenuis non
est copiose
evacuandus.*

*Sanguis bile
commixtus
parcius est
mittendus.*

qualitate, discernendum adhuc erit, vtrum sit propter modum substantiæ, an vero propter mixtionem aliorum humorum, & si propter modum substantiæ, vtrum sit vel quia tenuis, vel quia crassus. Nam si fuerit, quia tenuis, & calor innatus exilis, cum tales facile soluantur, cauendum erit a multitudine extrahendi sanguinem: quoniā, vt ait Galenus, si fuerit multitudo sanguinis cum rubore multo, reprimendus erit, non autem euacuandus: & hoc, quod in euacuatione diffidentur spiritus, & calor innatus, vnde ad syncopem, & casum virtutis ægri deducuntur. At si fuerit crassities, euacuandum quidem erit, sed primo erit attenuandum, & sanguis erit reducendus ad temperiem, & post illum dispositū oportebit euacuare, ac reliquum præparare. Sin autem sanguis erit infectus propter commixtionē aliorum humorum, considerandum erit quis sit ille humor sanguini commixtus: & si fuerit bilis, quæ superabundet in sanguine, sanguinem quidem mittere conueniet, sed parcius. quoniam vt ait Galenus 4. de val. tuen. cum humor sanguini est admixtus, modo nō sit crudus, nec multum recedens a natura sanguinis, mittendus quidem erit sanguis, sed parce, dummodo non adsit plurima bilis. Quia tunc prius euacuandum erit corpus, dein sanguis mittendus: aliter educto sanguine, qui est veluti frenum ipsius bilis, statim æger effrenitaret. hæc si materia fluxionis fuerit sanguis. Sin autem excremen.

crementum illud quod deponitur in fluxione fuerit alius humor a sanguine, indicabit euacuandum esse humorem illum, prius tamen præcedente illius præparatione. quæ sane materia quomodo secundum earum diuersitatem diuersimode sint præparandæ, ac post præparationem diuersimode pharmacandæ, satis abunde declaratum fuit in curatione ipsarum causarum. His decursis quo ad causas intrinsecas materiales, considerandæ erunt etiã reliquæ causæ efficientes ipsam fluxionem. Et indicatione sumpta a causis efficientibus, semper per oppositum erit procedendum: infrigidando, si id euenerit ratione malæ temperaturæ calidæ: vel calfaciendo, si ratione frigidæ. Sin autem fuerint causæ extrinsecæ efficientes, si non perseverabunt, ab eis nulla sumetur indicatio: veluti si agroti crapula fuerit in causa, & amplius non crapuletur. At si perseverabunt, indicabunt vt remoueantur: eodem modo procedemus in omni causarum genere extrinseco, aut si aer, aut somnus, aut vigilia, aut venus, aut aliud quid. Viçtus autem ratio recta est, quoties iubemus eam contrariam causis facientibus fluxionem, vt in materia frigida viscida, moderate erit calfaciendum, & attenuandum non solum circa cibum, & potum, sed etiam circa reliquas causas: vsque adeo vt aliquando & ira & exandescencia, & febris etiam conueniant. Hactenus percurrimus artem cu-

*Fluxionum
ab aliis præ-
ter sangui-
nem humo-
ribus cu-
ratio.*

*Indicatio-
nes a causis
efficientib.*

*Viçtus ra-
tio.*

*Catarrhi
curatio.*

*Quid ca-
tarrhus.*

*In catarrho
sumuntur
indicatio-
nes a mem-
bro manda-
te & reci-
piente.*

*A membro
natur
quot indi-
cationes
sumantur.*

randi fluxionem excrementorum: ex cuius re-
cta cognitione facile modo erit recte curare
fluxionem hanc pituitosam, quæ catarrhus
appellatur, descendente ad partes subiectas:
exempli gratia ad partes thoracis; quod ut fa-
cilius fiat, prius præponemus definitionem i-
psius catarrhi. Porro cum catarrhus sit fluxio
pituitosa emanans a cerebro ad subiectas par-
tes, facta vel ratione cerebri, vel ratione par-
tium inferiorum, vel ratione vtriusque, aut ra-
tione causarum extrinsecarum, aut omnium
simul, a quo plurimi morbi manare solent:
sequitur igitur, cum hic quoque duo adsint:
alterum membrum mandans, scilicet cerebrum:
alterum vero membrum recipiens, utpote ali-
qua subiectarum partium, ut etiam sumendæ
sint indicationes a natura vtriusque. Natura
autem membrorum cum consistat in horum
duorum consideratione: nempe substantiæ,
ex qua membrum est confectum, an ex carne,
venis, nervis, arteriis: modi substantiæ, ut an
laxum vel solidum: temperaturæ, an calidum,
vel frigidum: sensibilitatis & insensibilitatis:
nobilitatis & ignobilitatis: operationum, qua-
rumnam operationum sit opifex: situs, utrum
in profundo vel in superficie positum sit: col-
ligantiæ seu communicantiæ. Sequitur etiam
in catarrho hæc omnia esse considerata: &
hoc, quod secundum diuersam membri natu-
ram diuersæ etiam oriantur indicationes cu-
randi. Membrum autem mandans in catarrho
cum

cum sit ipsum cerebrum, & cerebrum quo ad substantiam suam constet ex substantia medullari, membranis, venis, nervis, arteriis, & multis foraminibus: sequitur quod ratione tot vasorum indicabitur materiã posse trahi & cõmode per vasã, & facile quidem ratione quã laxum est: ratione situs, cũ sit in superioribus, quod euacuatio erit commoda, si sanguinem mittere opus erit, ex cephalica superiori: aut si pharmaco, per vomitũ, & alium ratione cõmunicantiẽ cum stomacho. Quo ad temperaturam, cerebrum est frigidum & humidũ, consequenter abundans plurima pituita. Cũ talis ergo sit excrementorum proventus, qualis est ipsa complexio: ideo complexio indicabit euacuandum esse. Quẽ quidem pituitẽ euacuatio per superiores venas, & per emunctoria, euacuari poterit cum caput purgiis per propria foramina, & cum masticatoriis, trahẽdo materiam per palatum, & per nares. Loca etiam, per quẽ transit catarrhus, indicabunt agendi modum. Nam si catarrhus trãsibit per venas, indicabit per missionem sanguinis, & per vrinẽ prouocationem id fieri posse, dummodo materia non adsit admodum cruda, 4. de val. tuen. Quia tunc commodius euacuabitur per vrinẽ prouocationem quam per sanguinis missionem. Sin autem materia trãsibit per canales amplos, & primo per asperam arteriam, indicabit euacuationem per tussim, & bechicis medicamentis prouocãda erit tussis.

Indicationes sumptæ a structura cerebri.

Pituita in cerebro vacuatio.

Catarrhus transiens per venas indicat miss. sang. & vrinẽ prouocationem.

*Catarrhus
transiens
per asperam
arteriam,
per gulam,
per spinalem
medullam.*

*A membro
mandante
indicatio-
nes.*

*Totius eua-
cuatio per
phleboto-
miam &
pharmaciam.*

*Tria instru-
menta va-
cuandi ca-
put.*

Corroboratio duplex.

Si vero per gulam, indicabit euacuationem per vomitum, si vomitui erit assuetus, aut per secesum. Sin autem transibit per spinalem medullam, & nervos, in quibus nervis frigidis imbibatur materia frigida, ibique figatur, indicabit esse procedendum cum concoquentibus & digerentibus, & attenuantibus efficacissimis, & euacuationibus validissimis: sicuti fit in iis, qui patiuntur spasmus. Quod si membrum mandans excrementa non solum sit cerebrum, sed etiam corpus vniuersum, orientur duae indicationes: primo totum corpus, secundo caput euacuandi: tertio corroborandi. Totius autem euacuatio primo fiet per sanguinis missionem duplici ratione: tum pro euacuatione, quod pituita per venas defluat, tum ratione auersionis propter periculum rupturæ venæ: dein pharmaciam; & hoc ratione humorum extra venas existentium, ut pituita exempli gratia in ventriculo existentis: postmodum ad capitis euacuationem erit descendendum, quæ quidem tribus instrumentis commode fieri poterit: caput purgiis per nares scilicet trahendo: masticatoriis per palatum: & gargarismatibus: quanquam eam euacuationem quæ per nares fit non multum laudem: Dein ad capitis roborationem erit accedendum: corroboratio autem cum duplex sit: altera improprie fortiori vocabulo corroboratio dicta, quando scilicet membrum constringimus, ne ita aptum sit ad receptionem fluxionis: altera proprie, quæ

B

quæ est reductio membri ad proprium habitum naturalem, a quo lapsum fuit: quod fit caloris innati, spirituum, humorum, & solidorum reparatione. Igitur cum caput lapsum sit ad temperiem frigidam & humidam, per calidum & siccum erit reducenda. Sed hætenus de curatione membri mandantis. Quo vero ad membrum recipiens, ipsum quoque indiget suæ curatione, diuersa tamen. Primum igitur prouidendum erit ne amplius recipiat: quod fiet duobus instrumentis: corroboratiõne scilicet membri impropria, quæ fit cum repellentibus, & astringentibus, & auersione. Quæ quidem auersio in omni casu perpetua est: non autem sic ipsa corroboratio. Vnde quo ad materias, quæ per venas pectoris defluunt, reperiendum erit, non quidem cum exterius repellentibus, cum huiusmodi Galen. 5. meth. sint abominanda, & hoc, quod refrigeratæ partes illæ aptiores euadant ad fluxum suscipiendum. Igitur erit reperienda cum interius repellentibus. Ea autem quæ interius exhibentur, non debent esse cuiusque generis, quoniam opiata, & philonium, quod moderni tam facile exhibent, cauenda sunt: sed repellentia in hoc casu debent esse nec multum frigida, sicuti est opium: nec multum astringentia, qualia sunt illa, quæ exasperant, cuiusmodi est electuarium factum ex succo granatorum, balaustiorum, vel mespili, vel sumach, vel huiusmodi. Quoniam cum exasperent arterias, tussim prouocant, pulmo-

*Membri recipientis
curatio.*

Auersio.

*Galenus repellentia
exterius improbat.*

*Repellentia
quando
materia per
venas pectoris
defluunt.*

Corroboratio.

nem exsiccant, & sputum sanguinis caulant. Quare corroborantia debent esse moderate frigida, cum aliquali caliditate: sicuti est illud Galeni, quo vitur in distillatione ad pectus, theriaca noua, vel diaspermaton ex seminibus confectum, quod habet multa calida: vel moderate exsiccantia, cuiusmodi est saccharum

Saccharo rosaceo phthisici curati.

rosaceum, rodosaccharum appellatur, cuius vsu asserit se Auicenna phthisicos curasse: vel succo myrtillorum, vel syrupo de iuinibus, qui leniter astringit absque exasperatione: syrupo

Iuinibus succus.

violaceo composito cum nucibus aptissimo ad corroborandum: syrupo de siliquis, bolo armena orientali, quæ præseruat a sputo sanguinis. Neque enim verum est quod vulgo dicitur, quod astringat cum asperitate: quinimo lenit & corroborat absque valida astrictione:

Bolus armena orientalis non astringit.

neque enim omne exsicicans astringit. Neque propter id, quod in ore posita, videntur linguam astringere, est arguendum, bolum armenâ astrictiuâ esse, quoniâ illud euenit ob hoc, quod linguâ statim exsiccat, vnde pestilētibus maxime conuenit, in quibus maxima exsiccatio

Bolus armena pestilentibus conuenit.

opponitur maximæ putredini, & asthmaticis propter plurimos humores descendētes. His factis, quo ad membrum mandans, & quo ad membrum recipiens: consideranda post ea erit materia catarrhi, quæ quidē cum sit pituitosa & frigida, vt ex eius diffinitione patet, euacuanda erit. At vt recta fiat euacuatio, prius erit consideranda: postmodum ad illa tria instrumēta

Materia catarrhi consideratio

artis

17 artis medica erit accedendum: primumq; erit instituenda recta viuendi ratio circa cibum & potum, ad duo potissimum respiciendo, ad quantitatem videlicet & qualitatem. Quantitatem metiemur vt ait Hippocrates l. aph. a si ne ipsius ægritudinis, quæ si cito terminatura est, pauca quantitatis erit: cum modo in hoc casu egritudo pendeat a materia frigida et crassa, consequenter habeat in longum trahi, victus non erit exhibendus tenuis, sed carnes, & vinum quandoque. Quo ad qualitatem ciborum, ratio eligendi veram ciborum qualitatem iudicetur semper a causa faciente affectum: causa autem faciens affectum, cum sit materia pituitosa, crassa, & viscida: indicabit qualitatem ciborum attenuantem, subtrahentem, incidentem, atq; abstergentem, talem, qualē descripsit Gal. lib. de attenuante diata. Acetaria igitur secundum Acetaria. anni tempora erunt eligenda, qualia sunt lupuli, asparagi, radices petroselini, cappares, radices dauci, quas carotas appellant, cum saccharo, aceto, & cinnamomo: radices etiam Radices cichoreæ, cum aperiant, urinam prouocent, & ratione amaritudinis abstergant: in ferculis semper aliquid apponentes, quod urinam prouocet, qualia sunt radices petroselini cum feniculo, & aniso, carnes erunt aues, pulli, ha- Diuretica. dina præparata cum iusculis, in quibus aliquid sit quod habeat vim incidendi, vt cum Vinum in principio non conuenit. caryophyllo, mace, cinnamomo. A vino in principio cauendum erit in catarrho, tum quod

*Potio ante
purgationē
conueniens.*

*Quomodo
vinum pur-
gato cor-
pore pro-
fit.*

*Animi ac-
cidentia.*

*Somnus &
vigilia.*

Exercitia.

in principio sit plenum, vinum autem euapo-
ret: tum quod humores præparatos & crudos
per venas distribuat, causans per varia loca
venarum obstructions: sed potio sit decoctū
vel ex aromatibus, vel seminibus, vel herbis
confectum, sicuti caryophyllis, aniso, ciminio,
betonica, roremarino, in quibus est vis inci-
dendi, addendo oxysaccharum, illud efficien-
tes magis & minus acidum, vt docet Galen. 4.
de tuen. val. de oxymellite pro ratione corpo-
ris, cui debet offerri. Atque hæc erit potio,
quæ ante purgationem conueniēs erit. Mun-
dificato corpore vniuerso, ex parte vinum cō-
ueniet: tum quod ventriculum corroboret, &
per venas residuum materiæ existētis in ve-
nis ad vrinam deducat, tum quod excrementa
melius conficiantur a moderato vini calore.
Vinum autem nec fumosum, nec crassum sit,
nec dulce, sed lene, tenue, bene maturum, ha-
bens tandem syrupi vim, illud prius diluendo,
donec ager assuefiat. Quo ad accidentia, o-
mnia quæ poterunt calfacere & exsiccare sine
spirituum resolutione, optima erunt, sicuti
aliqua brevis iracundia. Quo ad somnum &
vigilias, declinabit potius ad vigilias, mode-
ratas tamen; quia immoderata postea refri-
gerant. Quo ad exercitia, exerceatur tempo-
re matutino, aut si non poterit ratione agri-
tudinis, fricentur partes inferiores longis
frictionibus: & post frictiones inungatur oleo
camomellino calido, aut anethino cum por-
tione

tione vini aromatici, vt materia diffletur. *Inanitione & repletio.*

Quo ad inanitionem & repletionem habeat alui beneficium ad prohibendum euaporationes. Quod si natura defecerit, arte erit succurrédum, clysteribus communibus, semper commiscendo aliquid hyeræ picræ, vel aliquã ex hyeris magnis, qualis est illa Logodii, & Hermetis. Quo ad secundum instrumentum, *Missionis sanguinis tempus.*

B chirurgia in hoc ægro sane erit necessaria, tū quod materia fluat etiam per venas, tum etiam propter imminens periculum rupturæ venæ ipsius pectoris. Tempus autem mittendi sanguinem, tametsi in principio semper phlebotomia fiat, in hoc tamen casu, in quo materiæ crassæ frigidaë per venas defluunt, *Materia crassa phlebotomia prius preparanda est.* opus erit huiusmodi materiam crudam cum sanguine in venis commixtam, concoquere prius & attenuare, ne incidamus in frigidorum incrudationem: Quare biduo saltem, aut triduo concoquendum erit & euacuandum, postea vena erit secanda: quæ autem vena sit secanda sumetur ex Galeni præceptis, ex consideratione ipsius materiæ, vt *Qua vena sit secanda.* vt fluxura sit, an sit fluxa, an vero partim fluxerit partim fluat. Quoniam fluxura auersionem tantū requirit, eligendo venam maxime remotā: fluxa vero auersionem non postulat, sed euacuationem, & deriuationem. fluxa autem & fluens tribus indiget, euacuatione, deriuatione, & auersione. vnde erit eligēda vena, quæ hæc tria simul efficere possit: huiusmodi autem erit ce-

*Purgatio
totius præ-
mittenda est
purgationi
capitis.*

*Materia
catarrhi
præparatio.*

*Purgantia
totum cor-
pus.*

*In euacua-
tione partis
mandantis
gargarif-
mata sunt
fugienda.*

phalica. Vtrum autem semel, vel bis, vel ter hoc sit faciendum, indicabitur vt ait Gal. lib. de phlebotomia, a ratione magnitudinis, ægritudinis, & conditione corporis affecti. Quo ad tertium instrumentum, pharmaciam scilicet euacuantem, cum prius totum sit euacuandum, quam caput, materia autem in toto exlites sit frigida, crassa, viscida, & quatenus crassa indiget præparatione per incisionem: quatenus viscida absterfione: quatenus frigida & cruda concoctione: sequitur quod oxymel optimum erit, syrupus acetosus ex saccharo & aceto compositus, syrupus ex duabus, & quinque radicibus, oxymel Iuliani compositum efficacissimum, syrupus de betonica, de stæcha de simplex & compositus. Decocta etiam ex betonica, salvia, & vbi timetur caliditas hepatis, endiuiia, boragine. Dein totum corpus erit euacuandum agarico, pilulis cochiis, & compositis hyeris omnibus, & tandem iis omnibus, quibus diximus huiusmodi humorem purgari. Hæc de euacuatione corporis vniuersi. Sequitur particularis euacuatio membri mandantis, & recipientis. Pro euacuatione igitur mandantis, & si caput tribus instrumentis, euacuari possit, vnum tamen, quod est gargarisma est fugiendum: & hoc, quod trahat materiam ad partes pectoris: sed caput purgiis vtendum cum aqua maioranæ, betonicæ, succo ciclamini, decoctione ellebori, vel elaterii, quod efficacissimum est ad trahendas a capite materias:

terias : masticatoria in hunc vsum erunt, ma-
stix primi gradus:radix capparis secūdi gradus:
pyrethrum & piper tertii, staphisagria omniū
validissima:aliquod vero istorum, vel plura si-
mul accipiemus,& faciemus pulueres,& cum
cera illos componemus, aliter per gulam di-
luerentur, & facerent excoriationem, quam
prohibet cera;cum propter sui visciditatē ad-
hæreat,& firmiter atque diu retineatur in ore.
Quo vero ad membrum recipiens,pectus sci-
licet,euacuabitur cum iis, quæ tussim prouo-
cant : cuiusmodi sunt syrupus de farfara, de
tussilagine,de hysopo, cum decocto seminū
citri, quod a pulmone per vias vrinæ euacuet,
faciendo validam decoctionem, ex saccharo
& syrupis. Sequitur corroboratio membri
mandantis & recipientis : Corroborabimus
igitur caput cum sit frigidum & humidum,
calfacientibus & exsiccantibus, puluisculos
ponentes supra capitis cōmissuram, ex mace,
caryophyllis, maiorana, cinnamomo, gingi-
bere confectos, qui exsiccant, & odorati sunt.
Poterunt etiam fieri cerata,dropaces, sinapis-
mi,cum pyrethro,nasturtio,thapsia,quæ faci-
unt vesicas.Amplius lixiuiis diuersis corrobo-
rari poterit, in quibus sint decocta calfaciētia
& exsiccantia:cuiusmodi sunt maiorana, ros-
marinus, agaticus, ad calfaciendum & exsic-
candum:conficiendo saponem ex caryophil-
lis,iride,ladano,mace.Amplius balneis calidis
& siccis in caput distillantibus. Nam tametsi

*Masticato-
ria.**Puluerum
correctio.**Membrum
recipientis
vacuatio.**Tussim pro-
uocantia.**Decoctum
seminum
citri.**Corroboratio
capitis
per pulueres
dropaces.**Lixiuum.**Saponem.*

*Balnea.
Ventriculi
corrobo-
ratio.*

*Pectoris
corroboratio.*

Corroboratio totius.

Galenus dixerit, balnea calida & sicca capiti non conuenire, intellexit de capitibus calidis. Corroboratio autem membrorum recipientium, ut ventriculi, fiet cum astringentibus omnibus, quæ sint amara, cuiusmodi est absinthium, confectio diarrhodon, aromaticum rosatum, diaciminum. Pectus autem corroboratur theriaca noua, mithridato nouo, diaspermation, bolo armena, saccharo rosaceo. Vniuersum vero corroborabitur, theriacis magis, qualis est illa antiqua, mithridato antiquo, diamusco, & diambra. Sed hæc de curatione affectuum simul implicitorum ipsius capitis, quorum exemplo facile cuique erit curare affectus simul implicitos aliorum etiam membrorum.

F I N I S.

INDEX

INDEX TOTIVS OPERIS

Admonitio Typographi ad Lectorem.

VT vitaremus amico Lector errores crassissimos, qui in Indicibus cōficiendis ob tediū ac molestiā laboris immensi committi solent, nihil in hoc a nobis mutatum, sed intacta illa saq. relicta sunt omnia. Quare in quarendis iis, quae velut memorabilia & ἀξιωματικὰ in Indicem sunt relata, non eos qui singulis columnis sunt praefixi, sed quos ad marginē videris numeros annotatos inspicias, ad eosq. tanquam ad scopum collimabis. Vbi praeterea & hoc observandum, post singulos numeros marginales sequi literam B. Hanc literam alicubi in Indice videris, alicubi non. Vbi videris, quares in libro numerū consonanti B praepositum. Ad id ubi quarendo peruenies, certo statues ea, quae litera B in Indice fuerunt notata, repertum iri intra literam B & numerum sequentem immediate. Sic ubi vero nullam in Indice videris adscriptam literam, numerus te docebit ea, quae scire aues. Vale.

A

Abdomen,

IN inflammatione abdominis extrinseca, cū inflammatione iecoris, partium situs quantitatem remedia variat. 17.b

Abcessus.

Abcessus dicitur collectio puris, quando materia inflammationis a calore insito vincitur. 3.b

Absinthium.

Absinthium incoctum in mulla, commodè pellit succos tenues, quicunq.

continentur in ore ventriculi. 73.

Absterfus.

Absterfus definitio, eiusque explicatio. 53.b

Accessio.

Accessio Græcis paroxysmus dicitur. 35.

Accessio est deterior pars periodi. ibi.

In accessione a cibo abstinendum est. 37.b

Accessio cōtinet sub se principium, augmentum & statum, non autem declinationem 35.

I N D E X.

Accessionis febrium quatuor tempora.	136.	plex est.	ibidem.
<i>Acetata.</i>		Animalis motuæ læsio	6.b
Syrupi acetati nocent thoraci.	69.b	Animalis sensitiva seu cognoscitiva.	4.b
<i>Acetum.</i>		Animalis sensitiva interior duplex est.	5.b
Correctio aceri.	68.b	Actionis attractivæ symptomatica.	107.
Acetum mire convenit in intemperie cerebri a materia biliosa.	145.b	Læsio actionum in febribus.	131. b
Acetum facit bilem degenerare in pituitam.	ibi.	In putrida continua actiones duplici modo læduntur.	132. b
In hæctica temperatum aqua præstans est	141.	Actiones naturales aut sunt factæ propter individuū, aut propter speciem; quæ propter individuum aut sunt principales, aut deseruiunt principalib⁹.	3. b
Medicamenta ducit in altum.	29.	Actiones naturales deseruientes principalibus.	3. b
Neruis nocet.	68. b	Actio naturalis sensitiva externa.	4. b
Picrocholis convenit.	115. b	Actionum integrarum causa.	107.
in Obstructionib. viscerū.	19.	Actio vitalis.	3. b
in Phreneticis.	20.	<i>Ægilops.</i>	
in Scirrho maxime salutare est, si debito tempore adhibeatur.	82.	In incipiente Ægilope secatur vena humeralis eiusdem lateris.	77. b
<i>Achores.</i>		<i>Aer.</i>	
Galenus illenit achoribus chartam iustam, exacetato.	18. b	Habet rationem alimenti & medicamenti.	31. b
Propter ingratum odorem achoribus vrina non convenit.	28. b	in Apoplexia debet fieri calidus.	147.
<i>Acria.</i>		Mutat artem alendi.	39.
Medicamenta acria exsiccat sordes in vlceribus.	11. b	Quomodo paretur frigidus & humidus.	54. & seq.
Acria mordent, calfaciunt & fluorem excitant.	ibi.	<i>Ærugo</i>	
<i>Actio.</i>			
Actiones sunt tri. lices.	3. b		
Actio animalis duplex.	4. b		
Animalis cognoscitiva du-			

INDEX.

Ærugo.

Ex cera & æruginē medica-
mentum incarnans. 30.

Æs.

Æs vñtum vehementer ex
tergit. 31.

Itē æris flos & squama. ibi.

Æstuario.

Postulat vomitum. 73.b

Ætas.

indicat similia. 35.b

mutat artem alendi. 39.b

deducit in cognitionē mor-
bi. 35.b

Affectus.

Affectus præter naturam 1.b

Affectus duplex simplex seu
solitarius & alteri associa-
tus. 2.

Affectus simplicis simplicif-
sima est curatio per con-
traria. 13.

Affectus impliciti. 10.b

Impliciti sunt aut eiusdem
generis aut diuersi. 12.

Eiusdem generis sunt aut
similes aut dissimiles aut
contrarii. ibid.

Affectus penes qualitates,
sunt multiplices. 52.b

Affectuum quantitas du-
plex longa & brevis 33.

Quantitas affectuum, eadē
remedii contrarii quan-
titate curanda est. 15.

Aphorismus in affectibus
frigidis. 147.b

Requisita perfectæ cog-
nitionis affectuum. 12. b

Agaricus.

Purgat atram bilem. 62.

Prodest Epilepticis. 119.b

Purgat pituitam. 61.

Alendi ars.

Dignitas vis & vñus artis a-
lendi. 31. b. 32.

Requisita 138 b

Desumitur ab affectu, loco
seu corpore affecto, reme-
dio & circumstantiis. 32.
b. 137. 138. b

Quæ immutent artem alē-
di. 39.

Ars alendi veterum, appli-
cata ad nostra tēpora. 33. b

Alendi ars in omni febrium
genere. 138 b

Vide victus.

Alimentum.

Cōsideratur tripliciter. 38. b

Certo respectu tale dicitur.
31. b

Relatum ad hominem est
quadruplex. ibid.

Genus alimenti sumitur a
genere affectus. 138 b

Alimenti indigentia & su-
perabundantia. 33. b

Crassum morbis longis, te-
nue breuibis & acutis
competit. 33.

Quantitas alimenti. 137. b
138. b

Quot vicibus sint adhiben-
da. 36. b

Alimenta temperata. 56. b

Exhibendi tempus idone-
um. 37. 138. b

Ccc

INDEX.

Aloe.
Ducit bilem & pituitā. 62.
In hæmorrhagia narium.
124. b potest exhiberi in
febre valde miti. ibid.
Aloë & mel siccant citra ro-
sionem. 11. b
Lota multum remittit de
vi medicamentosa. 31.

Alopecia.
In Alopecia a lenioribus au-
spicandum est. 30.
Medicamentum Galeni. 29.
Alopeciæ inueteratæ cura-
tio. 16. b

Alteratio.
Definitio alterationis, eius-
que explicatio. 52. b
Alteratio in Vitiis causæ cō-
tinentis penes qualita-
tes. 67. b
Alterationis causæ. 52. b
Species. ibid.

Althea.
Maturat, resoluit & dissol-
uit sine attractione. 145.
Mucilago seminum altheæ
in dolore capitis. ibid.

Alum.
Excremēta alui triplicia. 36.
Causa tardæ deiectionis. 4.
vnde petēda medicamen-
ta ī tarda deiectione. 109.
Rhabarbarum crasso mo-
do datum mouet aluū 19.
Alui cruenta deiectio. 9.
Profluuium. 29. b 120. b
Fluor a catarrho. 126. b ani-
mi a humiditate. 28.

Aluus per febres liquida. 43.
Frigida & constringentia nō
conueniunt fluxionibus
alui. 111.
In fluxionibus alui non fit
mētio sectionis venæ. 80.
In fluxu alui victus ratio a
vi morbi. 142. b

Alumen.
Etsi alumen non sit frigidū
tamen ratione acerbita-
tis validissime repellit. 65.

Amara.
Exsiccant citra morsum. Id-
eo p sunt exulceratis. 11. b
quæ sunt fundata in crassa
substantia, adiuuāt tran-
situm coris in astictio-
nibus. 94. b

Amentia.
Causa amentia. 6.
Amentia a pituita. 118.
a frigida & sicca intemperie
cerebri. ibid.

Amygdala vide Tonsilla.
Anasarca.
Anasarca cum febre 110.
quando Venæ sectio possit
vtiliter institui. 78.

Angina.
Est morbus exquisitissime
acutus. 33-34.
Curatio. 106.
Deriuatio. 67. b
Venæ sectio confert dupli-
citer. 77. b
Quæ vena & quomodo se-
canda. ibid.
Sectio venæ humerariæ. 57.
Venæ

INDEX.

- Venæ sub lingua sectæ ma-
gnopere profunt. 77.b
- Gargarismata, rotulæ, discu-
tientia, trahentia ad ex-
tra. 106.b
- Repellentia 66.
- Vacuatio corporis ab excre-
mentis confert duplici-
ter. 106.
- Angina vergens in absces-
sum. 106.b
- Anhelitus difficultas vide*
Asthma.
- Animus.*
- Accidentia animi. 31.
- Deliquiū, vide lipothymia.
- Æstuatō siue anxietas. 8.
- Anus.*
- Cōstitutio anni est circum-
stantia annexa virtuti. 31.
- Tempus anni indicat con-
stitutiones morborū. 35.b
- mutat rationem curandi. 31.
- mutat victum. 40.
- Anodyna vide Stupefacien-
tia.*
- Anthera.*
- Quid vulgo dicatur. 127.
- Antimonium.*
- Illotum astringit, lotū mor-
daciditatē fere deponit. 31.
- Anus.*
- Procidentia ani ex decubi-
tu pituitæ, a tumore præ-
ter naturam & aliis cau-
sis curatio. 129.
- Doloris in procidentia ani
curatio. ibid.
- Officium musculi ani. 24.b
- Vide Podex.*
- Apepsia.*
- Causa apepsia & cruditatis
ventriculi. 41
- Aperientia.*
- In febribus continuīs ante
euacuationem totius, nō
conueniunt aperientia.
139.b
- Modice tergētia & aperien-
tia admixta frigidis & sti-
pticis. 66 b
- Apertio.*
- Definitio apertionis, eiusq;
explicatio. 94.
- quid differat a rarefactione.
ibidem.
- Aphtha.*
- Aphtharum curatio. 16.b.
- In malignis aphthis validis-
sima medicamenta con-
ueniunt. 18.b.
- Medicamentum ex oleo &
chalcitide ad aphthas. 30.
- Aphorismus.*
- Explicatio aphorismi quarti
primæ particulæ. 34.
- Apnaa.*
- Est abolita respiratio. 6.b 118
- Apophlegmatismi.*
- Quibus noceant. 17.b
- Quo tempore iis vtendum.
ibid.
- Apoplexia.*
- est Symptoma omniū fun-
ctionum animalium. 7.
- est morbus instrumētarius.
ibid.

I N D E X.

- Causa apoplexiæ. 7.b 119. 146.
 Curatio causæ antecedentis. 147.
 Cognitio morum apoplexiæ. 146.b
 Tempora. ibid.
 Derivatio. 67.b
 Aër, missio sanguinis, pilulæ, frictiones, ligaturæ, localia. 146.b
 Suffitus, cucurbitulæ, apopleghmatismi, gargarismata, sternutamenta. 71.b
 Clysteres. 74.b 146.b
 Somnus & vigilia, animi accidentia, motus & quies. 147.
 Cibus & potus. 55. 147.
 an cõperat secare venâ. 79.b
 in Apoplexia non competit repulsio. 65.
 Pilulæ non exhibentur. 146.
 Apoplexiæ post paroxysmũ curatio. 147.
 Apoplectici post paroxysmũ muti & stupidi. 148.
 Dissipatio relictæ materiæ, obstruentis cerebrũ. 83.b
Appetitus.
 Abolitus. 3.b. 107.b
 Caninus. 72. 107.b
 Appetentia canina ex intemperie frigida, cum humore pituitoso & acido. 108.
 ex immodica dissolutione corporis. ibid.
 Curatur potu vini. 167.b
 Imminutus. 3.b
 Nimius a pituita acida 55.b
Aqua.
 Aquæ distillatę omnes sunt frigidæ. 147.b
 Aqua nervis est inimica. 20.
 Tepida bene vacuat renes excrementis. 129.b
 In quib. febribus concedatur. 43.b
 Aquosi potus differentia. 42.b
Arteria.
 Exasperatio arteriæ asperæ. 28.
 Hemorrhagia arteriæ. 124.b
 Quando conveniat in vertigine secare arterias post aures. 79.b 119.b
 vlcera arteriæ asperę. 19.b 29
 Arteriaca confectio lysiæ. 28
 Arthritis est nomen generale. 5.b
 Differentia. ibid.
 Duæ præcipuę causæ arthritidis. 116.
 Scopus curandi. 15.
 In magno colore arthritidis. 116.b
 in intolerabili dolore. ibid.
 in tumorib⁹ Arthriticis. 110
 Topica in Arthritide. 116.b
 in Arthritide quando materia desit fluere. ibid.
 Quæ vena sit secanda. 79.
 Arthritis curatur paralyti. 147.
 Arthritis. sola ratione victus curata 32.
 Medica-

INDEX.

- Medicamenta arthritica. 68.
vnde incoanda sit curatio
in doloribus articulari-
bus. 13.
- Ascites.*
Est Symptoma deprauatæ
nutritionis. 4.
Ab vniuersa euacuatione a-
quæ cauendum est. 110.
victus ratio. 55.b
- Asclepiades.*
Catagmaticum Asclepiadis
ad ossa fracta. 11.
- Assimilatio.*
non fit sine transmutatio-
ne. 22.
- Asthma.*
Causa asthmatis est morbus
in mala compositione,
nempe obstructio viarū
per quas inspiratur aer.
6.b
Asthma ab obstructione pe-
ctoris aut pulmonum. 69
71.b
ab obstructione viarū spiri-
tus. 95.b
Auersio. 51.b
siccātia sunt incōmoda. 29.
Dissipatio reliquiarum. 84.
- Astringentia.*
in dispncæa. 118.
fluxione biliosa. 126.b
fluore sanguinis: 124.b
phrenitide. 14.
pulmoni sunt aduersa. 26.b
curatione vlceris. 98.
in febribus non conueniunt
astringentia cutim. 121.
- nec in febribus. 139
- Atrophia.*
Causa atrophix. 4.
Atrophia ex calida & sicca
intemperie iecoris tollē-
da est lacte alinino, hu-
mano, & decocto hordei.
90.
- Attractio.*
Definitio, eiusque explica-
tio. 85.
Symptomata attractionis
deprauata. 107.b
in fluxu vehementi, nō sunt
vsurpanda attractoria. 67.
Attractio læsa. 3b
- Attritio.*
Cruda spuma argenti, corri-
git attritionem. 30.b
- Auctio.*
Auctionis symptomata, nō
enarrantur apud Medi-
cos. 4.
- Auditus.*
Grauis. 111.
Causa grauis auditus. 4.b
Meatus auditorius fert me-
dicamenta validissima.
111.b
Auditus læsus. 4.b
- Auersio.*
Definitio, & eius declaratio
50.b
a repulsione & deriuatione
differentia. ibid.
Tres conditiones auersio-
nis. 120.
Auersio locum dupliciter
reddit tutum. 50.b

INDEX.

Aues.

Caro aurium ex seipſa declinat ad caliditatem & ſiccitatem. 5.b

Aures.

Cavitas aurium. 184.
Dolor a frigidityte. 114.
ab intemp. calida. ibid.
in dolore aurium cataplaſma. 113.b
Stupeſacientia quando adhibenda. 16.114.
Quomodo medicamēta iniicienda ſint in vehemēti dolore. ibid.
Frigida infuſa nocēt. 145.b
Quæ vena ſit ſecanda, in dolore aurium ab inflammatione. 78.b
Inflammatio aurium. 51.
Deriuatio in inflammatione. 67.b
Obturation aurium in hæmorrhagia narium. 124.
Cauſa ſonitus, ſibili, fluctuationis & ſtrepitus aurium. 4.b
Sonitus a ſpiritu craſſo & flatulento. 111.b
a ſubtilitate ſenſus audiendi. ibid.
in febris. ibid.

Axilla.

Inflammatio axillarum. 51.

B

Balani.

Inteſtino recto inuēti ſunt. 18.

Balanſtium.

validiſſime repellit. 65.b

Balneum aqua dulcis.

Curat dolores oculorū concocta phlegmone. 113.b
Quando non conueniat. 121
Commodiſſima eſt in Syncope a fluxione ventriculi. ibid.

Bilis.

Materiæ educētes atrā bilem leniter, mediocriter & vehementer. 63.
Quomodo cognoſcatur an bilis vel pituita præualeat. 140.b
Quomodo obtundatur bilis calida & feruens. 53.b
Cauſæ bilis exſuperātis. 134.
Alteratio bilis per ſyrupos. 56. & per alimenta. 56.b
Immutatio qualitatū bilis per alimenta compoſita. 57.
Corpus atra & ruſa bile repletum. 12.
Purgatio bilis. 59.60.
Bilis cum pituita, aut atra bile, aut cum pituita & atrabile coniuncta purgatio. 62.62.b
lenis, mediocris & vehemēs euacuatio bilis. 62.b
Myrobalani citrini purgantes bilem. 145.
Vitia bilis. 53.b
Bilioſus.
Vitia humoris bilioſi. 2.
Bilioſus

INDEX.

Bilioſis cōuenit viſtus craſ-
ſior quam phlegmaticis.

140.

In fluxionibus bilioſis *ἀντι-
πις*.

126.

In fluxione bilioſa deiicien-
te vires, astringētia.

126 b

viſt^{us} in morbis bilioſis.

137. b

Sanguis bilioſus parcius eſt
vacuandus.

135. b

Bitumen.

ſiccatur.

11. b

Boethus.

Curatio vxoris Boethi.

128. b

Bolus.

Armena Orientalis non a-
stringit.

156. b

conuenit peſtilentibus. *ibi.*

Boli conueniunt cum a lon-
ginquis partibus trahen-
dum eſt.

19.

Bradypepsia.

eſt ſymptoma coctionis im-
minutæ.

108. b

Cauſa bradypepsia.

4.

Bulimus.

in febris.

108.

Qui animo deficiunt, odo-
ramentiſ excitantur. *ibi.*

C

Cachexia.

Cauſa Cachexia.

4.

Curatio.

110 b

Quando conueniat purga-
re, aut venam incidere.

78.

Caliaca.

Eſt ſymptoma diminutæ
retentionis.

3 b

Calchantus.

in affectionibus oris, non eſt
exhibendus.

21.

Calculus.

In quo genere morborum
reponendus.

10.

ex calida intemperie renū.

10. 90. b

ab obſtuctione renum.

95.

obturans meatū vrinae.

13. b

Cautela in curatione calcu-
li.

129. b

Emollitio.

81. b

vehementer calida fugien-
da.

129. b

Dolor.

116.

Viſtus.

55. b

Vomitus.

73. b

Præſeruatione.

72. 70. 74. 129. b

Calida.

Vis calidorum in primo, ſe-
cundo & tertio.

81. b

In affectibus calidis fugien-
da ſunt medicamēta for-
tia.

145.

Quomodo calida in reſera-
tione vaſorū conueniant.

125.

Caliditas.

Intenſa condenſat, modera-
ta aperit.

53.

Caluaria.

Emplaſtra idonea fracturis
caluariae.

11.

Calx.

Ignem non experta inſigni-
ter mordicat, elota mor-
daci tatem deponit.

30. b

Ccc 4

INDEX.

<i>Camomellum.</i>		ab æstu.	19
Decoctum Camomelli in I-		a bile.	74.112.b 145.b
leo.	73.109.	Criticus.	112.b
Hypochondriis & reliquis		Deriuatio in dolore capitis.	
visceribus decoctum est			67.b
gratissimum.	73.	Dolor ex ebrietate.	20.
<i>Canis.</i>		a febre.	14.b
Morsus canis rabidi.	16	a flatu cum calore aut frigo-	
stercus in dysenteria.	97.b	re.	112.
<i>Capilli.</i>		ex frigidityte.	16.
Defluuium.	16	ex frigidityte ambiētis.	112.
Tinctura.	20.	ex frigidityte antiquus.	93.
<i>Caput.</i>		ex calida intemperie cere-	
Corroboratio capitis per		bri.	76.72.
pulueres, lixiuum, sapo-		ex calida & sicca intempe-	
nem, balnea.	157.b	rie cerebri.	51.53 b 111.b
Solutio cōtinui in partibus		ex calida intemperie cū ma-	
capitis.	100.b	teria biliosa & flaua.	111.b
Deriuatio in affectibus ca-		ex intemperie calida & hu-	
pitis.	67.b	mida.	51.65.b
Frigida adhibentur capiti.		ab intemperie cerebri con-	
	120.b 145.b	tinente, corpore vniuerso	
Fracturæ capitis.	22.	repleto.	144.
Inflammationes partiū ca-		ex intemperie cerebri cum	
pitis.	144. b	sanguine peccante	144.b
Morbi capitis ex plenitudi-		ex frigida intemp. cerebri.	
ne.	51.		51.b 111.b
Affectus capitis inueterati.		ex intemperie sicca.	94.
	30.b	a plethora.	112.
Refocillatio.	29.b	a sanguine.	145,
Tria instrumenta caput va-		a materia calida & biliosa.	
cuantia.	156.b		74.b
Capitis a pituita purgatio.		a materia pituitosa & Me-	
	70.b 71.b	lancholica.	146.
Decoctio hellebori nigri est		ob plagam.	11 b
efficacissima ad trahēdas		a ventriculo.	ibid.
materias a capite.	157.b	Frigida & reperiuentia	
<i>Capitis dolor.</i>		quousque sint adhiben-	
ex ardore.	14.b	da.	145.
			Localia

INDEX.

- Localia ante euacuationem
non sunt adhibenda. 146.
- Succus papaueris in calido
dolore capitis. 92.
- Repercutientia non conue-
niunt ante euacuationē:
144. b
- Repellentia nocent, si adsit
febris. 66.
- Reuulsio. 57.
- Stupefacientia sunt fugien-
da. 20.
- Succus Mandragoræ nō ci-
tra damnum refrigerat. 92.
- Quando sit secunda vena.
78. b
- an dolor capitis valeat ægrū
interficere, aut in synco-
pen trahere. 146.
- Cardiaca.*
- Affectio Cardiaca ab intem-
perie calida. 73. 75.
- Medicamenta Cardiaca. 68.
- Caro.*
- in generatione carnis est
duplex excrementū. 97.
- Carnis & nerui corrobora-
tio in quo consistat, & quid
differat. 154. b
- Carus.*
- In quo genere morborum
reponatur. 6.
- Quid differat ab Apoplexia.
ibid.
- Intemperies cerebri frigida
& humida, orta a pituita,
est causa cari. ibid.
- Curatio. 6, 118.
- Cassia.*
- ducit bilē emolliendo. 60. b
- ducit bilem & pituitam. 62.
- Castoreum.*
- ratione renuis substantiæ
plus calfacit & siccit, quā
alia ipso calidiora & sic-
ciora. 145. b 146
- Catalepsis seu Catoche.*
- Causa. 6.
- Curatio. 118.
- Clyster. 74.
- venæ sectio. 79.
- Cataphora.*
- in quo genere morborum
reponatur. 5. b
- ex humiditate. 117. b
- ex frigidityte. ibid.
- an venæ sectio cōueniat. 79.
- Coma vigil. 117. b
- Catarrhus.*
- Definitio Catarrhi. 8. 155. b
- Causæ variæ. 8.
- Origo in capite. 123.
- Alui fluora catarrho. 126. b
- Aphorismus de catarrhis.
123.
- Consideratio materiæ. 156. b
- Præparatio. 157. b
- In Catarrho acri, acria me-
dicamenta conueniunt
ab initio. 123. b
- In acri & bilioso catarrho ex
intemperie cerebri calida,
suffitus & balnea. 92. b
- Catarrhus transiens per a-
speram arteriam, per ve-
nas gulam aut medullam
spinalem. 1, 6.

Ccc 5

INDEX.

- Fluens ad os aut nares. 123.
 delabens ad pectus. 154.b
 ad partes thoracis. 155.b
 Corroboratio pectoris. 156.b
 Præseruantia pectus a catarrho. 123.
 ex intemperie calida cerebri. 92.
 ex materia calida. 52. 54. 123.
 Pituitosus. 122.b
 a materia frigida. 52. 55. 123.
 in Catarrho frigido sacculi sinapismi, cauteria, suffitus. 92.b
 in fluxu acrium humorum, cauteria. 123.b
 Catarrhi longioris pericula. 122.b
 Indicationes sumuntur & a membro mandante & recipiente. 156.
 Tres indicationes Galeni. 123. 154.b
 Masticatoria, pulueres in Catarrho. 157.b
 Membri recipientis curatio. 156.
 Potio ante purgationē conueniens. 157.
 Repellentia nocent in catarrho calido. 66.
 Galenus improbat exterius repellentia. 156.
 Vacuatio totius præmittenda est. 156 157.b
 In vacuatione partis mandantis gargarismata sunt fugienda. 157 b
 Quæ vena sit secanda. 86.
 Tempus sectionis. 157.
 Quantitas & qualitas victus vnde sumenda. 156.b
Catheteres.
 qui adhibendi sint. 24.
Causa.
 Omnis causa prius quam affectus tollenda est. 15.
 Eadem contraria causæ & morbo semper competunt. 157.
 in febribus causa prius tollenda est. 137.
 Cognitio causarum monstrat indicationes. 120.
 Indicationes sumuntur a causa. 137.
 Causa duplex, alia antecedens alia continens. 2.
 Antecedens ex euidente defluit & continentem efficit. 15.
 Vitia causæ antecedentis. 2.
 2.b
 Curatio causæ antecedentis. 50 b
 Præparatio & curatio antecedentis causæ in Apoplexia. 147.
 in spasmo antecedens prius tolli debet quam coniuncta. 152.b
 Continens ex antecedente, antecedens ex euidente effluit. 13.
 Continentis ab antecedente differentia. 65. 67.b
 Curatio causæ continentis, quæ a loco remeabilis est, quæ

INDEX.

quæ non remeabilis, &
medio modo se habet. 65.
65. b

Euacuatio causæ continen-
tis per particularem de-
tractionem sanguinis. 81.

Euidens causa primo demē-
da, deinde antecedens,
quæ continentē efficit. 13.

Euidentiū causarū nul-
la est artificiosa curatio.
50. b

Cautica.

vnde dicantur medicamen-
ta caustica. 86. b

Cauterisatio.

Est extremum remediū. 86.

Definitio & declaratio. ibi.

Cauterisatio alia est actualis
alia potentialis. 86.

Quæ igne fit, tucior. ibid.
vtendi tempus, modus, quā-
titas, terminus. ibid.

Materiæ. 87.

Cauterisatio ī catarrho. 123. b

in Cranio. 87.

Epilepsia. 96.

Ischiade. 87.

Tabæ. 110. b

visione imbecilli. 52.

Cephalæa.

quid differat a Cephalalgia
& Hemicrania. 5. b

Curatio. 112.

Cephalalgia.

Distinctio Cephalalgia, Ce-
phalæa & Hemicrania. 5. b

viētus ratio in Cephalalgia
sanguinea. 54.

Cephalica.

Medicamēta Cephalica. 18.
68.

Cera.

Sola minime prohibet for-
des vlceris. 30.

Cerata.

differunt ab emplastris &
linimentis. 29.

Cerebrum.

Situs, temperamentum, o-
peratio, consensus & alli-
gātia, locus per quem ex-
purgatur. 25. 25. b

In inflāmatione cerebri v-
timur repellentibus. 65. b

in inflammatione cerebri
ca, quæ phrenitis dicitur,
vacuamus sine præpara-
tione. 68. b

In intemperie calida & sic-
ca, adhibentur repellens
tia. 66.

in intemperie cum materia
sanguinea reliquiarū dis-
sipatio. 83.

in Apoplexia cerebrum ca-
lescimus. 148.

Alteratio frigida intempe-
rici. 92. b. 93.

Repulsio non competit in-
temperiei frigida. 65. b

Vacuatio materiæ pituito-
sæ in intemperie frigida
cerebri. 92. b

Dissipatio reliquiarum in
pituitosa cerebri intem-
perie. 83.

vacuantia pituitam. 156. b

INDEX.

Intemperies frigida & humida. 55.

ex frigida & humida intemperie paralyfis. 93.

intemperies frigida & sicca. 93. b

Obstructio a materia pituitosa. 65. b 68.

ex materia sanguinea obstructio. 51 b

Repulsio non conuenit obstructioni cerebri. 65. b

Cerussa.
validissime repellit 65. b

ota exsiccatur sine erosione. 19.

Chalcitis vsta.
Extergit cum quadam mordacitate. 31.

Chironia.
sunt vltra cancro exulcerata similia. 3.

Cholera.
in quo genere morborum collocatur. 8. b

Causæ eiusdem. ibid.

Cholera ex corruptis cibis, cum copia bilis, aut vomitu intolerabili. 126.

Astringentia debet esse moderata. 125. b

Balneum, ligaturæ dolorificæ & frictiones conueniunt. 52. b

Purgatio. 75.

Missionis sanguinis non fit mentio. 80.

Ratio victus. 54. b

Cholerici.

Quomodo sint nutriendi. 37.

Cibus.

Cibi qualitas medicamenti potius, quam alimenti rationem habet. 32. b

Qualitas cibi indicatur a causa morbi. 153. b

Quantitas a tolerantia virtutis. 33. b

Cibi & potus diminutio indicatur a virtute oppressa & ab ipso morbo. ibid.

Causa corruptionis cibi. 4.

Quæ sint adhibenda in corruptione cibi. 109.

Præparatio cibi in febre pestilenti. 141.

Cibi fastidium vide in appetentia.

Cicatrix.

Ad vlcera, quæ cicatricem ægre recipiunt. 30. b

Inducunt cicatricem in vlcere oculorum. 101.

Cicer.

Decoctum ciceris pro immutandis qualitatibus humoris pituitosi. 57.

Cichorea.

Radices aperiunt, vrinas prouocant & ratione amaritudinis abstergunt. 157

vsus in Catarrho. ibid.

Cinaglossa.

Pilule Mesue de Cinaglossa. 123. b

Circumstantia.

variant curationem. 31

quot

INDEX.

- quot sint virtuti annexę. ibi. 75
Clysteres.
 Alij conueniunt cum eluendum est, alij cum intestinis debeat morari. 18
 Clysteriorũ in diuersis morbis forma varia. 73.b
Cochlea.
 In anasarca & arthriticis doloribus. 110.
Coctio.
 Ventriculi diminuta. 72.b
 Symptomata coctionis imminuta. 108.b
 Coctio laesa. 4.
 Medicari purgare cõcocta, 58
Cœlum.
 Status cœli monstrat constitutionem morbi. 35.b
Colicus dolor.
 ex flatu. 116
 ob inanitionem spirituum, cum syncope. 12.b
 a pituita. 151
 a materia crassa & lēta. 73.74
 a materia crassa inclusa intra tunicas cum astrictione alui. 12.b
 ab humoribus acris. 74. 115.b
 curatio. 146,6
 vehementer calida sunt fugienda in dolore colico a materia frigida & pituitosa. 115
 Bolus, clyster, glandes, fomenta, infusus, cataplasmata, stercus lupinum & vaccinum. ibid.
- Purgatio.* 75
Stupefacientia. 74.115.b
Collyria.
 Materiæ collyriorum siccorum & liquidorum. 66
 Collyrium ex thure. 101
Columbi.
 Caro columborum præter nutrimentum etiam calefacit. 39.
Columella.
 in Columella incipiendum est a repellentibus. 16.b
Condensatio.
 Definitio & declaratio. 52.b
 obstructionis & condensationis differentia. ibid.
Constitutio.
 sana corporis constitutio est causa actionum integrorum. 107.
 Quid sit constitutio morborum. 35
Consuetudo.
 indicat similia. 32.b
 habet vim circumscribendi & limitandi curationē. 31
 Minor & maxima. 42
 In victus & medicamentorum inuentione consuetudinis habenda ratio est. 40
Contenta.
 Naturalis contentorum cõstitutio consistit in tribus. 50.b
Contiguitas.
 Cõtiguitatis & vnionis differentia. 96

I N D E X.

Contrarium.

quid sit. 1.b
 Contraria contrariis curantur. 1.b 32.b
 Causæ & morbo nō semper eadem contraria competunt. 137

Conuulsio.

quid sit. 7.
 Curatio. 51.b 68.b
 Conuulsio canina. 96. 119
 ex consensu. 19
 ex inanitione, siccitate, aut ictu venenatorum animalium. ibid.
 venæ sectio in conuulsione ex inflammatione & repletionem. 79.b
 Febris superueniens curat conuulsionem. 119
 an sit tutū excitare febrē. 84
 larga frigida perfusio, soluit conuulsionem. 1.b
 Repulsio nō competit. 65.b
 Balnea. 84
 Reliquiarum dissipatio. 96

Cor.

Cordis temperatura, habitus, dignitas. 26.b
 Colligatio & cōsensus cum aliis partibus. 27
 sensus. 26.b 27
 situs. 27.b
 Paucissimis nervis indiguit. 27
 Partes cordi inserviētes. ibi.
 Dolor. 23.
 Corroboratio loco repulsio-

nis in calida aut frigida intemperie. 65.b
 Intemperies cordis a materia calida. 51.b
 Palpitatio. 6.b 57. 79. 118.b
 sanguis cordis est siccior & flauior quā hepatis. 26.b
 in omni syncope, cordi prospiciendum est. 120
 Tremor a materia calida. 51. 54. 68. b
 a materia & intemperie frigida. 68.b

Corpus.

Tres sedes corporis. 58
Corroboratio.
 Corroboratio totius. 158
 Membri corroboratio duplex est propria & impropria. 156.b
 in Catarrho. 154.b 156.b
 in fluxionibus. 154

Coxendix.

Dolor coxendicum. 13.b
 Fluxiones. 21

Craneum.

Fractura cranei. 20.b
 Cauteria in craneo. 87

Crisis.

Conditiones crisis absolutæ. 58
 Criticæ excrementorū expulsiōnes non sunt inhibendæ. 122.b

Crocus.

in inflammationibus concoquit & astringit. 14.b

Cruda.

quādo vacuanda sint. 149.b
 20

I N D E X.

an vacuanda in spasmo. 151.

153.

Cruditās.

ex multitudine ciborū 109.

ex ciborum vitiosa qualita-
te.

ibid.

Cruenta spūitio vide sputum.

Crus.

Inflammatiō cruris. 51

Cucurbitula.

Quomodo euacuent. 81.

Cutis.

Morbi cutis a salsis & adu-
stis humoribus. 56

Balnea pro crustis cutis &
alitis affectionibus. 90

Ulcerā cutis. 19

Curatio.

quid sit. 1.

Curatio sit per contraria. 1. b

32. b

Tria summa curationis ca-
pita. 131

In curatione quatuor omni-
no spectanda sunt. 136. b

Variantia curationem. 21. b

Mutatio curationis talis est
qualis morborum per sua
tempora. 14

Finis curationis, ut actiones
læsæ, pristinae dignitati re-
stituantur. 15

Cyclamen.

educit pituitam. 61

D

Daucus.

Radices dauci in Catarrho.

157

Delirium.

Deriuatio in delirio. 67. b

Quale vinum cōcedat Hip-
pocrates. 93

Dentium dolor.

ab intemperie calida aut fri-
gida. 114

Affectus dentium calidio-
res. 17:

Deriuatio in affectibus den-
tium calidioribus. 67. b

Quæ vena sit secanda, in do-
lore dentium a redundā-
tia sanguinis. 78. b

Stupefacientia. 114

Dentifricium. 18

Perforatio seu erosio den-
tium. 11. b

Depulsio.

Ampla depulsionis accep-
tio. 1.

Deriuatio.

Definitio deriuationis eius-
que explicatio. 67

Deriuationis & auersionis
differentia. 50. b 67. b

Destillatio.

Aquæ destillatę omnes sunt
frigida. 147. b

Diabetes.

quid sit. 9. 27

Eius causæ. 9.

Purgatio. 75. b

Topica. 90. b

venæ sectio. 80. b

Diacharion.

Est efficax stomachicum. 19.

Diachalcitis.

In affectibus oris fugiendū

INDEX.

est emplastrum diachalcis teos. 19	<i>Diuretica.</i> in catarrho. 157 in calida & sicca intemperie iecoris. 90 in principio inflammationis non conueniunt. 72.b
<i>Diagalanga.</i> in frigida & humida intemperie ventriculi. 88.b	<i>Dolor.</i> Causa doloris. 5. Articularis triplex. 5.b Capitis. 5.b in febribus. 137 Colicus. ibid. Iecoris. 23. in spasmō. 152.b compressiuius, cōtusiuius. 5.b exasperatiuius, grauatiuius. 5. extensiuius. 5.b Laceratiuius, mordicatiuius nephriticus, perforatiuius pulsatiuius, pungitiuius, pruritiuius, stupefactiuius, tractiuius, vlcerosus. ibid.
<i>Diagridium.</i> est scamoneum præpara tū in cotoneo & pasta. 62	Lateris. 5.b Ars sedandi dolores. 112 Moderate calida sedant do lores ab humoribus di stendentibus. 81.b Sedantia dolores. 21
<i>Diamoron.</i> Est medicamentum stoma machicum. 29	<i>Dropacismus</i> Actio dropacismi. 85 Causa efficiens, & a sinapif mo differentia. 85.b Ratio conficiendi dropacif mos. 85.b 86 in Apoplexia pro depulsi one refrigerationis cere bri. 148. an conueniant neruis. 152 Cur adhibeantur in spasmō. 152. 154
Examē compositionis. 14.b	
<i>Diaphragma.</i> Inflammatio diaphragma tis. 51	
Deriuatio in inflammatio ne diaphragmatis. 67.b	
<i>Diarrhæa.</i> qualis affectio, & quas cau sas habeat. 8.b	
Curatio diarrhææ ex redun dantia pituitæ. 74	
ex materia biliosa. 74. 126.	
Critica, vel vires consumēs. 126	
Purgatio in diarrhæa. 75	
Puluis, irrigationes, empla strum, sacculi, auersio ad renes in materia pituitosa. 126.b	
<i>Digestio.</i> Definitio & declaratio. 83	
<i>Directio.</i> Medicamenta directoria. 63	
<i>Dispnaa.</i> Quid sit. 6.b 32. 118	
Dispnaæ conuenit multus vini potus. 118	
Incidētia & astringētia. ibi.	

Durum

INDEX.

Durum.

Materiae induratae euacuatio. 81

Emollitio duri per congelationem a frigido. 81, b

Emollitio duri ex siccitate multum aut non multum excedente. 81

Dysenteria.

Curatio dysenteriae hepaticae. 89, 90

Dysenteria pituitosa. 97, b sanguinea. ibi.

Dysenteriae conveniunt astringentia, exsiccantia, diuretica, abstergentia, emplastica, detergentia, sarcotica. 97

Purgatio. 1, b 75

in vehementi dolore an conveniant stupefacientia. 97, b

in dolore vehementissimo. 98

ulcus profundum dysenteriae. 97

venae sectio. 76, b

victus. 29, b

vomitus. 73, b

E

Elaterium.

Decoctio Elaterij est efficacissima ad trahendas materias a capite. 157, b

Elephantiasis.

ab intemperie hepatis calida & sicca. 90

Emplastrum.

differunt a linimentis & vnguentis. 29

Emplastificatio duplex est. 53

Empyema.

Est prima species spasmi. 7

Empyema.

suppuratio inflammationis pulmonum. 104

Epilepsia.

In quo genere symptomatum sit collocanda. 8

Causae. ibid.

per essentiam in Capite. 119, b

per consensum ventriculi. ibi.

per consensum manus aut pedis. 120

ab obstructione cerebri a pituita. 95, b

Puerorum. 119, b

Clysteres, Balani, frictiones purgatio. 51, b

sternutamenta, errhina, pastilli. 91, b

Inunctio, pulvis, suffitus cucurbitulae, cataplasma, sinapism⁹, cauterisatio. 96

Syrupi. 56

In intermissione alteratio pituitae. 68, b

Agaricus sua facultate sanat

Epilepsiae obnoxios. 119, b

Repulsio non competit Epilepsiae. 65, b

Reliquiarum dissipatio, 84 venae sectio. 80

victus. 32, b 55

Epithymum.

ducit atram bilem. 61, b

pituitam & atram bilem. 62, b

bilem pituitam & bilem atram. ibid.

Ddd

I N D E X.

<i>Erosio.</i>		<i>Extrema.</i>	
sarcotica in vase eroso.	99, b	Extremis morbis extrema	
<i>Errhina.</i>		diata conuenit.	34, b
Quomodo purgent pituitā		F	
in cerebro.	71	<i>Febris.</i>	
quid differant a sternuta-		Definitio eiusq; explicatio.	
mentis.	ibid.		111
<i>Erysipelas.</i>		Febris superueniens curat	
liuidum.	14	conuulsionem.	119
suppuratio in absoluto Ery-		Adionum læsio in febribus.	
sipelate.	82, b		131, b
<i>Euacuatio.</i>		Accessionis quatuor tempo-	
quid sit.	136	ra.	136
Duplex, particularis & vni-		Causæ intemperiei calidæ	
uersalis.	63	cordis in febribus.	131, b
Modus euacuandi in febr-		Compositio febrium dupli-	
būs.	143, b	citer potest accipi.	134, b
<i>Euphorbium.</i>		Tres primæ febrium diffe-	
Est calidum in quarto.	146	rentiæ.	131, b
ducit medicamenta in al-		Indicationes.	136, b
tum.	29	Tempora.	136
in dolore capitis.	146	Termini.	138
in phrenitide.	20, b	Curatio.	136, b
in obstructione viscerū.	19	Quando sit humectandum	
<i>Excrementa.</i>		& refrigerandum.	137
vitia excrementorum im-		Quādo causa adest, ea prius	
mutatorum.	121	tollenda est.	ibi.
venæ sectio in excrementis		Auriū sonitus in febribus.	111, b
mutatis.	80	Quomodo sit cognoscen-	
Fluxio excrementorum va-		dum an bilis vel pituita	
lidior.	122, b	præualeat.	140, b
Excrementa retenta.	129	In febris valida lac fugiendū	
suppressionis causæ.	122, b	est.	100, b
<i>Expulsio.</i>		senibus febres non facile	
Est species motus.	122	fiunt acuræ.	39
Expulsionis requisita.	ibid.	Alendi ars in omni febrium	
Expulsionis symptomata.	4,	genere.	138
109		Quando concedatur potus	
		frigida.	43, b
		viētus	

INDEX.

- ictus humidus conuenit febribus. 32, b
ictus subtilis quando noceat. 140
ictus in febribus cum in quietatione. 138
in vigore febris cibatio. 108
modus euacuandi. 143, b
in febre cum fluxione biliosa. 98
Consideratio symptomatum in febribus. 137
quando in acutis vinum conueniat. 44, b
ardenti febre sine inquietatione victus. 138
venæ sectio in ardentibus biliosa. 56, 137
biliosa nothæ. 56, b
biliosa in aere calido, temperato, frigido. 12, b
causa curatio. 132
causa frigidis tantum pugnare decet. 68, b
causa legitimus. 138
causa legitimo fugienda sunt vehementer frigida & astringentia. 139
causa notho frigida fugienda sunt. 139, b
e ratione victus in causa sententia Hippocratis. 139
ictus in causa cum materia pituitosa, salsa, habitu denso aut raro. 139, 139, b
ictus in causa cum humore bilioso & habitu denso ibi.
in alio liquida. 142, b
in febribus confusæ. 144, b
Colliquatiuas vocant caules. 33
victus in colliquatiuis. 44, 141, b
Compositæ. 134, b 143, b
Compositio febrium dupliciter potest accipi. ibid.
in continentibus fugienda sunt vehementer frigida & astringentia. 139
Continuæ. 138
Accessionis tempora in febri continua. 136, b
Differentia continuarum & intermittentium. 132, b
Aperientia ante euacuationem totius non conueniunt in continuis. 139, b
Continua pituitosa. ibid.
Putrida continua. 133
Continua quotidiana. 133, b
Tertiana. 133
Victus in febre continua. 138
Ephamera non est acuta. 34, b
Ars alendi in Ephemeris. 139
Curatio. 137
Venæ sectio auxiliatur febribus ephemeris a constitutione pororum. 139
in Epiala victus. 140, b
Hæctica quid sit. 88, b
Quid ab aliis differat. 135, b
Curatio. 137
Hæctica humectantibus tollitur. 88, b
Cautela in hæctica. 135
Actu frigida sunt periculosa. 14
victus. 142
Ddd 2 1

INDEX.

Hætica pestilens,	135, b	Lipyrria ardentium deterri-	
putrida.	ibid.	ma	132, l
Hæticarum a putridis dif-		Melancholica.	137, 143,
ferentia.	132	Mixtæ vide implicitæ.	
Tabes ex hætica.	135, b	Pestilens.	3
Febris phlegmatica seu la-		Pestilentis & putridæ diffe-	
tica dicta, assimilatur hæ-		rentia.	1
cticæ.	139, b	Bolus armena conuenit pe-	
Hemitritæ ⁹ quid sit, & quid		stilentibus.	156,
ab aliis differat.	135	quæ euacuatio competat i	
Hemitritæus pendens a pi-		pestilentibus.	14
tuita & bile simul.	12. b	an venæ sectio conuenia	
viçtus in hemitritæo vero.		63, b 64	
140, b		in Febribus pestilētibus pro	
Viçtus in hemitritæo domi-		curāda est generatio sp	
nante pituita.	ibid.	rituum.	14
Implicitarum differentia.		Viçtus ratio in pestilent	
134, b		bus.	ibid
Materia.	135	an vinum, an salsa conu	
Implicitarum continuarum		niant.	ibid
ab intermittētib. dif-		Phlegmatica latens assim	
ferentia.	ibid.	latur hæcticæ.	139,
Implicitarum intermittē-		in Phlegmatica latente v	
tium inter sese differen-		ctus.	ibi
tia.	ibid.	in Pituitosa quæ somnolen	
Intermissio februm.	136	tos reddit, omiſſa feb	
Venæ sectio in puris inter-		causæ attendendū est.	
mittentibus.	133, b	Pituitosa cum causā imp	
Interpolatarū quatuor dif-		cita.	1
ferentia.	136	Vacuantia.	143
Interpolatæ putridæ defini-		Viçtus ratio in febrī ex	
tio & differentia.	134	tuita crassa vel dulci.	14
Quartana interpolata.	134, b	an in Pituitosa vel Tertia	
Quotidiana interpolata.	134	plus sit alendum.	ibi
Actionum læsio & excremē-		Putridæ definitio & exp	
ta mutata in interpolata		catio.	1
quotidiana.	134, b	In putridis necesse est h	
Interpolata sanguinea.	134	mores putridos cōmife	
in Lipyrria viçtus.	140, b	ri cū humorib. cordis. i	
		Putridarum	

I N D E X.

- Putridarum duo prima sunt genera, continua & intermittens. 132, & seq
- In putrida continua actiones duplici modo læduntur. 132, b
- Putrida cōtinua sanguinea, tertiana, quotidiana, quartana. 133
- Quid differat putrida continua sanguinea a febre sanguinea interpolata. ib.
- Putrida intermittens. 132
- Putridarum & intermittētium differentia. ibid.
- Putrida interpolata sanguinea, biliosa, pituitosa, melancholica. 134
- Putridarum ab Ephemeris & heceticis differentia. 132
- In putridis implicitis diæta. 140, b
- Putrida pestilens. 135, b
- Putridarū & pestilentis differentia. 132
- Quid Synochus putrida differat ab aliis putridis. 133
- Quartana in æstate citius pertransit. 35, b
- venæ sectio in quartana. 63, b
- viæ ratio. 140
- Quotidiana causæ implicita. 33
- Quotidiana pituitosa. 12, b
- venæ sectio. 63, b
- Synochi tres differentia. 131, b
- vehementè frigida & astringentia sunt fugienda in synocho. 139
- Synochus putrida. 134
- Causæ synochi putridæ. 135
- Synochus putrida differt ab aliis putridis. ibid.
- In synocho putrida est putredo omnium humorū. ibid.
- viæ ratio. 391
- in Synocho simplici mittūt sanguinem ad animi deliquium. 63, b
- Synochus non putrida. 131, b
- venæ sectio auxiliatur synocho non putridæ. 139, 143
- Tempora accessionis in tertiana. 136, b
- Tertiana intemperie calida & sicca a bile flava. 12, b
- Tertiana in regione & temperatura frigida tarde resolvitur. 35, b
- Evacuantia simplicia & cōposita. 143, b
- Tertiana propter tenuitatē materiæ grassatus in caput. 35, b
- in hieme paroxysmos habet longiores. ibid.
- Excrementa mutata. 133, b
- in Tertiana secatur interior dextri brachij. 63, b
- utrum plus sit alendum in tertiana, an pituitosa 140
- Tertiana continua. 133
- viæ in tertiana continua permanentibus symptomatis, aut parvis vel nullis cōcurrentibus vel quiescentibus. 139, b

INDEX.

- Tertianæ continuæ ab Ephemeris, hecticis, interpolatis, putridis & ceteris putridis continuis discretio. 133, b
- Requisita tertianæ exquisitæ. 134, b
- Tertiana interpolata. ibid.
- Tertiana notha. 135
- In tertiana simplice pura & non pura victus. 10
- Victus in tertiana duplici. ibi.
- Fella.*
- acria, clemētia, clementissima. 84, b
- Flatus.*
- Flatuum curatio. 108, b
- Discutiētia flatus. 72, b 89 b 114, b
- Fluor muliebris.*
- Quisnam affectus. 9, b
- Purgatio. 75, b
- Ruber fluor. 128, b
- venæ sectio. 80, b
- Fluxio.*
- quid sit fluxio. 129, 154
- Fluxionum causa efficiens. 129
- Cōsideratio materiæ in fluxionibus. 155
- Duo vulgati errores in principio fluxionum. 154, b
- Errata in principio fluxionū sunt nocentissima. ibi.
- Indicationes. 154, 155, b
- Fluxio post corroboratiōē & euacuatiōē persistens quid indicet. 154, b
- Fluxionum curatio. 154
- Indicationes in fluxione sanguinea. 155, b
- Fluxionum ab aliis præter sanguinem humoribus curatio. ibid.
- in fluxionibus biliosis *Ono-* 126
- lactis præstantia in fluxionibus biliosis. 98
- Fluxiones manuum, pedū, cōxendicis 21
- an repercutientia conueniāt in omnibus fluxionibus. 155
- Fistula.*
- Qualisnam morbus. 3, b
- Cauteria in fistulis ani. 87
- Fanugracum.*
- in dolore oculorum. 113, b
- Fontanella.*
- non sunt antiquorum cauteria. 87
- Fotus.*
- Duplex est humidus & siccus. 117
- Humidi debent præcedere siccos. 103, b, 117, b
- Fractura.*
- Curatio fracturarum. 97
- Fractura Caluariæ. 11
- Frictiones.*
- quomodo fiat instituendæ. 121
- Frigida.*
- conueniunt fluxionibus alui. 121
- auribus infusa nocent. 145, b
- adhibentur capiti. ibi.
- obstruunt meatus. 52, b
- valde

INDEX.

- valde frigidantia in quibus febris debeant vitari, 139
quando cōueniant in fluore sanguinis, 124, b
an in inflammatione frigida actu sint præstantiora an potentia, 145
obsunt nervis, 19, b
Thoraci disconueniunt, itemque vtero & ventriculo, 120, b
Fumaria.
Educit bilem & atram bilem. 62
G
Galbanum.
emollit, concoquit, ac sedat dolorem. 11, b
Galenus.
defensus contra Alexandrū in catarrho 123, b
Galla.
validissime repellit. 65, b
Emplastrum e galla in diarrhæa. 126, b
Gangrena.
qualis sit morbus. 3, b
Gargarismata.
quibus noceant. 71, b
in catarrho pro vacuatione partis mandantis fugiantur, 137, b
Generatio.
symptomata generationis. 4, 110, b
Gingiva.
Affectus gingiuarum calidiores. 51
Deriuatio in affectibus gingiuarum calidiorib, 67, b
Gingiuarum inflammatio, 51
Gonorrhæa.
Curatio. 9, b 91, 128, b
Gula.
vlcera gulæ. 19, b
Gurgulio.
Inflammatio gurgulionis. 67, 77, b 105
Laxitas. 106
sanguinis ex gurgulione erectatio 125
Gustus.
Læsa gustatio. 5
H
Habitus corporis.
Limitat curationem. 31
quando conueniat in malo habitus corporis secare venam aut purgare. 78
Hæmorrhagia.
Arteriæ. 124, b
Narium. 52, 54, b
ab inflâmato sanguine. 124
Curatio per astringētia, emplastica, escharotica, &c. ib.
Cauteriorum vsus. 87
Purgatio. 76
Hæmorrhoides.
Apertio hæmorrhoidum. 9
Fluxus. 51, 52, b 54, b 120
Auersio in hæmorrhoidibus. 120
Dolor. 177
Suppressio. 51
Helleborus.
Pleuriticis vitandus. 143

INDEX.

- Albus vehementer commo-
 uet. 61, b
 Nigri varia præparatio, ibi.
 Niger purgat bilem, pituitā
 & atram bilem. 62, b
 Decoctio hellebori nigri est
 efficacissima ad trahendas
 materias a capite. 57, b
Hemicrania.
 Hemicranie a cephalæa &
 cephalalgia distinctio. 5, b
 Curatio. 112
 vetusa causa frigida. 18, b 93
Hemiplegia.
 a paraplegia distinguitur.
 7, b
Hepar.
 Est pars princeps. 22, b
 Temperatura, connexio, v-
 sus, operatio. ibid.
 Sensus. 21, b 27
 Loca per quæ expurgatur.
 22, b
 Conuenientia & differentia
 vinculi hepatis, quo phre-
 nib. adnectitur, cum peri-
 toneo. 23
 Hepar non fert admodum
 fortia. 102
 Roborantia hepar, 55
 Eadem genere medicamen-
 ta, quæ lien postulat. 95
 Purgatur per aluum & vo-
 mitum. 23, b
 Calfactio hepatis. 29
 Dolor. 23, 116
 Iecur lupinum, cuiuslibet im-
 becillitati hepatis auxi-
 liatur. 110
 Inflammatio hepatis. 17, b
 18, b 51, 52, 54, 72, 74
 Gibbæ & cauæ partis inflā-
 matio. 102
 Inflammationi hepatis cle-
 menter frigida & stiptica
 admouenda sunt. 66, b
 Præparatio materie in in-
 flammatione. 70
 In inflammatione hepatis
 repellimus. 65, b
 Suppuratio inflammatio-
 nis. 82, b 102
 In suppuratis cauterisatio.
 87
 In inflammatione admit-
 tuntur purgantia. 101
 venæ sectio, eiusque tem-
 pus. 76, b
 in inflammatione hepatis
 topica, alterantia, Epithe-
 mata, obseruationes, ve-
 næ sectio. 101, b
 Reliquiarum digestio in in-
 flammatione. 84, b
 Intemperies calida. 52, 89, b
 Intemperies calida & sicca.
 89, b 90
 Intemperies frigida & ob-
 structio simplex. 13, b
 Obstructio hepatis. 52, 55, b
 94, b
 Præparationes materie in
 obstructione hepatis. 69, b
 Purgatio in obstructione.
 75, b
 In obstructione hepatis vice
 digerentium, sunt adhi-
 benda tergentia. 84, b
 venæ

INDEX.

venæ sectio in obstr. hep. 82

Purgatio hepatis a pituita.
71

Materiæ continentis in hepate purgatio. 75, b

Purgatio inclinante phlegmone. 75, b

Scirrhus. 18, b, 32

Scirrhus ex inflammatione hepatis. 102

Emollitio scirrhi. 82

Hepatica affectio. 109, b

Causa affectionis hepaticæ. 4

in affectione hepatica liminetum, vnguentum, ceratum, epithema. 90, b

Morsulæ, Epithema, vnguentum, cataplasma in affectione hepatica calida. 89, b

Dysenteria hepatica. 90

Fluxus hepaticus. 9

Medicamenta hepatica. 21, 68

Herculanus.

Error Herculanus de spasmo. 152, b

Hiera.

in appetentia canina potest imbibitum humorem extrahere ex profundo oris & per aluum inferne vacuare, ac ventriculo robur addere, ne nocuum humorem suscipiat. 72

Hircus.

Sanies iccoris hircini in nitatopia. 111

Hirudo.

vacuatio sanguinis per hirudines. 81

Hordeum.

Est alimentum naturæ familiare. 149, b

Humor.

Simplex humor requirit simplex purgans, compositus compositum. 2, b

Humorū præparatio. 149, b

Etiam subtiles humores cōcoctione indigent. 59, b

Quinam humores purgandi. 49, b

In synocho putrida est putredo omnium humorū. 133

Hydrops.

Species hydropsis. 455, b

Hydrops cum febre. 12, b, 33

ex repletionem aut suppressis excrementis. 73, b

Cauterisatio. 87

Curatio. 90

Hyems.

Hyeme parcius est bibendum. 40

Hyssopus.

ducit pituitam. 61, b

I

Iberis.

vsus Iberidis in Ischiade. 36

Ichor.

quomodo purgentur Ichores. 60, b

Ictericia.

Citrina.

Ddd 3

INDEX.

- Critica in febris.** 127
ex calore partium solidarū. 127, b
ex causa venenata. ibi.
ex vicio iecoris aut vesicæ fellis. ibid.
Nigra. 80, b 94, b 127, b
in iſtero nigro venæsectio. 80, b
Purgatio in iſtero nigro. 127, b
Medicamenta iſterica. 68
Iecur vide Hepar Ileos.
Causa Ileos solet eſſe obſtrictio intestinorum, præsertim gracilium atque eorundem inflammatio. 4
Medicamenta per os sumta magis conueniunt in Ileco, quam colico. 109
Ileos ex multitudine stercoreum. 71, b 72, b 109
Purgatio in Ileco ab inflammatione. 75
Purgatio in Ileco ab venenato pharmaco. 72, b
Impotentia vide Venus.
Inappetentia.
Causa inappetentiæ. 3, b
Inappetentia cibi cum intemperie frigida. 89
In cibi inappetentia nō fit mentio missionis sanguinis. 78
Curatio. 88, 107
Incisio.
Incisionis definitio & explicatio. 33, b
Incidentia.
Correctio incidentiū. 147, b
in Spasmo incidentib. præmittuntur emollientia. 152
Incidentia in dispnœa. 118, b
Incidentia pituitam. 153
Syrupi incidentes. 147, b
Incrassatio.
a quibus fiat causis. 13, b
Incubus.
Eſt præludium morbi comitialis aut Apoplexiæ. 7
causa Incubi. ibid.
Curatio. 119
Indicationes.
gubernant rectū vsum medicamentorum. 88
Causarum cognitio monstrat indicationes. 120
In indicationibus contrariis spectanda est magnitudo eorum, quæ ad indicationem coierunt. 45, b
Indicationes sumtæ a causa. 137
a loco affecto. 144
a morbo. 137, 144
a materia morbi. 144, 145
a natura membrorum. 156
a Symptomatis. 136, b 141, b
a virtute. 144
Indicationes in febris. 136, b
in intemperie cum materia. 144
Inedia.
Nocet siccis calidisque corporibus tum sanis tum ægris. 38
Eſt

INDEX.

- Est utilis temperaturæ frigidæ & humidæ. 38, b
- Inflammatio.*
- fit dupliciter, ratione congestionis & fluxionis. 3, b
- recens. 14, b
- existens in principio cū dolore. 12, b
- Inflammatio partium capitis. 144, b
- Duritici in inflammatione emollitio. 81
- Inflammatio inguinum. 51
- vitia succedentia inflammationi. 3, b
- Insania.*
- Irrigationes in insania. 92
- In insania ex feruenti sanguine venæ sectio. 79
- Insania lupina. ibid.
- Instrumenta.*
- Tria sunt Medicorū instrumenta præcipua, Diæta, Chirurgia & medicatio. 31, b
- Ischias.*
- Acria medicamenta circa partem affectam non conueniunt ante euacuationē totius. 13, 116, b
- Cauterisatio. 86, 87
- Mitigatoria conueniunt in principio. 116, b
- Iberidis vsus præstans. 86
- a repellentibus cauendū est, 67, 116, b
- Sinapismus. 86
- venæ sectio. 79
- Ischuria.*
- est totalis vrinæ suppressio. 9, b
- ex calculo. 129, b
- ex grumo crassis humorib⁹, ex inflammatione, ex imbecillitate vesicæ. ibid.
- ex obstructione vesicæ. 95
- Fotus & vnguentum in Ischuria. 91
- Intemperies.*
- simplex & composita. 2, b
- cum vel sine materia. ibid.
- Indicatio in intemperie cū materia. 144
- Immutatio intemperierum partium humani corporis. 88
- Intermissio in febris. 136
- Intestina.*
- quando non sint purganda per clysterem. 59
- vlcera intestinorum 18, b 29
- vlcus intestinorum cum obstructione Epatis. 12, b
- Exulceratio crassorum. 97, b
- vlc⁹ in intestinis gracilib. ibi.
- vlcera intestinorum tenuiū, crassorum & mediorum alia atq; alia postulant. ib.
- vlcera depascentia intestina. 98
- Iuiuba.*
- Syrupus de iuiubis leniter absque exasperatione astringit. 156, b
- Iunctura.*
- Iuncturarum a pituita purgatio. 71

INDEX.

Ius.
consumtum & non cōsum-
tum. 57

L

Lac.

Asininum in vlcerib. & pu-
re est optimum. 98,b

Asininum in exulceratione
vesicæ. 99.

Equinum in vlcerib. & pure
est optimum. 98,b

Emendatio lactis. 100,b

In febris valida lac fugiendū
est. ibid.

In fluxionibus biliosis cum
febre lactis præstantia. 98

In tabe est optimum & ali-
mentum & medicamen-
tum. 100

In Tabe quando sit cau-
dum. ibid.

In vigiliis a phrenitide lac &
oleum violaceum. 150,b

Defectus lactis. 10

Purgatio in defectu lactis.
76

Defect⁹ lactis ex defectu san-
guinis. 130

Defectus lactis ex sanguine
deteriore, ratione bilis &
pituitæ. ibi.

Lactis redundantia. 9,b

Redundantia lactis ex vitio
corporis sanguine redun-
dantis. 127

Medicamenta tuta in redū-
dantia lactis. 127,b

venæ sectio in redundanda.
80, b

Lac conuersum in grumos.
19,b 80,b

Lapis.

Armenus educit pituitam
& atram bilem. 62,b

Armenus est vehemens me-
dicamentum in expurga-
tione Melancholiæ. 61,b

Lazuli expurgat Melancho-
liam. 61,b

Educit pituitam & atrā bi-
lem. 62,b

Lassitudo

Exercitatio lenit lassitudi-
nem. 1,b

Latus.

Dolor lateris a Melancho-
lia. 117,b

vnguenta, cucurbitulæ, con-
ciliantia somnum. ibid.

Dolor lateris Hippocrati fo-
tu depellitur. 117

Purgatio ī dolore lateris. 76

In inflāmatione lateris ex-
purgatio humorū. 103,b

Fotus, vnguenta. ibid.

Lenitio.

Liquores lenitiui in Oph-
thalmia. 9,20,b

Lentes.

in dolore capitis a sanguine.
145

in dolore capitis a bile. 145,b

Lepra.

ab intemperie calida & sic-
ca hepatis. 90

Lepus.

Coagulum leporis in lētero
nigro. 127,b

in

INDEX.

- in profluuiio muliebri, 128, b
in Epilepsia. 119, b
Lethargus.
Est symptoma memoriæ a-
bolitæ, rationis & imagi-
nationis deficientis. 5, b
Curatio. 105, 117, b
venæ sectio. 77
Lien.
Ex accidenti præstat vsum
toti corpori. 21
Temperatura, vsus, operatio
sensus, situs, loca per quæ
expurgatur. ibid.
Lien & iecur eadem genere
medicamēta postulāt. 95
Lieni tanto acriora conue-
niunt, quanto is crassio-
re vtitur alimento. 23, b
Affectus lienis. 52, 21
Venæ sectio in liene affecto,
51
Dolor. 116
Materiæ præparatio in do-
lore. 70
Induratio. 94, b
Inflammatiō. 54
Præparatio materiæ in in-
flammatiōe. 70
Fotus, vnguētum, cataplas-
ma. 102, b
quando repellentia conue-
niant in inflammatiōe.
65, b 66, b
venæ sectio in inflammatiō-
ne. 76, b
Purgatio. 75, b
suppuratio. 83
Intemperies lienis. 54, 90, b
Medicamenta splenica. 68
Obstructio. 55, b 94, b
Præparatio materiæ in ob-
structione. 70
Purgatio apituita. 71
Tumor. 32, 82
Dissipatio reliquiarum in
morbis lienis. 84, b
Scirrhi curatio. 82, 102, b
Lienteria.
Causa lienterix. 4
ex intemperie calida. 72, b
ex intemper. cal. cum mate-
ria. 108
ex intemp. calid. citra acres
humores. 108, b
cum intemperie calida ven-
triculi. 88
ex intemperie frigida. 72, b
cum frigida ventriculi & in-
testinorum intemperie.
89
Purgatio. 74, b
vomitiō. 73, b
Ligamenta.
carent sensu. 20
Ligamentorum affectio. ibi.
Linimenta.
differunt ab emplastris &
vnguētis. 29
Lipothymia.
quid sit. 8
vomitiō in lipothymia. 73, b
Lippitudo.
quid lippitudo. 16, b
Purgatio in lippitudine. 76
venæ sectio. 77, b
Missionis sanguinis quanti-
tas. ibid.

I N D E X.

<i>Lithargyrum.</i>		M	
Præparatio lithargyri.	30, b	<i>Mamma.</i>	
<i>Lixiuum.</i>		Consensus mammarum cū	
quid dicatur.	29	matrice.	25
caput roborans.	157, b	In inflāmate mammarū	
<i>Locus affectus.</i>		purgatio.	76
Loci affecti figura & tem-		venę sectio in inflammatio-	
peramentum.	18	ne mammarum.	77
via, sensus, vsus.	18, b	<i>Mandragora.</i>	
Distantia loci vehementio-		succus mandragoræ cū dā-	
ra requirit remedia.	17, b	no refrigerat.	92
Diuersitas loci affecti, variat		<i>Mania.</i>	
remedii cum formam, tū		Causa mania.	6
vehementiam.	ibid.	Ex melancholia adusta.	118
Indicationes sumtæ a loco		Ex feruenti sanguinē.	ibid.
affecto.	144	in Mania pharmacum Actii.	
Locus purgationi commo-			92
dus.	37, b 49, b	Purgatio.	76
<i>Lumbrici.</i>		Syrupus de pomis.	56
In quo genere morborum		<i>Manna.</i>	
sint collocandi.	10, b	Purgat bilem.	61
Lumbricorum triplex ge-		<i>Manus.</i>	
nus.	130, b	Fluxiones manuum.	21
Lumbrici cum fluore alui.		<i>Marrubium.</i>	
ib i. d		mitigat vlcera.	11, b
Missionis sanguinis in lum-		<i>Mastix.</i>	
bricis non fit mentio.	81	ad prouocandā salinā.	148, b
Victus.	55, b	in suppressione menstru-	
Curatio.	130	rum,	95
<i>Lupus.</i>		<i>Materia.</i>	
stercus Lupinum medetur		Fluens quid indicet & quid	
omni dolori colico.	115, b	fluxura.	144
auxiliatur etiā cuilibet im-		a Materia morbi sumuntur	
becillitati hepatis.	110	variæ indicationes.	155
venę sectio in infania lupi-		Induratæ materiæ vacua-	
na.	79	tio.	81
<i>Lysias.</i>		<i>Maturatio.</i>	
Arteriaca cōfectio Lysie.	28	quid sit.	82, b
		quid	

INDEX.

quid ab digestionē differat.	Cephalica.	18
83	deducentia.	18
quid ab emollitione. 82, b	Directoria.	63
Maturantia & resoluentia	Hepatica.	21, 68
sine caliditate. 145	Nephritica.	ibid.
<i>Maxilla.</i>	Stomachica.	68
Deriuatio in calidis affecti-	Pneumonica.	ibid.
bis maxillarum. 67, b	Polychresta.	11, b
<i>Meatus.</i>	Polyponaria.	20, b
angusti. 19	Splenica.	68
vrinarii. 24, b	Incarnans medicamentū. 30	
<i>Medicamenta.</i>	Medicamentis, quæ appli-	
Ablutio medicamentorum.	cantur partibus toti cor-	
29	pori vsum præstantibus,	
Affatio. 29	astringentia sunt admi-	
Color. 28, b 30	scenda. 18, b	
Consistentia. ibi.	<i>Vide remedia.</i>	
Commoditas. 30, b	<i>Medicina.</i>	
Exstinctio. 29, b	Est ars coniecturalis. 47, b	
Elixatio, frictio, infusio. ibi.	<i>Medicus.</i>	
Forma. 18	Tria sunt Medicorum in-	
Odor. 28, b 30, b	strumenta præcipua, Diæta,	
Præparatio. 30, b	Chirurgia & medicatio. 31, b	
Medicamenta præparatione	<i>Medulla.</i>	
variantur. 29	Conferunt scirrho. 83	
Sapor. 28, b	<i>Mel.</i>	
Torrefactio. 29, b	siccatur, digerit & a putredine	
Tritura. 19	seruat. 11, b	
Necessitas componendorū	in pulmonum vlceribus. 125	
medicamentorum. 27, b	in Tabæ. 110	
Vsus compositionis. 29, b	In vlceribus thoracis. 125	
Indicationes gubernantes re-	in principio inflammatio-	
ctum vsum medicamen-	nis tonsillarum non con-	
torum. 88	uenit gargarismis. 105, b	
Medicamentū variatur vel	<i>Melancholia.</i>	
ratione substantiæ vel qua-	Melancholia & pituita sunt	
litatis. 27, b	materiæ associatæ. 146	
quædam nomen a partibus	Causa Melancholiæ super-	
sortita sunt. 68	fluæ. 134, b	

INDEX.

vitium humoris Melancho-
lici, 2,55 b

Melancholiæ per alimenta
alteratio. 56,57

Purgatio. 61,b 143,b

Humor Melancholicus per
secessum potius quam per
vomitum est purgandus.

59

Melancholicorum victus. 37,
137,b

Curatio. 118

Clyster. 74,b

Syrupus de pomis. 56

venæ sectio. 79

Epirhemata, balneum, irri-
gationes, inunctiones, suf-
fitus in Melancholia ex fri-
gida & sicca intemperie ce-
rebri. 93,b

Fomentum in Melancholia
hypochondriaca. 94,118

sacculus, vomitus, cucurbi-
tula. 118

venæ sectio. 79

Melicratum.

quid sit & quomodo pare-
tur. 33

Membra.

Communicantia membro-
rum. 155

In Catarrho considerata
est membrorum nobili-
tas. ibid.

Calfactio & nutritio mem-
brorum per dropacismos.
35,b

Indicationes a natura mē-
brorum. 156

Memoria.

abolita a pituita. 118

In memoria abolita non fit
mentio venæ sectionis. 79

Memoriæ deperditæ causa. 6

In memoria deperdita a pi-
tuita irrigationes, vinctio-
nes, sacculi. 93

Memoria deperdita a Me-
lancholia. ibid.

Memoria vna cum ratione
deperdita. 118

Menses.

Albi. 9,b

Fluxus mensium. 9,b 51

Auersio. 120

In fluxione mensium vitan-
di sunt pessi caustici. 128

In fluore mensium purga-
tio. 75,b

Largior fluxus a copia san-
guinis. 127

ab apertione osculorum v-
teri. 128

ab erosione vaforum. 128,b

ab erosione venarum vteri,
99,b

a bile mixta, a pituita serosa,

a lapsu, ab ulcere. 128

venæ sectio in immodicis

mensibus. 80,b

Prouocantia menses. 19, 130

Causæ suppressionis men-
sium, 10,b

Præparatio materiæ. 70

Frictio, cucurbitulæ. 52

Victus. 55,b

Scylla cur adhibeatur. 94,b

Menses suppressi ex bile. 130

cx

INDEX.

ex atra bile suppressi. ibid.	variolarum.	142
ex calida intemperie vteri.	Victus ratio.	142
91, 130	In morbillis vehemēter ca-	
ex frigida intemperie. 91, b	lida, frigida & fumosa vi-	
ex obstructione. 95	tanda sunt. ibid.	
ex repletionē. 130	<i>Morbis.</i>	
In mensibus suppressis pur-	Prima morborū genera vn-	
gatio. 72, 75, b	de cognoscenda. 87, b	
venæ sectio. 51, 80, b	Circuitus idem est quod pe-	
Cum fœmina lactat, menses	riodus. 57	
sistuntur. 25	Cognitio morbi ex trib. de-	
<i>Metrenchita.</i>	sumitur. 35, b	
sunt instrumenta, quæ me-	Constitutio morbi. 136	
dicamenta immittunt, cū	Distinctio morborum. 2, b	
vlcera citra vterū aut vesti-	Impetus. 59	
cam consistunt. 21	Termin ⁹ vnde indicetur. 36	
<i>Mercurialis.</i>	in vigore victus. 137, b	
Herba Mercurialis pessi lo-	Morbo & causæ non eadem	
co in suppressis mēstruis.	semper contraria compe-	
72	tunt. 137	
<i>Mictio.</i>	Indicationes a Morbis. 1, b	
Causa cruentę mictionis, seu	32, b 137, 144	
pfluuij sanguinis renū. 9	Morbus per se nihil postulat	
Curatio. 98, 126, b 127	de alimento. 32, b	
<i>Mirrha.</i>	Morbus vt morbus cibum	
Calefacit & discutit. 14, b	non postulat. 153	
<i>Mithridatium.</i>	Acutorum diuisio. 33	
in Apoplexia. 140	Acuti morbi triplices. 138, b	
in suppressis mensibus. 72	Acutorum quaternarii. 138	
<i>Mola.</i>	In omnibus acutis valida	
quid sit. 10	pharmaca fugiēda sunt, 150	
Curatio. 95, b 130	Victus in acutis. 138	
venæ sectio. 80, b	Quando sit nutriendum in	
<i>Mollitio.</i>	acutis. 37, b	
Duri emollitio. 81	In peracutis quando a victu	
Differentia emollitionis &	abstinendum sit. 138	
maturationis, 82, b	victus in acutissimis. 150	
<i>Morbilli.</i>	Bonitas aut malitia morbi a	
Differentia morbillorum &	tribus desumitur. 36	
	Ece	

INDEX.

In calidis morbis fortia me- dicamēta fugiēda sunt. 145	positio consistit in tribus 112, b
Chronici ab humore melā cholico. 57, b	Narcoticis calida admiscen- da sunt. 21, 30
Victus in cōplicatione mor- borum cum virtute. 40 b	in calidis affectibus sunt tu- tiora. 112, b
Diuturni. 32	in sputo sanguinis. 19, b
in Diuturnis quando nu- triendum. 17, b	Galenus semper formidauit narcotica. 112, b
Diuerſorum morborum ea- dem remedia. 106, b	Idem veretur adhibere par- tibus natura frigidis. 18, b
Extremi. 15, b 34, b	<i>Vide anodyna.</i>
Duæ extremorum condi- tiones. 34, b	<i>Nares.</i>
Impliciti inter se vel cōsen- tiunt vel non consentiūt. 13 b	Cavitas narium. 5
Labores morborum. 34, b	In ſatore nariū cauteria. 87
Quilibet morbus trifariam ſit magnus. 49, b	Hæmorrhagia narium. 8, b 120, b
Malitia aut bonitas morbi a tribus ſumitur. 36	Obturatorio auriū in hæmorrhagia. 124
Morbus parum, multū aut maxime vrgens. 40, b	Auerſio. 120
Organicorum curatio. 94	præter auerſionem etiā co- arctatione opus eſt. 120, b
Signa morbi ſicci. 142	In magna hæmorrhagia me- dicamenta indantur na- ribus. 123, b
<i>Motus.</i>	Aſtringentia quando adhi- benda. ibid.
Perficitur tribus. 122	Frigida adhibentur capiti in hæmorrhagia. 120, b
impedit vnitatem. 96, b	Emplaſtrum. 123, b
Amiſſio ſenſus & motus. 68	venæ ſectio. 80, 123, b
<i>Mutatio.</i>	Cauſa vitiorum narium. 5
Mutationes periculofæ. 45	vlcus purum, verus. 101
<i>Myrobalani.</i>	vlcus narium difficulter cu- ratur. 100, b
Chebuli. 62, b	<i>Nauſea.</i>
Citrini. 145	ab humorum copia aut vi- tio prouenit. 4
Lutei. 61	Nauſcā a vitioſis humori- bus
N	
<i>Narcotica.</i>	
Optima narcoticorum cō-	

INDEX.

- bus impactis ventriculo. 73
 a sola humiditate aut cum
 vitiosis humoribus. 109
 cum frigida & humida in-
 temperie ventriculi. 88, b
 Purgatio. 75
Nephritis.
 Dolor nephriticus. 116
 Medicamenta Nephritica.
 21, b 68
Nervi.
 Acetum nervis nocet. 68, b
 Aqua nervis inimica est. 20
 Nervorum corroboratio. 154 b
 Curatio. 17, b
 in curandis affectibus ner-
 vorum semper habenda
 est ratio cordis & cerebri.
 152
 In curatione nervorum fu-
 gienda sunt valide abster-
 gentia & mordicantia. 68, b
 144
 an Dropacismi conueniant
 nervis. 152
 Emplastrum in affectibus
 nervorum. 144, b
 Terebinthina in affectibus
 nervorum. 152, b
 Unguentum efficax in resol-
 uendis nervorum affecti-
 bus. 83, b
 Frigidæ ægitudines nervo-
 rum. 56
 Nervi nudati. 19, b 20
 Punctio nervorum. 16, 19, b 20
 Dolores nervi puncti. 113
 Nervus vulneratus. 19, b
- Nervorum vulnera putredi-
 ni sunt obnoxia. ibid.
Noma.
 sunt ulcera putrida, repascē-
 tia. 16
 Qualia medicamenta desi-
 derent. ibid.
Nuces.
 Medicamentum ex nucibus
 in angina. 106
Nutritio.
 quid sit. 22
 Symptomata nutritionis a-
 bolitæ. 110
 Diminutæ nutritionis sym-
 ptomata. 109, b
 Depravatæ symptomata.
 110, b
 Læsa nutritio. 4
 Per sarcotica fit renutritio.
 125, b
Nyctalopia.
 Causa nyctalopiæ siue no-
 cturnæ cæcitudinis. 4, b
 Curatio nyctalopiæ. 111
 venæ sectio. 78
 O
Oblivio.
 cur dicatur iners. 5, b
Obstructio.
 de Obstructionibus mem-
 brorum humani corpo-
 ris. 94, b
 Causæ obstructionis. 129
 Obstructio triplex. 2, b
 quid indicet obstructio. 146, b
 Obstructio attenuatoria, co-
 arctatoria, oppilativa. 2, b
 Obstructiones magnæ. 56
 Ecce 2

INDEX.

Obstructiones viscerum. 19	Odoramenta in dolore capitis. 145.b 146
venæ sectio in omnibus magnis obstructionib. est vitilis. 95	Odoratio læsa. 5
Obstructio quam rationem victus postulet. 32.b	<i>Oleum.</i>
<i>Occiput.</i>	ab oleo non desumitur denominatio. 145.b
nec facile nec citra noxam potest exuri. 20	<i>Olfactus.</i>
<i>Oculi.</i>	Causa læsi olfactus. 5
Affectus oculorum. 11.b	Curatio. 111.b
Dolor oculorum ex flatuoso spiritu. 114	<i>Operatio.</i>
Localia in dolore oculorum ex humoribus crassis & frigidis. 113.b	Operationes fiunt per calidum. 155
Liquor oui maxime sedat dolores oculorum. ibid.	<i>Opium.</i>
Inflammatio oculorum. 51, 67	medicamentorum vim retrahit. 19.b
Methodus curandi dolores ab inflammatione oculorum. 113	quando sit utendum opio in dolore capitis. 16
in inflammatione oculorum repulsoria. ibid.	Correctio opii in dolore colico. 115
Anodyna fugienda. 113.b	<i>Opisthotonos.</i>
Obfuscationis causa. 4.b	Est species spasmi. 7
Curatio. 111	<i>Ophthalmia.</i>
venæ sectio in obfuscatione. 78	Albugo coniuncta Ophthalmiæ. 13.b
ulcera oculorum. 19	Qualia medicamenta conueniāt Ophthalmiæ. 20.b
ulcus cum inflammatione. 101	Repellentia quando conueniant. 66, 105
Inducentia cicatricem in ulcere oculorum. ibid.	Qualia ea esse debeant. 18.b
<i>Vide visio.</i>	in Ophthalmia liquor albus oui. 105
<i>Odores.</i>	Stupefacientia in Ophthalmia. 65, 105
cito reficiunt. 120.b	<i>Ordo.</i>
corroborant. 152	In affectibus simplicibus habenda est ratio ordinis. 13
	<i>Origanum.</i>
	ducit Melancholiam. 61.b
	Os

I N D E X.

Os oris.

- | | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Cavitas oris. | 18 | Causa paralyſis præcipua. | 119 |
| Affectus. | 19 | Imperfecta paralyſis. | 111, b |
| Inflammatio. | 20, b | Causa imperfecte paralyſis. | 5 |
| Tortura. | 7, b | Paralyſis ex intemperie cere- | |
| Ulcerata putrida. | 18, b | bri frigida & humida. | 93, b |
| | | ex frigore. | 119 |

Os ossis.

- | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|
| Catagmaticum Aſclepiadis | | ab inflammatione, a ſcirrho. | |
| ad oſſa fracta. | | ibid. | |

Orthopnoea.

- | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------|-------|
| est difficultas respirandi ita | | Auerſio materiæ fluentis. | |
| aucta, vt ægri iacentes | | 11, b 71, b | |
| ſuffocentur. | 6, b | Præparatio pituitæ. | 68 |
| in Orthopnoea ab humore | | Syrupus. | 56 |
| crasso & lento ſiccantia | | Tabellæ, vnguenta, ſacculus, | |
| ſunt incommoda. | 29 | fomenta, ſinapiſmi, cau- | |
| venæ ſectio in Orthopnoea. | | teria. | 93, b |
| 79, b | | Ab acetatis eſt cauendum. | |
| | | 68, b | |
| | | Repellentia non conueniunt. | |
| | | 85, b | |

Oua.

- | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Oui alteratio. | 37 | Thermæ ſunt efficaces. | 2, b |
| Oua dura. | 34, b | Valentiora caute adhibean- | |
| Liquor albus maxime ſedat | | tur. | ibi. |
| dolores oculorum. | 105, 113, b | Viſtus. | 55 |

Oximel.

- | | | | |
|-----------------------------|----|----------------------------|-------|
| Scylliticum. | 56 | venæ ſectio. | 79, b |
| Præparatio oxymellitidis ad | | Reliquiarum diſſipatio. | 83, b |
| membra determinata. | 68 | Spasmi & paralyſis curatio | |
| | | in quo conueniant. | 152 |

P

Panacia Hora.

- | | | | |
|------------------------|-------|--------------------------|------|
| mire conducit ad omnem | | Paraplegia. | |
| malignitatem ulcerum. | 11, b | ſequitur Apoplexiam & in | |
| | | eam ſæpe recurrit. | 7, b |

Panata.

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| est cibarium frigidum & hu- | | Parotides. | |
| midum. | 56, b | Phlegmone in parotidibus | |
| | | qualia medicamenta po- | |
| | | ſtulet. | 19, 20, b |

Papauer.

- | | | | |
|--------------------------|----|--------------|-------|
| Succus papaueris cum dā- | | Reuulſio. | 51 |
| no refrigerat. | 92 | venæ ſectio. | 77, b |

Paralyſis.

- | | | | |
|-----------|------|-------------------------------|--|
| quid ſit. | 7, b | Paroxiſmus vide accēſſio | |
| | | Pars. | |
| | | Partium ſitus, dignitas, ſen- | |

INDEX.

Sus,cauitas,formatio, va- ria constitutio.	117	<i>Pedes.</i>	
viæ connexio.	19	Fluxiones pedum.	23
Partes humani corporis sūt duplices.	87, b	<i>Peplum.</i>	
Partes rariores mitiora, dē- sa validiora remedia po- stulant.	17, b	Pleuriticis vitandum.	145
<i>Partus.</i>		<i>Periodus.</i>	
In difficultate partus nō fir- mentio missionis sangui- nis.	81	quid sit.	35
<i>Tassum.</i>		Incrementa periodorū mō- strant constitutionē mor- borum.	35, b
In passo est viscositas apta ad remorandum mate- riam in transiru, quæ ad- æquat asperitatem.	28	<i>Peripneumonia.</i>	
<i>Pectus.</i>		Præparatio materiæ in peri- pneumonia.	69, b
Astringentia non conue- niunt pectori.	26, b	Auersio.	51, b
Corroboratio.	138	Cutatio per topica.	104
Preservantia pectus a destil- latione.	113	<i>Peritoneum.</i>	
Inflammatiō.	57	Conuenientia & differentia vinculi, quo hepar phre- nibus coniungitur a pe- ritoneo.	23
Deriuatio in inflammatiō- ne pectoris.	67, b	<i>Pessi.</i>	
in inflammatione pectoris nō repellimus.	65, b	collo vteri inuenti sunt.	18
Intemperies calida & frigi- da.	91	<i>Phagedana.</i>	
In intemperie calida & fri- gida non repellimus.	65, b	Est vlcus solam cutem exe- dens.	3
in obstructione pectoris nō repellimus.	ibid.	<i>Phasiani.</i>	
Purgatio pectoris a pituita.	70, b	Carophasianorum.	38, b
Prouocantia tussim, eua- cuant pectus.	157, b	<i>Philo.</i>	
vnitastolutio ī pectore.	100	Antidot ^o Philonis. 21, 109, b 112, b	
		<i>Phlebotomia.</i>	
		est euacuatio vniuersalis.	58, 63
		Phlebotomiæ species com- positæ.	64
		veterum obiecta aduersus phlebotomiā ridicula.	66, b
		Purgatio debet præcedere phlebotomiam.	143
		Differentia particularis pur- gatio-	

INDEX.

gationis & phlebotomię.	Auersio.	54.b
70, b	Deriuatio simplex.	67, b
crassa materia phlebotomię	149, b	
prius preparanda est. 157, b	Euacuatio.	68. b
Requisita phlebotomię re-	Indicationes vnde sumen-	
cte instituendę. 63, b	dę.	148, b
Tres scopi principales 64, b	Indicationes a loco affecto	
Phlebotomia diuerſa, e-	149	
uacuatia, deriuatiua, e-	a materia fluxa & fluente.	
uentatiua. 63, b 64	148, b	
particularis. 2, b	a temporibus morbi. 149	
Cōmoda particularis phle-	a virtute. 149, b	
botomię. 48	Indicationes miſſionis ſan-	
Tres modi particularis phle-	guinis. 150	
botomię. 82	De miſſione ſanguinis con-	
Simplex. 6, b	trouertia. 77	
quando phlebotomia ſit	ſanguinis miſſio conuenit.	
protrahēda vſque ad ſyn-	149, b	
copin. ibi.	Localia tātum in principio	
<i>Phlegmon.</i>	conueniunt. 150, b	
eryſipelatodes. 14, b	Tempus & modus applicā-	
Tempora phlegmones. ibi.	di localia. ibid.	
Sanguis qualis in phlegme-	Cum materia non dat in-	
ne. 48	ducias, non vrimur ſyrupis	
Omnis phlegmon curatur	preparantibus. 68, b	
peruacuantia. 18, b	Purgatio. 76	
Phlegmon in parotidib. 19	Repellētia an adhibēda. 66	
<i>Phrenitis.</i>	Reliquiarum diſſipatio. 84	
quid ſit. 148, b	Reuulſio. 51, b 149, b	
alia eſt per eſſentiam, alia	Suppuratio. 82, b	
per conſenſum. 149	Symptomatū curatio. 150, b	
Bilioſa. 53, b	valida medicamenta fugiē-	
ab ambulatione ī ſole. 148, b	da ſunt viciuſ. 68, b 150	
ex plenitudine. ibid.	<i>Phthiſis vide Tabes.</i>	
Lethalis. 149	<i>Pica.</i>	
dolor in phrenitide. 150, b	gravidarum. 72, b	
Curatio. 54, 104, b 148, b	cum materia. 108	
Acetum in pharmacis ad	humor in pica vomitu va-	
phreneticos. 20	cuandus eſt. 72	

Ecc 4

I N D E X.

<i>Picrocholi.</i>		Salsæ pituitæ euacuatio. 61
poros habent raros, succos		Causa pituitæ superflue. 134
tenuēs & sunt calidi na-		vitia pituitæ. 55
tura. 43		quem victum indicet. 153, b
<i>Pili.</i>		<i>Pituitosi.</i>
Affectus pilorum. 13		Pituitosis non conuenit vi-
Generantia pilos. 28. b 30		ctus tam crassus ac bilio-
<i>Pilula.</i>		sis. 140
In Apoplexia non exhiben-		victus in morbis pituitosis.
tur. 146		137, b
Pilulis vtimur cum a lon-		<i>Pix.</i>
ginquis partibus trahen-		derasis capillis rubificat, &
dum est. 19		mire calfacit. 148
<i>Pisces.</i>		<i>Planta.</i>
Saliti in morbillis. 142		Plantarum nutritio. 21, b
<i>Pituita.</i>		<i>Plantago.</i>
quomodo cognoscendū an		Aqua radicum plantaginīs,
pituita vel bilis præualeat.		refrigerat, siccāt, astringit
140, b		profluuiā sanguinis 66, b
pituita & Melancholia sunt		<i>Plethora.</i>
materiæ associatæ. 146		Plethora non est numeran-
Alteratio pituitæ per ali-		da inter scopos mittendi
mētā & per syrupos. 56, 57		sanguinem. 47
Consequentia pituitā. 152		Cura plethoræ. ibid.
Eductio pituitæ. 59, 61, 62, b		<i>Pleura.</i>
Pituita prius præparanda,		signa pathognomonica pleu-
quam euacuanda est. 153		ræ inflammata. 36.
Euacuantia pituitam. 143, b		<i>Pleuritis.</i>
Euacuatio materiæ pituito-		quomodo dolor oriatur in
sæ in frigida intemperie		pleuritide. 36
cerebri per instrumenta		Curatio. 104
varia. 92. b		Auersio materiæ. 51, b
Incidentia pituitam. 153, b		Deriuatio. 67, b
Pituitæ a capite purgatio.		Helleborus & peplium vi-
70, b		tanda sunt. 145
a cerebro. 156		in initio refrigerandū est 19
a pectore. 70, b		quando fetus conueniat in
Pituitæ & atræ bilis purga-		initio. 84
tio. 62		<i>Materiæ</i>

INDEX.

- Materiæ pleuritidis præparatio. 69, b
Missio sanguinis conuenit pleuritidi. 149
In dextra secamus latus dextram. 50, b
Internæ cubiti sectio. 78, b
sanguis mittitur vsque ad animi deliquium. 64, b
Medicamenta pleuritica. 68
Reliquiarum dissipatio. 84
Reuulsio. 51
Signa pleuritidis. 35, b
sputum promouētia in pleuritide. 71, b
Suppuratio. 84
Pneumonia.
Medicamenta pneumonica. 68
Purgatio in pneumonia. 76
venæ sectio 77
Podagra.
Duæ præcipuæ causæ podagræ. 116
Podagræ a Chiragra & Ischiade distinctio. 5, b
Scopus curandi. 15
cataplasma, vnguent. opiata in podagra. 116
Tophorum curatio. 82
venæ sectio. 79
Podex.
Cauitas podicis. 184
Inflammatiō. 51
vlcera. 18, b 21. 101
Vide anus.
Polychrestæ.
medicamenta multi vsus. 50
Polypodium.
Purgat bilem, pituitam & atram bilem. 62, b
Polypus.
quando sit necessaria venæ sectio. 78, b
Pompholyx.
Lota siccatur sine corrosione. 29
Pori.
Venæ sectio auxiliatur febribus ephemeris a constipatione pororum. 139
Potus.
Aquosi potus differentiæ. 42
quando sit vtendum formæ potionis. 19
Tria indicant potum, Morbus, Virtus & consuetudo. 44
Ars exhibendi potum. 41, b
Roborans potus quintuplex. 42
Preparatio.
Purgationi præmittēda est. 59, b 143
Priapismus.
Causa priapismi. 4, b
Priapismus ex repletionē spiritus crassi & visci. 73, b
Purgatio. 75, b
venæ sectio, 78
Propolis.
attrahit. 11, b
Pruna.
Damasceana. 145
Hispana. ibid.
Ptisana.
quomodo paratur. 57
Ecc 5

INDEX.

Cremor.	33,b	perie pulmonum non re-
Colata.	ibid.	pellimus. 65,b
Hordeacea.	ibid.	Materie ad expulsiōem in
Succus ptisanæ.	33	pulmonibus præparatio.
Ptisana satisfacit morbis a-	69	
cutis.	150	a materia continente pul-
in febrib. colliquatiuis. 141,b		monis purgatio. 76
Confectio ptisanæ in diar-		Roboratio pulmonis in
rhœa.	126	phthisi. 69
<i>Pudenda.</i>		vlcus pulmonis. 100
Purgatio in affectibus pu-		Curatio vlceris. 100,b
dendorum.	75,b	Mel in vlceribus pulmonis.
vlcera pudendorum.	21	125
<i>Pueri.</i>		vlcus cum febre. 100,b
non egent detractiōe san-		Exsiccatio vlceris. 110,b
guinis.	48,b	vlcera pulmonis difficilime
<i>Pulmo.</i>		sanantur. 96,b
Pulmonis habitus, sensus,		vnitatis in pulmone solu-
situs temperatura, vsus.		tio. 19
25,b		<i>Pulueres.</i>
Nutritio.	26	Correctio puluerum in Ca-
Affectus pulmonis.	10,b	tarrho. 157,b
Astringentia pulmoni non		<i>Purgatio</i>
conueniunt.	26,b	Est euacuatio particularis.
an pulmo laboret inopia a-		58,
limenti.	26	vitiosum tantum eiicit. 57,b
Pulmo contra quam aliæ		Circumstantiæ purgationū.
partes habet venam cras-		143
sam & arteriam tenuem.		Circumstantiæ variantes ar-
ibid.		tem purgandi. 60
Inflammatiō.	51,104	Differentiæ septem. 60,b
Deriuatiō in inflammatiō-		Duo præcipua genera. 60
ne	67,b	Requisita purgationis recte
suppuratiō inflammatiōis		instituendæ. 58,1+2,b
pulmonum.	104	Concocta purgari debent.
Intemperies calida aut fri-		58,b
gida.	91,b	Dies purgandi. 59
In calida aut frigida intem-		Humores qui purgandi. 49,b
		Tres ordines purgantiū. 58,b
		Parti-

INDEX.

Particularis. 2, b 66, b 70, b
Ars recte & conuenienter
instituendi purgationem
particularem. 71

Materiæ purgationis particu-
laris. 70, b

Purgationis particularis &
vniuersalis differētiæ. ibi.

Pblebotoмиæ & purgatio-
nis particularis differen-
tiæ. ibid.

In Catarrho purgationi ca-
pitis præmittenda est pur-
gatio totius. 157, b

Purgatio in febribus mix-
tis. 143, b

in iſtericia. 127, b

Purgatio debet Phlebo-
miam præcedere. 64, 143

Præparatio purgationi præ-
mittenda est. 59, b 143

Purgatio materiæ cōtinen-
tis ex diuerſis partib. 74, b

Purgandi quantitas. 143, b

Vnde definita quantitas pe-
tenda. 58, b

Locus purgandi 143, b 59

Quid, quando & quantum
purgandum. 58, 58, b

Tempus. 49 b 59, 143, b

Tempus indicatur a duob.
58, b

Quibus moleſta & quibus
vitanda purgatio. 49, b

Scopi. 49

Validitas aut imbecillitas
purgātis vnde petēda 58, b

ulceribus & vulneribus pur-
gatio vtilis est. 49

Tres purgationes vniuerſa-
les. 60, b

Virtus conſtans aut debilis
variat artem purgādi. 60

Purgantia.

Quomodo purgent purgā-
tia. 58

Tres ſpecies vnum humorē
purgantium. 60

Complicatos humores pur-
gantium quatuor gene-
ra. 60, b

Purgātia non transcendunt
loca ventriculi aut inte-
ſtinorum. 109, b

Totum corpus purgantia.
157, b

In inſlāmatione iecoris ad-
mittūtur purgātia. 101, b

In inſlāmatione ventricu-
li ſunt vitanda. 75

Pus.

Concoctio puris per fomen-
ta, cataplaſmata in inſlam-
matione pulmonum, & c-
ductio. 104, b

Quale lac in pure optimum.
48, b

Mouentia pus. 82, b

Pus vlceris. 3

Qualitas.

Qualitates ſecundæ. 52, b

Affectus oborti penes qua-
litates ſunt multiplices. 52

Quantitas.

Remedii & curationis quā-
titas, elicitur ex quantita-
te affectus. 15

INDEX.

R		in vehementiori dolore a calculo. 80, b
<i>Rarefactio.</i>		
Definitio rarefactionis eiusque declaratio. 33		Purgatio in exulceratione renum. 75, b
Differentia rarefactionis & apertionis. 94		in exulceratione renum abstergentia Topica. 98, b
<i>Ratio.</i>		In Diarrhæa auersio ad renes. 126 b
cū memoria deperdita. 118		Inflammatio renum. 51, 52, 54, 72.
<i>Razes.</i>		Clyster in inflammatione renum. 74, b
Error Razis in dolore capitis. 67. b		in Augmēto inflammationis. 103
<i>Regio.</i>		in Declinatione inflammationis. ibid.
immutat rationem victus. 40		Diuretica non conveniunt in principio inflammationis. 72
<i>Remedia.</i>		Præparatio materiæ. 70
tantum debent esse contraria quantus est recessus. 15		Purgatio. 75, b
Remedium in contrarietate aut par est morbo, aut impar. ibid.		vehementer refrigerantia sunt fugienda. 102, b
Applicatio remedii in eodē gradu fit dupliciter. ibi.		Repellentia. 65, b 66, b
quando remedio æquali aut inæquali uti cōueniat. ibi.		Inflammationis suppuratio. 83
Quatuor summa remediorum genera. 87, b		Cōtrouersia de sectione venæ. 77
Variantur pro cavitae, dignitate, sensu, quib. partes sunt præditæ, situ, viæ lōgitudine partiū. 17, b 18		Reliquiarum in inflammatione controuersia. 84, b
Eadem diuersorum morborum remedia. 106. b		Intemperies calida. 9, b 54, 75, b
<i>Renes.</i>		Obstructio. 52, 55, b
Calculus renum. 28, 29, b 95, 129, b		In Obstructione præparatio. 70
Cōtrouersia de sectione venæ in calculo renū. 80, b		Purgatio. 72
Dolor renum. 23		in Obstructione renum non repellimus. 65, b
Cataplasma, cucurbitulæ		Reliquiarū dissipatio in obstructione renum. 84, b
		Pro.

INDEX.

Profluuium sanguinis e re- nibus. 9,80	non conueniat repulsio. 65,b
Purgatio renum a pituita. 71,71,b	Repulsionis scopus. 144,b
Loca per quæ expurgantur. 24	<i>Repletio.</i>
Aqua tepida bene vacuat re- nes excrementis. 129,b	Indicationes missionis san- guinis ex repletionē. 143
Quando non sint purgandi per viinas. 59,b	<i>Resoluentia.</i>
Regio renum. 31	sine caliditate. 145
Sensus, situs, temperatura vius. 24,27	<i>Respiratio.</i>
Soluta viinas. 58	abolita. 6,b
<i>Repellentia.</i>	difficultas respirandi. 118,95,b
quando & quibus morbis conueniant. 65,b	<i>Retentio.</i>
quando noceant. 66	Symptomata retentionis. 108
Galenus improbat exterius repellentia in Catarrho. 156,b	<i>Reuulsio.</i>
an omnibus fluxionibus cō- ueniant. 155	Per missionē sanguinis. 48
in dolore oculorum ab in- flammatione, Galenus re- pulsoriis admiscet lenien- tia. 113	<i>Rhabarbarum.</i>
in dolore oculorum ab in- flammatione repulsoria debent moderate astrin- gere. ibid.	in acutis est suspectum. 150
<i>Repulsio.</i>	quomodo sit terendum ad mouendam aluum & v- rinam. 29
Definitio repulsionis & eius explicatio. 65,b	crassum in mouēda aluo. 19
Attractionis & repulsionis differentia. 85	Rhabarbari varia exhibitio in eductione bilis. 60
Auersionis & repulsionis differentia. 50,b	Pituitam purgat secunda- rio. 62
quibus morbis conueniat, &	Febrem soluit. 6,b
	<i>Risus.</i>
	Sardonius. 7
	<i>Rosa.</i>
	Oleum rosaceum. 144,b
	<i>Ruptio.</i>
	Causæ ruptionis vasorum. 8,b
	Dux obseruationes. 100
	S
	<i>Saccharum rosatum.</i>
	Phthisici curati saccharo ro- fato. 156,b

INDEX.

- Salsa salita.*
 an salsa conueniant in febris.
 bus. 141
 Pisces saliti in morbillis.
 142.b
- Sanguis.*
 Biliosus parcius est vacuan-
 dus. 155.b
 in Ægri tudinibus sanguinis
 alimenta composita. 56.b
 Alteratio sanguinis per e-
 lementa. ibid.
 Medicina sanans concretum
 sanguinem. 125
 Eiectio sanguinis a capite.
 125
 Ex faucibus. 125
 Ex gurgulione. ibid.
 per tussim. 51
 ex pulmone, thorace, arte-
 ria, larynge, ex locis circa
 stomachum, aluum aut
 aliquod intestinum. 21
 in Eruptione sanguinis vi-
 num. 120.b
 venæ sectio in fluore sangui-
 nis a capite. 80
 Quando astringentia & fri-
 gida adhibeantur in fluo-
 re sanguinis. 124.b
 Sanguis grumescens in ven-
 triculo. ibid.
 Mictus sanguinis criticus ob
 redundantiam. 126.b
 Biliosus, aquosus, a faculta-
 te secretice imbecilla, a
 vase lacerato, a casu. 127
*Missio sanguinis, vide vena
 sectio.*
- Sanguis peccat bifaria. 46.b
 Sanguis nō expurgatur me-
 dicamentis catharticiis.
 60
 Stupescientia in profluio
 sanguinis. 124, 125.b
 venæ sectio. 80
 Sputum sanguinis. 8, b 54, b
 100.
 Sistentia sanguinem a tota
 substantia. 124
 Tenuis sanguis non est co-
 piose vacuandus. 155, b
 vitia sanguinis. 54
 venæ sectio in vomitionib.
 sanguinis. 80
 viæ educendi crassum & te-
 nuem sanguinem. 59
- Sani.*
 Purgatio sanis molesta est
 49, b
- Sanies.*
 vlceris. 3.
- Sapo.*
 caput roborans. 157, b
- Sarcites.*
 ex intemperie frigida. 4
- Sarcotica.*
 Renuitritio fit per sarcotica.
 125, b
 Sarcotica in vase amplo aut
 paruo eroso. 99, b
- Scabies.*
 ab intemperie calida & sicca
 hepatis. 90
 Salsedo medicamentis addi-
 ta efficacissime exsiccatur
 & extergit scabiem. 29
- Scam-*

INDEX.

- Scammonium.*
Bilem primo ducit, pituitam secundario. 62
Dosis. 61
Vfus, cum a longiniori-
bus partibus est trahen-
dum. ibid.
- Scarificatio.*
Quomodo cum venę fec-
tione conueniat. 81
- Scirrhus.*
Hepatis. 18, b
ex inflammatione hepatis. 102
Emollio in scirrho Epa-
tis. 82
Scirrhus pendens a materia
pituitosa indurata & pi-
tuita tenui ac viscosa. 12.
Emollientia scirrhum a pi-
tuitosa materia. 82
vehementer calida & siccan-
tia vitanda. 81, b
Lienis. 102, b
Scirrhusa ventriculi inflam-
matio. 101, b
- Scrophula.*
Cautela in aduisione scro-
phularum. 87
- Scylla.*
in suppressis menstribus. 94, b
- Sebesten.*
Purgat bilem. 61
- Secundina.*
Relicta. 10. b 130
- In secundina relictā non fit
mentio missionis sangui-
nis. 81
- Sedes.*
Tres corporis sedes. 58, b
- Selenion.*
in vlceribus. 11, b
- Seminalia crassa.*
Intemperies calida & humi-
da vasorum seminalium. 91
- Semperuina.*
Succus semperuina repellit. 65, b
- Sena.*
Purgat bilem, pituitam &
atram bilem. 62, b
varia senę præparatio. 61, b
- Senes.*
Non facile habent febres a-
cutas. 39
Facile ferunt ieiunium. 39, b
Primum senium. ibi.
- Sensus.*
Acrior mitiora, obtusior va-
lentiora fert remedia. 18, b
Communis. 5, b
Amissio sensus & motus. 68
Interiorum sensuum vitia. 117, b
Sensus princeps. 5, b
Symptomata animę sensi-
tiuę. 111.
- Serpen.*
Exuuie serpentis in dolore
dentium. 114

I N D E X.

<i>Serum.</i>		Sinapismi a dropace differ-	
Confert morbis melanco-		rentia.	85, b
licis.	62	in Apoplexia.	148
		in spasmō.	154
<i>Siccitas.</i>		<i>Sinus.</i>	
nimia siccitas inane potius		Sinibus liquida cōueniunt.	
quam solidum efficit cū		18, 19, b	
nimis exasperat, & pro-		sinus puri aut sordidi vlce-	
prium humorem mem-		rum.	11
brorum exhaurit.	53	<i>Sitis.</i>	
<i>Siccus.</i>		Rx bile.	72. b 73
signa affectus sicci.	142	a causa calida & sicca.	74, b
<i>Signa.</i>		107	
Agnostica, critica, diagno-		a causa calida & humida cū	
stica, prognostica, patho-		febre.	107, b
gnomonica, post appa-		in febribus.	56, 137, 142
rentia.	36	Immoderata sitis a diuersis	
<i>Simplicia.</i>		causis.	3, b 142
Omnia simplicia sunt com-		in phrenesi.	142
posita.	62	in siti cum validissima sicci-	
Medicamenta simplicia pos-		rate cibus disconuenit.	
sunt purgare humores cō-		ibid.	
plicatos.	ibid.	In immoderata siti non fit	
<i>Singultus.</i>		mentio missionis sangui-	
Causa singultus.	4	nis.	78
ex inanitione.	108. b	<i>Solatrium.</i>	
ex intemperie calida, cum		Succus solatri ad repellens	
humoribus acribus.	ibi.	dū est efficacissimus.	65, b
ex intemperie frigida cum		<i>Somnus.</i>	
materia.	ibi.	Causa somni non naturalis.	
a repletionē.	73, 73, b	5, b	
<i>Sinapismus.</i>		Conciliantia somnum.	55, b
Actio sinapismi.	85	Conciliantia somnum in	
Causa efficiens.	85, b	phrenitide.	104, b
Confectionis motus.	85, b	<i>Sordes.</i>	
86		Crassitudo sordium.	29
		Discretio	

I N D E X.

Discretio sordium a sanie. 3
 Discretio sordiū ab acrimedimento & propria ratione vlceris excitatū. 11.b
 sordities vnitatem impedit. 96.

Spasmus.

est morbus matæ complexionis & compositionis. 151.b

Species spasmi. 7

Cinicus siue canina conuulsio. 7.b

Natura spasmi. 152.b

Curatio. 150.b

Dolor in spasmo. 112.b 152.b 153

Continentis causæ curatio. 154

Curatio in quo cum paraly-
 si conueniat. 152

in spasmo ex repletionē. 118.b 152.b

in spasmo sanguineo venæ
 sectio & causæ coniunctæ
 deriuatio. 151.b

in spasmo calidiora & sic-
 ciora sunt vitanda. ibid.

Cruda aliquando vacuan-
 tur in spasmo. 151, 153

Dropacismi. 85.b

Emollientia sunt præmit-
 tenda incidentibus. 152.b

Exemplum patientis spas-
 mum. 152.b

Fomenta. 151.b

Forma spasmi. 152.b

Imbecillitas post spasnum. 154

Indicationes a causis intrin-
 secis & extrinsecis. 151.b

a loco affecto. 152

a materia in spasmo bilioso, 151, 152.b

ab essentia morbi. 151

a termino, motu, victu, sym-
 ptomatis. 151.b

a virtute. 152.b

syrupus in spasmo. 56

Curatio symptomatū. 152.b

Reliquiarum dissipatio. 83.b

venæ sectio in bilioso non

conuenit. 152.b

victus ratio. 153

vigiliæ. ibid.

vinum. 153.b

Spermatice vasa.

Calida & humida intempe-
 ries vasorum spermatico-
 rum. 91

Sphacelus.

quid sit. 3.b

Spiritus.

Animalem spiritum trans-
 mittit cerebrum, cor vi-
 talem. 25.b

Animalis spiritus generatio. ibid.

In dissolutione spirituum non
 conuenit vinum calidū. 120.b

Generatio spirituum in A-
 poplexia. 148

in febre pestilenti spirituum

F ff

INDEX.

- generatio necessaria est. ab intemperie sicca, humi-
da, calida, frigida. *ibid.*
141.
- Nutritio spirituum. 148 *Sternutamenta.*
Aer nutrit spiritus. 31, b differunt ab errhinis. 72
Odores boni nutriunt & in-
staurant. 54, b *Stiptica.*
Lumen & calor spiritus re-
soluunt. 54, b cum modice aperientibus
Suffocatio spirituum ex flu- & tergentibus. 54
xione calidorum humo-
rum, 122 *Stomachus.*
ex pituita suffocatio. 147 Odorata stomachum corro-
Spodium. borant graueolentia sub-
Trochisci de Spodio. 126, b uertunt. 30, b
Sputum. Medicamenta stomachi a.
Causæ cruenti sputi. 8, b 68
sputum cruentum ex gingi-
uis. 124, b stomachicum optimū. 106
ex instrumentis spiritus ra-
tione refrigerationis. 125 Phlegmon stomachi. 18, b
ex reperatione aut ruptione
vasorum. 124, b 125 syrupi stomachici calidi. 88
per vomitum. 124, b voluulosa stomachi disposi-
Narcotica fugimus. 19, b tio. 30, 30, b
Promouentia sputum. 69, 29
71, b *Strabismus.*
Status. Est conuulsio oculi. 7
Status morbi requirit diæ-
tam tenuissimam. 37, b *Stranguria.*
Stercus. qualis affectus, eiusque cau-
Emollientia duritiem ster-
coris. 73 sæ. 9, b
Sterilitas. ex acrimonia. 129, b
est symptoma generationis
abolitæ. 4, b ex causa frigida. *ibid.*
ab angustia oris vteri. 110, b in dolore vehementi ex strā-
a rumia apertione oris vte-
ri. 111 guria. 116, b
Medicamenta valentia. 117
Stultitia.
Stultitiæ seu fatuitatis cau-
sa. 6
Stupefacientia.
non citra damnum refrige-
rant. 20
quid agendum a stupefa-
cientibus in arthritide.
116, b

Sedant

INDEX.

- Sedant dolores. 81, b
in dolore capitis. 146
in dysenteria sunt fugienda. 97, b
in Ophthalmia sunt fugienda. 105, 113, b
quando Galenus ex beat in profluio sanguinis, 125, b
Stupor.
est imperfecta paralytis. 111, b
Causa. 5
Curatio. 111, b
Subiectum.
affectuum præter naturam. 1, b
Suffocatio.
Spirituum & caloris, ab humoribus calidis fluentibus ad ventriculum. 122
Suffusio.
Incipiens. 111
Auerfiones in suffusione. 52
Reliquiarum dissipatio. 84, b
Venæ sectio. 77, b
Nulla caro.
nocet imbecillo ventriculo, & in syncope. 147, b
Suppressio.
Definitio & declaratio. 122
Causæ. 129
Suppositoria vide Balani.
Suppuratio.
Definitio & explicatio. 82, b
Surditas.
Causa surditatis. 4, b
Curatio. 111
Symptoma.
est vitium functionum & excrementorum. 1, b
Duplex. 3, b
Symptomatum nulla est propria curatio. 13, 50
Symptomata interdum curam ad se trahunt, 14, 50, 107, 151
Consideratio symptomatum in febribus. 137
Indicationes sumtæ a symptomatis. 136, b 141, b
In quibusdam symptomatis non fit mentio venæ sectionis. 78
Victus mutatio a quibusdā symptomatis. 141, b
Synciput.
facile pharmacorum & calidorum & frigidorum vim intro distribuit. 20
Os syncipitis. 19
Syncope.
qualis morbus eiusque causæ. 8
Duæ primæ causæ. 120
In omni syncope cordi prospiciendum est, ibid.
Fotus, odoramenta, Epithemata prospiciētia cordi. 121
Cibus, sacculi, vinum. ibid.
Euacuationes quomodo sint instituendæ. 121
Frictiones. ibid.
Syncope ex bile. 57
ex dolore. 31
Ex fluxione calidorum humorum ad ventriculum. 122

INDEX.

Balneu aquæ dulcis in syn-	Renulſio.	91
copæ a fluxione ventricu-	Roboratio pulmonis.	69
li.	ex Hæſtica.	435, b
ex inanitione & reſolutio-	Lactentia præſtantius.	110
ne.	Tabes ex vlcere pulmonis	
Differentia ſynopes ex re-	difficilime ſanatur.	110
pletione & ſuffocatione.	Tuſſis in tabe.	110, b
121	Tabidi curati ſaccharo ro-	
ex redundantia humorum	ſato.	156, b
in ventriculo.	ibid.	
ex ſuffocatione ſpirituum.	laſus.	3
121, b	<i>Tamarindus.</i>	
Caro ſuilla nocet in ſynco-	Purgat bilem.	61
pe.	<i>Telephia.</i>	
<i>Syrupi.</i>	ſunt vlcera quæ ſi cicatrice	
Abſtergentes in Apoplexia.	tenui interdum obdu-	
147, b	cantur mox diſrupta vl-	
Syrupus acetofus ſimplex	cus renouant.	3
valet in materia tenui, ca-	<i>Temperatura.</i>	
lida, craſſa & glutinoſa.	monſtrat conſtitutionem	
56	morbi.	39, b
Bifantinus.	ibid.	
Acetofitatis citri.	ibid.	
de Epithymo.	ibid.	
de fumo terræ.	ibid.	
incidentes in Apoplexia.		
147, b		
pectorales.	68, b	
de pomis.	56	
roſatus ſolutius.	61	
de ſtœchade.	56	
ſtomachici calidi.	88, b	
violatus compoſitus cum		
nucibus.	156, b	
T		
<i>Tabes.</i>		
Cauteria quando ſint inſti-	conſuuntur cum periculo.	
tuenda in tabe.	78, 110, b	20.
		<i>Tenſio.</i>

INDEX.

- | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| <i>Tensio.</i> | | <i>Tonsilla.</i> | |
| Apertio tensiones tollit. 112 | | Inflammatio. 105, b | |
| <i>Tepida.</i> | | Repellentia in inflamma- | |
| dissoluunt firmitudinē ven- | | tratione tonsillarum. 66, b | |
| triculi. 89 | | quæ vena sit secanda. 77, b | |
| <i>Terebinthina.</i> | | <i>Tophi.</i> | |
| deterget, discutit, conco- | | Curatio tophorum in po- | |
| quit. 11 b | | dagricis. 82 | |
| quando Galenus caueat in | | <i>Topica.</i> | |
| affectibus neruorū. 152, b | | in dolore capitis ante eua- | |
| <i>Tergentia.</i> | | cuationem non sunt ap- | |
| in inflammatione hepatis. | | plicanda. 146 | |
| 66, b | | in principio tantum phreni- | |
| <i>Terra Ampelite.</i> | | tidis conueniunt. 150, b | |
| Siccat, digerit. 11, b | | <i>Torrefactio.</i> | |
| <i>Tetanus.</i> | | medicamentorum. 29, b | |
| est species spasmi. 7 | | <i>Torta.</i> | |
| <i>Thapsia.</i> | | in affectibus pituitosis. 57 | |
| Correctio Thapsiæ in pro- | | <i>Totum.</i> | |
| ducendis pilis. 30 | | Corroboratio totius. 158 | |
| <i>Theriaca.</i> | | <i>Tremor cordis.</i> | |
| in Apoplexia. 148 | | Causa tremoris. 6, b | |
| Exsiccat vlcus pulmonis. | | Syrupus in tremore. 56 | |
| 100, b | | <i>Tritura.</i> | |
| <i>Thorax.</i> | | medicamentorum. 19 | |
| Expurgatio thoracis. 71, b | | <i>Trochisci.</i> | |
| Frigida non sunt applican- | | albi, Rhazis. 113 | |
| da thoraci. 120, b | | <i>Tumor.</i> | |
| suppurantia in inflammata | | præter naturam. 14 | |
| membrana thoracis. 104 | | Curatio tumoris duri in lie- | |
| Mel in vlceribus thoracis. | | ne. 82 | |
| 125 | | <i>Tussis.</i> | |
| <i>Thus.</i> | | Causa tussis. 6, b | |
| est substantia crassiore & em- | | Tussis aspera & insomnis. | |
| plastica. 28 | | 128 | |
| coquit & suppurat. 11. 11. b | | ab asperitate. 118, b | |
| Collyrium ex thure. 101 | | ab intemperie calida cū ma- | |
| <i>Thymus.</i> | | tena. 118, b | |
| ducit pituitam. 61 | | | |

INDEX.

- ab inæquali intemperie & cohibitione spiritus. 118, b
 ab intemperie frigida cum materia. 118, b
 a frigida intemperie organorum respirationis 91, b
 a frigida pectoris aut pulmonum intemperie. 55
 a materia calida, aut frigida. 51, b 71, b 68, b
 Tussis in febribus. 137, b
 Prouocantia tussim euacuât pectus. 157, b
 In tussi ex obstructione viorum spiritus cataplasma, vnguentum. 95, b
 Reliquarum dissipatio. 84
 Tussis in tabe. 110, b
 victus in tussi. 54
 Tussis & vox vitiosa. 12
- Tympanites.*
 quale symptoma. 4
 faccelli discutientes flatus, cataplasma, cucurbitulæ. 115
 victus. 55, b
- V
- Vacca.*
 sterus vaccinum vtiliter admouetur in dolore colico. 115
- Vacuatio.*
 quid præstet. 70
 Duo vacuandi genera. 57, b
 Anginæ dupliciter confert. 103, b
 quando sit instituenda in
- syncope. 128
Vide purgatio.
Variola.
 Morbillorum & variolarum differentia. 142, b
 Victus in variolis. ibi.
- Vasa.*
 Consensus vasorum in indicatione a duobus potest impediri. 59
 Exspuitio cruenta ab exsione, refectione aut ruptura vasorum. 125
 qua ratione calida & tenuium partium conueniant in refectione vasorum. ibid.
 Spermaticorum vasorū intemperies calida & humida. 91
- Vena.*
 Cava. 46, b
 in ruptura venarum duæ obseruationes. 110
- Vegetatiua.*
 Symptomata animæ vegetatiuæ. 107
- Vena sectio.*
 Circumstantiæ sectionis venæ. 48, b 143
 venæ sectio non est perpetuo facienda e directo lateris. 78, b
 venæ sectio in excrementis mutatis. 80
- Auxi-

INDEX.

Auxiliatur febribus ephemeris & syncho nō putridæ. 139

Indicationes venæ sectionis in phrenitide. 150

Indicationes ex repletionē. 143

Loci determinati venæ sectionis in quocunque affectu corporis humani. 48, b 76

Venæ sectio utilis est in omnibus magnis obstructionibus. 95

Partitionis utilitas. 48

Purgationem debet præcedere. 49

Quantitas. 47, 47, b

Requisita. 143

quæ venæ sectionem non ferant. 47, b

in Symptomatibus. 77, b

in quibus Symptomatibus non fiat mentio sectionis venæ. 78, 78, b

quomodo veteres eam impugnavant. 46, b

viæ educendi crassum & tenuem sanguinem. 59

Venenata.

de convulsione ex ictu venenatorum animalium. 119

Venter.

Voluolosæ dispositiones venteris. 30, b

Vide *Alnus*.

Ventriculus.

Affectus ventriculi. 21

Calefacientia ventriculū. 29

Costio ventriculi diminuta. 72, b

ventriculus comparatus ad peritos præparandi triticum. 21, b

Connexio. 12

Consensus cum cerebro. ibi.

Corroboratio. 121, b 155, 158

Cruditatis causa. 4

in Dolo ventriculi an conueniant anodyna topica stupefacientia. 114, b

Dolor ex crassis & frigidis succis. ibi.

ex flatibus. ibi.

quatuor facultates ventriculi, attractrix, retentrix, expultrix, alteratrix. 21, b

Tepida dissolunt firmitudinem ventriculi. 89

ventriculus frigidus & icur calidius. 13, b

ventriculus frigidus & laxus. 89

quæ conueniant nimis refrigerato ventriculo. ibi.

Frigida non sunt applicanda ventriculo. 88, 120, b

Imbecillitas. 51, b 55, b

Materiæ præparatio in imbecillo ventriculo. 69, b

Cato suilla nocet imbecillo ventriculo. 147

Inflammatiō ventriculi. 52, 54, 56

Fff 4

I N D E X.

in inflammatione astrin-		Nocturnæ venercorum i-	
gentia Epithemata, vn-		magines.	29
guenta.	101, b	<i>Vermes.</i>	
Purgantia sunt fugienda.	75	vlceris.	3
Repellētia adhibentur.	65, b	<i>Vertigo.</i>	
66.		Est deprauatio sensus & mo-	
Suppuratio.	82, b	tus.	7, b
venæ sectio.	76	Causa vertiginis.	ibid.
Scirrhusa ventriculi inflam-		Alia vertigo est per consen-	
matio.	101, b	sum, alia per essentiam ce-	
Inflatio ventriculi.	72, b	rebri.	119, b
73, b 94		Vertigo vitio capitis obor-	
Intemperies calida, 54, 69, b		ta.	57
88		Arteriarum sectio supra au-	
Frigida & humida intem-		res.	79, b 119, b
peries.	88, b	Cucurbitulæ, apophlegma-	
Frigida & humida cum ex-		tismi, gargarismata, suf-	
coriatione Oesophagi.	12	fitus, sternutamenta,	96
Sicca intemperies, 69, b 88, b		Deriuatio.	67
Laxitas a materia frigida.		Purgatio.	76
69, b		venæ sectio.	79, b
Operatio ventriculi.	21, b	in Tenebricosa vertigine cu-	
Purgatio materiæ continē-		curbitulæ, apophlegma-	
tis.	74, b	tismi, gargarismi, suffitus,	
Sanguis grumescens in vē-		sternutamenta.	96
triculo.	124, b	<i>Vesica.</i>	
Sensus.	22	Calculus vesicæ.	3, 130.
situs.	22, b	Colligantia.	24, b
Temperatura,	21, b	Exulceratio.	99
quomodo cognoscatur an		Habitus.	24, b
humores sint impacti in		Purgatio in vitio vesicæ fel-	
tunicis ventriculi.	122	lis.	75, b
Quando ventriculus nō sit		Inflamatio.	51. 103
purgandus vomitu.	59	venę sectio in inflammatio-	
vsus ventriculi.	21, b	ne.	ibid.
<i>Venus.</i>		Intemperies frigida.	90, b
Impotentia rei veneræ.	4, b	Musculi efficacia & officiū.	
110. b		24, b	
			Ischuria

I N D E X.

- Ischuria ex obstructione ve
 sicæ, 95
 Operatio vesicæ. 24, b
 a pituita purgatio. 71, 71, b
 quando sit purgandum per
 urinas. 39, b
 Locus per quem debet ex-
 purgari. 24, b
 Sensus, situs. ibid.
 vlcus depascens. 99
 Serpens. ibi.
 viscera maligna. 18
 Sordida. 99
 In vlceribus vesicæ medica-
 menta crassa & lenta. 29
 Crassis medicamentis in vl-
 ceribus vesicæ admiscen-
 tur diuretica. 27
 Instrumenta quibus medi-
 camenta infunduntur.
 21
 Medicamenta inducentia ci-
 catricem. 99
Victus.
 exquisitissime tenuis acu-
 torum morborum pro-
 prius est. 33, b
 Extrema victus ratio quib.
 conueniat. 34, b
 victus in morbis acutis. 138
 in biliosis, pituitosis & Me-
 lancholicis. 17
 Chronicorum morborum
 victus non ita exquisitus
 proprius. 3, b
 Tres differentia. 137, b
 victus ratio quadrifaria. ibi.
 Totus victus in quinque dif-
 ferentias diuiditur. 18
 Genus a genere affectus,
 quantitas a quantitate in-
 dicatur. 33
 in vigore febrium. 108
 Sola victus ratio non suffi-
 cit ad omnia humorum
 vitia tollenda. 46
 victus pro complicatione
 morbi cum virtute. 40, b
 Prope statum indebite egris
 administratur. 34, b
 Ex subtili victu quædam fe-
 bres læduntur. 140
 Symptomata interdum mu-
 tant victum. 141 b
 victus diuersitas in tempe-
 ramentis. 38
 Tenuis, tenuior, tenuissi-
 mus. 32, 33, 137, b
Vide ars alendi.
Vigilia.
 Causa vigiliarum. 5, b
 In vigiliis ob vehementiam
 doloris non conueniunt
 cibi. 142
 victus qualis conueniat. ibi
 vigilia a febribus. 137, 142
 in phrenitide. 150, b
 a siccitate. 117, b
 in spasmō. 153
Vigor.
 victus in vigore morbi. 137, b
Vinum.
 Hippocrates in acutis ter
 concessit. 44, b
 nocet apoplecticis. 147
 Calidum vinum non con-
 Fff 5

I N D E X.

- uenit in dissolutione spirituum. 120, b
 Porus vini curat appetentiā caninam. 107, b
 Catarrhi principio non cōuenit, prodest expurgato corpore. 157
 in dispnoea conuenit multus vini potus. 118
 an in febre pestilente conueniat. 141, b
 Picrocholis datur in acutis febribus. 143, b
 vinum nigrum. 38, b
 Rubrum. 43
 Quando vinum conueniat in spasma. 153, b
 Electio vini in eruptione sanguinis. 120, b
 in ventriculo debili. ibid.
Viola.
 Oleum violaceum humectat & frigidat in secundo. 150, b
 Adhibetur in vigiliis a phrenitide. ibid.
Vipera.
 Preparatio viperarum. 90
Vires.
 Odores cito reficiunt vires. 120, b
Virtus.
 In curatione morborum reperitur triplex, debilis, fortis & medio modo se habens. 31
 Circumstantiæ annexæ virtuti. ibid.
 Virtus consistit in trib. 144
 aut propter spiritus, aut humores aut solida afficitur. ibid.
 Indicationes a virtute. ibi.
 Regi comparata a Galeno. 31
 quomodo cognoscatur an sufficiat. 39
 parum, multum aut maxime vrgens. 40, b
 Symptomata virtutis vitalis. 120
Visio.
 Imbecillis a multa humiditate. 55, b
 Auersio in visione imbecilli. 52
 Dissipatio reliquiarum in visione imbecilli a largiore humore. 84, b
 visio læsa. 4, b
 Difficilis discretionis, hallucinationis, hebetudinis, lusciositatis, obfuscationis causa. 4, b
Vitrum.
 Combustum & contritum exhibetur in Medicinis emplasticis ad calculum. 28
Vlcus.
 asperæ arteriæ. 29
 Associatum lieni male affecto, aut iecori, aut corpore existente plethorico vel cacoethymico. 17, b
 Cacoethe ægre sanabile. 3. 10, b
 Cauum. 17, 19, b 30, 97
 Contu-

INDEX.

- Contumax, cruentum. 15, b
Curationem impediencia. 125
97, b
Curatione vlcis astringentia valida. 98
Dysentericum profundum. 97
Esepulotica vlcera. 10, b 16
Exsiccatio & tersio omni se-
re vlcis conuenit. 10 b
Intestinorum. 18, b 19
Vlcera depascentia intesti-
na. 98
Intestinorum gracilium, te-
nuium, crassorum & me-
diorum alia atq; alia po-
stulant. 97, b
Iac quale optimum. 98, b
Consideratio vlcis ratio-
ne materiae quae succre-
scit vlcis, quaeque vlcis
causa est. 3
Signa mundati vlcis. 98, b
Oculorum. 19
Oesophagi. 29
Vlcus cum phlegmone. 11
Pudendorum. 21
Pulmonis. 96, b 100, b 125
Purgatio prodest omnibus
vlcis. 49
Signa purgati vlcis. 98, b
Vlcera putrida. 16
Renum ex vitiosis succis a-
cribus & non acris. 98, b
Vlcera fundentia sputu san-
guineum. 51
Sedis. 18, b 21
Vlcus in parte sicca & toto
corpore sicco. 19, b
Mel in vlcis thoracis. 125
Vlcus associatum varici. 21
Vesicae. 18, b 21, 27, b 29
Vlcera citra vesicam consi-
stentia. 21
Vlcera meatus vrinarii. 18, b
Vteri. 18, b 19
Vlcera depascentia vterum. 128
Citra vterum consistentia. 21
Vlcus vteri sordidum. 99, b
Vnio.
Definitio & eius explicatio 96
Vnionis & contiguitatis dif-
ferentia. ibid.
Oseruanda in vnione. 96, b
Quae requirantur ad vnio-
nem. ibid.
Motus impedit vnionem. ibid.
Sordities impedit vnionem, ibid.
Vnionis solutio. 32, b
Solutio vnionis duplex est,
pura & impura. 3
Ars curandi solutionem v-
nionis. 96, b
Voluulus.
a venenoso pharmaca. 109
Voluulosa ventris disposi-
tiones. 30, b
Vomitus.
Causae. 4. 1 9
Vomitus ex bile. 56
Qui vomere non potest, non
est cogendus. 72, b

INDEX.

In difficili vomitu per infe- riora purgandum. <i>ibid.</i>	Exitus. 128, b
Hyeme cauendum est a vo- mitu. 59	Purgatio in exulceratione. 75, b
Auersio quomodo instituē- da in vomitu. 120, b	Frigida non sunt applican- da vtero. 120, b
Quæ vena secanda in vo- mitionibus sanguinis 80	Inflammatiō accedens ad naturā erysipelatis. 103, b
vomitionem sedat vom- itio. 1, b	Inflammatiō cum plenitu- dine. 57
Vnguenta, sacculi in vomitu cum frigida & humida intemperie vetriculi. 88, b	In declinatione inflamma- tionis vteri. <i>ibid.</i>
Vomitio ab humoribus vi- tiosis impactis ventricu- lo. 73	Epithemata, cataplasmata, pessi, adiuuantia suppu- rationem inflammatio- nis vteri. <i>ibid.</i>
Vomitoria. <i>ibi.</i>	In inflammatione cauendū est a prouocatione men- sium. 103
<i>Vox.</i>	Purgatio in inflammatione. 75, b
Amisio vocis post Apople- xiam. 148	Repellentia in inflamma- tione. 65, b 66, b
Harmonia vocis duplici de causa amittitur. 148, b	Controuersia de sectione venæ. 77
<i>Vrgentia.</i>	Inflatio vteri. 94, b 95
vrgentiori primo occurren- dum. 13, b	Intemperies calida. 54, 70, 91
<i>Vrina.</i>	frigida. 70
Compescencia acrimoniam vrinæ. 117	Nutritio. 25
vrinæ incontinentia. 9, 91, 127	Obstructio. 55, b 70, 95
Prouocantia vrinam. 19, 29	Operatio. 25
vrina purulenta. 127	Immodica euacuatio. 120, b
suppressio vrinæ. 9, b 79	Loca per quæ repurgatur. 25
vlcera meatus vrinarii. 18, b	Purgatio vteri a pituita. 71
<i>Vterus.</i>	Purgantia vterum. 72, 75, b
Cauitas vteri. 18	situs. 24, b
Cauteria ad vterum. 87	strangulatio. 80, b
Quibus partib. coalescat. 25	In affectibus vteri venæ se- ctio. 51, 52
Colligantia vteri. 24, b	Victus ratio. 25
	vincula.

INDEX.

- | | |
|--|---|
| Unguentum inducens cicatricem in ulcere vteri. 99, b | humida in secundo, 56, b |
| Ulcera depaſcentia vterum. 99, b 128 | Vua paſſa ſanat dyſenteriam hepaticam. 89 |
| Ulcera cum inflammatione, 99, 99, b | Vua paſſa eſt præſtantiſſima in affectione hepatica. 109, b |
| Ulcus profundum & ſuperficiarium. 99, b | |
| Ulcus ſordidum. ibid. | <i>Vulnus.</i> |
| <i>Vua.</i> | Differentiæ vulnerum. 3 |
| matura eſt calida in primo, | Anguſtum. 20 |
| | ſimplex, a contuſione. 10, b |
| | Purgatio prodeſt omnibus vulneribus. 49 |
| | <i>Vulpes.</i> |
| | Hepar vulpis in ſcirrho hepatis. 102, b |
| | Pulmo in diſpnœa. 118, b |
| | Teſtes in impotentia. 110, b |

FINIS.



